Path. 96d/12 Baumgärtner

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

HANDBUCH
der
speciellen
Krankheits- und Heilungslehre
mit besonderer Rücksicht
auf die
PHYSIOLOGIE
ausgearbeitet
von
Dr. K. H. Baumgärtner,
Grossherzogl. Bad. Hofrath, Professor der Medicin und Director des medicinischen Klinikums und der poliklinischen Anstalt an der Universität zu Freiburg, Medicinalreferenten bei der Grossherzogl. Bad. Regierung des Oberrheinkreises und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

Mit Königl. Würtembergischem Privilegium.

ZWEITER BAND.

STUTTGART UND LEIPZIG,
Verlag von L. F. Rieger und Comp.
WIEN,
in der Karl Gerold'schen Buchhandlung.
1835.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Gedruckt bei F. X. WANGLER
in Freiburg i/B.

VIERTE KRANKHEITS-FAMILIE.

Die Blutflüsse.

(Blutungen, Haemorrhagiae, Haemorrhoeae, Sanguifluxus, Profluvia cruenta.)

Schriftsteller.

Schröder (Diss. Göttingen 1769). — *Steidele* (Wien 1776). — *Krause* (Lpz. 1777 und 1783). — *Vogel* (Stendal 1800, zugleich 3ter Theil seines Handbuchs d. pract. Arzneiw.). — *Chrestien* (Par. 1803). — *Meyer* (Wien 1804 u. 1805, 2 Thl.). — *Spangenberg* (Braunschweig 1805). — *Wallkopf* (Lpz. 1805, 2 Thl.). — *Jones* (aus d. Engl. 1805, von Spangenberg, Hannov. 1813). — *Lordat* (a. d. Franz. 1808, von Wendler, Leipz. 1811). — *Pinel* (a. d. Franz. von Renard und Wittmann, Lpz. 1821). — *Latour* (Paris 1820).

§. 929.

Ein **Blutfluss** ist jede Blutergiessung aus den Gefässen, welche entweder an einem ungewöhnlichen Orte erfolgt, oder so reichlich ist, dass hieraus nachtheilige Folgen entstehen, oder zu einer Zeit eintritt, in welcher dieselbe nicht stattfinden sollte.

§. 930.

Dieser Begriffsbestimmung gemäss ist jede Blutergiessung ein Blutfluss, welche nicht in der monatlichen Reinigung oder der Kindbettreinigung besteht, und es sind auch diese Blutentleerungen die genannte Krankheit, wenn sie zu reichlich sind, und die erstere auch, wenn

sie zu häufig eintritt. — Es sind auch nach dem angegebenen Begriffe sowohl diejenigen Blutergiessungen unter Blutfluss verstanden, in welchen das Blut sich nach Aussen entleert, als auch diejenigen, in welchen es in Höhlen des Körpers oder im Gewebe von Organen liegen bleibt (die Extravasate); ebenso ist jede krankhafte Blutergiessung hierunter begriffen, wenn sie auch nur einige Tropfen Blutes beträgt, ob man gleich gewöhnlich nur eine stärkere Blutung Blutfluss nennt. Ergiesst sich das Blut nur tropfenweise, so wird dieses Bluttröpfeln (Sanguinis stillicidium) genannt, bricht es aber in grosser Menge hervor, so dass der Blutfluss augenblicklich tödten kann, so belegt man Dieses mit dem Namen Blutsturz.*)

§. 931.

Der Blutergiessung gehen oft die Zeichen eines mehr oder weniger heftigen Blutandranges und allgemeiner Gefässreitzung voraus (der active Blutfluss). Der Kranke fühlt Hitze, Druck, Spannung und oft Kitzeln und Klopfen in dem leidenden Theile; dieser Theil zeigt sich erregt und in seinen Verrichtungen mehr oder weniger gestört, die benachbarten äussern Theile sind roth und heiss, der Puls ist voll, hart und häufig, und zuweilen zeigt sich eine allgemeine Erregung durch Unruhe und Schlaflosigkeit des Kranken. Nun ergiesst sich das Blut aus dem leidenden Organe, worauf die genannten Erscheinungen allmählig nachlassen. Das ergossene Blut ist arteriell und das aus der Ader gelassene Blut zeigt in der Regel die Speckhaut. Dauert die Blutung fort, so treten mehr und mehr an die Stelle der verschwundenen, so eben angegebenen Zufälle Erscheinungen von ganz entgegengesetzter Art, wie sie in dem

*) Diejenigen Blutflüsse, welche durch Verwundung hervorgebracht werden, und durch chirurgische Hülfe gestillt werden müssen, werden hier nicht abgehandelt.

passiven Blutflusse stattfinden, doch ist nicht gerade immer der active Blutfluss in einen passiven übergegangen, indem die nächste Ursache der Blutung immer noch die nämliche, wie im Entstehen derselben sein kann, z. B. örtliche Reitzung, die Wirkungen auf den Gesammtorganismus treten aber nun in derselben Art ein, wie bei dem passiven Blutfluss, nämlich die Folgen der Blutleere. Zuweilen kommen auch active Blutflüsse vor, bei welchen keine allgemeine Gefässerregung stattfindet und selbst nicht immer die Zeichen der Congestion deutlich sind, wesswegen es nothwendig ist, um den Character der Blutung zu erkennen, zugleich auf die Ursachen derselben Rücksicht zu nehmen.

§. 932.

In andern Fällen erfolgt die Blutung ohne ein Zeichen der Gefässerregung und der Congestion, und es gehen derselben im Gegentheile zuweilen Krankheitszufälle vorher, die auf einen Zustand allgemeiner Schwäche und Auflösung oder auf örtliche Schwäche und Zerstörung hinweisen, wie die faulicht-scorbutische Dyscrasie, Verschwärungen etc. Hier erfolgt meistens ohne nähere Anzeigen ein Blutfluss; es hat zwar auch das Blut meistens mehr den arteriellen Character, doch ist es hier aber auch oft rein venös, zeigt zuweilen selbst eine dünnflüssige, mehr aufgelöste Beschaffenheit und es treten hier schneller als in dem oben bezeichneten Falle die allgemeinen Zeichen des Blutverlustes ein. Der Kranke wird blass, schwach, die Temperatur vermindert sich und der Puls sinkt, bei Fortdauer der Blutung und starkem Blutverlust wird der Körper noch kälter, der Puls kaum fühlbar und aussetzend, der Kranke wird von einer unüberwindlichen Schläfrigkeit mit vielem Gähnen befallen, er empfindet Schwindel, Ohrensausen, einen stumpfen Kopfschmerz, Kälte im Hinterhaupte und dem Nacken, Neigung zum Erbrechen, zuletzt wird es ihm

schwarz vor den Augen und er wird wiederholt von Ohnmachten befallen, oft verfällt er auch in ein Delirium und wird von heftigen Zuckungen und tonischen Krämpfen ergriffen.

§. 933.

Ergiesst sich das Blut nicht nach Aussen, so kann man auf die Blutung in der Regel nur aus den so eben angegebenen Zufällen der Verblutung schliessen, doch können beinahe dieselben Zufälle durch alle äussern Einwirkungen hervorgebracht werden, welche Ohnmachten erregen und können auch durch verschiedene innere Krankheitszustände veranlasst sein, so z. B. beobachtete ich schon einigemale ein solches plötzliches Sinken der Kräfte, Kaltwerden der Glieder und die meisten übrigen Zeichen der innern Blutung bei Verschwärungen des Darmkanals, ohne dass Blut in den Darmentleerungen war oder bei den Leichenöffnungen vorgefunden wurde; auch kommen ähnliche Zufälle bei seröser Ergiessung in den Herzbeutel vor etc. In solchen Fällen müssen die Krankheitsursachen und der ganze vorhergegangene Krankheitszustand sorgfältig erwogen werden und man muss die Entleerungen des Kranken genau untersuchen, um die Spuren der etwa vorhandenen Blutung aufzufinden; doch ist es demungeachtet nicht immer möglich, mit Sicherheit zu bestimmen, ob eine innere Blutung stattfindet oder nicht.

Zuweilen werden durch die innere Blutung nicht die Zufälle des Blutverlustes hervorgebracht, sondern Störungen anderer Art bewirkt. Ein Beispiel davon giebt die Hirnblutung, welche als Schlagfluss sich darstellt.

§. 934.

Es hat die Blutung oft einen so raschen Verlauf, dass zuweilen dieselbe in wenigen Augenblicken einen tödtlichen Ausgang nimmt, geringere Blutungen können stundenlang andauern und sich auch Wochen und Monate hindurch stets von Neuem wiederholen. Die Blutung

steht still, indem durch die Verminderung der Blutmenge die allgemeine Gefässreitzung und der Blutandrang nach einzelnen Theilen vermindert wird, die Arterien und auch das Organgewebe sich zusammenziehen und indem sich in den Gefässchen und aussen auf der blutenden Fläche Blutpfröpfe bilden, die dem Austritt des Blutes mechanisch den Weg versperren. Die Blutflüsse hinterlassen eine Neigung des leidenden Organs zur Blutung, ihre öftere Wiederholung hat eine Schwäche in allen Verrichtungen, Abmagerung des Körpers und leicht Wassersucht zur Folge. Den Tod können die Blutungen sehr schnell unter den angegebenen Erscheinungen der Blutleere und auch durch die Folgekrankheiten veranlassen.

§. 935.

Anlage zu Blutflüssen geben grosse Vollblütigkeit, grosse Reitzbarkeit des ganzen Körpers und des Gefässsystems insbesondere, Neigung zu Blutwallungen nach einzelnen Theilen, wesswegen nach den verschiedenen Lebensaltern die Anlage zu einzelnen Arten der Blutungen verschieden ist,[1]) früherhin stattgefundene Blutflüsse aus einem Theile, grosse Aufgedunsenheit und Schlaffheit des Körpers, Schwäche einzelner Organe etc. Auch ist die Neigung zu Blutflüssen zuweilen erblich (die Bluter-Familien).[2])

§. 936.

Gelegenheitsursachen sind alle die Einflüsse, die eine Congestion oder passive Blutüberfüllung veranlassen können, insbesondere starke Körperanstrengungen, erhitzende Getränke, heftige Gemüthsaffecte, unterdrückte Blutflüsse, Hemmung des Blutumlaufes durch angelegte Binden etc. Ferner alle Einwirkungen, die eine Erschlaffung, Zerreissung oder Zerfressung von Gefässen unmit-

1) Vergl. §. 880. — 2) Vergl. *Ricken*, neue Untersuch. in Betreff der erbl. Neigung zu tödtlichen Blutungen. Frankf. a. M. 1829.

telbar bewirken, wie z. B. zu frühe und theilweise Lostrennung des Muterkuchens, die Einflüsse, welche um sich fressende Geschwüre veranlassen etc.

§. 937.

Nächste Ursache der Blutflüsse. Man nimmt gewöhnlich folgende Arten an, auf welchen das Blut aus seinen Gefässen gelangt, 1) Oeffnung und Erweiterung der Mündungen der Gefässenden (Anastomosis), 2) Durchschwitzung des Blutes durch die Gefässhäute (Diapedesis), 3) Trennung durch äussere Gewalt (Diaeresis), 4) Zerreissung durch zu heftigen Andrang des Blutes (Rhexis), 5) Zerfressung durch scharfe Stoffe (Diabrosis) und 6) krankhafte Absonderung[1]) wobei das Blut durch die übermässig vermehrte Gewalt der Fasern, durch die kleinern Gefässe, die sonst für dasselbe nicht offen sind, getrieben werde.

§. 938.

Nach meinen und Anderer mikroskopischen Untersuchungen über die Capillargefässe muss wohl die Annahme von der Anastomose aufgegeben werden, indem keine solche Gefässenden, als hier angenommen werden, aufgefunden werden können und alle Capillargefässe sich in venöse Gefässchen umbiegen, auch stellt sich die Vorstellung von *P. Frank* als unhaltbar dar, indem es in den feinen Gefässen, in welchen die Absonderungen vor sich gehen, so wenig als Gefässenden Fasern giebt, wodurch sich die Gefässe zusammenziehen und das Blut aus den Enden herauspressen könnten. Auch kann ein Austritt von wirklichem Blute aus den Gefässen nicht wohl Absonderung genannt werden, indem unter Absonderung doch nur jene Lebensprozesse verstanden werden können, wodurch gewisse Stoffe aus dem Blute chemisch abgeschieden oder aus demselben bereitet aus-

1) *P. Frank*, Ep. L. V. T. II. pg. 102.

geschieden werden. Eine wahre Absonderung findet dagegen statt, wenn eine Flüssigkeit roth gefärbt ist, aber diese Färbung nicht von wirklichen Blutkügelchen herrührt, wie dieses bei dem pneumonischen Auswurf der Fall zu sein scheint.

Ich kann nur zweierlei Weisen annehmen, auf welchen sich das Blut ergiesst, 1) durch Oeffnung der Gefässe, indem die Gefässwand durch um sich fressende Geschwüre, die Einwirkung ätzender Stoffe oder mechanische Gewalt in der Art zerstört ist, dass sie an einer Stelle ganz fehlt und daher das Blut sich in vollem Strome nach Aussen ergiessen kann, und 2) durch Durchsickern durch das die Gefässwandungen bildende Gewebe. Dieses Durchsickern oder Durchschwitzen kann zwar im gesunden Zustande, obgleich die Capillargefässrinnen keine eigentlichen Gefässhäute haben, nicht statt finden, indem die Blutkügelchen im Vergleich zur Porosität des Gewebes immer noch viel zu grosse Körper sind, um durch dasselbe durchdringen zu können, im kranken Zustande aber kann in Organen mit schwammigem Bau, bei Erschlaffung des Gewebes, starkem Andrang des Blutes, Ueberfüllung und Ausdehnung der Gefässrinnen, wohl zuweilen das die Gefässwandung bildende Gewebe einzelnen Blutkügelchen den Durchgang gestatten.

§. 939.

Die krankhaften Vorgänge, die den Blutergiessungen zum Grunde liegen, sind von verschiedener Art und haben zum Theil den Character der erhöhten, zum Theil den der gesunkenen Lebensthätigkeit, ersteren bei der activen, letzteren bei der passiven Blutung, und zwar spricht sich derselbe theils in den festen Theilen, theils in dem Blute aus. Der activen Blutung kann von Seite der Gefässe zum Grunde liegen: ein heftiger Herzschlag, namentlich bei der Hypertrophia cordis, vielleicht auch zuweilen eine Affection der Arterien, am häufigsten aber

eine erhöhte Einwirkung der Nerven auf das Blut in den Capillargefässen, wodurch der heftigste Blutandrang veranlasst werden kann, und von Seite des Blutes der Orgasmus desselben. Die passive Blutung ist von Seite der Gefässe bedingt durch Erschlaffung oder Zerstörung der Substanz und durch verminderte Einwirkung der Nerven auf das Blut, wodurch passive Blutstockung entsteht, und von Seite des Blutes durch einen wässerigten und aufgelösten Zustand desselben, wie z. B. im Scorbut.

Das Sinken aller Lebensäusserungen, welches dem Blutflusse folgt, erklärt sich daraus, dass das Blut derjenige Lebensfactor ist, aus dessen Wechselwirkung mit den Nerven die meisten Lebenserscheinungen hervorgehen; dass aber vorübergehende Zufälle von Erregung des Nervensystems, nämlich Delirien, Sinnestäuschungen und Krämpfe sich einstellen, scheint darin begründet zu sein, dass durch plötzliche Hinwegnahme eines grossen Theiles des Blutes, derjenige Theil der Nervenkraft nicht gebunden wird, welcher auf die Lebensprozesse im Gefässsystem gewöhnlich verwendet wird, und dass daher dieser auf die Muskeln, die Sinnesorgane und das Gehirn sich überträgt und eine erhöhte Thätigkeit in diesen Theilen veranlasst, bis das Nervenleben im Ganzen schwindet, was bei der unterbrochenen Einwirkung des Blutes auf dasselbe bald geschieht.

§. 940.

Die gewöhnlichern Blutflüsse sind:

Das Nasenbluten. (Haemorrhagia narium, Epistaxis.)

Wagner (Diss. Hal. 1723). — *Riederer* (Diss. Altdorf 1791). — *Acrel* (Diss. Upsal. 1797). — *Heilmann* (Wirceb. 1801). — *Vignes* (Diss. Paris 1808). — *Fournée* (Diss. Par. 1811).

Das Nasenbluten ist die Blutung aus der, das Innere der Nase auskleidenden Schleimhaut, und es gehört also ein Blutausfluss, bei welchem das Blut aus einem andern

Theile, z. B. aus den Lungen ergossen wird und nur durch die Nase ausgestossen wird, nicht zu dieser Art Blutung.

Zuweilen gehen dem Nasenbluten Vorboten vorher, die einen Congestionszustand nach dem Kopfe andeuten, Wüstigkeit des Kopfes, Schwindel, Ohrenklingen, Funken vor den Augen, drückendes Kopfweh, besonders in der Gegend der Stirnhöhlen, starkes Klopfen der Carotiden, starke Röthe des Gesichtes, ein voller und doppelt anschlagender Puls etc., zuweilen hat der Kranke nur das Gefühl von Völle, Trockenheit, Wärme und Jucken in der Nase und es stellt sich wiederholt Niesen ein, sehr häufig jedoch tritt der Blutausfluss ohne alle Voranzeigen ein. Oft fliesst das Blut nur tropfenweise, oft mehr in einem anhaltenden Strome, meistens nur aus *einem* Nasenloche, bis einige wenige Uncen ergossen sind, worauf der Blutfluss unter gleichzeitigem Nachlass der vorhergegangenen Zufälle von selbst aufhört; zuweilen jedoch wird der Blutfluss auch so stark, dass mehrere Pfunde Blut verloren gehen. Oft wiederholt sich auch die Blutergiessung von Zeit zu Zeit, so dass zwar nicht gerade viel Blut auf einmal, aber doch nach und nach eine beträchtliche Menge desselben ausgeleert wird. In solchen Fällen hat das Nasenbluten dieselben nachtheiligen Folgen, wie der zu grosse Blutverlust überhaupt. Fliesst das Blut nicht aus der vordern Nasenöffnung heraus, sondern nach dem Rachen hinab, wo es zuweilen geschluckt wird, so kann es unter Husten oder Erbrechen ausgeleert werden und bei einer oberflächlichen Untersuchung für Bluthusten oder Blutbrechen gehalten werden.

§. 941.

Anlage zum Nasenbluten haben besonders junge Leute bis zum Anfange des Jünglingsalters und vorzüglich solche, die zur Lungenschwindsucht geneigt sind. *Gelegenheitsursachen* sind verschiedene krankhafte Zustände des Körpers,

bei welchen das Nasenbluten häufig als Krise, zuweilen auch nur symptomatisch auftritt, wie Congestionen nach dem Kopfe, Gehirnentzündung, entzündliche und auch faulichte Fieber, Entzündungen in Brust und Unterleibseingeweiden, Anschwellungen der Leber oder der Milz (wo das Blut in der Regel aus dem Nasenloche der Seite fliessen soll, auf welcher das leidende Organ liegt), Würmer etc., ferner Einwirkung der Sonnenhitze, starkes Schneuzen, Niesen, Husten, Schreien, Tragen enger Halsbinden, Contusion der Nase, Nasengeschwüre, Nasenpolypen und die allgemeinen Ursachen der Blutflüsse.

§. 942.

Das **Mundbluten.** (Haemorrhagia oris, Stomatorrhagia.)

R. A. Vogel (Diss. de morb. rarioribus. p. 7.). — *Orlov* (resp. Haller. Diss. Regiom 1781).

Das Mundbluten ist die Blutung, bei welcher das Blut aus irgend einer Stelle der die Mund- und Rachenhöhle auskleidenden Weichtheile sich ergiesst.

Selten gehen dem Mundbluten die Zeichen der Blutcongestion nach dem Kopfe vorher, der Kranke empfindet zuweilen Brennen und Jucken an der wunden Stelle, das Blut fliesst rein, ohne mit Schleim vermischt zu sein, aus, oder es wird in kleiner Menge mit dem Speichel ausgespieen. Eine genaue Untersuchung der Mundhöhle, etwa nach vorhergegangener Ausspülung derselben mit lauem Wasser, giebt in der Regel bald Auskunft über den Ursprung der Blutung, wenn etwa durch Hinabschlingen des Blutes oder Hinabfliessen desselben nach dem Kehlkopfe dasselbe unter Erbrechen oder Husten ausgeleert worden ist oder absichtlich ein Bluthusten oder Blutbrechen nachgeahmt werden sollte; auch dient in solchen Fällen eine genaue Vergleichung der vorhandenen Zufälle mit den jenen bezeichneten Blutflüssen

eigenthümlichen Erscheinungen zur Diagnose. Bei dem Mundbluten wird gewöhnlich nur eine sehr geringe Menge Blut ausgespieen, doch wurden auch schon mehrere Pfunde Blut entleert.

§. 943.

Dem Mundbluten liegen, ausser den allgemeinen *Ursachen* der Blutflüsse, häufig zum Grunde: die bei dem Scorbut stattfindende Entartung des Zahnfleisches, und auch ähnliche leichtere Auflockerungen des Zahnfleisches und Lostrennung desselben von den Zähnen, die Bildung und Zerreissung von Blutaderknoten, Blutblasen, wie sie insbesondere in der Werlhofischen Blutfleckenkrankheit vorkommen, um sich fressende Geschwüre in der Mundhöhle, Beinfrass der Kiefer, Geschwülste und Steine in der Mundhöhle, Ausreissen von Zähnen und andere Verletzungen. Auch soll zuweilen die Unterdrückung der Hämorrhoiden diesen Blutfluss veranlassen. (Haemorrhoides oris.)

§. 944.

Der Bluthusten. (Das Blutspeien, Lungenblutung, Haemoptysis, Haemoptoe, Pneumonorrhagia.)

Boissier de Sauvages (Diss. Montpellier 1757). — *Reichard* (Glogau 1762). — *C. a Linné* (Diss. Upsal. 1764). — *Schröder* (resp. Gramberg. Diss. Goett. 1776). — *Hohnbaum* (über d. Lungenschlagfluss, mit einer Einleitung über den Schlagfluss überhaupt. Erlangen 1817).

Bluthusten wird die Blutausleerung genannt, in welcher das Blut aus den Athmungswegen sich ergiesst, es kommen jedoch seltene Fälle vor, in welchen das Blut nicht ausgeworfen wird, für welche also der Name Bluthusten nicht passend ist und besser die Benennung Blutung in den Respirationswegen gewählt werden kann. Auch ist es für die Therapie nicht unwichtig, in der Benennung der Krankheit schon den Sitz derselben näher bezeichnet zu sehen, und somit würde dieser

Blutfluss in folgende Arten eingetheilt werden können, 1) die Blutung in dem Kehlkopfe und der Luftröhre (Laryngorrhagia et tracheorrhagia), 2) in den Luftröhrenästen (Bronchorrhagia) und 3) die Blutung in dem Lungengewebe (Apoplexia pulmonalis Laennec), es ist jedoch häufig die bestimmtere Erkennung des Sitzes der Blutung nicht möglich.

§. 945.

Der blutige Auswurf ist von verschiedener Art, entweder ist er der gleichförmig roth gefärbte zähe Schleim, der bei der Lungenentzündung ausgeworfen wird, dieser enthält bei näherer Untersuchung nicht wirkliches Blut und gehört also nicht hieher, oder es sind Blutstreifen, welche im Schleime oder im Eiter enthalten sind, oder es ist eine bedeutende Menge reines, hellrothes oder auch dunkelrothes und geronnenes Blut. Bei längerm Aufenthalte in den Bronchien nimmt das Blut meistens eine bräunliche Farbe an.

Die nur mit dem Auswurfe gemischten Blutstreifen bestehen aus hellrothem schäumigtem Blute; ist der Auswurf rein schleimigt, so geht meistens dieser Blutentleerung ein stärkerer Husten vorher, ist er eiteratig, so erfolgt sie oft sehr leicht und ist sodann häufig der Vorbote einer grössern Blutung. Die Stelle, aus welcher in diesen Fällen das Blut sich entleert, lässt sich oft durch den Sitz eines schmerzhaften Gefühles, das den Husten veranlasst, erkennen. Ist die gereitzte Stelle in der Luftröhre, so hat der Kranke das Gefühl von Hitze, Kitzel und Brennen in derselben, ist sie in den Luftröhrenästen, so hat er daselbst die Empfindung des Wundseins und nimmt an dieser Stelle den Reitz zum Husten wahr. Befinden sich die Blutstreifen in eiterigem Auswurf, so giebt die Erkennung des Sitzes der Verschwärung Aufschluss über den Sitz der Blutung.

§. 946.

Die Blutung, bei welcher das Blut unvermischt in mehr oder weniger bedeutender Menge ausgeworfen wird, tritt oft plötzlich ohne alle Vorbothen ein, oft gehen aber derselben folgende Zufälle voran: Der Kranke wird von Beengung befallen, er hat das Gefühl von Druck und Schwere in der Brust, Angst, Herzklopfen und einen zusammengezogenen Puls, und eine fliegende Hitze überzieht die Wangen; oft hat er dabei Frösteln, fühlt sich sehr abgeschlagen und empfindet in der Regel einen süsslichen und salzigen Geschmack, sodann nimmt er oft plötzlich ein Gefühl von Wärme und Wallung in der Brust wahr und es erfolgt nun entweder unter Husten oder indem ein Kitzel in der Luftröhre ein leichtes Räuspern veranlasst, die Entleerung des Blutes, welches oft nur in der Menge von einem oder mehreren Mund voll ausgeworfen wird, zuweilen aber auch in solchen Massen hervorstürzt (Blutsturz), dass es zugleich zu Mund und Nase hervordringt und, indem ein Theil davon verschluckt wird, auch ausgebrochen wird. In solchen Fällen wird der Kranke blass und kalt, er wird selbst von Ohnmacht befallen, während welcher die Blutung zum Stehen kommt, oder er stirbt plötzlich, nachdem zuweilen noch Zuckungen hinzugekommen sind.

Solche stärkere Blutungen erfolgen meistens aus den Bronchien und der Lungensubstanz, selten aus dem Kehlkopfe und der Luftröhre. Untersucht man während oder nach dem Anfalle mit dem Stethoscop, so nimmt man eine Art Schleimrasseln wahr, dessen Blasen aber grösser als bei dem wahren Schleimrasseln sind, und zuweilen ist an einzelnen Stellen das Respirationsgeräusch ganz mangelnd und im Umfange derselben mehr oder weniger das knisternde Geräusch wahrzunehmen, dieses deutet, nach *Laennec*, die Stellen an, in welchen sich eine hämoptische Anschwellung gebildet hat. Durch

dieses Zeichen wird demnach die Blutergiessung in der Substanz der Lunge von der Blutung in den Bronchien unterschieden.

§. 947.

Diese Blutflüsse wiederholen sich, wenn sie einmal sich eingestellt haben, gern in den ersten Tagen noch mehreremale und kehren auch leicht später wieder zurück. Das Blut, das nach Beendigung des Anfalls noch einige Zeit lang rein oder in Verbindung mit Massen von dicklichem, grünlichem Eiter ausgeworfen wird, nimmt eine braune Farbe an und ändert diese wiederum in helles Roth, wenn ein neuer Anfall bevorsteht. — Zuweilen kann ein Bluthusten viele Jahre bestehen. Nur selten geht er ganz ohne Nachtheile für die Brust vorüber, was noch am meisten der Fall ist, wenn er ganz allein durch eine äussere Ursache veranlasst ist und bei einem nicht zur Schwindsucht geneigten Individuum vorkommt. Manchmal entscheidet er sich durch das regelmässige Eintreten der monatlichen Reinigung oder das Eintreten der Hämorrhoiden. Meistens geht der Bluthusten in Lungenschwindsucht über, oder er ist vielmehr in der Regel ein Symptom dieser oft schon längere Zeit vorhandenen Krankheit, die man oft aber erst durch den sich einstellenden Bluthusten wahrnimmt. Den Tod kann der Bluthusten sowohl durch die Heftigkeit der Blutung, als auch durch nachfolgende Lungenschwindsucht herbeiführen.

§. 948.

Ergebniss der *Leichenöffnungen.* Es kommen vorzüglich folgende drei Fälle vor, man findet 1) flüssiges Blut und schwarze Blutklumpen und polypenförmige faserige Gerinnsel, welche in den Röhren der Bronchien sich befinden, und die Schleimmembran der Bronchien getränkt mit Blut und in ihrer ganzen Dicke davon gefärbt und gewöhnlich auch etwas erweicht. (Dieses ist

der Fall, wenn die Blutung durch Aussickern aus der Schleimhaut der Luftröhrenäste geschah.) 2) das Blut in ausgehöhlten Tuberkeln in grossen Gerinnseln, wobei oft ein die Aushöhlung durchziehendes Blutgefäss zerrissen ist, und 3) die hämoptische Anschwellung (nach *Laennec*). Diese besteht in einer Verhärtung, welche immer nur partiell ist, eine Ausbreitung von 1 — 4 Cubikzollen hat, scharf umschrieben ist und eine schwarzrothe Farbe, dem des venösen Blutpfropfes ähnlich, hat. Ihre Schnittfläche zeigt sich körnigt, wie in der Hepatisation, aber sie hat mehr ein gleichförmiges Ansehen und lässt von dem Gewebe nichts anderes erkennen, als die Bronchien und die grössern Gefässe. Wenn man diese Stelle mit dem Messer schabt, so kann man ein wenig, sehr schwarzes und halb geronnenes Blut hinwegnehmen. Manchmal ist der Mittelpunkt dieser Verhärtung erweicht und mit einem Pfropf von reinem Blute angefüllt. Der Umfang dieser Stelle ist meistens gesund, doch oft auch das Gewebe der Lunge mit Blut getränkt. Diese Verletzung ist nach *Laennec's* Meinung das Resultat einer Aushauchung von Blut in das Parenchym, das ist in die Luftzellchen, wobei oft auch ein Theil des Lungengewebes zerreisst. — Ausserdem hat man auch schon Amevrysmen und Zerreissungen der Lungenarterie, der Aorta, Zerreissung der Hohlader etc. gefunden.

§. 949.

Ursachen. Der Bluthusten kommt vorzüglich in dem Alter von 18 — 35 Jahren vor, besonders bei Individuen mit der Anlage zur Schwindsucht, demnach bei solchen mit langem Halse, hervorragenden Schulterblättern, umschriebener Röthe der Wangen etc., ferner bei solchen, die in dem Knabenalter viel aus der Nase geblutet haben, und auch bei denen, die zum Herzklopfen geneigt sind. — Bei weitem die häufigste Ursache des Bluthustens sind die Lungengeschwüre der Schwindsüchtigen, sodann

heftiger Herzschlag, besonders bei der Hypertrophia cordis, Herzbeutel- und Brustwassersucht, Stockungen in den Gefässen des Unterleibes, Anschwellung der Milz und der Leber, Unterdrückung der Hämorrhoiden, heftiges Schreien, Singen, anstrengendes Blasen von Instrumenten, besonders Blechinstrumenten, Husten, ein Stoss auf die Brust, Verwundung der Lunge, das Einathmen scharfer Dämpfe, endlich alle übrigen Ursachen von Blutflüssen überhaupt, wie heftige Körperbewegung, der Genuss erhitzender Getränke etc.

§. 950.

Das Blutbrechen und die Darmblutungen. (Vomitus cruentus, Gastrorrhagia, Enterorrhagia.)

Fr. Hoffmann (resp. Herl Diss., Hal. 1701). — *Tissot* (Laus. 1765). — *Gasser* (Diss., Argentorat 1761). — *Schoning* (Groning, 1768). — *Apples* (Samml. auserles. Abhandl. B. 7). — *Portal* (ebend. B. 19). — *Lentin* (Beiträge z. ausüb. Arzneiw., Supplementb.).

Blutergiessungen in dem Magen und Darmkanal kommen in Verbindung von mancherlei krankhaften Zuständen vor, wo sodann die Zufälle dieser Krankheiten im Vereine mit denen der Blutung auftreten; die Blutung selbst aber ist in den einzelnen Fällen sehr verschieden, sowohl in Hinsicht der Menge als in Hinsicht der Beschaffenheit des Blutes.

Zuweilen wird nur weniges Blut durch Erbrechen oder die Stuhlentleerungen ausgeleert, wo ausser dem Erscheinen des Blutes selbst in der Regel nur die Erscheinungen der von der Blutung begleiteten Krankheit manchmal in Verbindung mit den Zufällen der Congestion wahrgenommen werden; so ist zuweilen ein heftiges Erbrechen mit Entleerung von etwas Blut verbunden, bei der Ruhr gehen Blutstreifen mit dem Schleime ab, ebenso wird in der Regel nur wenig Blut bei den Hämorrhoiden entleert, in welchen Fällen der Blutabgang eher mit

Erleichterung schwerer Zufälle verbunden ist, als dass er solche hervorbringt.

In andern Fällen wird eine grössere Menge Blutes, *oft selbst* von einigen Pfunden, ausgeleert, wo sodann *heftige* Zufälle die Blutung begleiten. Einem derartigen Blutbrechen gehen meistens verschiedene Erscheinungen voran, Mangel an Esslust, Druck und Aufgetriebenheit in der Herzgrube, Magenkrampf, das Gefühl von Wärme in dem Magen, Neigung zum Erbrechen, ein süsslicher Geschmack und oft schon vor dem Erbrechen Blasswerden des Gesichtes, Kaltwerden der Hände, Sinken des Pulses und Neigung zur Ohnmacht, worauf sodann eine geringere oder grösserere Menge von flüssigem oder geronnenem Blute ausgebrochen wird und der Kranke oft einem Sterbenden ähnlich niedersinkt. Nach einigen Stunden geht hierauf gewöhnlich auch geronnenes Blut mit dem Stuhlgange ab. In seltenen Fällen kommt es nicht zum Erbrechen, sondern das Blut bleibt im Magen liegen und erzeugt die Zufälle der Verblutung, wobei zuweilen eine Geschwulst in der Magengegend fühlbar wird. — Ergiesst sich das Blut nicht in den Magen, sondern in die Gedärme, so stellen sich die Zeichen der innern Blutung ein, Blasswerden der Lippen und des Gesichtes, Kaltwerden der Gliedmassen etc., wobei der Kranke zuweilen das Gefühl von einer warmen, hinrinnenden Flüssigkeit haben soll und in seltenen Fällen auch der Leib etwas anschwillt, und es geht sodann eine grössere oder geringere Masse Blutes geronnen mit dem Stuhlgange ab.

Die Beschaffenheit des ausgeleerten Blutes ist verschieden, oft ist dasselbe hellroth (arteriell), was häufiger stattfindet, wenn die Blutergiessung gering ist und auch meistens in dem Falle, wenn das Blut ohne im Magen und den Gedärmen liegen zu bleiben, schnell nach aussen entleert wird, oft ist es dunkelroth und flüssig (venös), oft sind es dunkelrothe geronnene Klumpen, was sowohl

arteriellen als venösen Ursprungs sein kann, zuweilen ist die ausgebrochene Masse braun, an Farbe der Chocolade ähnlich, wie in dem gelben Fieber, oft mehr wie die des Kaffeesatzes, wie bei dem Magenkrebse, oft ist sie ganz schwarz, verkohlt und pechartig, wie in der Melaena.

§. 951.

Diese Blutergiessungen sind oft nur vorübergehende Zufälle (acut), wie z. B. meistens das Blutbrechen bei Einwirkung äusserer Gewalt auf den Magen und die Milz, bei Vergiftungen, in dem gelben Fieber, die Darmblutungen in nervösen und fauligten Fiebern, in der Ruhr etc., oft sind sie aber auch mehr andauernd oder vielmehr von Zeit zu Zeit wiederkehrend, wo sie entweder blos als ein Symptom verschiedener langwieriger Krankheiten, wie z. B. des Magenkrebses und der Hämorrhoidalkrankheit erscheinen, oder als das Hauptsymptom auftreten, wie in der Melaena.

§. 952.

Die Melaena oder der Morbus niger Hippocratis ist der Form nach eine mit einem langwierigen Krankheitszustand verbundene, meistens wiederholt wiederkehrende, durch Erbrechen und Stuhlgang erfolgende Ausleerung von einer dunkeln, oft schwärzlichen Materie, welche entweder mit Blut gemischt ist oder ganz allein aus sehr dunkelm, wie verkohltem, Blute besteht. Die Kranken haben meistens ein blasses, schmutzig-erdfahles Aussehen, sie leiden vor dem Eintritt des schwarzen Erbrechens oft geraume Zeit an Verdauungsbeschwerden, besonders an den Zufällen des sauren Magensaftes und an Magenkrämpfen, oft ist die Magen- oder die Milzgegend aufgetrieben, die Kranken fühlen sich matt und sind in ihrem Gemüthe verstimmt. Sodann kommt es unter kaltem Schweiss an der Stirne und Neigung zur Ohnmacht zum Erbrechen, wodurch eine sehr saure, die Zähne stumpf

machende, dunkle und den Hefen oder der Flüssigkeit des Dintenfisches ähnliche Materie oder reines, aber pechschwarzes, geronnenes Blut ausgebrochen wird; auch werden ähnliche Stoffe durch die Stuhlgänge entleert, wodurch die den Blutflüssen zukommenden üblen Folgen herbeigeführt werden, die vor dem Anfalle bestandenen Beschwerden aber sich gewöhnlich mildern.

§. 953.

Die Magen und Darmblutungen können, wenn ihnen kein unheilbares Leiden, wie z. B. der Krebs zum Grunde liegt, wieder in vollkommene Gesundheit übergehen und wandeln sich auch oft in eine mildere Form, nämlich die Hämorrhoiden, um; sie können plötzlich durch die Heftigkeit des Blutflusses tödten und auch besonders bei öfterer Wiederkehr Abzehrung und Wassersucht zur Folge haben.

§. 954.

Das Blutbrechen kann mit Erbrechen von vorher verschlucktem Blute oder von der Brühe von Heidelbeeren, Kirschen, rothen Rüben etc. verwechselt werden, es unterscheidet sich jedoch von diesen Zufällen durch die Zeichen des Blutverlustes, welche mit diesen Ausleerungen keineswegs verbunden sind, wenn nicht etwa Blut bei dem Bluthusten geschluckt wurde, wo sodann aber die dieser Art des Blutflusses eigenthümlichen Zufälle zugleich vorhanden sind. Bei Kindern kann das aus den Brustwarzen geschluckte Blut ebenfalls bedeutende Zufälle veranlassen, doch haben diese einen andern Character als die der Blutung.

§. 955.

Bei den Leichenöffnungen fand man oft noch eine ausserordentliche Masse von geronnenem Blute in dem Magen und den Gedärmen, an der Stelle, wo die Blutung stattfand, die Schleimhaut in ihrer ganzen Dicke mit Blut getränkt, Krebs, Geschwüre, die Milz gross

und mürbe oder scirrhös und zuweilen verkleinert, die kurzen Gefässe zerrissen, erweitert und nach der Höhle des Magens offen stehend, in der Kranzvene des Magens varicöse Ausdehnungen, die Leber gross und voller Geschwülste etc.

§. 956.

Ursachen. Anlage zum Blutbrechen haben mehr Weiber als Männer, vorzüglich in den climacterischen Jahren, selten kommt dagegen die Krankheit bei jugendlichen Individuen vor; auch wird sie vorzugsweise bei Personen von cholerischem oder melancholischem Temperamente angetroffen.

Veranlassende Ursachen sind krebsartige und andere Geschwüre des Magens und Darmkanals, Fehler der Milz und der Leber, Stockungen im Pfortadersysteme, ein Anevrysma, Unterdrückung und Ausbleiben des Monatsflusses, Unterdrückung der Hämorrhoiden, eine sitzende Lebensart, Kummer, Zorn, der Genuss erhitzender und scharfer Dinge, insbesondere der scharfen Gifte, Wurmreitz, mechanische Verletzungen durch einen Stoss, geschluktes Glas, der Druck der schwangern Gebärmutter auf die Gefässe des Unterleibes, heftige Körperbewegung, Scorbut etc.

§. 957.

Diesen Blutflüssen liegt bald eine durch örtliche Reitzung veranlasste active Congestion zum Grunde, in welchem Falle die Blutung arteriell ist, bald ein passiver Bluterguss und zwar kann dieses geschehen durch Zerfressung von Capillargefässen durch Geschwüre, wo sowohl arterielles als venöses Blut sich ergiessen kann, durch Berstung von Capillaergefässen wegen Stockung des Blutes in den Gefässen der Pfortader, der Milz etc., wobei dasselbe oft eine sehr verkohlte Beschaffenheit hat, wie insbesondere in der Melaena, und wo alsdann vorzugsweise venöses Blut, das nach der geöffneten Stelle zurückfliesst, sich ergiesst, durch Zerreissung von Venen,

in welchem Falle das Blut venös ist, und durch Berstung eines Anevrysmas, das mit dem Magen oder einem Darm verwachsen war, in welchem Falle hellrothes Blut ausgeleert wird.

§. 958.

Das Bluthamen (Haematuria, mictus cruentus).

Fr. Hoffmann (Diss., Hal. 1730). — *Hasselmann* (Diss., Leid. 1768). — *Latourette* (Par. 1810). — *Aran* (Prr. 1811). — *Laroche* (Par. 1814).

Bei dem Bluthamen kommt das Blut entweder aus den Nieren oder aus den Harnleitern oder aus der Blase.

Hat die Blutung in den Nieren selbst ihren Ursprung (Haematuria renalis), so gehen derselben meistens die Zeichen der Entzündung und der Vereiterung der Nieren voraus oder der Kranke hat, wenn auch die Erscheinungen dieser Krankheitszustände nicht vollständig vorhanden sind, doch in der Regel einige ähnliche Beschwerden, ein Gefühl von Spannung und Schmerzen in der Nierengegend, Aufblähung des Leibes, krampfhaftes Anziehen der Hoden, einen sparsamen und mit Beschwerden erfolgenden Abgang des Urin etc. Nur selten erfolgt die Blutung ohne diese und ähnliche Zufälle. Das Blut ist, wenn es nicht in sehr grosser Menge abgeht, wo es selbst rein ausfliessen kann, innig mit dem Urin gemischt, welcher ein hineingetauchtes Papier oder Leinwandläppchen roth färbt und fällt nicht in der Ruhe und beim Erkalten des Harnes zu Boden.

Hat die Blutung ihren Sitz in den Harnleitern (Haematuria ureterica), so ist ihr Ursprung oft schwer auszumitteln, doch kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit auf diesen Ursprung schliessen, wenn ein Stein in einem Harnleiter sich befindet, der an einer bestimmten Stelle desselben Schmerzen erregt, wiewohl auch durch Blut, das aus der Niere kommt, in dem Harnleiter gerinnt und denselben verstopft, durch Zurückhaltung des Urins

und Ausdehnung der Harnleiter Schmerzen in denselben erregt werden können, welche sich selbst auch auf die Nieren fortpflanzen und auf diese Weise die Diagnose sehr erschweren können; ferner wenn der Kranke etwa das Gefühl von dem Erguss der Flüssigkeit aus einer bestimmten Stelle der Harnleiter hat und endlich wenn das Blut in cylinder- oder röhrenförmigen Stücken abgeht, doch findet dieses auch bei der Nierenblutung statt.

Kommt das Blut aus der Blase (Haematuria vesicalis), so fliesst dasselbe in der Regel nach Vorausgang und unter Begleitung von mancherlei Harnbeschwerden, insbesondere denen der Blasenhämorrhoiden ab, doch stellt sich auch zuweilen die Blutung beinahe ohne alle Beschwerden ein. Das Blut ist in diesem Falle nicht innig mit dem Harne gemischt, sondern scheidet sich sogleich von demselben ab und fällt geronnen zu Boden, oder es gehen auch Klümpchen von schon geronnenem Blute bei dem Harnlassen ab.

§. 959.

Das Blutharnen kann sich von selbst stillen und wiederum in vollkommene Gesundheit übergehen, wobei oft andere Blutflüsse, z. B. der auf dem gewöhnlichen Wege erfolgende Hämorrhoidalblutfluss, sich ausbilden; es kann aber auch diese Blutung die den Blutflüssen überhaupt zukommenden üblen Folgen haben, sie kann schnell durch die Heftigkeit der Blutung tödten oder Nachkrankheiten der Blutflüsse, vorzüglich Abmagerung und Wassersucht nach sich ziehen; ausserdem können die Blutungen in den Harnwerkzeugen dadurch sehr schlimme Zufälle herbeiführen, dass sie durch Bildung von Blutpfröpfen den Ausgang aus der Blase oder aus den Harnleitern verstopfen und dadurch eine gefährliche Harnverhaltung herbeiführen, und können auch durch Entstehung von kleinen Blutgerinseln den Kern zur Bildung eines Blasensteines geben.

§. 960.

Ursachen. Das Blutharnen kommt mehr bei dem männlichen als dem weiblichen Geschlechte und besonders in höherm Alter vor.

Veranlassung geben Nierenentzündung, Vereiterung, Krebs, Encephaloiden, Harnsteine im Nierenbecken, den Harnleitern oder der Blase, Würmer in der Blase, die Hämorrhoidalkrankheit durch Ausdehnung derselben auf die Gefässe der Blase oder durch Unterdrückung der fliessenden Hämorrhoiden, grosse Abdominalplethora, ferner heftige Körpererschütterung durch starkes Reiten, Fahren auf holperigem Wege, einen Fall oder Stoss auf die Nierengegend, das Heben schwerer Lasten, der Missbrauch der harntreibenden Mittel, besonders der Canthariden, so wie erhitzender Abführungsmittel, der geistigen und auf die Urinwerkzeuge wirkenden Getränke, endlich alle allgemeinen Ursachen der Blutflüsse, wie starke Körpererhitzung, der Scorbut etc.

§. 961.

Die Blutung aus der Harnröhre (Urethrorrhagia, Haemorrhagia penis, Stymatosis, Stymatorrhagia.)

Fr. Hoffmann (Diss., Halle 1720). — *Junker* (resp. Heyer, Diss. Hal. 1747). — *Rud. Aug. Vogel* (resp. Sandorf, Diss. Gött. 1765).

Bei dieser Blutung, welche von Manchen noch zu dem Blutharnen gerechnet wird, ergiesst sich das Blut entweder aus der Harnröhre selbst, oder aus dem untern Theil des Blasenhalses, der Vorsteherdrüse, den Saamenbläschen und vielleicht auch zuweilen nebst den Ausführungsgängen des Saamens aus den Hoden selbst. Es geht hier das Blut, ohne dass Urin gelassen wird, meistens in flüssigem Zustande und auch geronnen in geringerer oder grösserer Menge ab, ein Gefühl von Jucken und Brennen bezeichnet oft die Stelle, aus welcher das Blut sich ergiesst und man kann auch dieselbe zuweilen

dadurch auffinden, dass man an verschiedenen Stellen von hinten nach dem vordern Ende des Gliedes gehend, dasselbe zusammendrückt, bis man die Stelle trifft, durch deren starke Zusammendrückung die Blutung gestillt wird. Die Blutung tritt zuweilen nur bei stattfindenden Saamenentleerungen oder nach denselben ein.

§. 962.

Die Blutung aus der Harnröhre scheint nur bei Männern vorzukommen und ist zuweilen durch die Hämorrhoidalkrankheit, Geschwüre oder Krebs in der Harnröhre, den Saamenbläschen oder der Prostata, oder durch heftige Anstrengung beim Beischlafe, Onanie, einen entzündlichen Tripper etc. veranlasst.

§. 963.

Der Mutterblutfluss. (Haemorrhagia uteri, Metrorrhagia, Hysterorrhagia, Sanguifluxus uterinus.)

Fr. Hoffmann (Diss. Hal. 1730). — *Schröder* (Diss. Gött. 1771 u. in dessen Opusc, Vol. I). — *Saxtorph* (Diss. Hal. 1774). — *Rigby* (a. d. Engl. in d. Samml. auserles. Abh. f. pract. Aerzte, B. III). — *Leroy* (a. d. Franz., Par. 1802, übers. v. Renard, Lpz. 1802). — *Zadig* (Bresl. 1802). — *Lobstein* (Strassb. 1803). — *Leroux* (Dijon 1776 u. 1810, a. d. Fr. v. Held, Königsb. 1784). — *Strack* (lat. Berl. 1794 u. deutsch Marb. 1800). *Burns* (Lond 1807). *Eli v. Siebold* (lat. Würz. 1814). — *Bigeschi* (Vol. 2. Florenz 1816). — *Duncan* (Lond. 1816). — *Rigby* u. *Duncan* (in d. Franz. übers. v. Mad. Boivin, mit einem Anh. v. Chaussier üb. d. Structur d. Uterus. Par. 1818). — *Mad. Boivin* (Par. 1819).

Ein Mutterblutfluss (krankhafter Mutterblutfluss) ist jede aus der Gebärmutter erfolgende Blutergiessung, welche keine monatliche oder Kindbettreinigung ist oder es sind diese im gesunden Zustande vorkommenden Blutentleerungen selbst, wenn sie entweder zu frühe eintreten oder zu lange dauern oder in zu reichlicher Menge erfolgen.

§. 964.

Diese Blutentleerungen bieten manche für die Praxis

wichtige Verschiedenheiten dar, je nachdem sie ausser der Zeit der Schwangerschaft, der Geburt und des Kindbettes oder gerade während dieser Zustände sich einstellen.

a) *Der Gebärmutterblutfluss, welcher ausser der Schwangerschaft, der Geburt und dem Kindbett erfolgt.* Derselbe ist entweder eine regelwidrige Menstruation oder ein Blutfluss, welcher mit dieser in keinem Zusammenhange steht.

Als krankhafte Blutentleerung kann der Monatsfluss angesehen werden (Menorrhoea), 1) wenn derselbe sich zu früh einstellt. In unserm Klima kann man die Reinigung wohl immer krankhaft nennen, wenn sie sich vor dem zwölften Jahre einstellt; auch ist dieselbe oft noch im 14ten und selbst im 16ten Jahre nachtheilig, wenn sie bei schwächlichen Individuen schon um diese Zeit eintritt. Die Folgen sind entweder ein Stehenbleiben im Wachsthum des Körpers oder Körperschwäche, übles Aussehen, und Neigung zur Abzehrung. 2) Wenn derselbe zu frühe wiederkehrt und daher sich zu häufig wiederholt. Die gewöhnliche Wiederkehr des Monatflusses findet in 4 Wochen, bei manchen Frauen in 3 Wochen statt. Eine häufigere Wiederkehr kann man daher krankhaft nennen. Die Folgen hievon sind die allgemeinen Nachtheile der zu starken Blutentleerungen. 3) Wenn derselbe zu lange anhält. Die gewöhnliche Dauer ist 3 bis 5 Tage, eine krankhafte Menstruation kann aber 8 und 14 Tage andauern, ja es kann eine, wiewohl geringe Blutausscheidung beinahe habituell werden. Ausser den gewöhnlichen Folgen der Blutungen haben diese lange andauernden Blutentleerungen auch örtliche Folgen, indem die Absonderung mehr wässerig wird, ein weisser Fluss daraus sich entwickelt und auch leicht Unfruchtbarkeit hieraus entspringt, und 4) wenn der Blutausfluss zu stark ist. In diesem Falle gehen der Blutentleerung oft die

Erscheinungen allgemeiner Blutwallungen voraus, Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel, Ohrensausen, beschwerliches Athmen, Herzklopfen, Angst etc., sodann fühlt die Kranke Schmerzen im Kreuze, eine Völle im Unterleibe, ein Drängen nach den Geschlechtstheilen, öftern Trieb zum Urinlassen, und dabei zuweilen Frösteln, Hitze und Durst, auch Uebelkeit und Neigung zum Erbrechen etc., welche Zufälle oft noch einige Zeit fortdauern, nachdem das Blut schon zu fliessen angefangen hat. Das Blut ist bald hellroth und flüssig, bald geronnen und schwarz, und kann sehr feste, den Pseudomembranen ähnliche Gerinnsel bilden. Nur selten werden diese Blutentleerungen augenblicklich gefährlich, doch wiederholen sie sich leicht wieder, und können sodann die gewöhnlichen Folgekrankheiten der Blutflüsse und auch Unfruchtbarkeit nach sich ziehen.

§. 965.

Mutterblutflüsse ausser der Schwangerschaft, welche mit dem Monatsflusse in keinem Zusammenhange stehen, sind meistens mit den Zufällen eines schweren Gebärmutterleidens, z. B. denen des Mutterkrebses verbunden. Diese Blutflüsse werden meistens viel heftiger, als der zu reichliche Monatsfluss und können durch die Grösse des Blutverlustes sehr schnell den Tod herbeiführen.

§. 966.

Die *Ursachen* dieser Arten der Mutterblutflüsse sind, ausser den allgemeinen Ursachen der Blutflüsse, wie Vollblütigkeit, Erhitzung des Körpers (durch Tanzen), Blutstockungen, durch sitzende Lebensart erzeugt, der Scorbut etc., Reitzung der Geschlechtstheile durch Ausschweifungen der Phantasie, Onanie, häufiger und heftiger Beischlaf, der Missbrauch der die Menstruation befördernden Mittel, Mutterkränze, die Feierstübchen, Wurmreitz, Gallenreitz, das Ausbleiben des Monatsflusses in den climarterischen Jahren und dadurch bedingte

Blutüberfüllung in den Unterleibsgefässen, Polypen, der Gebärmutterkrebs etc.

§. 967.

b) *Der Gebärmutterblutfluss* während der Schwangerschaft. Es sind hier zwei Fälle zu unterscheiden, entweder kommt das Blut nicht aus der Stelle, an welcher der Mutterkuchen angeheftet ist oder es fliesst das Blut aus dieser Stelle. In ersterm Falle ist die Blutung in der Regel nicht mit der Austreibung des Kindes verbunden, im zweiten Falle tritt die zu frühe Geburt meistens oder wenigstens sehr häufig ein.

Der erstere Fall findet zuweilen statt, wenn sich die monatliche Reinigung noch während der Schwangerschaft einstellt. Man kann diese Blutentleerung von der den Abortus begleitenden mit mehr oder weniger Sicherheit dadurch unterscheiden, dass sie nur in den für die monatliche Reinigung bestimmten Perioden eintritt, niemals sehr reichlich wird, mit keinen Wehen verbunden ist und sich während des Blutabganges der Muttermund nicht erweitert. Ausserdem können auch Blutflüsse ohne Lösung des Mutterkuchens durch die den Mutterblutflüssen im nicht schwangern Zustande zum Grunde liegenden Ursachen veranlasst werden, z. B. durch Congestionen, einen scorbutischen Zustand, das Platzen eines Blutaderknotens, ein Krebsgeschwür etc. Ein solcher Blutabgang veranlasst in der Regel nur dann die Austreibung der Frucht, wenn derselbe sehr reichlich ist, doch kann auch durch den fortdauernden nicht übermässig starken Monatsfluss die Ernährung des Kindes leiden.

§. 968.

Die durch eine theilweise Trennung des Mutterkuchens verursachte und meistens mit Austreibung der Frucht verbundene Blutung ist entweder durch das Aufsitzen des Mutterkuchens auf dem Muttermunde be-

dingt, in welchem Falle die Blutung nur in den letzten drei Schwangerschaftsmonaten eintritt oder sie ist nicht durch diese Ursachen veranlasst und kommt in der Regel nur in der ersten Hälfte der Schwangerschaft vor.

Der häufigere Fall ist die Blutung in den ersten Monaten der Schwangerschaft, besonders in dem zweiten und dritten Monate. Entweder tritt hier zuerst die Blutergiessung ein und es folgen wehenartige Schmerzen auf dieselbe, oder es stellen sich zuerst diese ein und der Blutfluss folgt ihnen nach. Oft dauert es mehrere Tage, bis es zu Wehen kommt, die Frau bemerkt nur unbedeutende Spuren von blassem und mit Schleim gemischtem oder auch reinem und gehörig gefärbtem Blute in dem Hemde, was nicht leicht von einer unschädlichen Blutergiessung, namentlich dem Monatsflusse, unterschieden werden kann; diese Blutentleerungen wiederholen sich aber immer wieder, werden stärker, und nunmehr kommen anfallsweise wehenartige Schmerzen und ein drückender Schmerz im Kreuze hinzu, nach welchem die Blutung jedesmal stärker wird, bis die Fehlgeburt erfolgt. Folgt dagegen der Blutfluss erst den Wehen nach, so wird die Schwangere von zusammenziehenden Schmerzen im Leibe, vorzüglich dem untern Theile desselben befallen, die sie, zumal wenn sie noch nie geboren hat, leicht für Colikschmerzen halten kann; bald aber wird die Natur derselben klar, indem nunmehr etwas Blut anfängt aus den Geschlechtstheilen zu fliessen oder es plötzlich zu einem bedeutenden, selbst Gefahr drohenden Blutflusse kommt. Während der Wehen öffnet sich der Muttermund und es sind, wenn hiezu die Schwangerschaft schon weit genug vorgeschritten ist, die Eihäute und Theile der Frucht in denselben zu erkennen. Ist das Ei noch ganz klein, so wird es gewöhnlich unter einem starken Blutfluss, eingehüllt in ein grosses Blutgerinnsel, ausgeleert, in

welchem man es nur durch eine vorsichtige Zerlegung auffinden kann. Ist die Frucht etwas grösser, so erkennt man zwar beim Zufühlen die in den Eihäuten eingeschlossenen Theile des Kindes, dieselbe geht aber noch bis zur Vollendung des dritten und häufig auch im vierten Monate mit den Eihäuten ab. Bei einer noch mehr reifen Frucht platzen die Eihäute, es gehen die Wasser ab, worauf zuerst der Embyo und sodann der Mutterkuchen folgt, welcher oft aber auch noch einige Zeit sitzen bleibt und noch bedeutende Nachblutungen veranlassen kann, doch soll derselbe mit weniger Gefahr als bei einer gewöhnlichen Geburt längere Zeit, selbst mehrere Wochen, zurück bleiben können. Oft bleibt die schon losgetrennte und in den geschlossenen Eihäuten enthaltene Frucht noch geraume Zeit im Muttermunde und in der Scheide liegen und unterhält die Blutung, bis durch die Natur oder Kunst die Frucht vollends entfernt wird.

§. 969.

Die Mutterblutflüsse in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft sind meistens durch das *Aufliegen des Mutterkuchens auf dem Muttermunde* (Placenta praevia) bedingt. Es stellen sich in einem solchen Falle, meistens im neunten oder achten Monat, zuweilen auch schon im siebenten oder sechsten, meistens ohne Wehen, Mutterblutflüsse ein, die sich nach einigen Tagen immer von neuem wiederholen, im Anfange gering sind, aber immer stärker werden und die Zufälle der Verblutung mehr oder weniger schnell herbeiführen. Bei der innern Untersuchung findet man den untern Abschnitt der Gebärmutter dicker und weicher als gewöhnlich und in dem Muttermunde, wenn er geöffnet ist, einen weichen, schwammigten Körper. Die Blutung wird ohne zeitige Hülfe meistens tödtlich, ehe es zur Geburt kommt, doch wird in seltenen Fällen dieselbe dadurch durch die Natur gestillt, dass der Kopf oder der Hintere des Kindes in den

Muttermund eindringt und den Mutterkuchen an die Wand der Gebärmutter anpresst. Eine nähere Würdigung dieses Blutflusses gehört in das Gebiet der Geburtshülfe, indem in der Regel nur durch ein baldiges und entschlossenes geburtshülfliches Eingreifen die Rettung der Frau bewirkt werden kann.

§. 970.

Eine besondere *Anlage* zum Mutterblutfluss während der Schwangerschaft wird bedingt durch vorhergegangene ein- oder mehrmalige Fehlgeburten, und man bemerkt, dass der Missfall gerne zur nämlichen Zeit sich einstellt, als er früherhin statt fand, auch kommt er leicht zur Zeit, in welcher die monatliche Reinigung ohne erfolgte Schwangerschaft sich eingestellt hätte, ferner sind Frauen von sehr reitzbaren Nerven und zugleich von grosser Vollblütigkeit dazu geneigt und auch solche, die erst in einem vorgerückten Alter zum erstenmal schwanger wurden, was man dem Unvermögen der Gebärmutter, sich gehörig auszudehnen, zuschreibt; endlich solche, bei welchen die Gebärmutter wenigstens stellenweise in einem entarteten Zustande sich befindet, wie insbesondere bei dem Scirrhus der Gebärmutter.

§. 971.

Unter den *Gelegenheitsursachen* dieser Blutung und der Fehlgeburt sind wohl die drei häufigsten: 1) starke Gemüthsbewegungen, besonders Verdruss und Schrecken, 2) häufiger und heftiger Coitus und bei Neigung zum Abortus jeder Beischlaf, und 3) starke Muskelanstrengung und Dehnungen und Erschütterungen des Körpers, wie z. B. bei dem Heben einer schweren Last, besonders von oben herab, bei dem Fahren auf holperigem Wege, bei dem Tanzen, Springen, bei einem Fall, Stoss, bei starkem Husten, Erbrechen etc. Andere Ursachen sind das zu feste Schnüren des Leibes, lange andauernde Leibesverstopfung, zu reichlicher Genuss von Nahrung,

der Genuss erhitzender Getränke, der Missbrauch der Purgiermittel, Krankheiten mit Fieber oder Krämpfen, Krankheiten mit starkem Säfteverlust etc. Endlich liegt oft auch die Ursache dieser Blutung und des Missfalles in der Frucht selbst, nämlich in dem Absterben der Frucht, in Hydatidenbildung im Mutterkuchen, in dem Vorhandensein einer Mola neben der Frucht etc.

§. 972.

c) Der *Gebärmutterblutfluss während und sogleich nach der Geburt.* Die während der Geburt erfolgenden Blutflüsse sind meistens durch eine theilweise Lösung des Mutterkuchens bedingt, was entweder durch den Sitz desselben in der Nähe des Muttermundes, oder durch ungleichmässige Zusammenziehung der Gebärmutter oder starke Congestion nach derselben, welche bei heftigen Gemüthsbewegungen, starkem Erbrechen etc. eintreten kann, oder durch Zerrung an der Nabelschnur bei zu kurzer Nabelschnur, Umschlingung derselben, zu schneller Austreibung des Kindes etc. geschehen kann; in seltenern Fällen sind sie durch starkes Einreissen des Muttermundes, Zerreissung der Gebärmutter selbst, wo das Kind in die Bauchhöhle fallen kann, Berstung von Blutaderknöpfen, Verletzung durch die eingebrachten Instrumente etc. bedingt. Erfolgt die Blutung vor dem Sprung der Blase, so hört sie gewöhnlich nach dem Abgang des Fruchtwassers und bei dem Fortschreiten der Geburt auf. Die durch Zerrung an dem Nabelstrang entstandenen Blutflüsse stellen sich gewöhnlich erst bei dem Einschneiden oder bei der vollendeten Austreibung des Kindes ein. — Die vorzüglichsten Ursachen des Mutterblutflusses, nach der Geburt, sind theilweise Lösung des Mutterkuchens, wobei derselbe noch ganz in der Gebärmutter zurück sein oder theilweise ausgestossen und theilweise noch in Verbindung mit der Gebärmutter sein kann, und bei vollständiger Lösung des Mutter-

kuchens mangelnde Zusammenziehung der Gebärmutter, was man daran erkennt, dass dieselbe sich nicht wie gewöhnlich, als ein harter umschriebener Körper in der untern Bauchhöhle fühlen lässt. Auch können Blutklumpen und in der Höhle der Gebärmutter zurückgebliebene Stücke des Mutterkuchens durch ihren Reitz eine Blutung veranlassen und dieselbe auch noch durch andere allgemeine Ursachen bedingt sein. — Zuweilen ergiesst sich auch das Blut nicht nach aussen, sondern wird, durch den auf dem Muttermunde aufliegenden Mutterkuchen, ein grosses Blutgerinnsel oder krampfhafte Verschliessung des Muttermundes zurückgehalten und ergiesst sich in die Höhle der erschlafften Gebärmutter, wo sodann die allgemeinen Erscheinungen der innern Blutung eintreten und sich die Gebärmutter nicht als eine feste Kugel über den Schoossbeinen fühlen lässt.

Diese Blutergiessungen sind übrigens Gegenstand der Geburtshülfe, und ich habe daher ihrer nur kurz Erwähnung gethan.

§. 973.

d) Der *Mutterblutfluss während des Kindbettes* (Lochiorrhagia). Dieser Blutfluss tritt oft ein, nachdem die Kindbettreinigung sich schon vermindert oder selbst aufgehört hat; es gehen demselben oft Schmerzen in der Gebärmutter und im Kreuze vorher und er hat die allgemeinen Folgen der Blutflüsse.

Die vorzüglichsten Ursachen sind Gemüthsbewegungen, zu frühes Aufstehen, unterlassenes Säugen des Kindes und eine zu reichliche und erhitzende Nahrung in dem Kindbett, namentlich durch Wein, Kaffe, Chocolade etc.

§. 974.

Die Vorhersage bei den Blutflüssen richte sich zum Theil nach dem Character derselben. Die activen Blutflüsse ziehen weniger schnell, als meistens die passiven, die

Nachtheile der Blutflüsse nach sich, und sind im Gegentheile oft günstig, da sie bei Blutwallungen, Entzündungen, Fieber mit dem sthenischen Character etc.; häufig als Krisen erscheinen, doch werden sie leicht auch zu reichlich und haben sodann die gewöhnlichen Folgen eines zu starken Blutverlustes. — Ferner nach der Beschaffenheit des Individuums. Kräftigen, vollblütigen Leuten schadet die Blutung weniger, dagegen oft ein geringer Blutverlust bei sehr erschöpften Kranken, wie z. B. bei den an Nerven- oder Faulfiebern Leidenden, bei Wassersüchtigen, bei den durch unmittelbar vorhergegangene Blutflüsse, Geschwüre etc. Geschwächten tödtlich werden kann. Frauen scheinen stärkere Blutflüsse, als die Männer, ertragen zu können, Individuen von mittlerem Alter besser als Kinder und Greise. — Vorzüglich endlich nach der Grösse des Blutverlustes, und nach dem Organe, aus welchem die Blutung erfolgt, und nach der jeweiligen Beschaffenheit dieses Theiles.

§. 975.

Das Nasenbluten ist sehr häufig kritisch und selten gefährlich, besonders da man auch in der Regel Mittel hat, dasselbe sicher zu stillen, doch kann auch diese Blutung tödtlich werden, besonders wenn ihr Verschwärungen und Polypen in der Nase zum Grunde liegen, in welchem Falle sie sich immer von neuem wiederholt, und indem sich auch nicht immer alle Mittel anwenden lassen.

§. 976.

Das Mundbluten ist ebenfalls zuweilen kritisch, meistens ohne bedeutenden Einfluss auf das Gesammtbefinden, nur selten gefährlich.

§. 977.

Der Bluthusten ist immer einer der gefährlichern Blutflüsse, indem zuweilen sehr reichlich Blut durch denselben ausgeleert wird, so dass er augenblicklich tödten

kann, und auch derselbe den Grund zu tödtlichen Veränderungen in dem leidenden Organ legen kann; bei Anlage zur Schwindsucht oder bei schon vorhandenen Lungengeschwüren ist er besonders gefährlich; eher ist aber noch Heilung zu erwarten, wenn keine solche Anlage im Spiele ist, wenn auch selbst das Gewebe durch einen plötzlichen Blutandrang oder durch Verwundung verletzt wurde, wiewohl in solchen Fällen auch leicht Lungenschwindsucht nachfolgt. Am wenigsten bedenklich ist der Bluthusten, wenn das Blut nur aus der Schleimhaut des Kehlkopfes, der Luftröhre oder der Luftröhrenäste sich ergiesst, besonders wenn diese Blutausscheidung nicht sehr bedeutend ist.

§. 978.

Das Blutbrechen wird wohl häufiger, als der Bluthusten, nämlich nach Verhältniss der Häufigkeit seines Vorkommens, plötzlich lebensgefährlich, es geht dagegen leichter als ein heftiger Bluthusten vorüber, ohne Nachkrankheiten im Organe zu hinterlassen, auch ist es zuweilen kritisch. — Auch die grössern Darmblutungen sind höchst gefährlich, zuweilen aber auch kritisch. Die kleinern Blutausscheidungen im Darmkanal, wie namentlich die bei den Hämorrhoiden, sind nicht gefährlich und meistens erleichternd.

§. 979.

Das Blutharnen ist manchmal kritisch, doch wird es leicht sehr gefährlich, besonders wenn es durch äussere Gewaltthätigkeit, durch Blasensteine oder Verschwärungen der Nieren veranlasst ist oder im Gefolge eines fauligten Fiebers vorkommt.

Der Abgang von Blut aus der Harnröhre wird nicht leicht lebensgefährlich, weil er mit Leichtigkeit zu unterdrücken ist, doch ist diese Blutung oft sehr schwer zu heilen.

§. 980.

Die im nicht schwangern Zustande eintretenden Mutterblutflüsse sind zuweilen kritisch, selten gefährlich und auch leicht zu stillen, wenn ihnen nicht ein Polyp, der Gebärmutterkrebs oder andere Entartungen im Gewebe der Gebärmutter und der Scheide zum Grunde liegen. — Die im schwangern Zustande fortdauernde monatliche Reinigung wird selten lebensgefährlich, sondern schwächt blos die Mutter und das Kind. — Die aus einer theilweisen Trennung des Mutterkuchens hervorgehende Blutung in den ersten Monaten der Schwangerschaft hat meistens eine Fehlgeburt zur Folge, welche nur in den seltenern Fällen nach schon begonnener Blutung durch die Hülfe der Kunst verhütet werden kann, auch wird diese Blutung öfters lebensgefährlich. — Höchst gefährlich und selbst bei der besten Hülfe der Kunst sehr gefährlich ist die Blutung, die durch den, auf dem Muttermunde sitzenden Mutterkuchen veranlasst wird. — Von grossem Erfolge dagegen ist in der Regel die Kunsthülfe in den Blutungen nach vollendeter Geburt.

§. 981.

Bei der Behandlung der Blutflüsse muss zuerst entschieden werden, ob eine Blutung gestillt werden darf oder nicht. Nicht gehemmt darf sie werden, wenn sie kritisch ist und zugleich aus einem Theile geschieht, durch dessen Verletzung durch die Blutergiessung dem Leben keine Gefahr gebracht wird; unterdrückt muss sie dagegen werden, wenn sie durch den Blutverlust die denselben eigenthümlichen Folgen herbeizuführen droht, und wenn sie aus einem Theile erfolgt, dessen Verletzung grössere Nachtheile veranlassen würde, als die etwa wünschenswerthe Blutentleerung Nutzen gewähren würde. In den zweifelhaften Fällen stillt man den Blutfluss nur allmählig und nicht sogleich mit zurücktreibenden Mitteln.

§. 982.

Muss die Blutung gehemmt werden, so verfährt man nach den gewöhnlichen Anzeigen.

a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Es versteht sich von selbst, dass alles das, was die Blutung hervorgebracht haben kann, wo möglich entfernt werde, doch dürfen die zu diesem Zwecke nothwendigen Kunsteingriffe nicht während des Laufes der Blutung gemacht werden, wenn durch dieselbe die Blutung vermehrt oder der Anwendung der blutstillenden Mittel ein Hinderniss in den Weg gelegt werden könnte und es möglich ist, die Blutung bei fortdauernder Gelegenheitsursache zu stillen. Ausser den Ursachen, die die Veranlassung der Blutung waren, müssen nun aber auch alle nachtheiligen Einflüsse, welche die Blutung unterhalten könnten, vermieden werden. Diese sind vorzüglich: der Schrecken, welcher durch den Blutfluss selbst leicht bei dem Kranken erzeugt wird; der Arzt verrathe daher selbst keine Besorgnisse, und suche den Kranken durch Vorstellungen und durch ein geeignetes Benehmen zu beruhigen; — ferner fest anliegende Binden; diese müssen sogleich gelöst werden, so wie es auch rathsam ist, keine Hemmungen im Blutlaufe in den Gefässen der Pfortader durch Kothansammlungen aufkommen zu lassen. — Bewegungen des Theiles, aus welchem die Blutung erfolgt, wie z. B. durch Husten, Reden, Erbrechen müssen möglichst vermieden und durch geeignete Mittel gemässigt werden — tiefe Lage des Theiles, aus welchem das Blut fliesst, muss ebenfalls vermieden werden — ebenso zu grosse Wärme im Zimmer. — Warme und reitzende Getränke, so wie eine reichlich nährende Kost, dürfen nur genossen werden, wenn die Blutung aufgehört hat und keine Gefahr der Wiederkehr mehr da ist, dagegen bediene sich der Kranke, so lange dieses der Fall ist und so weit es sein Allgemeinbefinden gestattet, nur

kühlender Getränke und nur sehr wenig nährender Nahrungsmittel.

§. 983.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Da der Krankheitsvorgang, welcher der Blutentleerung zunächst zum Grunde liegt, ein verschiedener sein kann, so muss die Behandlung auch nach Verschiedenheit desselben eingerichtet werden.

Bei der activen Blutung haben wir die Anzeigen, die örtliche Reitzung zu mildern, den Orgasmus, der das Blut ergriffen hat, so wie die heftige Herz- und Arterienthätigkeit zu mässigen oder selbst die Blutmasse zu vermindern, und endlich die Oeffnungen, aus welchen das Blut fliesst, zu verschliessen.

Zuweilen genügt es, um einen Blutfluss zu mässigen, blos den Zustand der Reitzung, in welchem das leidende Organ sich befindet, zu mildern, und es zeigen sich oft schon einhüllende, gelind reitzmildernde Mittel, wie die Mandelmilch, eine Emulsion von Kürbiskernen, Mandel-, Mohnsaamen-, Olivenöl von Nutzen. Befindet sich der leidende Theil in einem sehr starken Reitzungszustand, so dass Schmerz und krampfhafte Bewegungen damit verbunden sind, so müssen zuweilen die stärker auf die Sensibilität wirkenden Mittel angewandt werden, z. B. Hyoscyamus, Digitalis, nach Beschaffenheit des Organs die Ipecacuanha in kleinen Gaben, und das Opium, welches bei weitem am zuverlässigsten die beabsichtigte Wirkung hervorbringt, und daher bei der rechten Anzeige angewandt, auch bei Blutflüssen ein grosses Mittel ist, aber nur dann, und zwar auch in diesem Falle immer mit Vorsicht gebraucht werden darf, wenn durchaus kein Orgasmus des Blutes und keine allgemeine Gefässerregung vorhanden sind und die Blutung lediglich von örtlicher Reitzung bedingt ist. Schicklich werden, neben dem Opium, wo dasselbe nothwendig ist, zugleich

die gegen einen etwa vorhandenen Orgasmus des Blutes wirksamen Mittel zu Hülfe gezogen.

Die wirksamern Mittel bei activen Blutflüssen sind aber in der Regel diejenigen Mittel, welche den Orgasmus des Blutes und die übermässige Energie der Gefässthätigkeit herabstimmen. Hieher gehören: reichliches Trinken von kaltem Wasser, der Weinsteinrahm, Salpeter und andere kühlende Salze und kühlende Laxiermittel, vielleicht auch das Kochsalz, in Gaben von einem Kaffelöffel voll bis zu einer Unce, in mehrern Uncen kaltem Wasser aufgelöst, das oft in Blutungen, die nicht aus dem Magen und Darmkanal erfolgen, eine sehr schnelle Wirkung zeigt, die man gewöhnlich durch die statt findende Kälteerzeugung und die Annahme einer antagonistisch-wirkenden Reitzung des Darmkanals zu erklären sucht, die Pflanzensäuren, sehr verdünnte Mineralsäuren, zur Mässigung der zu starken Herzthätigkeit auch die Digitalis, und das kräftigste Mittel, um ein erhöhtes Gefässleben herabzustimmen, die Blutentleerungen. Dieses letztere Mittel wird meistens durch die Blutung selbst entbehrlich gemacht, da durch sie selbst die Hauptwirkung, die man durch die Aderlässe bezweckt, nämlich Verminderung der Blutmasse herbeigeführt wird, auch darf eine Aderlässe nicht wohl angewandt werden, wenn man befürchten muss, dass ungeachtet derselben noch sehr viel Blut entleert werden wird, wie z. B. bei einer nicht mehr zu verhindernden Frühgeburt, indem in einem solchen Falle der Kranke durch den doppelten Blutverlust allzusehr geschwächt werden könnte; anzuwenden ist dagegen dieses kräftige Mittel, wenn man hoffen kann, einem Blutfluss vorzubeugen oder wenn es darauf ankommt, ein edles Organ zu retten, das durch eine starke Blutergiessung zerstört würde. Hier wirkt die Aderlässe nicht allein durch die Blutverminderung, sondern auch zum Theil durch Ableitung.

Wie im allgemeinen, so sucht man auch örtlich das erhöhte Gefässleben herabzustimmen, wozu die zurücktreibenden Mittel, namentlich die örtliche Anwendung der Kälte, passen, welche Mittel aber bei activen Blutflüssen mit mehr Vorsicht als die bisher angegebenen in Gebrauch gezogen werden müssen, da sie leicht einen Blutandrang nach andern Theilen zur Folge haben können. Zu demselben Zwecke hat man auch ableitende Mittel, namentlich warme Fuss- oder Handbäder, und Blutegel oder Schröpfköpfe an entfernte Theile gesetzt, empfohlen, ferner die Umbindung der Gliedmassen, so dass die Venen, nicht aber die Arterien, zusammengedrückt werden, wodurch eine Quantität Blut, so lange dieselbe dauert, ausserhalb der Circulation bleibt, was aber ein sehr unsicheres und selbst leicht nachtheiliges Mittel ist; dagegen wäre die Zusammendrückung der zu den blutenden Theilen führenden Gefässe das zuverlässigste Mittel, wenn dasselbe auch bei den, der medicinischen Behandlung zugewiesenen, aus innern Theilen erfolgenden Blutungen eine Anwendung finden könnte.

Was endlich die Mittel betrifft, die zur Verschliessung der Oeffnungen, aus welchen das Blut fliesst, nothwendig werden, so kann hier auf das, was über die Behandlung des passiven Blutflusses sogleich gesagt werden wird, verwiesen werden.

§. 984.

Bei der Behandlung der passiven Blutflüsse haben wir die Anzeigen, die Lebensthätigkeit in den erschlafften oder theilweise zerstörten Gebilden in der Art umzustimmen, dass das Gewebe sich zusammenzieht und das Blut möglichst aus diesen Theilen entfernt wird, so wie auch die Oeffnungen, aus welchen das Blut sich ergiesst, mechanisch zu verstopfen. Auch kann in einzelnen Fällen die Aufgabe vorliegen, die Beschaffenheit des Blutes zu verbessern, und es hiedurch weniger

geneigt zu machen, aus den Gefässen zu treten. Die meisten der ersten Anzeige entsprechenden Mittel passen auch für den letztern Zweck, indem sie auch bei dem Scorbute, wo vorzugsweise eine solche fehlerhafte, die Blutflüsse begünstigende Beschaffenheit des Blutes vorkommt, in Anwendung gebracht werden können. In den Fällen, in welchen noch ein Zweifel über die active oder passive Natur des Blutflusses obwalten kann, sind unter den innerlichen Mitteln vorzüglich kaltes Wasser, die Pflanzen- und Mineralsäuren, namentlich das Acidum sulphuricum dilutum, so wie auch das Elixir acidum Halleri (Nro. 53) und Elixir Vitrioli Mynsichti, das Kochsalz und der Alaun passend. Bei vollständig entwickeltem passivem Character können dieselben Mittel und ausserdem das Gummi Kino, die Terra Catechu, der Eisenvitriol, die Abkochungen und Extracte von Radix Bistortae, Tormentillae, von Campechenholz, Eichenrinde, Weidenrinde, Radix Ratanhiae (Nro. 54), China etc., und vorzüglich auch die Zimmttinctur und das Creosot (Nro. 55) angewandt werden. Wie in der Zimmttinktur etwas Geistiges wirkt, so können auch bei sehr darniederliegender Nerventhätigkeit, neben den andern angegebenen Mitteln, mit Vorsicht erregende Mittel gebraucht werden, namentlich rother Wein, Branntwein, der Spiritus sulphurico-aethereus etc.

Noch wirksamer, als diese innerlichen Mittel, sind die örtlich angebrachten: Umschläge, Bespritzungen, Einspritzungen von kaltem Wasser, Eis, Schnee, den Schmucker'schen Umschlägen (Nro. 18), Wasser mit Essig, Mineralsäuren, Alaun, Vitriol, Branntwein, Wein, Thedens, Schusswasser, Terpenthingeist, Creosot, Abkochungen von Eichen-, Weiden-Rinden etc., das Aufstreuen von zusammenziehenden Pulvern, Alaun, Kinogummi etc., von klebenden Mitteln, wie arabisches Gummi, Traganth, Leim, Mehl etc., das Auflegen und Compression

vermittelst des Eichenschwammes, des Meerschwammes, Charpie, Compressen, das Ausstopfen der Höhlen mit Charpie, Unterbindung der blutenden Gefässe, das glühende Eisen. Auch hat man ableitende Mittel empfohlen, wie Fuss- oder Handbäder, Senfteige, trockene Schröpfköpfe auf entfernte Theile gesetzt, welche Mittel aber nur eine geringe Wirkung äussern können; endlich auch hier, wie bei den activen Blutungen, die Unterbindung der Gliedmassen.

§. 985.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die bedeutendsten Zufälle während der Blutflüsse sind: grosse Schläfrigkeit, Ohnmachten und Krämpfe. — Steht der Blutfluss stille und ist die Erschöpfung nicht zu gross, so darf der Kranke, unter gehöriger Aufsicht, sich dem Schlafe überlassen; dauert aber die Blutung fort und ist die Entkräftung so gross, dass ein Erlöschen des Lebens zu fürchten ist, so muss man den Kranken wach zu erhalten suchen, damit noch hinreichende Reitze auf das Leben einwirken. — Gegen Ohnmachten dienen insbesondere Besprengungen des Gesichtes mit kaltem Wasser, Anstreichen mit geistigen Dingen, Essigwaschungen, Riechenlassen an scharfem Essig, Hirschhorngeist etc., Reibungen des Körpers an Orten, die von der Stelle der Blutung entfernt sind und auch, jedoch nur mit grosser Vorsicht, dass hiedurch nicht die Blutung vermehrt werde, die innerlichen erregenden Mittel, wozu sich vorzüglich die Zimmttinktur eignet. Ist auf die angegebene Weise das Leben nicht mehr zu erhalten, so kann auch die Transfusion von Blut versucht werden. — Stellen sich Krämpfe ein, so muss der Kranke, wenn er Neigung hiezu hat, dem Schlafe überlassen werden, man wendet die besänftigenden Mittel an, vorzüglich auch Opium, unter den nöthigen Vorsichtsmaassregeln, namentlich unter gleichzeitigem Gebrauche der blut-

stillenden Mittel. Ist man sicher vor der Wiederkehr der Blutung, ist z. B. derselben durch Conpression vorgebeugt, so können auch warme Bäder angewandt werden.

§. 986.

Ist der Blutfluss gestillt, so müssen die, gegen ihn gebrauchten Mittel noch einige Zeit in Anwendung bleiben und alles aufs sorgfältigste vermieden werden, was seine Wiederkehr bewirken könnte. In der Regel ist es nothwendig, den Kranken noch einige Zeit auf schmaler Kost zu lassen, und wenn eine bessere Ernährung nothwendig ist, nicht erhitzende Nahrungsmittel zu wählen, wie Milchspeisen, dünne Fleischbrühe, Sago, Gerstenschleim etc.

§. 987.

Nach diesen Regeln können alle Blutflüsse behandelt werden, und es bleibt daher nur übrig, diejenigen Besonderheiten des Heilverfahrens anzugeben, welche durch die Natur des Organs, aus welchem der Blutfluss erfolgt, bedingt sind, und einige gegen einzelne Arten der Blutflüsse besonders gerühmte Mittel anzuführen.

Da das Nasenbluten häufiger kritisch nnd seltener gefährlich, als andere Blutflüsse, ist, und durch seine unzeitige Unterdrückung leicht das Gehirn afficirt werden kann, so ist eine gewaltsame Hemmung desselben seltener als bei den meisten andern Blutflüssen angezeigt. Erregt das Aufschnupfen von kaltem Wasser und andern stiptischen Dingen Niesen, so muss es unterlassen werden, und es ist oft besser, nichts in die Nase zu bringen und die Nase durchaus nicht zu berühren, damit der sich bildende Blutpfropf, der oft am besten die Blutung stillt, nicht hinweggeräumt werde. Man macht nicht allein auf die Nase, sondern auch auf die Stirne, den ganzen Kopf und den Nacken kalte Umschläge, besonders wenn man eine Blutanfüllung in den Gefässen des Kopfes überhaupt annehmen kann. Bringen die kalten Umschläge

und das Einschnupfen von stiptischen Dingen keinen Nutzen, so kann man, vermittelst einer Sonde Charpie, welche mit stipftischer Flüssigkeit getränkt oder mit Eiweiss bestrichen und mit stiptischen Pulvern bestreut und an einem Faden befestiget ist, in die Nasenhöhle einbringen. Zuweilen ist es nothwendig, beide Nasenhöhlen auszustopfen. Oft ist das Einführen eines oben zugebundenen Darms und das nachherige Ausfüllen desselben mit kaltem Wasser nützlich. Kommt das Blut aus weit oben sich befindenden Gefässen, so dass die blutende Stelle durch die von vornen eingebrachte Charpie nicht erreicht wird, so sucht man vermittelst einer Saite, welche man durch die Nase einführt und vermittelst einer gebogenen Kornzange aus der hintern Nasenöffnung durch den Mund herausführt, oder vermittelst der Bellocq'schen Röhre einen Charpiebausch in die hinteren Nasenlöcher zu bringen und füllt sodann die ganze Nasenhöhle mit Charpie aus. Dieses Verfahren ist in den Fällen vollkommen sichernd, in welchen dieser Verband von dem Kranken ertragen wird, oft erregt er aber einen zu grossen Reitz, so dass er hinweggenommen werden muss oder er wird von selbst locker, so dass das Blut aus der vordern oder hintern Nasenöffnung ausfliesst. In diesen Fällen ist das Einbringen der Charpie oft nachtheilig, indem sie die wunden Stellen immer von neuem aufreitzt und daher an der Heilung hindert. Befindet sich die blutende Stelle weit nach vornen in der Nase, so genügt es oft, die Nase anhaltend zusammenzudrücken.

§. 988.

Bei dem Mundbluten dienen, ausser den zusammenziehenden Mundwassern, Essig und Wasser, Alaunauflösung etc., die Compression, das glühende Eisen und andere chirurgische Mittel. Blutblasen öffnet man in der Regel.

§. 989.

Der Bluthusten erfordert sorgfältige Vermeidung alles dessen, was zum Husten reitzt, daher des Sprechens, scharfer Stoffe in der Luft, die der Kranke einathmet, z. B. des Tabakes, der Getränke, die zum Husten reitzen, daher müssen die Mineralsäuren, die man in dieser Krankheit anwendet, in einem dicken, schleimigen Getränke, z. B. Salepdecoct, gegeben werden etc. Auch sucht man den Husten durch Arzneimittel zu mässigen, wie z. B. durch Mixturen mit Oel und arabischem Gummi, Bilsenkrautextract, nach *Harless* das Oleum Hyoscyami coctum, das Opium nur bei dem geringern Blutauswurf, welcher zuweilen durch heftigen Krampfhusten erzeugt ist etc.

Mehr als bei allen andern Blutflüssen ist bei dem Bluthusten die Aderlässe angezeigt, welche in der Regel und besonders bei heftigen Anfällen, am Arme vorgenommen werden muss, bei weniger dringender Gefahr aber und bei unterdrückten Hämorrhoiden oder unterdrückter monatlicher Reinigung am Fusse vorgenommen werden kann. Unter den übrigen, gegen den Bluthusten besonders gerühmten Mitteln, müssen erwähnt werden: das von *Fr. Hoffmann*, *Burserius* u. a. empfohlene kalte Wasser, jede halbe Stunde 8 — 10 Unzen immer kälteres Wasser und zuletzt selbst Gefrornes, die Mineralsäuren, Alaunmolken, das von *Rush* empfohlene Kochsalz, der von *Lentin* anempfohlene Salmiak etc. In dringenden Fällen kann man auch kalte Umschläge auf die Brust machen lassen, welche aber hinweggenommen werden müssen, sobald dieselben Husten erregen.

§. 990.

In der Behandlung des Blutbrechens ist ebenfalls auf die erregenden oder den Blutfluss unterhaltenden Ursachen Rücksicht zu nehmen. Sind giftige und andere reitzende Stoffe in dem Magen, so müssen Milch, Butter-

milch, Emulsionen, Oel und andere einhüllende Mittel gegeben, oder diese Stoffe durch die geeigneten Mittel neutralisirt oder, was jedoch hier nur bei dringender Anzeige geschehen darf, durch Beförderung des Brechens ausgeleert werden, ist ein heftiges krampfhaftes Erbrechen die Ursache des Blutbrechens oder wenigstens mit demselben verbunden, so müssen der Riverische Trank und andere Brechen stillende Mittel, in dringenden Fällen Opium, gegeben werden, mit welchem schicklich blutstillende und die Blutwallungen zurücktreibende Mittel, wie die Mineralsäuren, verbunden werden können. Sind langwierige Stockungen des Blutes im Pfortadersystem die Ursache, so passen auflösende Mittel, und man darf durch die hiebei häufig vorkommenden gastrischen Stoffe sich nicht leicht dahin führen lassen, ein Brechmittel zu geben etc.

Sehr häufig sind die Anfälle des Blutbrechens so stark, dass nicht immer sogleich auf die erregenden Ursachen Rücksicht genommen werden darf, sondern ohne Verzug die blutstillenden Mittel in Anwendung gebracht werden müssen. Selten passt bei diesem Blutflusse die Aderlässe, indem derselbe meistens passiver Natur ist; sie kann jedoch von Nutzen sein, wenn das Blutbrechen von starker Körpererhitzung, äusserer Gewalt, unterdrückten Blutflüssen u. dgl. veranlasst ist. Die vorzüglichsten Mittel sind wohl eiskaltes Wasser und verdünnte Mineralsäuren, im Nothfalle zerstossenes Eis oder Schnee auf die Magengegend gelegt. Auch sind die Alaunmolken, Eisenvitriol (von *Adair* gerühmt) und das Terpenthinöl empfohlen worden. Bei der Anwendung aller innerlichen Mittel muss man übrigens darauf aufmerksam sein, ob sie nicht zum Erbrechen reitzen, und dieselben aussetzen, so wie dieses der Fall ist.

Treten nach dem Blutbrechen keine gehörigen Stuhl-

entleerungen ein, wodurch das im Darmkanal befindliche Blut entleert wird, so sucht man dieselben auf eine gelinde Weise durch Manna, Tamarinden, Weinsteinrahm und Klystiere aus Molken etc. zu befördern.

Der Kranke muss noch längere Zeit bei einer kühlenden und schwach nährenden Kost beharren und sich kühlender Getränke, wie Limonade, Molken, Buttermilch etc. bedienen.

§. 991.

Bei der Behandlung des Blutharnens müssen alle die Harnwerkzeuge reitzenden Dinge vermieden werden, daher auch die Salze, die sonst zur Stillung der Blutflüsse angewandt werden, dagegen dienen einhüllende Mittel und bei grosser Reitzung selbst Opiate, sind Canthariden die Ursache der Blutung, so sind Emulsionen mit Kampher von Nutzen. Im übrigen passen die gewöhnlichen blutstillenden Mittel.

Bei der Blutung aus der Harnröhre sind vorzüglich örtliche Mittel dienlich, kalte Umschläge, Baden des Gliedes in kaltem Wasser, zusammenziehende Einspritzungen, Druck durch Auflegen von Compressen, Zusammendrücken der Harnröhre mit den Fingern oder Einbringen einer Kerze und das Zusammendrücken der nach vornen über die Eichel gezogenen Vorhaut.

§. 992.

Bei dem Mutterblutflusse im nicht schwangern Zustand der Gebärmutter müssen die oft als Ursachen wirkenden Kothansammlungen in den Gedärmen und andere gastrische Reitze entfernt, Mutterpolypen unterbunden werden etc. Nebst dem passen die gewöhnlichen blutstillenden Mittel. Sind Einspritzungen in die Scheide nothwendig, so kann man hiezu kaltes Wasser, Wasser und Essig, auch mit Zusatz von rothem Wein oder Branntwein, Alaunauflösung und zusammenziehende Abkochungen wählen. Ein bei augenblicklicher Gefahr anzuwendendes sicheres Mittel ist die Ausstopfung der Scheide mit Charpie, zusammen-

gedrehter Leinwand oder einem Schwamme (der Tampon), wobei diese Stoffe vor ihrer Beibringung in zusammenziehende Flüssigkeiten getaucht werden können.

§. 993.

Der Mutterblutfluss in den ersten Monaten der Schwangerschaft und die davon abhängende Fehlgeburt können eher verhütet, als wenn sie einmal begonnen haben, gehemmt werden. Dem zu Folge muss bei Anlage zu dieser Blutung und zur Fehlgeburt die grösste Sorgfalt auf die Vermeidung der Ursachen gewendet werden, daher vor dem Coitus gewarnt werden; es muss auf die Umgebungen der Schwangern gewirkt werden, damit sie zu keinem Verdrusse Veranlassung geben, oder es kann auch die Schwangere zur Vermeidung beider Gelegenheitsursachen sich bei Verwandten oder an einem Badeorte aufhalten; starke Körperbewegung und Erschütterung müssen vermieden werden, bei sehr grosser Neigung zum Abortus kann selbst eine, mehrere Monate fortgesetzte Rückenlage anempfohlen werden, bei Vollblütigen muss die Nahrung sparsam sein und es ist zuweilen zuträglich, frühzeitig, z. B. im zweiten Monat der Schwangerschaft zur Ader zu lassen, bei Schwächlichen dagegen sind zuweilen stärkende Mittel, z. B. die innerliche Anwendung von Eisenmitteln und Stahlbäder nothwendig, bei Neigung zu rheumatischen Affectionen muss eine flanellene Binde um den Unterleib getragen werden, bei Neigung zur Verstopfung muss für tägliche Leibesöffnung gesorgt werden etc. Um künftighin Fehlgeburten zu verhüten, ist es gut, wenn die hiezu geneigte Frau nicht zu schnell nach geschehenem Abortus wieder schwanger werde und wenn sie einmal ausgetragen hat, dass sie ihr Kind selbst stille.

Hat der Blutfluss schon begonnen, so kann allerdings eine Aderlässe von Nutzen sein, doch erfolgt sehr oft, ungeachtet derselben und wenn schon wehenartige

Schmerzen eingetreten sind, beinahe immer der Abortus, in welchem Falle die vorgenommene Aderlässe durch zu grosse Entkräftung der Kranken nachtheilig werden kann und daher im allgemeinen besser unterlassen wird. Die kühlenden blutstillenden Mittel, namentlich verdünnte Mineralsäuren sind nunmehr anzuwenden und, wenn wehenartige Schmerzen hinzukommen, zugleich das Opium in kleinen Gaben, etwa in einer Emulsion mit süssem Mandelöl. Die Zimmttinctur und das Secale cornutum dürfen dagegen, so lange der Abortus noch vermieden werden kann, durchaus nicht angewandt werden, indem sie die Zusammenziehungen der Gebärmutter befördern und dadurch die Blutung vermehren und den Abortus bewirken.

Kann die Fehlgeburt nicht mehr vermieden werden, fliesst anhaltend viel Blut ab, ohne dass gehörige Wehen vorhanden sind und die Geburt vorwärts schreitet, so kann man, wenn die künstliche Entbindung noch nicht möglich ist, durch eine gehörige Gabe von Zimmttinctur oder durch Secale cornutum, so wie auch durch kreisförmige Reibungen der untern Bauchgegend, und selbst durch kalte Umschläge und Einspritzungen, die Zusammenziehungen der Gebärmutter und dadurch die Geburt zu beschleunigen suchen. Wird die Gefahr dringend, so muss man tamponiren, bis die Geburt weiter vorgerückt ist. Bleibt die Frucht zu lange zurück, was oft noch geschehen kann, wenn schon das ganze Ei von der Gebärmutter getrennt ist, so leitet man dieselbe mit der Hand heraus.

§. 994.

Bei dem Mutterblutflusse in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft, welcher von dem auf dem Muttermunde aufsitzenden Mutterkuchen herrührt, muss man, wenn der Blutfluss noch mässig ist und die Geburt noch nicht erwartet werden kann, suchen, durch Ruhe, eine antiphlogistische Diät und kühlende Mittel die Blutung

so selten und so gering als möglich zu machen, damit die Schwangerschaft so nahe als möglich bis zur regelmässigen Zeit der Geburt vorrücke; ist die Blutung schnell Gefahr drohend und der Muttermund schon so weit geöffnet, um ohne Gefahr die Hand durch denselben bringen zu können, so muss die künstliche Entbindung vorgenommen werden; ist der Muttermund noch nicht so weit offen, so muss bei Gefahr der Verblutung tamponirt werden.

§. 995.

Bei den Blutungen während und sogleich nach der Geburt ist sehr häufig die Hülfe des Geburtshelfers nothwendig, indem dieselbe oft nur durch die künstliche Entbindung oder die Hinwegnahme der Nachgeburt gestillt werden können. Ausserdem können auch die gewöhnlichen blutstillenden Mittel angewandt werden, wobei aber die Anwendung der Zimmttinctur stets von der Frage abhängig ist, ob Contractionen der Gebärmutter bewirkt werden sollen oder nicht. Der Tampon passt für dringende Fälle, wo die künstliche Entbindung nicht angezeigt ist. Tritt nach der Geburt bei ausgedehnter Gebärmutter ein Blutfluss ein, so passt der Tampon nicht, weil hier leicht eine innere Blutung stattfinden könnte, sondern es müssen Mittel, welche Zusammenziehungen der Gebärmutter erregen, in Anwendung kommen, wie die Zimmttinctur, kreisförmiges Reiben der untern Bauchgegend, kalte Umschläge und Aufspritzen von Wasser auf dieselbe, Einspritzungen von gleichen Theilen Branntwein, Essig und Wasser in die Gebärmutter, endlich das Einbringen der Hand in den Uterus und das Andrücken desselben vermittelst eines äussern Druckes gegen die in demselben geballte Faust.

§. 996.

Bei der zu starken Kindbettreinigung genügt es oft, die erhöhte Reitzbarkeit durch leichte Mittel, wie Man-

delmich, Oelmixturen etc. zu besänftigen oder leichte kühlende Mittel anzuwenden, die Kindbetterin eine magere Diät befolgen und das Kind fleissig anlegen zu lassen. Selten sind stärkere blutstillende Mittel nothwendig. Kalte Ueberschläge werden leicht nachtheilig. In dringenden Fällen ist der Tampon das sicherste Mittel.

FÜNFTE KRANKHEITS-FAMILIE.

Die krankhaften Absonderungen.

ERSTES HAUPTSTÜCK.

Von den krankhaften Absonderungen im allgemeinen.

§. 997.

Krankhafte Absonderungen sind diejenigen Krankheitsprozesse, wodurch entweder eine zu grosse Menge von Ausscheidungsstoffen gebildet wird oder diese Stoffe eine fehlerhafte Beschaffenheit erhalten, oder in zu geringer Menge erzeugt werden.

§. 998.

Das Krankheitsbild ist sehr verschieden, je nachdem die eine oder die andere dieser drei Abweichungen vom normalen Zustand stattfindet und je nachdem das eine oder das andere Absonderungsorgan leidet. Die Erkennung ist gewöhnlich leicht, indem in der Regel das Erzeugniss des krankhaften Vorgangs nach aussen gestossen wird oder die gewöhnlichen Ausscheidungsstoffe nicht zum Vorschein kommen, doch giebt es auch Ablagerungen in das Innere des Körpers, die man vorzüglich aus den Folgen derselben zu erkennen suchen muss.

§. 999.

a) *Die vermehrte Absonderung.* Dieselbe kommt oft vor als Ausgang von Entzündung, häufig als Begleiter von Fiebern, oft aber auch ohne dieselben. Sie kündigt sich zuweilen durch erhöhte Empfindlichkeit des leidenden Theiles an, oft aber ist dieses nicht zu bemerken und die Absonderung beginnt ohne alle Vorboten. Die Ausscheidungen sind oft erleichternd und hören, nachdem durch sie selbst der Krankheitszustand gehoben ist, von freien Stücken auf, oft veranlassen sie aber verschiedene secundäre Krankheitszufälle und werden leicht langwierig. Das Absonderungsorgan selbst wird durch den andauernden Krankheitsprozess oft selbst mehr oder weniger in seiner Structur verändert, weich, empfindlich, zuweilen stocken die abgesonderten Stoffe in ihm und veranlassen eine neue Reitzung, Geschwulst und selbst Entzündung; ebenso können auch die abgesonderten Stoffe in benachbarten Theilen liegen bleiben und dort als krankhafter Reitz wirken; durch die vermehrte Absonderung kann allmählig eine fehlerhafte Mischung des Blutes und selbst der festen Theile herbeigeführt werden, und durch die übermässige Entleerung von Stoffen kann Entkräftung, Abmagerung und Zehrfieber veranlasst werden.

§. 1000.

b) *Die der Art nach veränderte Absonderung.* Es ist die vermehrte Absonderung in der Regel auch mehr oder weniger mit einer Umänderung in der Beschaffenheit der abgesonderten Stoffe verbunden. Zuerst sind die Stoffe mehr dünnflüssig, werden sodann zäher und zuletzt dick und geballt. Oft ist aber die qualitative Umänderung sehr wichtig und wichtiger als die Menge der Stoffe, die zuweilen nicht grösser als im normalen Zustande ist. Es zeichnen sich die abgesonderten Stoffe oft dadurch aus, dass sie wegen veränderter Beschaffenheit nicht mehr zu den Zwecken, zu welchen sie im

Körper noch verwandt werden sollen, gebraucht werden können, oder dass sie scharf sind und die Theile, mit denen sie in Berührung kommen, reitzen und selbst in Entzündung oder Verschwärung versetzen, oder dass sie ernährende Theile aus dem Körper ausscheiden und dadurch Abzehrung herbeiführen, oder endlich dadurch, dass sie bei einem Individuum, dem sie als Nahrung dienen sollen, Uebelbefinden veranlassen oder dass sie Ansteckungsstoffe enthalten, wodurch sie in einem gesunden, dafür empfänglichen Körper dieselbe Krankheit erzeugen. Oft erkennt man die veränderte Beschaffenheit der Ausscheidungsstoffe auf ihrem Aussehen und vermittelst der chemischen Untersuchung, oft aber auch nur an der üblen Wirkung, die sie auf den Körper des Kranken oder auf ein anderes Individuum äussern.

§. 1001.

c) *Die Verminderte und unterdrückte Absonderung.* Die örtlichen und die allgemeinen Zufälle, die der Verminderung und Unterdrückung der Absonderung vorausgehen und sie begleiten, sind entweder Zufälle von Reitzung, Krampf, Entzündung, insbesondere Hitze, Geschwulst, Härte, entzündliches Fieber, oder Zeichen von verminderter Lebensthätigkeit und selbst von Lähmung. Die verminderte Absonderung kann in dem Absonderungsorgan eine Stockung der Säfte und selbst Entzündung zur Folge haben; es werden die Verrichtungen, welche durch die abgesonderten Stoffe unterstützt werden sollen, gestört; es werden die Stoffe, welche durch die nunmehr gehemmte Absonderung aus dem Blute und den festen Theilen ausgeschieden werden sollen, nicht entfernt, die Mischung leidet daher und es kann daher Cachexie oder Fieber entstehen; endlich wird auch leicht durch die unterdrückte Absonderung antagonistisch eine krankhafte Thätigkeit geweckt, es entsteht oft in entfernten Theilen eine Absonderung, die zuweilen den

Character der unterdrückten Secretion deutlich an sich trägt, oder es entsteht Schmerz, Krampf, Entzündung etc.

§. 1002.

Anlage zu krankhaften Absonderungen haben vorzüglich Individuen mit erethischer Constitution und cachectische Leute.

Gelegenheitsursachen sind eines Theiles alle Reitze, die unmittelbar oder durch Consens und Antagonismus auf ein Absonderungsorgan wirken; insbesondere verdienen die Seelenreitze Erwähnung, die nach der Verschiedenheit ihres Characters immer bestimmte Absonderungen erregen, so vermehrt der Zorn die Gallenabsonderung und zum Theil auch die Absonderung des Speichels, der bei Thieren zuweilen selbst eine giftige Beschaffenheit erhalten soll, das Gelüste nach Speisen die Speichelabsonderung, der Kummer die Thränen, die Furcht die Harnabsonderung etc.; auch verdient besonders erwähnt zu werden, dass gewisse Substanzen nur als Reitze für besimmte Absonderungen wirken, dass durch Unterdrückung einer Absonderung sehr leicht eine Erregung einer andern erfolgt, wodurch oft die gleichen oder wenigstens ähnliche Stoffe, wie durch die unterdrückte Absonderung, erzeugt werden und dass durch Vermehrung einer Absonderung oft eine andere vermindert wird; endlich auch, dass oft eine Veränderung der Säfte, wodurch das Material zur Absonderung ein anderes wird, der entferntere Grund der krankhaften Absonderung ist, wie dieses z. B. bei der durch das Quecksilber erzeugten Dyscrasie der Fall ist.

§. 1003.

Wesen der Krankheit. Die Absonderung ist ein Lebensprozess und zwar ein Prozess der Verflüssigung, der durch die Zusammenwirkung von wenigstens zweien Kräften oder Stoffen bewirkt wird. Eines Theiles wirkt immer das Nervensystem und zwar bewirkt dasselbe an

verschiedenen Endigungen (Polen) verschiedene Arten der Absonderung, andern Theiles nehmen das Blut und auch die verschiedenen Substanzen im Organengewebe Theil, denn es werden dieselben beständig aufgelöst, zu anorganischen Stoffen verwandelt und ausgeschieden, während sie immer von neuem ersetzt werden. Krankhaft wird nun die Absonderung, wenn entweder das Nervensystem primär leidet oder die ihm entgegenstehenden Stoffe verändert sind. Eine fehlerhafte Thätigkeit des Nervensystems ist Ursache der fehlerhaften Absonderung bei verschiedenen Nervenkrankheiten, wie z. B. in Krampfkrankheiten, bei Hypochondrie, bei Lähmungen, ferner bei Seelenreitzen, bei rein örtlich stattfindenden Einwirkungen, und bei den consensuell und antagonistisch wirkenden Reitzen, wie z. B. ersteres bei der vermehrten Gallenabsonderung, die auf eine Reitzung des Gehirnes eintritt und letzteres bei dem schnell entstehenden Durchfall auf unterdrückte Hautausdünstung der Fall ist. — Von dem Nervensystem aus kann sowohl eine Absonderung erhöht werden, was der häufigste Fall ist, als auch qualitativ verändert werden, was z. B. bei manchen, auf Seelenreitze eintretenden Veränderungen der Absonderungen, namentlich bei der Milch-, Gallen- und Speichelabsonderung öfters der Fall ist, als auch unterdrückt werden, was z. B. bei Lähmung geschieht.

Von den dem Nervensysteme entgegenwirkenden Stoffen, die vorzüglich das Material zur Absonderung hergeben, geht die Krankheit aus, wenn das Blut quantitativ oder qualitativ verändert ist, wie dieses letztere z. B. der Fall ist bei Aufsaugung fremdartiger Stoffe, wo sodann das von den Nerven ausgehende Etwas, das Blut und der fremdartige Stoff, z. B. ein Contagium, die Factoren des krankhaften bio-chemischen Prozesses sind, ferner wenn Stoffe nicht aus dem Blute entleert werden, die ausgeschieden werden sollen, z. B. bei Desorganisation der

Leber oder der Nieren, oder wenn das Blut innerhalb der Gefässe durch langwierige Stockungen und krankhafte Lebensprozesse eine Mischungsveränderung erhalten hat etc., so wie auch, wenn die Organengewebe nicht die gehörige Beschaffenheit haben, z. B. zu viel Fett erzeugt worden ist, das zur Verflüssigung geneigt ist. Viele Einflüsse mögen zugleich aufs Nervensystem und durch Veränderung der Blutmasse wirken, auch mögen wohl manche Stoffe in die Blutmasse gelangen, ohne auf das Blut verändernd zu wirken, und nur auf diesem Wege in innigere Berührung mit dem Nervensystem gebracht, dieses doch primär afficiren. Manche äussere Einflüsse haben vorzugsweise zu bestimmten Organen eine Beziehung, mögen sie diese Theile auf consensuelle und antagonistische Weise oder indem sie in die Wege der Circulation aufgenommen sind, erregen, welches letztere namentlich bei den Contagien der Fall zu sein scheint.

Die vermehrte Absonderung ist wohl immer eine erhöhte Lebensthätigkeit, eine vermehrte Absonderung aus Lähmung scheint es nicht zu geben. Eine passive Ergiessung von Säften durch zerstörtes oder aufgelockertes Gewebe, kann wohl nicht Absonderung genannt werden, und es liegt auch durchaus kein Beweis vor, dass die eigentlichen Absonderungen auf diesem Wege zu Stande kommen. Als einen Beweis für das Gegentheil kann ich anführen, dass ich in dem Darmkanal, der wegen der zarten Structur der Schleimhaut am meisten zur passiven Aussickerung seröser Flüssigkeit geeignet wäre, niemals bei langwierigen Durchfällen, das Gewebe der Schleimhaut mit Serum infiltrirt sah, sondern dasselbe, wenn eine Veränderung angetroffen wurde, immer verschwärt und theilweise entzündet fand. Zuweilen ist wohl auch die Vermehrung der Absonderung nur scheinbar, indem das Erzeugniss der Absonderung in seiner

Beschaffenheit verändert ist und daher mehr in die Augen fällt, dieses mag z. B. oft bei der Verschleimung der ersten Wege statt finden, wo statt der farblosen und mehr wässerigen Feuchtigkeit, die die Schleimhaut überzieht, ein weisslicher, zäher Schleim abgesondert wird.

Die verminderte Absonderung kann sowohl durch eine gesunkene Lebensthätigkeit bedingt sein, z. B. bei Lähmung, als auch durch eine erhöhte, wobei aber in dem Absonderungsorgan der gewöhnliche Character seiner Thätigkeit, nämlich der der Verflüssigung aufgehoben ist; dieses findet vorzüglich statt bei einer vollkommenen Entzündung, bei welcher das Blut in eine gleichförmige festere Masse umgewandelt wird und also keine Verflüssigung zu Stande kommt.

§. 1004.

Vorhersage. Erscheinen krankhafte Absonderungen im Gefolge von andern Krankheiten, so sind dieselben sehr häufig, ja in der Regel wohlthätig, oft sind sie aber auch ein schlimmes Symptom und vermehren oft, besonders durch Erschöpfung der Kräfte, die Gefahr. Für sich bestehende krankhafte Absonderungen werden nur selten lebensgefährlich und können auch meistens gehemmt werden, doch giebt es auch sehr gefährliche und der Kunst meistens Trotz bietende Arten von krankhaften Absonderungen. Oft muss die Vorhersage weniger günstig sein, weil wir nicht alle, uns zu Gebot stehende Mittel, um die Absonderung zu unterdrücken, wegen Gefahr einer Metastase, in Anwendung bringen dürfen.

§. 1005.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Wir müssen den etwa im Körper sich befindenden Reitz, der die Absonderung unterhält, aufsuchen und entfernen, so namentlich müssen auch die Producte der krankhaften Thätigkeit, insofern sie wieder als Reitz wirken, hinweggebracht werden, wie z. B.

Säure und scharfe Galle; wir müssen, ausser der krankhaften Absonderung, die zunächst der Gegenstand unserer Behandlung ist, auf die übrigen Secretionen im Körper unser Augenmerk richten und sie so zu reguliren suchen, dass sie nicht nachtheilig auf das kranke Absonderungsorgan zurück wirken; wir müssen die Diät des Kranken so ordnen, dass in den genossenen Speisen und Getränken Nichts enthalten ist, was nachtheilig auf die Absonderungen wirkt etc.

§. 1006.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Es giebt zwei Wege, um auf die Absonderungen zu wirken, Umstimmung der Nerventhätigkeit und Veränderung der Blutmasse. Manche Mittel scheinen auf beiden Wegen zugleich die krankhafte Thätigkeit umzuändern.

1) *Verminderung der krankhaft vermehrten Absonderung.* Wir vermögen dieselbe durch Einwirkung auf das Nervensystem zu bewirken: durch Besänftigung der Nerven, vermittelst örtlich angebrachter Mittel, besänftigender Umschläge, Einreibungen, Einspritzungen etc. und durch innerliche, schleimige und vorzüglich durch narkotische Mittel, insbesondere bei mehreren Arten der Absonderungen durch das Opium; ferner durch Ableitung der Nerventhätigkeit vermittelst Erhöhung der Lebensthätigkeit in andern Theilen, insbesondere durch Vermehrung anderer Absonderungen, z. B. bei dem Durchfall durch Erregung des Schweisses, und bei dem Speichelfluss durch Erregung des Schweisses oder der Absonderung der Darmsäfte, durch Hautreitze etc., endlich durch Zurücktreibung der Nerventhätigkeit aus dem leidenden Organ nach andern Theilen oder durch Erregung einer Zusammenziehung des Gewebes im leidenden Theil oder einer mehr contractiven Thätigkeit im ganzen Körper, vermittelst der örtlichen und nach Umständen auch der

innerlichen Anwendung der Kälte und der tonischen und adstringirenden Arzneimittel.

Durch Einwirkung auf das Blut beschränken wir die Absonderungen, wie es scheint, dadurch, dass wir der Säftemasse eine weniger reitzende Beschaffenheit geben, durch den Genuss milder Nahrungsmittel und einhüllender Substanzen, und auch durch Entfernung reitzender Stoffe auf den für sie bestimmten Ausleerungswegen, z. B. durch Vermehrung des Urins, der Gallenabsonderung u. s. w. Ferner dadurch, dass wir die Quantität der zur Absonderung dienenden Säfte vermindern. Hiezu können aber nicht leicht und nur bei besondern Verhältnissen, z. B. bei Stockung des Blutes in den krankhaft-absondernden Organen Blutentleerungen gebraucht werden, da nach denselben das Blut leicht dünnflüssiger wird; häufiger passt Verminderung der serösen Bestandtheile des Blutes durch Verminderung des Getränkes und Erregung einer serösen Absonderung. Endlich wirken vielleicht auch öfters auf diesem Wege die tonischen Mittel, Columbo, China, Eisen etc., indem sie vielleicht die festern, zur Verflüssigung weniger geeigneten Bestandtheile des Blutes und der Gewebe vermehren und ihnen mehr Widerstandskraft gegen die auflösende Wirkung des Nerveneinflusses geben.

§. 1007.

2) *Umstimmung der Absonderung.* Zum Theil wird dieselbe schon dadurch bewirkt, dass wir die krankhaft-vermehrte oder verminderte Thätigkeit beschränken oder erhöhen, womit auch meistens die Beschaffenheit des Abgesonderten verändert und zum Normalen zurückgeführt wird. Auch vermögen wir noch ausserdem die Nerventhätigkeit qualitativ umzustimmen und das Blut in der Art zu verändern, dass die abgesonderten Stoffe eine andere Beschaffenheit erhalten. Das erstere geschieht durch gewisse Mittel, welche specifisch auf ein Organ

wirken, und die Lebensthätigkeit in ihm eigenthümlich umstimmen, wie dieses z. B. bei den Expectorantien der Fall ist, die, wie es scheint, die unmerkliche oder die mehr flüssige Aushauchung in den Lungen befördern und den zähen Schleim losstossen und seine Erzeugung beschränken. Auch vermögen wir die Thätigkeit eines Absonderungsorganes qualitativ umzustimmen, indem wir auf ein anderes mit ihm in Antagonismus (Polaritätsverhältniss) stehendes Organ einwirken. So wird die (zum Theil durch Umtausch der Polaritätswirkung hervorgebrachte) krankhafte Thätigkeit der Haut in der Gelbsucht umgestimmt und zum Normalen zurückgeführt, wenn wir auf die Leber wirken. Auf dem zweiten Wege verändern wir die Absonderungen dadurch, dass wir Stoffe in die Säftemasse bringen, welche dieselbe mehr oder weniger verändern, z. B. dünnflüssiger machen, wie dieses reichliches Getränk thut, wodurch der Verflüssigungsprozess begünstiget und eine zu zähe Absonderung zum Normalen gebracht wird, oder dass wir Stoffe aus dem Blute hinwegbringen, welche die fehlerhafte Absonderung unterhalten, z. B. gallichte Stoffe durch Erregung einer vermehrten Gallenabsonderung in der Leber.

§. 1008.

3) *Vermehrung der Absonderung.* Ist die verminderte Absonderung in einem gereitzten oder selbst entzündlichen Zustand des Absonderungsorgans begründet, so finden die besänftigenden oder die rein entzündungswidrigen Mittel ihre Anwendung, unter welchen, nach gemässigter Heftigkeit der Entzündung durch Blutentleerungen, diejenigen, die den Verflüssigungsprozess befördern, besonders angezeigt sind, wie der Brechweinstein, kühlende Mittelsalze etc. Auf diese Weise, durch Verminderung einer bis zum Entzündlichen gesteigerten Lebensthätigkeit, mögen die von *Currie* empfohlenen kalten Begiessungen unter gewissen Umständen

den Schweiss befördern,*) obgleich die Kälte sonst derjenige Einfluss ist, der am leichtesten die Absonderung unterdrückt. — Ist die verminderte Absonderung durch verminderte Lebensthätigkeit begründet, so dienen, nebst den Mitteln, die überhaupt den Verflüssigungsprozess befördern, wie Wärme und reichliches Getränk, diejenigen Mittel, die specifisch auf die Absonderungsorgane wirken und ihre Thätigkeit erhöhen, wie bei gehemmter Hautausdünstung die Diaphoretica, bei mangelnder Harnabsonderung die Diuretica, bei unterdrückter Gallenabsonderung die Cholagoga etc.

§. 1009.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die wichtigste Folge lange dauernder vermehrter Absonderungen ist Erschöpfung der Kräfte, welche durch Nahrung und tonische Mittel möglichst verhütet werden muss. Die Folgen der gehemmten Absonderungen sind sehr mannigfaltig und werden am besten durch schnelle Wiederherstellung der unterdrückten Absonderung gehoben; ausserdem müssen aber die Mittel in Anwendung gebracht werden, die sie ihrem besondern Character gemäss erfordern.

§. 1010.

Eintheilung der krankhaften Absonderungen. Da die Absonderungen auf eine dreifache Weise vom normalen Zustand abweichen können, so können sie auch in drei Ordnungen getheilt werden, 1) vermehrte, 2) qualitativ veränderte und 3) verminderte und unterdrückte Absonderungen. Da übrigens meistens Vermehrung und qualitative Veränderung der Absonderungen zugleich besteht, so ist es zweckmässig, die beiden ersten Abweichungen vereinigt abzuhandeln und demnach die krankhaften Absonderungen nur in zwei Ordnungen einzutheilen.

*) Vergl. das Kapitel von dem Scharlachfieber und dem Typhus.

ERSTE ORDNUNG DER KRANKHAFTEN ABSONDERUNGEN.

Die vermehrten und die der Art nach veränderten Absonderungen.

Das krankhafte Schwitzen.

(Ephidrosis, Sudatio morbosa.)

§. 1011.

Krankhaftes Schwitzen nennen wir diejenigen Schweisse, welche ohne äussere erregende Ursache und ohne Fieber ausbrechen, oder in Hinsicht ihrer Stärke in keinem Verhältniss zu den erregenden Einflüssen stehen.

§. 1012.

Man könnte wohl krankhafte Schweisse auch alle Schweisse nennen, in welchen die Hautausdünstung entweder der Menge oder der Art nach vom gesunden Zustande abweicht, mithin vorzüglich auch die durch besondern Geruch, oft durch eine klebrige Beschaffenheit, durch Veränderungen in der Farbe etc. sich öfters auszeichnenden Schweisse, die in Fiebern vorkommen, doch bezeichnet man mit Recht mit jenem Namen nur diejenigen Schweisse, welche als eine selbstständige Krankheit vorkommen und ein Leiden der Haut sind.

§. 1013.

Die Individuen, welche an dieser Krankheit leiden, werden durch leichte Körperbewegungen, ja durch die geringsten Gemüths- und geistigen Anregungen in Schweiss versetzt. Es ist hier freilich die Grenze zwischen dem gesunden und dem kranken Zustande schwer zu bestimmen, indem

etwas stärkere Körperanstrengungen auch bei dem Gesunden Schwitzen veranlassen, doch giebt es sehr viele Fälle, in welchen das Krankhafte unzweifelhaft ist, z. B. wenn schon Schweisse durch das ruhige Auf- und Abgehen in dem Zimmer ausbrechen oder der Schweiss tropfenweis aus der Brust und allen Theilen hervordringt, wenn der Kranke nur zu einem gewöhnlichen Gespräche veranlasst wird, wie ich einen derartigen Fall beobachtet habe. Die Kranken schwitzen besonders in der Nacht und vorzüglich gegen Morgen sehr stark, so dass sie oft mehrere Hemden zu wechseln genöthigt sind. — Die nächste Wirkung, die diese Schweisse hervorbringen, sind eine ausserordentliche Weichheit und Empfindlichkeit der Haut, so dass der Kranke sich sehr leicht verkältet; leicht entsteht eine Art Wundsein (Intertrigo) an verschiedenen Theilen und ein frieselartiger Ausschlag. — Dauern die Schweisse lange an und sind sie stark und allgemein, so schwächen sie leicht den Körper; doch gewöhnt sich auch dieser so sehr an dieselben, dass, wenn kein inneres Leiden den gehörigen Wiederersatz der Kräfte hindert, sie viele Jahre und andauernd, ohne für das Leben gefährlich zu werden, ertragen werden. — Gesellen sie sich zu Schwächekrankheiten hinzu, so beschleunigen sie die Erschöpfung der Kräfte.

§. 1014.

Sind die Schweisse nur örtlich, so sind sie oft beinahe andauernd vorhanden, sie nehmen, insbesondere die Fussschweisse, oft einen äusserst widerlichen Geruch an, sie machen die Haut an diesen Theilen äusserst zart und empfindlich und veranlassen eine gefleckte, oft ins bläuliche gehende Röthe, zuweilen selbst mit Lostrennung der Epidermis, wodurch die Fussschweisse ein anstrengendes Gehen sehr schmerzhaft machen. Wirkt auf den, mit dem örtlichen Schweisse behafteten Theil Kälte

und Nässe ein, so entstehen leicht Zahnweh, Katarrh, Rheumatismus, Bluteisen und auch schwerere Leiden.

§. 1015.

Anlage zum krankhaften Schwitzen haben Personen mit einer sehr zarten und verweichlichten Haut, wie es scheint, mehr Individuen mit blonden, als solche mit dunkeln Haaren und solche mit schwächlichem Körper und mit Anlage zur Schwindsucht. Gelegenheitsursachen werden die Gewohnheit, reichliches, warmes Getränk am Abend zu nehmen, zu starkes Zudecken des Körpers im Bette, das Tragen von zu warmen Kleidern und besonders anhaltendes Tragen von Flanell auf blosser Haut, Unreinlichkeit etc.

§. 1016.

Vorhersage. Es ist äusserst schwierig, der erweichten Haut die normale Beschaffenheit wieder zu geben, und es ist auch die Behandlung häufig ohne Erfolg, da wegen leicht eintretenden Metastasen die Verfahrungsweisen, welche die übermässige Hautthätigkeit am sichersten zu beschränken vermöchten, oft nicht, und nur mit grosser Behutsamkeit in Anwendung gebracht werden dürfen.

§. 1017.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Der Kranke nehme die Getränke und Speisen mehr kühl und gewöhne sich allmählig an eine leichtere Kleidung und leichtere Bedeckung im Bette. Um die Fussschweisse zu mässigen, gewöhne sich der Kranke das Tragen von wollenen Strümpfen ab, gebrauche mehr baumwollene oder leinene Strümpfe oder hülle die Füsse nur in öfters zu wechselnde Leinwandlappen ein, auch trage er statt Stiefeln Schuhe und reinige die Füsse öfters durch ein nur wenig warmes Fussbad.

§. 1018.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krank-*

heit. Man sucht diese Absonderung durch den innerlichen Gebrauch kühlender und zusammenziehender Mittel zu beschränken, durch Weinsteinrahm oder Mineralsäure in kaltem Wasser als Getränk genommen, einen Aufguss der Salbei, kalt getrunken, durch Weidenrinde, Tormentille, China, rothen Wein etc. Von *de Haen* wurde der Agaricus empfohlen, von *Reil*, besonders in hektischen Schweissen, zweimal täglich einen Esslöffel voll Rhum in einem Glase Eselsmilch.

Hiermit kann der vorsichtige Gebrauch äusserlicher Mittel verbunden werden. Der Kranke gebrauche zuerst warme, sodann laue und zuletzt kalte Bäder, welche letztere aber nur unter angemessener Körperbewegung gebraucht werden dürfen; daher nur die Fluss- und Seebäder passen. Auch sind Soolebäder und Bäder mit Aufgüssen von aromatischen und tonischen Mitteln, so wie Stahlbäder empfohlen worden. Ferner kann, mit vorsichtiger Gewöhnung der Haut an dieses Mittel, der Körper täglich einmal mit einem in kaltes Wasser getauchten Schwamme bestrichen werden. *Percival* rühmt das Tragen von Hemden, die in eine Abkochung von China getaucht sind. Besonders gerühmt wurde auch die Kamphersaife.

§. 1019.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Sind durch Unterdrückung der Schweisse Nachtheile entstanden, so sucht man das Schwitzen durch die schweisstreibenden Mittel wieder zu Stande zu bringen. Um insbesondere die Fussschweisse wieder hervorzubringen, lässt man den Kranken wollene Strümpfe tragen, die Füsse in Flanell, Wachstaffent oder in ein Kaninchenfell einwickeln, erwärmen und reiben, und wendet warme und scharfe Fussbäder an.

Der Speichelfluss.

(*Ptyalismus*, *Salivatio.*)

§. 1020.

Der **Speichelfluss** ist eine, gewöhnlich mit veränderter Beschaffenheit des Speichels verbundene, vermehrte Absonderung in den Speicheldrüsen, so dass der Kranke häufig auszuspucken genöthigt ist oder der Speichel von selbst aus dem Munde fliesst.

§. 1021.

Manchmal gehen dem Speichelfluss Vorboten voraus, Hitze und Trockenheit in der Mundhöhle, Empfindlichkeit und Anschwellung der Speicheldrüsen, und besonders bei der Merkurial-Salivation ein übler, beinahe fauligter Geruch aus dem Munde und Anschwellung des Zahnfleisches. Sodann, oder auch ohne dass diese Vorboten sich zeigten, bemerkt man, dass der Mund des Kranken immer voll Speichel ist und es fliesst ihm im Sprechen leicht Speichel aus, so wie auch im Schlafe Speichel nach dem Kehlkopfe gelangen und Husten und selbst Erstickungsanfälle veranlassen kann. Die Menge des Speichels ist oft sehr beträchtlich und kann selbst 12 Pfunde in einem Tage betragen, die Beschaffenheit des Speichels ist oft verändert, derselbe hat einen üblen Geruch, schmeckt süsslich oder salzig, ist oft sehr zähe, nach einer Beobachtung von *Reil* wurde er bei einer Wöchnerin, die am Kindbettfieber litt, trübe und molkigt. Die ganze Mundhöhle wird sehr empfindlich. Das Zahnfleisch wird aufgelockert und schwammig, es entstehen weisse Blätterchen oder Bläschen im Munde, welche in Geschwüre mit weisslichem Grunde übergehen, oft bilden sich weisse Callositäten an der innern Fläche

der Wangen, die Zähne werden locker und schwarz, die Zunge schwillt oft bedeutend an und es fallen selbst zuweilen Stücke von ihr hinweg, die Parotiden und die Submaxillardrüsen schwellen an und werden schmerzhaft. Bei heftigem Uebel und langer Dauer leiden andere Theile und selbst der ganze Körper mit. Die Verdauung und Ernährung ist gestört. Durch den Speichel gehen viele Säfte verloren. Das Gesicht wird blass, aufgedunsen oder auch eingefallen, die Kräften nehmen ab und es gesellt sich selbst ein Zehrfieber hinzu. — Die Krankheit kann nur wenige Tage dauern, aber auch sehr langwierig sein. Der Uebergang in Gesundheit geschieht unter allmähligem Geringerwerden der Absonderung, oft durch Schweiss und vermehrte Stuhlentleerungen. Der Tod kann durch Erschöpfung der Kräfte und auch durch schnelles Aufhören der Absonderung und Metastase herbeigeführt werden.

§. 1022.

Unter den Ursachen eines stärkern Speichelflusses ist die Aufnahme von Quecksilber in den Körper die häufigste; am leichtesten wird er erregt durch die Anwendung dieses Arzneimittels in Form von Einreibungen der grauen Quecksilbersalbe, insbesondere in der Nähe der Speicheldrüsen, auch gern durch das Calomel, weniger durch den Sublimat, am seltensten und beinahe gar nicht durch das schwarze Schwefelquecksilber und den Spiessglanzmohr etc. Ausserdem ist eine stärkere oder geringere Speichelabsonderung zuweilen die Folge von einer Halsentzündung, von Geschwürchen im Munde, von Zahnweh, vom Reitz eines hohlen Zahnes, des Bruches der Kinnlade, von gastrischen Reitzen, Würmern, Galle, Schleim, vom Magenkrebs und dem Krebs der Bauchspeicheldrüse, von einer Leberverhärtung, von einer rheumatischen Affection der Speicheldrüsen, von unterdrückten Fussschweissen, von Metastase der Gicht,

der Flechten, der Krätze, von contagiösen Fiebern, namentlich der Blattern, von der Hundswuth u. s. w.

§. 1023.

Wesen der Krankheit. Die Speicheldrüsen scheinen stets in einem Zustande erhöhter Lebensthätigkeit zu sein und es ist nicht wahrscheinlich, dass, wie man angenommen hat, auch Lähmung dieser vermehrten Absonderung zum Grunde liegen könne. Die erhöhte Thätigkeit besteht nicht in Entzündung, sondern in vermehrter Verflüssigung, und wird hervorgebracht durch unmittelbar, von aussen auf die Speicheldrüsen wirkende Reitze, durch consensuelle und antagonistische Erregung und, wie es scheint, auch durch Veränderung der zur Absonderung dienenden Säfte, wie dieses wahrscheinlich bei der Mercurialsalivation und vielleicht auch bei dem Speichelfluss in contagiösen Fiebern der Fall ist.

§. 1024.

Vorhersage. Der Speichelfluss ist zuweilen wohlthätig, gewöhnlich nicht gefährlich, jedoch auch in seltenen Fällen in den höchsten Graden der Krankheit tödtlich, öfters sehr hartnäckig.

§. 1025.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man untersuche die Mundhöhle und nehme den etwa daselbst sich befindenden Reitz hinweg, man entferne Galle, Würmer und andere gastrische Reitze, ist der Quecksilbergebrauch die Ursache des Speichelflusses, so vermindere man die Gabe oder wechsle mit dem Präperat, oder setze den Gebrauch dieses Mittels ganz aus. Auch sind bei der Mercurialsalivation, ausser den unten anzugebenden Mitteln, Schwefel und Schwefelleber innerlich und in Bädern in Anwendung zu bringen.

§. 1026.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Wir vermögen die dieser Krankheit zum Grunde

liegende erhöhte Lebensthätigkeit zu beschränken 1) durch die besänftigende Methode und zwar sowohl durch unmittelbar besänftigende Mittel, wie die Anwendung von milden Mundwassern aus einer Abkochung von Eibisch, Salep, Mohnköpfen mit Zusatz von Honig und Tinctura thebaica, durch besänftigende Umschläge von einer Abkochung von Herba Cicuta oder von Mohnköpfen, durch das Auflegen von erwärmtem Flanell, von Kräutersäckchen mit Kampher bestrichen, durch Einreibungen von Oleum Hyoscyami, Opiatsalbe, Campheröl etc. und durch innerliche, die erhöhte Reitzbarkeit mindernde Mittel, insbesondere Opium und Campher, als auch durch mittelbar besänftigende Mittel, wie Ableitung auf die Haut durch die innerlichen, schweisstreibenden Mittel, Warmhalten des Körpers, warme Bäder, durch Hautreitze, namentlich Blasenpflaster, Fontanelle, durch Reiben und Bürsten der Haut etc. und durch Ableitung auf den Darmkanal, durch die abführenden Salze, Senneblätter, Rhabarber etc. — 2) Durch die den Verflüssigungsprozess beschränkenden tonischen Mittel. Diese Verfahrungsweise darf nur in Anwendung gebracht werden, wenn die Speicheldrüsen nicht zu sehr in einem gereitzten Zustande sich befinden und wenn von der mehr gewaltsamen Hemmung der Absonderung kein Nachtheil zu entstehen droht. Hieher gehören die Mundwasser von einem Aufguss von Salbei, nach Umständen mit Zusatz von Alaun, Borax, Mineralsäuren, Myrrhentinktur, die Abkochungen von Eichen-, Weidenrinde, von Tormentille, China, Rathanhia etc. und der innerliche Gebrauch der Columbo, der China, der Rathanhia, des Eisens etc.

§. 1027

c. *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die Geschwüre im Munde und das aufgelockerte Zahnfleisch werden auf die Weise behandelt, wie in dem Kapitel von der Mundfäule angegeben ist. Entsteht Entzündung

und Geschwulst der Speicheldrüsen, so müssen die Mittel, welche in den Paragraphen über Speicheldrüsenentzündung bezeichnet worden sind, in Anwendung kommen. Ist der Speichelfluss zu schnell unterdrückt worden und werden hierdurch schlimme Zufälle veranlasst, so sucht man ihn wieder herzustellen, nach Umständen durch erweichende Bähungen oder durch Kaumittel oder durch Einreibungen der grauen Quecksilbersalbe in die Gegend der Speicheldrüsen.

Der Milchfluss.

(*Galactorrhoea.*)

David (Paris 1763).

§. 1028.

Milchfluss nennen wir sowohl eine solche Milchabsonderung, die eintritt, ohne dass eine Absonderung statt finden sollte, als auch eine solche, welche in dem Grade vermehrt ist, dass die Menge der abgesonderten Milch grösser ist, als das Bedürfniss eines gesunden Kindes, das gesäugt wird, erfordert.*)

*) Gewöhnlich bestimmt man den Begriff der Krankheit auf die Weise: Der Milchfluss ist eine, für die Kräften der Kranken zu starke Absonderung der Milch. Es kann jedoch selbst eine sehr sparsame Milchabsonderung für die Kräften der Kranken zu reichlich sein, z. B. bei Schwindsüchtigen, in welchem Falle gewiss keine krankhafte Thätigkeit in den Brustdrüsen und also keine krankhafte Milchabsonderung angenommen werden kann. Sie ist in einem solchen Falle nur ein nachtheiliger Einfluss, wie auch eine ganz mässige Körperbewegung schädlich wirken kann, ohne dass sie selbst eine krankhafte Muskelthätigkeit ist. Krankhaft muss aber die Milchab-

§. 1029.

Wie in der Begriffsbestimmung schon angedeutet ist, giebt es zwei Arten von Milchfluss. Die erstere, in welcher eine Milchabsonderung bei Personen und zu einer Zeit vorkommt, wo sie nicht statt finden sollte, und die zweite, in welcher die Milchabsonderung unter der gewöhnlichen Bedingung eintritt, aber zu reichlich ist. Zur erstern Art werden gerechnet der geringe Ausfluss einer milchähnlichen Flüssigkeit bei neugebornen Kindern, der im Gefolge von Anschwellung der Brustdrüsen vorkommt und wobei sich oft entzündliche Härten und Eiterungen bilden, ferner ein ähnlicher Ausfluss mit Anschwellung der Brustdrüsen bei Jungfrauen, bei Weibern in den Jahren, in welchen die monatliche Reinigung verloren geht, so wie ein ähnlicher Zustand der Brustdrüsen, wie er in seltenen Fällen bei Männern vorkommt, endlich und vorzugsweise ein zu frühes und starkes Eintreten der Milchabsonderung in der Schwangerschaft und ein zu langes Fortdauern der Absonderung der Milch nach dem Entwöhnen des Kindes; es ist jedoch zweifelhaft, ob sämmtliche zuerst bezeichneten Krankheitszustände zu dem Milchfluss gehören.

§. 1030.

Kommt der Milchfluss als vermehrte Absonderung der Milch bei Frauen vor, die ein Kind nähren, so erkennt man dieselben daran, dass ausser der Milch, die das Kind entzieht, eine ziemliche Menge Milch aus-

sonderung genannt werden, wenn die Thätigkeit, in der sie besteht, im Verhältniss zum Reitze zu gross ist; naturgemäss steht aber jene Thätigkeit im Verhältniss zum Bedürfniss des dieselbe andauernd unterhaltenden Kindes, das durch die Mutter genährt wird, und es ist also diejenige Milchabsonderung krankhaft, durch welche mehr Milch erzeugt wird, als das Kind, wenn es gesund und kräftig ist, bedarf.

fliesst, und zwar geschieht dieses entweder, indem, während das Kind trinkt, auch aus der Brust, an welcher es nicht trinkt, Milch ausfliesst, oder indem die Milch auch sich entleert, wenn das Kind nicht angelegt wird. Zuweilen wird die Menge der ausfliessenden Milch sehr bedeutend, so z. B., dass täglich mehrere Pfunde Butter aus der überflüssigen Milch bereitet wurden. Die Frauen ertragen oft lange Zeit die vermehrte Absonderung gut, indem die Prozesse der Blutbereitung ebenfalls sehr gesteigert sind, in andern Fällen und selbst oft, wenn die Absonderung nicht krankhaft vermehrt ist, ja selbst zuweilen, wenn sie sehr sparsam ist, äussert diese Ausscheidung von Säften grosse Nachtheile auf den Körper. Die Frau hat jedesmal nach dem Säugen eine Empfindung von Schwäche und Erschöpfung, sie wird allmählig magerer, das Gesicht blass, die Haare gehen aus, sie hat auch häufig Trockenheit im Halse und bekommt ein Hüsteln, zuweilen Herzklopfen, Kopfweh etc. Später stellen sich fliegende Hitze der Wangen und nächtliche Schweisse ein, und es fangen die Lungen an, bedeutend zu leiden, bis sich zuletzt wirkliche Lungenschwindsucht, zu welcher auch noch colliquative Durchfälle hinzukommen, entwickelt.

§. 1031.

Manche nehmen auch eine Galactorrhoea erronea an, worunter sie eine durch Metastase bewirkte Absonderung der Milch in andern Theilen als den Brustdrüsen verstehen, andere leugnen das Bestehen dieser Krankheit. Es scheint dieselbe in soweit angenommen werden zu können, als wohl durch Metastase eine der Milch ähnliche, wenn auch nicht ganz gleiche Absonderung bewirkt werden kann, wie auch durch andere Theile, als die Leber, gallichte Stoffe ausgeschieden werden können.

§. 1032.

Anlage giebt ein schwacher und sehr reitzbarer

Körper (Erethismus), auch ist eine besondere Anlage zu starker Milchabsonderung zuweilen erblich vorgekommen.

Gelegenheitsursachen sind verschiedene Reitze, welche auf die Brustdrüsen wirken, das zu häufige Anlegen des Kindes, das Stillen zweier Kinder, zu lange fortgesetztes Säugen, unkeusche Berührungen der Brust, der zu reichliche Genuss milchmachender Dinge, fetter, öligter Nahrungsmittel, Pflanzentheile mit ätherischem Oele, wie des Körbels, Fenchels, Anises etc., endlich consensuelle Reitze, besonders durch ein Leiden der Gebärmutter, wie z. B. einen Polypen.

§. 1033.

Wesen. Der krankhafte Zustand der Brustdrüsen, der dem Milchflusse zum Grunde liegt, scheint niemals ein lähmungsartiger Zustand, sondern erhöhte Lebensthätigkeit zu sein, doch ist dieselbe keine Entzündung, denn diese unterdrückt die Milchabsonderung.

§. 1034.

Vorhersage. Die Krankheit ist in der Regel leicht zu beseitigen. Gefahr entspringt meistens nur bei zu beharrlich fortgesetztem Säugen des Kindes, bei einer schwächlichen und zur Schwindsucht geneigten Frau. Ausser den Nachtheilen für die Mutter entsteht durch den Milchfluss bei Schwangern zuweilen Gefahr für das Kind.

§. 1035.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* In Fällen, in welchen die Milchabsonderung Nachtheile für die Frau bringt, muss das Kind seltener angelegt oder ganz entwöhnt werden, letzteres muss vorzüglich bei drohender Lungenschwindsucht geschehen; findet aber dagegen nur eine für das Bedürfniss des Kindes zu reichliche Milchabsonderung statt und wird diese von der Frau gut ertragen, so ist diese Massregel nicht nothwendig und es muss nur jede unnöthige Rei-

tzung der Brustdrüsen vermieden werden. Auch müssen die herabhängenden Brüste etwas in die Höhe gebunden werden, um das stärkere Eindringen der Säfte zu verhindern.

§. 1036.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die erhöhte Thätigkeit der Brustdrüsen herabzustimmen, besitzen wir zwei Mittel: Verminderung der erhöhten Nerventhätigkeit und Verminderung der Säfte. Zu ersterem Zwecke wenden wir die auf die Sensibilität so sehr beruhigend wirkende Wärme an, am besten durch starkes Einhüllen der Brüste in Wolle oder Baumwolle, welche auch mit Zucker durchräuchert werden kann, durch Bestreichen der Brüste mit Schmalz oder Oel oder Auflegen von Schmalzläppchen, auch ist der Campher in Form des Oleum camphoratum und das Emplastrum saponato-camphoratum empfohlen worden. Mit Vorsicht können auch in Fällen, in welchen die Milchabsonderung zu frühe eintritt, während des Säugens viel zu reichlich wird, oder nach dem Entwöhnen des Kindes zu lange fortdauert, Waschungen mit erwärmtem Wein, Branntwein, oder mit aromatischen und selbst mit gelind zusammenziehenden Aufgüssen gebraucht werden. Ableitend auf die Lebensthätigkeit wirken auch die zur Beschränkung der Milchabsonderung gebräuchlichen Abführungsmittel.

Dem zweiten Zwecke entsprechen wir am besten durch Verminderung der Nahrungsmittel. Auch wirken wir zugleich auf diese Weise durch die Abführungsmittel, unter denen am meisten die Salze und zwar vorzüglich der Tartarus vitriolatus im Gebrauche sind.

§. 1037.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Indem wir auf die angegebene Weise die Milchabsonderung zu beschränken suchen, ist es nun, besonders bei gleichzeitiger Entwöhnung des Kindes, unsere Aufgabe, die leicht

eintretenden Milchstockungen, Verhärtungen, Entzündungen und Eiterungen zu verhüten und die schon entstandenen zur Heilung zu bringen. Wir suchen die stockende Milch durch erweichende Bähungen (welche jedoch auch durch Verkältung leicht nachtheilig werden können) und durch gelindes Ausstreichen zum Ausfluss zu bringen und durch Auflegen von Wolle und die andern schon angegebenen besänftigenden Mittel, so wie auch durch Auflegen von Cicuta-, Quecksilber- und Campherpflaster, durch Einreibungen von Ol. Hyoscyami, Digitalissalbe etc., durch sparsame Diät und nach Umständen durch Ansetzen von Blutegeln und selbst durch allgemeine Blutentleerungen, Verhärtungen und Entzündungen zu verhüten und zu zertheilen. Tritt Eiterung ein, so befördert man die Reifung des Abscesses durch die gewöhnlichen Mittel und überlässt die Oeffnung desselben der Natur.

Qualitativ veränderte Milchabsonderung.

(Galactia depravata, Galactacrasia.)

§. 1038.

Die Milch ist zuweilen zu wässerig, in welchem Falle sie eine ins Bläuliche spielende Farbe hat, manchmal ist sie auch zu dick und fett, zuweilen ist sie säuerlich riechend oder hat einen andern eigenthümlichen, von irgend einem Fehler im Körper abhängenden oder von bestimmten Nahrungsmitteln herrührenden Geruch; in manchen Fällen findet man aber keine sichtbare Fehler in der Milch und man schliesst nur auf die fehlerhafte Beschaffenheit derselben aus den übeln Zufällen, die sie bei dem Kinde erregt.*)

*) Die nachtheiligen Wirkungen, die eine fehlerhafte Milch auf die Gesundheit des Kindes äussern kann, anzugeben, ist ein Gegenstand der allgemeinen Krankheitslehre.

§. 1039.

Die gewöhnlichsten Ursachen sind ein sehr lange fortgesetztes Stillen, wodurch die Milch zuweilen sehr dick und fett wird, mancherlei Krankheiten der Stillenden, wie Flechten, weisser Fluss, stinkende Fussschweisse etc., ferner der Genuss ranziger, sehr stark gesalzener, saurer oder selbst faulender Speisen, starke und häufige Geschlechtsreizungen und vorzüglich häufiger Zorn oder anhaltender Kummer, was auf das Kind besonders in dem Falle nachtheilig wirkt, wenn es unmittelbar nach einem solchen Gemüthsaffect an die Brust gelegt wird.

§. 1040.

In der Behandlung ist die Erforschung und Beseitigung der Gelegenheitsursachen die wichtigste Aufgabe. Auffallend dünne Milch sucht man durch eine kräftige Nahrung, eine sehr dicke und fette Milch durch weniger nahrhafte Speisen und verdünnende Getränke zu verbessern. — (Ist eine solche Milch dem Kinde sehr nachtheilig und lässt sich nicht schnell ein Besserwerden erwarten, so muss das Kind eine andere Nahrung erhalten.)

Der saure Magensaft.

(*Acor primarum viarum.*)

§. 1041.

Der Magensaft des Menschen ist nach *Tiedemanns* und *Gmelins* Untersuchungen immer sauer; wir bezeichnen aber mit der Benennung saurer Magensaft den Krankheitszustand, in welchem der Magensaft einen so bedeutenden Grad von Säure und Schärfe annimmt oder eine so bedeutende Menge von (saurem) Magensaft vorhanden ist, dass dadurch Krankheitszufälle erzeugt werden.

§. 1042.

Die Kranken leiden gewöhnlich am Sodbrennen; sie haben nämlich ein Gefühl von Brennen an dem Magenmunde und in der Speiseröhre, und die Empfindung, wie wenn ein heisser Dunst aus dem Magen emporsteige, sie haben dabei oft Heisshunger (Bulimia), aber keinen Durst, sie riechen sauer aus dem Munde, haben saures Aufstossen und zuweilen Erbrechen von sehr sauer riechenden, die Zähne stumpfmachenden Stoffen, häufig stellt sich auch Durchfall ein, welcher oft mit Leibschmerzen verbunden ist und womit bei Kindern grünliche, schleimige, wie gehackt aussehende, sauer riechende Stoffe ausgeleert werden. Bei längerer Dauer und höherem Grade der Krankheit erhalten auch andere Absonderungen, wie der Schweiss und der Harn, eine säuerliche Beschaffenheit, das Gesicht wird bleich, die Lippen, das Zahnfleisch und die Zunge blass, bei den Kindern entstehen selbst Convulsionen. Alle diese Zufälle nehmen zu, wenn der Kranke saure und zur sauren Gährung geneigte Speisen geniesst.

Die Krankheit hat oft nur eine kurze Dauer, oft ist sie langwierig. In Gesundheit geht dieselbe über nach Entleerung der Säure, durch Erbrechen und Durchfall und auch durch allmählige Verbesserung des Magensaftes. Den Tod kann sie bei Kindern durch den Hinzutritt von Gichtern und bei langer Dauer durch Erschöpfung herbeiführen, auch bilden sich die Darrsucht der Neugebornen, Scropheln und Rheumatimus aus; doch kann auch in solchen Fällen die Säurebildung nur ein Symptom dieser beginnenden Krankheiten sein.

§. 1043.

Anlage haben besonders Kinder in den ersten Lebensmonaten und unter den Erwachsenen Hypochondristen und Hysterische.

Gelegenheitsursachen sind der Genuss saurer

und zur sauren Gährung geneigter Nahrungsmittel, saurer Weine, des Punsches, der Limonade, reiner Pflanzennahrung, vieler Erdäpfel, schlechten Brodes, verdorbener oder zu vieler Milch, fetter Dinge, insbesondere Butterbackwerke etc., so wie zurückgetretene Fussschweisse, Flechten, Krätze, Gicht und Unordnungen in der monatlichen Reinigung.

§. 1044.

Es können dieser Krankheitsform zweierlei wesentlich verschiedene Krankheitszustände zum Grunde liegen: 1) die Absonderung eines besonders sauren Magensaftes. Dieses mag durch Resorption säuerlicher Stoffe und durch idiopathisch, consensuell oder antagonistisch erregte Umstimmung der Magennerven geschehen, und hierbei mag der Magen zuweilen sich in einem gereitzten und selbst entzündlichen Zustande befinden. Vielleicht ist auch die Qualität des Magensaftes oft nicht sehr verändert, sondern die Absonderung desselben, der ja ohnehin eine säuerliche Beschaffenheit hat, nur *vermehrt.* 2) darniederliegende Verdauung, wodurch die Nahrungsmittel in saure Verderbniss übergehen. In dem letztern Krankheitszustand ist die Säurebildung eigentlich keine Krankheit, so wenig die Aufnahme von sauren Stoffen von aussen für sich schon Krankheit ist, doch zieht die auf diesem Wege gebildete Säure ähnliche Folgen nach sich, es können beide Zustände meistens nicht von einander unterschieden werden und sind wohl auch meistens mit einander verbunden.

§. 1045.

Vorhersage. Bei Erwachsenen wird die Krankheit wohl nie gefährlich. Die einzelnen Zufälle sind leicht zu heben, schwer aber ist die Anlage zur Säurebildung zu tilgen.

§. 1046.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den*

Ursachen. Erwachsene müssen die oben bezeichneten und überhaupt diejenigen Nahrungsmittel, von denen sie bemerken, dass sie ihnen Verdauungsbeschwerden verursachen, sorgfältig vermeiden. Bei Kindern muss besonders darauf gesehen werden, dass die Muttermilch und die übrigen Nahrungsmittel eine gute Beschaffenheit haben. Leidet die Mutter an Säure, so müssen ihr, um auf das Kind zu wirken, die geeignete Diät vorgeschrieben und Arzneimittel verordnet werden. Die Mutter lege das Kind nicht unmittelbar nach einem Verdruss an. Leidet die Mutter an Flechten, an den Drüsen, an stinkenden Fussschweissen oder stinkendem Athem, so muss eine Amme genommen oder das Kind künstlich ernährt werden. Wurde die Amme viel früher entbunden, als das Kind, das sie stillt, geboren wurde, und ist ihre Milch zu fett und zu nahrhaft für dasselbe, so muss das Kind auf eine andere Weise genährt werden. Wird das Kind künstlich genährt, so muss insbesondere die zu reichliche Darreichung von Nahrungsmitteln vermieden werden. Die Milch und das Mehl, das zum Brei genommen wird, müssen von guter Beschaffenheit sein und dieser gut ausgekocht und nicht zu dick sein. Oft ist es zuträglich, der Thiermilch etwas Fleischbrühe von Kalbfleisch oder von einer Huhn zuzusetzen, auch passen Zwiebackbrei, Griessuppen, bei schwachen Kindern eine Abkochung der Salepwurzel mit Fleischbrühe und Zusatz von etwas Eigelb.

§. 1047.

Die schon vorhandene Säure, die nicht allein verschiedene Beschwerden veranlasst, sondern auch wiederum Ursache vermehrter Säurebildung wird, sucht man entweder auszuleeren oder zu neutralisiren. Zu ersterem Zweck wendet man Brechmittel und auch Abführungsmittel an, zu welchen letztern man nicht leicht die die Verdauung schwächenden Salze, sondern vorzüglich Rha-

barber benutzt; zu letzterm Zwecke verordnet man Magnesia carbonica, Kali carbonicum, die Lapides cancrorum, Conchae praeparatae etc. (Nro. 56 u. 57).

§. 1048.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Liegt der fehlerhaften Absonderung des Magensafts ein entzündlicher Zustand zum Grunde, so müssen die gegen eine schleichende Magenentzündung dienlichen Mittel in Gebrauch gezogen werden; ist es blos ein erethischer Zustand des Magens, so dienen vorzüglich ätherisch-öligte Stoffe, wie Fenchel, Anis, Kümmel, Melisse, Pfeffermünze, Baldrian, auch Asa foetida, so wie auch eine angemessene Anwendung des Opiums und äusserlich geistige und aromatische Einreibungen, Pflaster etc.; ist mehr ein Zustand von Reitzlosigkeit vorhanden und liegen die Verdauungskräfte darnieder, so sind Wein, Gewürze, aromatisch-tonische und rein-tonische Mittel passend, wie Rhabarber, Calamus aromaticus, die Pomeranzenschaalen, Quassia, Absinthium, Columbo, die China, das Eisen etc. Oft ist es sehr zweckmässig, säuretilgende, erregende und tonische Mittel mit einander zu verbinden (Nro. 58 u. 59).

§. 1049.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Entsteht ein deuteropatisches Leiden, wie z. B. heftiger Magenkrampf oder Gichter, so sucht man die Säure so schnell wie möglich zu entfernen oder zu neutralisiren und wendet gegen das hinzugekommene Leiden die seiner Natur entsprechenden Mittel an, z. B. bei dem Magenkrampf etwas Opium.

Die krankhaft vermehrte Gallenabsonderung.

(Polycholia, Status biliosus.)

§. 1050.

Unter der angegebenen Krankheitsbenennung verstehen wir eine in *dem* Grade vermehrte Gallenabsonderung in der Leber, dass hierdurch Störungen in den Verrichtungen des einen oder des andern Organs bewirkt werden.

§. 1051.

Der Kranke erhält einen bittern Geschmack, die Zunge belegt sich in der Regel mit etwas Schleim und es zeigen sich zwei gelbliche, gegen die Spitze der Zunge hinlaufende Streifen, oft ist auch nur der hinterste Theil der Zunge mit einem gelblichen und oft grasgrünen Beleg versehen, zuweilen aber ist die Zunge ganz und zwar eigentlich krankhaft rein, glänzend und glatt. Der Kranke hat Abneigung gegen den Genuss von Speisen und insbesondere gegen Fleischspeisen, dagegen verlangt er säuerliche Getränke, er hat dabei ein Gefühl von Völle und Spannung in der Herzgrube, und dieselbe ist auch bei Berührung etwas empfindlich (Bilis in praecordiis); manchmal steigert sich diese Empfindung zum wirklichen Magenkrampf (cardialgia biliosa). Es stellt sich nunmehr oft Uebelkeit, Zusammenlaufen des Speichels im Munde, Aufstossen und Erbrechen ein, wodurch oft wiederholt eine grosse Menge gelber oder grüner Galle ausgeleert wird (Vomitus biliosus), oder es kommen oft unter starken Leibschmerzen (Colica biliosa) grünliche Durchfälle (Diarrhoea biliosa) zu Stande. Bei diesem galligten Zustand und besonders, bevor die Entleerungen nach aussen eingetreten sind, fühlt der Kranke sich matt, er ist verstimmt, zornmüthig, hat oft Kopfschmerz in der Stirn-

gegend, oft auch ziemlich beträchtliche Fieberbewegungen, selbst mit Delirien, und es bildet sich zuweilen ein vollkommenes Gallenfieber oder Gelbsucht aus.

Die Krankheit entscheidet sich durch galligte Entleerungen, doch können diese oft geraume Zeit bei steter starker Erneuerung der Gallenabsonderung fortbestehen, ohne dass Besserung eintritt. Zum Tode kann dieser Zustand durch den Uebergang in das Gallenfieber, die Gelbsucht und allmählige Entwicklung von Desorganisationen in der Leber führen.

§. 1052.

Anlage zu diesem Leiden haben Individuen von cholerischem Temperamente.

Gelegenheitsursachen sind vorzüglich der Zorn und eine sehr hohe Temperatur der Athmosphäre, besonders wenn sie öfters mit einer kühlern Beschaffenheit derselben wechselt, wesshalb gallichte Krankheiten in den Tropenländern so häufig sind, ferner fortgesetzter reichlicher Genuss geistiger Getränke, zu reichlicher Genuss von Fleischkost und fetten Speisen (jedoch nur bei besonderer Anlage), der Wurmreitz, der Missbrauch der drastischen Mittel, auch consensuelle Reitzung durch Kopfverletzungen etc.

§. 1053.

Wesen. Die vermehrte Gallenabsonderung scheint sowohl dadurch bedingt werden zu können, dass die Nerven der Leber in einem gereitzten Zustande sich befinden, wie z. B. bei Gemüthsaffecten und bei Gehirnverletzung, als auch dadurch, dass das in die Leber gelangende Blut Stoffe enthält, welche durch die Absonderung in der Leber ausgeschieden zu werden bestimmt sind, wie dieses bei einer überwiegend venösen Blutmasse der Fall zu sein scheint, und vielleicht auch bei hoher Temperatur der Athmosphäre vorkommt, bei welcher durch die Einwirkung der Hitze auf das Blut bei

dem Athmen und vielleicht auch durch einen hierdurch beschränkten Athmungsprozess selbst das Blut eine fehlerhafte Beschaffenheit erhalten mag.

§. 1054.

Vorhersage. Diese Krankheitszufälle werden in unserm Klima in der Regel nicht gefährlich. Gefahr drohend werden sie vorzüglich, wenn der Abfluss der Galle aus der Gallenblase in die Gedärme gehindert ist.

§. 1055.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Das Individuum, das zur Gallenerzeugung geneigt ist, darf besonders in hohem Sommer und in heissen Klimaten nicht reichlich geistige Getränke geniessen, es muss sich mehr der Pflanzen und insbesondere der Obstnahrung als des Fleisches bedienen, es muss sich gegen die starke Hitze durch den Aufenthalt in der kühl gehaltenen Wohnung schützen, die Gelegenheit zum Verdruss meiden etc.

§. 1056.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Ist Galle in bedeutender Menge in den Magen ergossen und sind keine Gegenanzeigen da, so wendet man ein Brechmittel an, was nicht allein die im Magen, sondern auch die im Zwölffingerdarm, der Gallenblase und selbst den Gallengefässen in der Leber angehäufte Galle entleert. Ist schon Erbrechen vorhanden, so darf dieses, in so fern es Folge des Gallenreitzes und nicht Ursache der vermehrten Gallenabsonderung ist, nicht gestillt werden. Ebenso dürfen galligte Durchfälle, wenn sie nur Folge der vermehrten Gallenabsonderung sind, nicht gestillt werden, sondern müssen im Gegentheil durch gelinde Abführungsmittel, von Tamarinden, Weinsteinrahm, Manna etc. befördert werden. — Um die Gallenabsonderung zu beschränken, dienen säuerliche Mittel,

z. B. Limonade, bei sehr gereitztem Zustande der Leber besänftigende Umschläge auf die Lebergegend, besänftigende Einreibungen, auch der vorsichtige Gebrauch des Opiums und bei Hinneigung zur Entzündung Blutegel.

§. 1057.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Gegen Magenkrampf dient vorzüglich der Riverische Trank mit Ueberschuss von Citronensäure (Nro. 60), oft reicht schon etwas Citronen- oder Pomeranzensaft hin, bei Colik Citronensaft mit Oel, ausserdem sind aber auch Opium und die übrigen gegen Magenschmerz und Colik gebräuchlichen Mittel anzuwenden.

Die Verschleimung der ersten Wege.

(*Pituita primarum viarum.*)

Doussin-Dubrenil (Par. 1799, nach der 8. Ausg. ins Deutsche von Schlegel, Ilmenau 1823 u. 3. Aufl. 1825). — *Himmer* (Dresd. 1828).

§. 1058.

Die Verschleimung der ersten Wege ist eine derartige Veränderung der Absonderung in der Schleimhaut der Schlingwege des Magens und des Darmkanals, dass hierdurch ein weisslicher, mehr oder weniger zäher Schleim gebildet wird.

§. 1059.

Die Zunge ist mit einem oft sehr zähen, dicken, hautartigen Schleim belegt, der Kranke hat einen faden, pappigen Geschmack, Mangel an Appetit und gewöhnlich auch keinen Durst, es fliesst ihm viel der Speichel im Munde zusammen, besonders am Morgen, wo sich auch leicht Würgen im Halse und Erbrechen einstellt, dabei

empfindet der Kranke mehr oder weniger Druck und Spannung in der Magengegend, er ist zu Blähungen geneigt, hat meistens Verstopfung und von Zeit zu Zeit auch schleimigte Durchfälle (*Diarrhoea mucosa*), bei höherm Grade des Uebels zeigt auch der Harn eine schleimigte Beschaffenheit und das Gesicht des Kranken erhält ein mehr blasses und aufgedunsenes Aussehen.

Dieser Krankheitszustand ist gewöhnlich langwierig. In Gesundheit geht er allmählig, zuweilen unter kritischen, schleimigen Durchfällen über, den Tod kann er herbeiführen durch den Uebergang in Schleimfieber oder in einen allgemeinen cachectischen Zustand.

§. 1060.

Anlage geben ein schlaffer Körperbau und scrophulöse, chlorotische und andere Cachexien.

Gelegenheitsursachen sind der andauernde, zu reichliche Genuss geistiger Getränke und sehr gewürzter Speisen, der Missbrauch der Abführungsmittel, der Wurmreitz, der Genuss schlechter, zäher, fader Nahrungsmittel, eine sitzende Lebensweise, Kummer, der Aufenthalt in einer feuchten Wohnung etc.

§. 1061.

Wesen. Die Entstehungsweise dieser Krankheit scheint eine verschiedene sein zu können. Oft wird ohne Zweifel die fehlerhafte Absonderung durch einen Reitz, der auf die Schleimhaut wirkt, hervorgebracht, wobei selbst die Reitzung bis zum Entzündlichen sich steigern kann; in andern Fällen scheint ein Fehler der Säfte der Krankheit zum Grunde zu liegen, vielleicht wegen schlechter Nahrungsmittel oder unkräftiger Verdauung ein gewisser Mangel an Blutroth und Faserstoff und dagegen Vorherrschen von Eiweiss und Serum, und wie es scheint auch überwiegende Venosität bei Stockungen des Blutes im Pfortadersystem.

§. 1062.

Vorhersage. Die Verschleimung der ersten Wege wird nicht leicht lebensgefährlich, ist aber oft sehr hartnäckig.

§. 1063.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Oft ist es nothwendig, im Darmkanal befindliche Reitze, wozu auch der in grösserer Menge angesammelte Schleim selbst gerechnet werden kann, durch Brechmittel und Abführungsmittel und Würmer zugleich durch Wurmmittel zu entfernen. Der Kranke ändere seine Lebensweise dahin, dass er von dem Genusse vieler geistiger Getränke mehr zu einer milden Nahrung übergehe, ist aber eine fade Nahrung, der Aufenthalt in feuchter Luft, eine sitzende Lebensart etc. Schuld, mehr der Fleischnahrung und des Weines sich bediene und häufig sich Bewegung im Freien machen.

§. 1064.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Ist der Darmkanal in einem gereitzten Zustand, so sind oft mehr die besänftigenden Mittel geeignet, die Absonderung zum Normalen zurückzuführen und daher die Zunge zu reinigen, als Mittel, die die Absonderungen im Darmkanal befördern, daher Oelmixturen, Getränke von Graswurzel, Süssholz, Molken, und selbst ein vorsichtiger Gebrauch von Opium. Ist der Darmkanal weniger gereitzt und die Absonderung in *der* Art verändert, dass ein zäher Schleim bereitet wird, so dienen verflüssigende Mittel, die Salze in kleinen und zeitweise auch in grössern Gaben, besonders die mildern Salze, wie der Tartarus tartarisatus und der Tartarus natronatus, welche sehr passend in Verbindung mit auflösenden Extracten, z. B. dem von Taraxacum, Marrubium album, Fumaria etc. verbunden werden können. Bei höherm Grade von Reitzlosigkeit dienen die Rhabarber, das Gummi Ammoniacum,

Gummi Guajacum, die Aloe, die Jalappe und das Calomel. Den Beschluss der Kur macht man gerne mit bittern Mitteln, dem Extractum Millefolii, Cardui benedicti, Centaurei m., Gentianae und zuletzt mit der China, welche Mittel die Neigung zur vermehrten Absonderung allmählig beschränken und zu einer bessern Blutbereitung beitragen.

Der wässerige Durchfall.

(*Diarrhoea serosa.*)

Lambsma (Amsterdam 1756). — *Dewar* (London 1803). — *Colson* (Paris 1808). — *Fritsch* (Breslau 1822).

§. 1065.

Wässerigen Durchfall nennen wir die Stuhlentleerungen, welche wegen zu reichlich abgesonderten Darmsäften und dem Saft der Bauchspeicheldrüse eine flüssige Beschaffenheit erhalten haben.

§. 1066.

Es geht entweder die wässerige Flüssigkeit unvermischt und nur durch etwas darin aufgelösten Koth braun gefärbt ab, oder es sind ihr verschiedene Substanzen beigemischt, oft Galle (Diarrhoea biliosa), saure Stoffe zugleich mit Galle (Diarrhoea acida), Schleim (Diarrhoea mucosa), Jauche, oft mit Blutwasser vermischt (Fluxus hepaticus), eine milch- oder eiterartige Flüssigkeit (Fluxus coeliacus), Blut (Diarrhoea cruenta), unverdaute Speisen (Lienteria), und nicht leicht finden diese Ausscheidungen in Form des Durchfalles statt, ohne dass nicht zugleich mit ihnen wässerige Entleerungen vorkommen, doch werden sie, da sie besondere Krankheitsarten bilden, in besondern Kapiteln abgehandelt werden.

§. 1067.

Der einfache wässerige Durchfall, d. h. derjenige, welcher nicht mit den genannten Ausscheidungen verbunden ist; giebt sich durch mehr oder weniger flüssige Stuhlentleerungen zu erkennen, in welchen, ausser mehr oder weniger Koth, Nichts als eine wässerige Flüssigkeit wahrgenommen werden kann. Oft ist die Beimengung von Koth bedeutend, so dass die Stuhlentleerungen mehr breiartig werden oder mit vielem Wasser auch Kothklumpen entleert werden (Diarrhoea stercoracea), oft ist es eine wässerige, nur etwas braun gefärbte Flüssigkeit (die gewöhnliche Diarrhoe). Diese Stuhlentleerungen erfolgen oft ohne Vorboten, nur mit plötzlich eintretendem, schnell sehr dringend werdendem Bedürfniss zum Stuhlgang, oft gehen ihnen Kneipen im Leibe, Abgang von Blähungen, ein Kollern im Bauche und zuweilen auch heftige Kolik voraus, in welchem Falle dieselben und wenn sie durch Verkältung entstanden sind, den Namen Diarrhoea rheumatica erhalten.

Gewöhnlich lässt der Durchfall nach einigen flüssigen Stuhlentleerungen wieder nach, zuweilen wird er aber auch sehr langwierig oder kehrt, wenn er gestillt ist, immer von Neuem wieder zurück. In diesen Fällen wird die Haut trockener, der Harn geht sparsamer ab, der Kranke hat vielen Durst, gewöhnlich Verdauungsbeschwerden und seine Kräften werden erschöpft.

§. 1068.

Die gewöhnlichsten Ursachen des serösen Durchfalles sind der Genuss zu vieler oder schwerverdaulicher Nahrungsmittel, z. B. des unreifen Obstes oder der zu reichliche Genuss der geistigen Getränke, und Verkältung, besonders der Füsse und des Unterleibs. Ausserdem wird er veranlasst durch Kothansammlungen, den Wurmreitz, den Missbrauch der Abführungsmittel, so wie auch durch den Reitz von Galle, sauren Magensaft, Schleim,

Eiter, Blut, von Desorganisationen oder entzündeten Stellen im Darmkanal, endlich auch zuweilen durch niederschlagende Gemüthsaffecte, insbesondere Furcht, den Zahnreitz, schnell geheilte Flechten, Fussgeschwüre etc.

§. 1069.

Das Wesen des serösen Durchfalles ist: erhöhter Verflüssigungsprozess in den Capillargefässen der Schleimhaut des Darmkanals und in der Bauchspeicheldrüse mit vermehrter peristaltischer Bewegung. Der Krankheitsprozess hat wohl immer mehr oder weniger den Character der Reitzung, welche idiopathisch, consensuell und antagonistisch erregt sein kann. Oft geschieht die Absonderung theilweise auf Geschwürflächen und ist mehr jauchigt, was aber in den Stuhlentleerungen sich meistens nicht erkennen lässt.

§. 1070.

Vorhersage. Der einfache wässerige Durchfall wird selten lebensgefährlich und ist meistens leicht zu heben, doch wird er auch zuweilen hartnäckig. Nicht selten ist er selbst wohlthätig.

§. 1071.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Der Kranke vermeide während des Durchfalles den Genuss blähender Gemüse, des Obstes, wenigstens der Zwetschgen, Pflaumen und alles nicht gehörig reifen Obstes, des Salates, insbesondere des Gurkensalates, der kalten Milch, der Sauermilch etc., und geniesse dagegen gebrannte Mehlsuppe, Mehlspeisen, Eier, Chocolade u. s. w. Er halte seinen Unterleib und seine Füsse warm. Oft ist es nothwendig, im Magen und Darmkanal vorhandene Reitze durch Brechmittel, wozu am besten die Ipecacuanha gewählt wird, und selbst durch Abführungsmittel zu entfernen, doch dürfen die letztern Mittel bei sicherer Diagnose und nur mit Vorsicht gebraucht werden.

§. 1072.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die erhöhte Sensibilität zu mässigen, wendet man einhüllende Mittel an, wie Abkochungen von Salep oder Eibisch, Mandelmilch, Hanfsamenmilch, arabisches Gummi, das Decoctum album Sydenhami (Nro. 5) etc., ferner Chamillen-, Melissenthee, die Ipecacuanha in kleinen Gaben, narkotische Mittel und zwar vorzüglich das Opium an, welches das Hauptmittel gegen Durchfälle ist (Nro. 22, 62 und 63 Hiermit verbindet man Klystiere mit Amylum und Opium oder von einer Abkochung von Hanfsamen, in der Quantität von 3 bis 4 Unzen Flüssigkeit, sanft beigebracht. Auch sind, besonders beim rheumatischen Durchfalle, die innerlichen schweisstreibenden Mittel und warme Bäder sehr nützlich. — Genügen diese Mittel nicht und ist der Reitzungszustand im Darmkanal nicht zu bedeutend, so giebt man die dem Verflüssigungsprozess entgegenwirkenden tonischen und adstringirenden Mittel, wie Columbowurzel (Nro. 64), das Extractum Cascarillae, Tormentillwurzel die Arnicawurzel, die Rhabarber in kleinen Gaben, den Zimmt, rothen Wein, Kinogummi, Rathanhia, Alaun, auch Bleizucker mit Opium, Eisenmittel etc. — Zugleich können geistige und gewürzhafte Dinge in den Unterleib eingerieben werden (Nro. 65) und aromatische oder Opiatpflaster auf denselben, und auch bei grösserer Hartnäckigkeit Blasenpflaster und andere Ableitungsmittel gesetzt werden.

Der jauchige und der eiterige Bauchfluss.
(*Diarrhoea ichorosa*, *Fluxus hepaticus*.)

Richter (Journ. d. Erfindd. 4tes und 5tes Stück).

§. 1073.

Zuweilen bemerkt man, dass die flüssigen Stuhlentleerungen eine röthliche, dem Fleischwasser ähnliche Farbe haben. Dieses kann bei einer gewöhnlichen serösen Absonderung durch die Beimengung von etwas Blut geschehen, wie dieses in der Ruhr, bei Hämorrhoiden, bei einer Hinneigung zum Scorbute etc. der Fall sein kann, in andern Fällen ist die Flüssigkeit ihrem Wesen nach mehr eine blutige Jauche (Diarrhoea ichorosa), welche aus krebshaften und andern Geschwüren im Darmkanal, aus Geschwüren in der Leber (Fluxus hepaticus) oder aus andern mit dem Darmkanal in Verbindung stehenden Theilen ausgeschieden wird. Oft ist die entleerte Flüssigkeit durch Beimengung einer weisslichen, gräulichen und gelblichen Materie getrübt und es schwimmt auch dieselbe theilweise obenauf, oder setzt sich mehr zu Boden und klebt an dem Kothe an; auch bemerkt man hiebei oft grünliche und gelbliche, in der Flüssigkeit schwimmende weisse Borken. Diese Stoffe sind in der Regel die Erzeugnisse von Verschwärungen im Darmkanal und ihr Vorkommen ist mit mancherlei Krankheitszufällen verbunden, welche in dem Kapitel von den Darmgeschwüren angegeben worden sind.

Die Behandlung ist die der angegebenen Desorganisationen in den Gedärmen.

Die Milchruhr.

(*Fluxus coeliacus, Fluxus chylosus, Diarrhoea chylosa.*)

Rud. Aug. Vogel (resp. Sothen, Diss. Goett. 1768). — *Uhthoff* (Diss. Goett, 1787). — *Richter* (med. chir. Bemerk. B. 1.).

§. 1074.

Milchruhr wird der langwierige Bauchfluss genannt, welcher in dem gewöhnlich ohne Kothentleerungen erfolgenden Abgange einer weisslichen, milchartigen Materie besteht und Abzehrung herbeiführt.

§. 1075.

Diese seltene Krankheit wird auf folgende Weise beschrieben. Dem Bauchflusse gehen verschiedene Verdauungsbeschwerden voran, Magendrücken, Brennen im Magen, saures Aufstossen, Mangel an Esslust, zuweilen aber auch Gefrässigkeit, Aufblähungen des Leibes, dumpfe Schmerzen in verschiedenen Theilen des Unterleibes, zuweilen aber auch wirkliche Kolik etc. Hierzu kommt nun ein, vorzüglich nach dem Genusse von Speisen unter Drängen zum Stuhlgange und unter Stuhlzwang erfolgender Abgang einer weissen, oft auch gräulichen und gelblichen, zuweilen mit Blutstreifen vermischten, milch- oder rahmartigen Flüssigkeit, in der Menge von etwas mehr oder weniger als einem Löffel voll. Gewöhnlich geht hierbei nur wenig oder kein Koth ab, indem die gewöhnlichen Stuhlentleerungen meistens schon am Morgen statt fanden, oder es zeigt sich wenigstens die abgegangene Materie von dem Kothe getrennt. Zuweilen erfolgen solche Entleerungen sehr häufig, selbst jede halbe Stunde. Es werden hierdurch die Kräften des Kranken erschöpft und es gesellen sich zuletzt Zehrfieber und auch wassersüchtige Anschwellungen hinzu. — Bei

den Leichenöffnungen fand man die Darm- und Gekrösdrüsen angeschwollen.

§. 1076.

Als Ursachen werden beschuldigt die scrophulöse Cachexie, Würmer, insbesondere Askariden, Hämorrhoiden, die Onanie und das Erdulden der Pädrastie, langwierige Durchfälle und Ruhren, zurückgetretene Gicht, Krätze, Milchversetzung etc.

§. 1077.

Wesen. Man hielt früher die Krankheit für den Abgang von Chylus, der wegen Verschliessung der aufsaugenden Gefässe und der Gekrösdrüsen nicht aufgenommen werde; genügender ist aber die Erklärung von *Richter*, welcher sie für eine Absonderung von eiterartigem Schleime in der Schleimhaut des Mastdarmes hält und ihr den Namen Fluor albus intestini recti beigelegt wissen will. Zuweilen mögen diesem Uebel auch Geschwüre im Mastdarm zum Grunde liegen.

§. 1078.

Vorhersage. Die Krankheit ist sehr gefährlich und schwer zu heilen.

§. 1079.

Behandlung. Man entferne den Reitz, der die krankhafte Absonderung unterhält. — Man sucht die Absonderung zu beschränken, wozu die gewöhnlichen, gegen hartnäckige Durchfälle dienlichen Mittel, wie das Opium, Columbo, Cascarille etc., gebraucht werden können. Auch sind Kalkwasser, Terpenthin, Copaivbalsam und reitzmildernde, so wie auch zusammenziehende und andere verschiedenartige Klystiere empfohlen worden, namentlich solche von kaltem Wasser, von Kalkwasser, von Sublimatauflösung.

Die Magenruhr.

(*Lienteria, Laevitas intestinorum.*)

Rud. Aug. Vogel (resp. Biel, Diss. Goett. 1770). — *Friedreich* (Würzburg 1824).

§. 1080.

Magenruhr wird der Durchfall genannt, in welchem die genossenen Speisen, selbst wenn sie sehr leicht verdaulich sind, unverändert abgehen.

§. 1081.

Mancherlei Störungen in den ersten Wegen gehen diesen Stuhlentleerungen voraus. Heisshunger mit öfters sich einstellendem Erbrechen (Hundshunger, Fames canina, Cynorexia) oder auch Mangel an Appetitt oder Abneigung gegen gewisse Speisen, z. B. Milchspeisen, ein Gefühl von Leere im Magen bei Ausdehnung der Herzgrube, Magenschmerzen, Kolik, Aufblähen etc. Gewöhnlich gehen die Speisen und Getränke sehr bald, selbst nur wenige Minuten nach dem Genusse derselben, meistens unter Leibschneiden unverändert und ohne allen Geruch mit Schleim, Blut oder Galle vermischt oder auch unvermischt ab, zuweilen erfolgt der Abgang dieser Stoffe aber auch erst am andern Tage. In der Zwischenzeit dauern verschiedene Unterleibsbeschwerden fort, auch geht der Harn sparsam und mit Brennen ab, und es entstehen oft Schwämmchen im Munde etc. In Genesung soll diese Krankheit vorzüglich unter vermehrtem Harnabgang und dem Eintritt von saurem Aufstossen und Sodbrennen, welches ein Zeichen der wiederbeginnenden Veränderung der Speisen sei, übergehen, in den Tod, durch Auszehrung, nachdem ein Zehrfieber hinzugetreten ist, und auch durch sich hinzugesellende Wassersucht.

§. 1082.

Als entferntere Ursachen der Magenruhr werden beschuldigt langwierige Ruhren, Schwämmchen, die Schwindsucht, der Scorbut und andere Cachexien, contagiöse und gastrische Fieber, unterdrückte Hautausdünstung, zurückgetretene Gicht.

§. 1083.

Wesen. Den Krankheitszustand des Darmkanals, der diesen krankhaften Entleerungen zum Grunde liegt, haben Einige in Erweiterung und Erschlaffung des Pylorus gesetzt, Andere aber wohl mit Recht in eine aus erhöhter Reitzbarkeit des Magens und Darmkanals entspringende beschleunigte, peristaltische Bewegung mit vermehrter Absonderung. Hierbei muss wohl zugleich ein aus irgend einer Ursache darniederliegendes Verdauungsgeschäft angenommen werden, wodurch selbst auf die ganz fein vertheilten Nahrungsstoffe die von der Magenwandung ausgehende lebendige Anziehung nicht stattfindet und daher diese Stoffe mit den zur Ernährung unbrauchbaren Substanzen durch die Stuhlentleerungen abgehen.

§. 1084.

Vorhersage. Die Magenruhr ist eine sehr gefährliche Krankheit, besonders bei alten Individuen, und schwer zu heilen.

§. 1085.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Zuweilen ist es nothwendig, durch ein gelindes Brech- oder Abführungsmittel einen vorhandenen Reitz aus dem Magen und dem Darmkanal zu entfernen. Der Kranke geniesse nur wenig, aber eine kräftig nährende, wenn kein entzündungsartiger Zustand vorhanden ist, die Verdauungskraft erregende Nahrung, wie lind gesottene Eier, eine gewürzhafte Chocolade, rothen Wein etc.

§. 1086.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Es können hier die nämlichen Verfahrungsweisen stattfinden, wie bei der Behandlung eines gewöhnlichen langwierigen Durchfalles. Nur selten werden eigentliche entzündungswidrige Mittel passen oder nur einhüllende Mittel genügen. Am meisten ist wohl von dem Opium, in Verbindung mit tonischen Mitteln, namentlich mit Columbo zu erwarten. Man verbindet damit das Auflegen von Theriakpflaster und aromatischen Pflastern auf die Magengegend, aromatische und geistige Einreibungen in dieselben, aromatische Bäder u. s. w. Auch sind die Absonderungen in der Haut und in den Nieren auf angemessene Weise zu befördern. Dem Kranken ist hierbei zu empfehlen, nicht zu oft, sondern nur, wann es unumgänglich nothwendig ist, zu Stuhle zu gehen.

Die Ruhr.

(Dysenteria, Difficultas intestinorum.)

Sydenham (opp.). — *Pringle* (Beobachtungen über d. Krankheiten d. Armee. Th. 3.). — *K.* u. *G. Strack* (Mainz 1760 u. Leyd. 1766). — *Zimmermann* (Zürich 1767). — *Ackermann* (lat. Leipz. 1777). — *Stoll* (rat. med. P. III.). — *Richter* (med. chirurg. Bemerk. B. I.). — *Vogler* (Giess. 1797). — *Horn* (Erf. 1806). — *v. Wedekind* (herausgegeben v. Dannenberg, Frankf. a. M. 1811). — *L. Frank* (de peste, dysenteria et ophth. aegypt. Wien 1820). — *Malik* (Prag 1828).

§. 1087.

Die **Ruhr** ist eine mehr oder weniger hitzig verlaufende Krankheit, welche sich vorzüglich durch ein sehr oft sich wiederholendes Bedürfniss zum Stuhlgang, verbunden mit Stuhlzwang und durch den Abgang von

einer grössern oder kleinern Menge wässeriger, schleimiger oder blutiger Flüssigkeit zu erkennen giebt.

§. 1088.

Gewöhnlich gehen dem Eintritte der eigentlichen Ruhrzufälle verschiedene Störungen in den Verdauungswegen, insbesondere Durchfälle und Leibweh, so wie auch rheumatische, catarrhalische und zuweilen auch fieberhafte Erscheinungen voraus. Sodann, oder auch ohne diese Vorläufer, stellt sich ein immer stärker werdendes Drängen zum Stuhlgange ein, das der Kranke vorzüglich in dem Mastdarme wahrnimmt und womit ein Gefühl von Hitze, Brennen und Spannen und auch heftigere schneidende Schmerzen verbunden sind (der Stuhlzwang, Tenesmus). Unter diesem Drange zum Stuhlgange wird nun eine wässerige, von Koth gefärbte Flüssigkeit entleert, in welcher meistens viele weissliche Flocken schwimmen, die zum Theil auch gelblich und grünlich gefärbt sind und auch Blutstreifen zeigen, oft gehen auch häutige Stücke, wie von Pseudomembranen, ab, zuweilen ist viele weissliche eiterartige Flüssigkeit in dem Entleerten enthalten (die weisse Ruhr), oft ist viel Blut mit ihr gemischt oder es geht selbst reines Blut ab (die rothe Ruhr), in manchen Fällen wird auch auf einige Zeit die Absonderung ganz unterdrückt, so dass ungeachtet des heftigen Drängens Nichts entleert wird (die trockene Ruhr). Durch das heftige Drängen fällt zuweilen der Mastdarm vor und kann, wenn er nicht zurückgebracht wird, in den Brand übergehen. Es werden oft diese Anstrengungen so stark, dass Uebelkeit, Neigung zum Erbrechen und zur Ohnmacht und bei Kindern selbst Gichter eintreten. Solche Stuhlentleerungen oder auch ohne Erfolg bleibende Anstrengungen hiezu wiederholen sich oft nur einigemal des Tages, oft aber auch sehr häufig, jede Viertelstunde und noch öfter. Häufig verbinden sich mit diesen Beschwerden ähnliche

in der Blase, schmerzhaftes Harnlassen und Harnverhaltung. In den höhern Graden der Krankheit gesellt sich ein Fieber hinzu, das deutlich nachlassend ist.

§. 1089.

Die gewöhnliche einfache Ruhr hat eine Dauer von 8 bis 14 Tagen, dehnt sich aber auch auf 4 Wochen und eine längere Zeit aus. In die Gesundheit geht sie unter allmähligem Nachlass der Zufälle und unter Wiedereintritt normaler Kothentleerungen und meistens unter Schweissen und kritischem Urin über. — Zum Tod kann sie durch Erschöpfung der Kräfte, durch den Hinzutritt von Krämpfen und durch Metastasen auf edle Organe führen. — Folgekrankheiten der Ruhr sind: langwierige Durchfälle, bei welchen sich zuweilen noch einzelne ruhrartige Zufälle zeigen (Dysenteria chronica), Verstopfung, Vorfall des Afters, Magenruhr, aus Versetzungen entstandene Uebel, wie, nach *Richter*, eine katarrhalische Bräune, Entzündungen der Lunge, des Gehirnes, Blindheit, Taubheit, Abscesse in den Ohrendrüsen, rheumatische Geschwülste, Ausschläge, Geschwüre in der Haut etc., endlich als Folge der Entkräftung Wassersucht.

§. 1090.

Durch verschiedene Umstände kann das Krankheitsbild etwas verändert werden. Oft ist die Ruhr von starken, reissenden Schmerzen im Kreuze und in den Gliedern, rheumatischen, oft wandernden Geschwülsten und von besonders heftigem Leibschneiden, so wie auch von catarrhalischen Zufällen begleitet (Dysenteria rheumatica, catarrhalis). Zuweilen werden die Schmerzen im Unterleibe anhaltend und festsitzend, der Bauch wird empfindlich, gehemmt und aufgetrieben, das Drängen zum Stuhlgang ist heftig, aber es wird wenig oder nichts dadurch entleert oder es geht reines Blut ab, und es stellen sich häufiges Erbrechen, Fieber mit sehr gereitztem

Pulse, Kopfweh, Delirien und mehr oder weniger alle Zufälle einer heftigen Darmentzündung ein (Dysenteria inflammatoria). — In andern Fällen sind besonders galligte Erscheinungen hervorleuchtend, die Kranken haben einen stark bittern Geschmack, galligtes Erbrechen, die unter Stuhlzwang abgehenden Entleerungen sind stark mit galligten Stoffen gefärbt, die Haut wird trocken und gelblich, der Urin safranfarbig, es gesellt sich ein Fieber mit schnellem und heftigem Pulse, das gerne ins Nervöse übergeht, hinzu (Dysenteria biliosa). — Endlich zeichnen sich manche Krankheitszufälle durch grosse, oft schnell eintretende Erschöpfung der Kräfte, leicht sich hinzugesellendes Irrereden, Sehnenhüpfen, Flockenlesen, Petechien, Schwämmchen, äusserst stinkende Beschaffenheit der Stuhlentleerungen und überhaupt durch die Ausbildung eines nervösen und fauligten Zustandes aus (Dysenteria nervosa, putrida, maligna).

§. 1091.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man findet vorzüglich in der Schleimhaut des Mastdarmes mehr oder weniger ausgebreitete entzündete Stellen, rothe und schwärzliche Stellen von ausgetretenem Blute, Verdickungen der Häute, zuweilen Verschwärungen und Brand, ausserdem auch Spuren von Entzündungen in andern Theilen des Darmkanals, Anschwellungen der Gekrösdrüsen, Entzündung der Leber, seröses, eiteriges und blutiges Extravasat im Unterleibe etc.

§. 1092.

Ursachen der Ruhr sind vorzüglich schneller Temperaturwechsel und Erkältung, daher die Krankheit als Volkskrankheit vorkommt, wenn eine schwüle Hitze mit kalter und nasser Witterung wechselt, oder die Tage heiss und die Nächte kühl sind, wie am Ende des Sommers und in heissen Klimaten, ferner wenn bei Armeen die Soldaten die Nächte auf feuchter Erde und unter

freiem Himmel zubringen müssen etc., doch finden bei ausgebreiteten Ruhrepidemien nicht immer diese Einflüsse statt, so wie diese Ursachen auch häufig vorhanden sind, ohne dass die erwähnte Krankheit herrscht, und es muss daher bei solchen Epidemien noch eine andere, uns noch unbekannte Schädlichkeit wirken, wie auch z. B. die Grippe nicht allein bei einem Wechsel in der Witterung ausbricht, sondern einer uns noch unbekannten Eigenschaft der Athmosphäre ihren Ursprung zu verdanken scheint; ferner befördern die Sumpfluft und die Ausdünstung vieler Kranken und ihrer Excremente die Entstehung der Ruhr, vielleicht wird sie auch zuweilen, wenn sie in das Fauligte übergeht, ansteckend, doch scheint dabei kein Contagium im engsten Sinne des Wortes, wie z. B. das der Blattern ist, sich zu entwickeln, sondern die abgesonderten Stoffe nur als specifischer Reitz auf die Schleimhaut des Darmkanals zu wirken, wie die Schnupfenmaterie auf die Schneiderische Haut wirkt. Zuweilen mögen auch schlechte Nahrungsmittel Ruhrepidemien veranlassen, z. B. verdorbenes Getreide, unreife oder verdorbene Erdäpfel, unreifes Obst etc. Bei einzelnen Individuen mögen auch ruhrartige Zufälle durch verdorbene Galle, zurückgetretene Gicht etc. hervorgebracht werden können.

§. 1093.

Das **Wesen** der Krankheit suchte die griechische Schule in einer Eiterung der Gedärme,*) *Sydenham* in einem Fieber, das seine Richtung gegen die Gedärme genommen habe, *Linne* glaubte, die Krankheit sei eine Art Krätze des Darmkanals, die durch eine eigene Milbenart (Acarus Dysenteriae) hervorgebracht werde, *Cullen*, *Hufeland*, *Horn* hielten sie für ein krampf-

*) Die Geschichte der Ansichten über die Natur der Ruhr hat *Haase* ausführlich gegeben. Chron. Krankh. 2te Aufl. 3ter B. S. 233 u. d. f.

haftes Leiden der Dickdärme, in der neuern Zeit sehen viele Aerzte, nach *C. Aurelianus, Fr. Hoffmanns, P. Franks* und Anderer Vorgang der Krankheit für eine rheumatische oder catarrhalische Affection der Gedärme oder auch, wie *Wedekind, Marcus* u. A., für wirkliche Entzündung und zwar des Mastdarmes an.

Es möchte wohl kaum im Zweifel gezogen werden können, dass bei der Ruhr eine entzündliche Affection der Schleimhaut des Dickdarmes statt findet, es ist hiermit viel Krampf verbunden und die Absonderungen sind in der Regel vermehrt, doch ist hierdurch noch nicht die ganze Natur der Krankheit aufgeklärt, da oft die entferntern Ursachen ganz unbekannt sind und man die Wege nicht kennt, auf welchen der Mastdarm ergriffen wird. Ist es unmittelbare Reitzung des Mastdarms durch Stoffe, die von aussen in den Darmkanal gelangen, und warum veranlassen sie nicht vielmehr Krankheit des Magens und der dünnen Gedärme? Sind Stoffe im Blute, die auf den Darmkanal abgelagert werden und diesen in einen gereitzten Zustand versetzen, und warum wenden sie sich gerade gegen den Mastdarm? Ist es eine consensuelle oder antagonistische Affection, durch Einwirkung von Schädlichkeiten auf die Haut erzeugt, und warum befällt dieselbe bei ganzen Volksmassen die dicken Gedärme?

§. 1094.

Die Vorhersage richte sich vorzüglich nach dem Character der Epidemie. Oft giebt es Seuchen, die zahlreiche Opfer fordern, oft kommen beinahe gar keine Todesfälle vor. Unter den angegebenen Abweichungen von der gewöhnlichen Form der Krankheit sind die nervöse und fauligte und sodann die galligte und die entzündliche Ruhr die gefährlichern.

§. 1095.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Um Verkältung zu vermeiden, muss der

Kranke den Unterleib durch eine flanellene Binde und die Füsse durch wollene Strümpfe warm halten, oder im Bette liegen bleiben, er gehe bei kaltem oder windigem Wetter nicht auf den Abtritt, sondern bediene sich eines Nachtstuhles oder der Bettschüssel. Der Kranke geniesse keine schwerverdauliche, blähende oder zu reitzende Speisen, halte sich dagegen mehr an leichte Suppen, bei entzündlichem oder gallichtem Character an gekochtes Obst, wie gekochte Kirschen, Zwetschgen, Heidelbeeren und an Buttermilch, und bei Bedürfniss zu besserer Ernährung, an kräftige Fleischbrühsuppen mit Reis, Gerste, Sago, weichgesottene Eier, leichte Mehlspeisen etc. — Zuweilen, wie z. B. öfters in der galligten Ruhr, ist es nothwendig, im Darmkanal liegende Reitze hinwegzubringen, man bewirke dieses nach Umständen entweder durch ein Brechmittel aus Ipecacuanha oder durch gelinde Abführungsmittel, wie öligte Mittel, Manna, Tamarinden, Weinsteinrahm etc.

§. 1096.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* In den gelindern Fällen wird die erhöhte Lebensthätigkeit im Darmkanal schon durch einhüllende Mittel, wie Abkochungen von Eibisch, Salep, Emulsionen von Mandeln, Hanfsamen, Magsamen, Auflösungen des arabischen Gummi, durch schleimige Klystiere und durch schweissbefördernde Mittel, wie die schweisstreibenden Thee, den Spiritus Mindereri, starkes Zudecken etc. gemässigt. Genügen diese Mittel nicht, so sind bei etwas stärker hervorstehendem krampfhaftem Zustande die Narcotica und unter ihnen vorzüglich das Opium, aber auch die Blausäure, die Nux vomica u. a. anzuwenden. Auch scheint die Ipecacuanha in kleinen Gaben auf den untern Theil des Darmkanals krampfstillend zu wirken. — Ist der Reitzzustand bis zu einer vollkommenen Darmentzündung gesteigert, so müssen Aderlässe vorgenommen oder Blut-

egel gesetzt werden. — Opium passt bei der entzündlichen Ruhr wegen der die Absonderungen im Darmkanal unterdrückenden Wirkung, wenn nicht ein sehr heftiger Krampf es durchaus erfordert, nicht, dagegen sind mehr einhüllende und verflüssigende Mittel, wie Oelmixturen, gekochtes Obst, Tamarinden und in den heftig entzündlichen Fällen Calomel anzuwenden. Unter den bei der Darmentzündung gebräuchlichen äusserlichen Mittel können, wegen der bei den häufigen Stuhlgängen leicht eintretenden Verkältung, nicht wohl feuchte Umschläge gemacht werden, dagegen eher ein in erwärmtes Fett getauchter Flanell aufgelegt und warme Bäder angewandt werden. — Ist die Reitzung nur unbedeutend und sind dagegen die flüssigen Stuhlentleerungen stark, so können, neben dem Opium, auch tonische Mittel in Anwendung gebracht werden, namentlich Columbo, die Cascarille, die Simaruba, die Arnicawurzel, die Rhabarber in kleinen Gaben, der rothe Wein. Diese Mittel sind besonders bei den nach der Ruhr oft noch einige Zeit fortdauernden ruhrartigen Durchfällen in Gebrauch zu ziehen.

§. 1097.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen der Krankheit.* Kommt ein entzündliches Fieber hinzu, so muss das ganze Verfahren antiphlogistisch sein, nur dürfen die Salze, wegen der Reitzung des Darmkanals, nicht gegeben werden. — Wird der Zustand nervös oder fauligt, so sind Wein, Valeriana, Serpentaria, Campher, die Mineralsäuren etc. zu Hülfe zu ziehen.

Die Harnruhr.

(*Diabetes, Dipsacus, Hydrops ad matulam, Urorrhoea.*)

Trnka de Krzowiz (lat. Wien 1778). — *Sprengel* (resp. Creuzwieser, Diss. 1794). — *Rollo* (a. d. Engl. v. Heidmann, Wien 1801, dasselbe von Jugler übersetzt, Stendal 1801). — *Knebel* (Material. z. theoret. u. prakt. Heilk. B. I.) — *Formey* (vermischte med. Schriften. B. I.). — *Venables* (Lond. 1825). — *v. Stosch* (Berlin 1828).

§. 1098.

Die Harnruhr ist eine, gewöhnlich mit vermehrtem Harnabgange verbundene, in *der* Art veränderte Absonderuug des Urins, dass durch dieselbe zur Ernährung nothwendige Bestandtheile des Körpers ausgeschieden werden und daher Abzehrung erfolgt.

§. 1099.

Die Krankheit beginnt gewöhnlihh mit Störungen in der Verdauung, namentlich Sodbrennen und anderen Zeichen der Säure, der Kranke hat dabei starken Hunger, heftigen Durst und Trockenheit im Munde, seine Haut wird trocken und selbst schuppig, er bemerkt allmählig, dass viel Harn abgeht, der Urin hat meistens eine strohgelbe Farbe und ist hell, zuweilen ist er aber auch trübe, molkenartig, er hat nicht den gewöhnlichen Harngeruch, riecht dagegen oft mehr süsslich-säuerlich oder nach Manchen den Veilchen ähnlich, er ist entweder ohne Geschmack (Diabetes insipidus), wobei er aber sehr reichhaltig an Eiweiss ist, oder er hat einen süsslichen Geruch und Geschmack und hinterlässt abgedampft ein zuckerhaltiges Extract, das sich überlassen in weinigte oder saure Gährung übergeht (Diabetes mellitus); auch fand man den Auswurf und das in den geschwollenen Füssen enthaltene

Serum zuckerhaltig [1]). Der von einem Tage gesammelte Harn beträgt oft 30 bis 50 Pfunde und meistens mehr, als der Kranke flüssige und feste Nahrung zu sich nimmt, doch ist die Menge des Harnes nicht immer vermehrt. Bei dem Harnen empfindet der Kranke oft Schmerzen und es ist ihm, wie wenn kalte Tropfen in die Blase fielen, zuweilen ist Unvermögen, den Harn zu halten, vorhanden. Die Vorhaut schwillt oft an, es sammelt sich unter ihr eine käsige Materie an und sie wird oft wund. Der Kranke magert allmählig ab, seine Kräften schwinden, sein Speichel wird zähe, das Zahnfleisch geschwollen, seine Stimme heiser, oft kommt ein säuerlicher, stinkender Geruch aus dem Munde vor, endlich gesellen sich ein Zehrfieber, Durchfälle und Wassergeschwülste hinzu.

Die Krankheit hat einen sehr langwierigen Verlauf. Der Tod wird durch Erschöpfung der Kräfte herbeigeführt.

§. 1100.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man hat Verhärtungen der Leber und der Gekrösdrüsen gefunden (*Mead*), Schlaffheit und Weichheit der Nieren (*Ruysch*), Verhärtungen, Steine und Geschwüre in den Nieren (*Ballonius*), erweiterte, Steine haltende Harnleiter (*Fr. Hoffmann*), Erweichung aller Knochen (*Pott*), eine Menge Gallerte in der Fetthaut (*Duncan*), ein trübes Blut von molkiger Farbe und süssem Geschmack (*Dobson*, letzteres auch *P. Frank*), das Blut in eine chocoladefarbige Flüssigkeit von süsslich saurem Geruch verwandelt, die Muskeln und alle sonst rothen Theile des Körpers ebenso gefärbt und in der Vena subclavia den Milchsaft vom Blute getrennt (*Marshal*), einen moschusartigen Geruch der Leiche, das

1) Mittheil. aus Bonn in Sachs med. Zeitung. 1832. Nro. 7.

Blut süsslich, braun und mangelhaft mit dem Chylus gemischt (*Michaelis*).[1])

§. 1101.

Ursachen. Die Krankheit soll beinahe nur bei Männern vorkommen und die Anlage dazu zuweilen erblich sein. — Als Gelegenheitsursachen werden beschuldigt, der Missbrauch geistiger Getränke und auch der harntreibenden Mittel, Geschlechtsausschweifungen, niederdrückende Gemüthsaffecte, der zu reichliche Genuss von Pflanzennahrung, unterdrückte Schweisse, zurückgetretene Gicht, Rheumatismus, Hautausschläge, Geschwüre, Verhärtungen von Eingeweiden, Nierensteine etc.

§. 1102.

Wesen. Aeltere Schriftsteller suchten die Krankheit aus einer Auflösung und Schärfe des Blutes zu erklären, *Mead* u. A. aus Verstopfung der Leber und andern Fehlern der Baucheingeweide, wodurch eine fehlerhafte Galle bereitet und die Verdauung gestört werde und ein fehlerhafter Chylus zu den Nieren gelange, — *R. A. Vogel* aus einem Leiden der Nieren selbst, das entweder in einer Reitzung und Krampf oder in Atonie und Erweiterung der Gefässe bestehen könne, — *Darwin* aus einer rückgängigen Bewegung in den Saugadern von dem Ductus thoracicus gegen die Nieren, wodurch es komme, dass der Chylus nicht in diesen, sondern in die Nieren abgelagert werde, auch glaubte er, dass die genossenen Getränke, ohne in die Blutmasse überzugehen, durch besondere Gefässe zu den Nieren geführt würden, — *Kausch* aus einem Krampf der Haut, wodurch die wässerige Feuchtigkeiten nicht ausgedünstet, sondern zu den mit der Haut in Sympathie stehenden Nieren geleitet würden, — *P. Frank* sucht eine Analogie zwischen der Hundswuth und der Harnruhr nachzuweisen, und glaubt,

1) Vergl. hierüber *Dreyssig*, *Haase* und *Conradi*.

dass auch bei dieser Krankheit ein eigenes Gift im Körper erzeugt werde, wodurch gleichsam ein Fieber im Saugadersystem hervorgebracht und dadurch ein zu schneller Uebergang des noch rohen Milchsaftes bewirkt werde, welcher sodann zu den Nieren geleitet und in Form des Zuckerstoffes ausgeschieden werde. — In der neuern Zeit hat man nach *Rollos* Vorgang vorzüglich die Bildung der zuckerartigen Bestandtheile des Urins zu erklären gesucht. *Rollo* nimmt eine krankhaft vermehrte Thätigkeit des Magens an, wodurch der Magensaft vermehrt abgesondert und übermässig Säure gebildet werde, hierdurch würde aus den Pflanzenstoffen Zucker erzeugt, wegen geschwächter Assimilation komme aber der Zucker des Milchsaftes unverändert zu den Urinwerkzeugen und würde durch diese ausgeleert. — *Hufeland* findet eine Analogie zwischen der Steinerzeugung und der Harnruhr, in beiden Krankheiten sei ein Ueberschuss von freier, thierischer Harnsäure vorhanden, diese verbände sich in dem einen Falle mit Schleim oder Erde und erzeuge den Stein, in dem andern Falle mit andern Stoffen und bringe Zucker hervor. — *Haase* erklärt die Harnruhr für eine dynamische und chemische Krankheit zugleich, es werde, meistens durch Störung der Funktion der Leber und der Milz, eine Hyperoxydation der Magen- und Darmsäfte hervorgebracht. Diese wirken nun zum Theil als Reitz, wodurch die Resorption im Darmkanal und in der Haut und die Absonderung in den Nieren vermehrt würden, was, so lange die Krankheit rein dynamisch bleibe, den Diabetes insipidus darstelle, zum Theil wirke aber die Säure chemisch auf die zur Nahrung gebrauchten Pflanzenstoffe, wodurch auf eine ähnliche Weise Zucker bereitet würde, wie man nach *Kirchhofs* Entdeckung vermittelst concentrirter Schwefelsäure aus Stärkmehl Zucker gewinnen könne. Der Zucker gelange aus den ersten Wegen ins Blut und werde mit dem

Urin ausgeschieden (der Diabetes mellitus). — Endlich verdient die Ansicht *Formey's* Erwähnung, welcher die nächste Ursache in einem von dem Rückenmarke und dem Gangliensystem ausgehenden krankhaft vermehrten Nerveneinfluss auf die Harnwerkzeuge sucht.

§. 1103.

Vorhersage. Die Harnruhr ist höchst gefährlich, insbesondere soll die zuckerartige Harnruhr, wenigstens bei ältern Individuen, beinahe immer tödtlich sein und auch schneller als der Diabetes insipidus das unglückliche Ende herbeiführen. Auch macht die Harnruhr leicht Rückfälle und wechselt oft nach *Desault's*, *P. Frank's* und *Raimann's* Erfahrungen mit Wassersucht ab.

§. 1104.

Behandlung. Nach Verschiedenheit der Ansicht, die man von der Natur der Krankheit hatte, sind verschiedene Heilmethoden empfohlen worden. In der Voraussetzung eines entzündlichen Leidens der Nieren hat man Blutentleerungen gerühmt und will von ihnen grossen Nutzen gesehen haben, (*Watt*, welcher zugleich Entziehung von Nahrung, Quecksilber, kohlensaures Ammonium, Kalkwasser und Blasenpflaster empfiehlt). — Um den vermehrten Nerveneinfluss zu mindern, lässt *Formey* bei magerer Diät Blutegel längs dem Rückgrathe setzen, denselben mit kaltem Wasser waschen und begiessen, und wendet dabei bald Calomel, bald Opium, Campher, Flores Zinci, oder Wismuthkalk an. — In der Voraussetzung des Vorhandenseins eines gereitzten und krampfhaften Zustandes der Nieren giebt man schleimige Getränke, das Opium, so wie auch die Valeriana, die Asa foetida, Zinkoxyd, Kupfersalmiak nach *Frank*, und wendet auch Brechmittel von Ipecacuanha an nach *Richter*. — Zu demselben Zwecke und indem man glaubt, die Krankheit entstehe durch Zurückhaltung der Hautausdünstung, empfiehlt man schweisstreibende Mittel, insbesondere das

Dover'sche Pulver, den Campher, warme Bäder, Dampfbäder und indem man zugleich eine vermehrte Aufsaugung in der Haut annimmt, Oeleinreibungen. — Indem man den Grund der Krankheit in Erschlaffung der Nieren suchte, hat man tonische und selbst stark reitzende Mittel empfohlen, wie die Rhabarber, Hb. Uvae Ursi, die China, die Eichenrinde, Galläpfel, Gummi Kino, den Alaun, Eisen, die Mineralsäuren, kalte Bäder, die Canthariden. — Um die Säure zu tilgen, in der man die Ursache des Leidens zu finden glaubte, hat man die Magnesia carbonica, das Kalkwasser, das Kali sulphuratum etc. in Anwendung gebracht. — Um die Erzeugung des Zuckers zu verhindern, hält *Rollo* eine rein animalische Kost für nothwendig, er empfiehlt insbesondere weiche Eier, Wildbrett, Schweinefleisch, Blutwurst, fettes ranziges Fleisch, Lachs, Aal, fetten Käs, zum Getränk Milch mit Kalkwasser, Wasser mit Pfeffermünzwasser und rohem Eidotter, Fleischbrühe, Rhum mit Milch etc. Zugleich lässt er den Kranken ein wollenes Hemd tragen, seine Haut alle Morgen mit Speck einreiben und giebt ihm zuerst das Kali sulphuratum zu 1 bis 2 Drachmen täglich in Wasser aufgelöst und späterhin das Ammonium hydrogenato-sulphuratum (Liquor fumans Boylei), welches kräftig desoxydirend und zugleich die erhöhte Sensiblilität beschränkend wirkt, im Anfang zu 3 oder 4 und allmählig steigend zu 12 Tropfen viermal täglich in destillirtem Wasser in Verbindung mit Opium und Antimonialmitteln.

Unter den angegebenen Heilverfahren scheint das von *Rollo* empfohlene den Vorzug zu verdienen; übrigens kann man nach Verhältniss der Umstände auch verschiedene zugleich anwenden, namentlich scheint der Uebergang zu den tonischen Mitteln wenigstens gegen das Ende der Krankheit oft nothwendig zu werden. Man kann diese Mittel auch gebrauchen, wenn man die

vermehrte Absonderung auch nicht von Atonie herleitet, indem sie überhaupt die Absonderungen beschränkend wirken und wegen der eintretenden Erschöpfung der Kräfte oft nöthig werden. Vielleicht werden sich auch die Cubeben, die eine so auffallende Wirkung auf die Geschlechts- und Harnorgan beim Tripper und andern fehlerhaften Absonderungen äussern, nützlich erweisen.

Der Saamenfluss.

(*Gonorrhoea, Spermorrhoea.*)

Tissot (von der Onanie, 1ste Auflage, Laus. 1760). — *Wichmann* (lat. Gött. 1682, deutsch, Altenb. 1791). — *Fried. Hildebrand* (Braunschw. 1792). — *Doussin Dubreuil* (a. d. Franz. 1807, 4te Aufl. Pesth 1827). — *Leo-Wolf* (Brem. 1810). — *Wildberg* (Berl. 1817).

§. 1105.

Der Saamenfluss ist eine krankhaft vermehrte, auf eine geringe Reitzung oder auch ganz ohne eine solche erfolgende Absonderung und Ausleerung des Saamens und des Saftes der Vorsteherdrüse.

§. 1106.

Die zu reichliche Ausleerung des Saamens ist eine sehr häufige Krankheitsursache und wird als solche in der allgemeinen Krankheitslehre betrachtet, so wie das Kranksein, das hierauf folgt, vollständig in dem Kapitel von der Rückemarksdarre beschrieben werden wird, sie selbst ist aber nur dann Krankheit, wenn sie auf einem krankhaften Zustande des Absonderungsorgans beruht, was daran erkannt werden kann, dass die Aussleerung des Saamens erfolgt, ohne dass ein solcher Reitz eingewirkt hat, der auch im gesunden Zustande den Abgang des

Saamens bewirkt. Nur solche Saamenentleerungen können als krankhafte Absonderung betrachtet werden. Man nimmt drei Grade dieses Uebels an: 1) die zu häufigen Ergiessungen des Saamens im Schlafe (die nächtliche Befleckung, Pollutio nocturna), diese ist jedoch selten Krankheit des Absonderungsorgans, sondern in der Regel Folge von wollüstigen Träumen und vom Reiben des Gliedes; 2) die im wachenden Zustand und auf einen geringen Reitz, z. B. schon durch Erregung der Phantasie und oft ohne vollkommene Erection erfolgende Saamenentleerung (Pollutio diurna) und 3) der ohne alle Reitzung und ohne das Gefühl der Wollust, entweder nur zeitweise, z. B. beim Harnen, beim Stuhlgange, beim Gehen etc., oder anhaltend tropfenweise erfolgende Abgang des Saamens (Gonorrhoea completa).

Man kann auf zu häufige Saamenausleerungen bei einem Individuum schliessen, wenn dasselbe in den Jahren ist, in welchen die Onanie am häufigsten stattfindet, das heisst in den nächstfolgenden 6 bis 10 Jahren nach eingetretener Mannbarkeit und dabei dasselbe ein blasses Aussehen und etwas tief liegende Augen und Ringe um dieselben hat, wenn der Herzschlag leicht sehr vermehrt wird, der Kranke über Mattigkeit und andere fehlerhafte Gefühle klagt, ohne dass man von denselben einen andern genügenden Grund auffinden kann, wenn er sehr besorgt um seinen Körper, niedergeschlagen und zugleich verlegen ist, wobei die Kranken gewöhnlich den Arzt nicht anschauen, sondern den Blick auf die Seite wenden.

Die nachtheiligen Folgen des Saamenflusses sind zunächst das Gefühl der Schwäche und Schläfrigkeit an dem Tage, an welchem die Saamenentleerung stattfand, sodann allmählig erfolgende, bleibende Kraftlosigkeit des Körpers, Abmagerung, Schwäche der Verdauung, Niedergeschlagenheit des Geistes, Schwäche des Gedächtnisses,

Schwäche der Sinne, insbesondere schwaches Sehvermögen, zuletzt die Rückendarre.

§. 1107.

Der eigentliche Saamenfluss entwickelt sich mit seinen nachtheiligen Folgen in der Regel nur langsam und hat daher einen langwierigen Verlauf. Die Gesundheit stellt sich nach dem Aufhören der Gelegenheitsursache allmählig wieder her, doch bleibt bei schon weit gekommenem Uebel oft eine dauernde Schwäche des Körpers, Nervenschwäche, Schwäche des Geistes und häufig männliches Unvermögen zurück. Den Tod können die zu häufigen Saamenentleerungen durch die Rückenmarksdarre und auch durch Schlagfluss zur Folge haben.

§. 1108.

Ursachen. Die Krankheit kommt am häufigsten unmittelbar nach eingetretener Mannbarkeit und bei schwächlichen und sehr reitzbaren Subjecten vor.

Die vorzüglichste Gelegenheitsursache ist Onanie, auch tragen die Ausschweifungen in der Phantasie viel zur Erhöhung der Reitzbarkeit der Geschlechtstheile bei und sind bei schon eingetretenem krankhaftem Zustande derselben schon hinreichend, die Absonderung und Entleerung des Saamens zu bewirken. Seltener hat der Beischlaf selbst den eigentlichen (krankhaften) Saamenfluss zur Folge, wiewohl sein Missbrauch ebenfalls grosse Störungen der Gesundheit nach sich ziehen kann. Ausserdem kann der Saamenfluss auch durch den Missbrauch der Urin treibenden und auf die Geschlechtstheile wirkenden Mittel, durch zu reichliche und reitzende Nahrung, durch Würmer und andere Reitze im Unterleibe, durch Geschwüre der Ausführungsgänge, der Vorsteherdrüse und der Saamenbläschen, und auch durch zu grosse Enthaltsamkeit, wenn zugleich die Phantasie aufgereitzt ist, erregt und befördert werden.

§. 1109.

Vorhersage. Der Erfolg der Behandlung hängt vorzüglich von dem Grade der Willenskraft des Kranken ab, durch welche derselbe den aufgeregten Naturtrieb zu bekämpfen im Stande ist. Der Saamenfluss des dritten Grades (die Gonorrhoea completa) ist häufig unheilbar.

§. 1110.

Als das Wesen der Krankheit muss ein gereitzter, jedoch nicht entzündlicher Zustand der Geschlechtstheile, insbesondere der die Saamenfeuchtigkeit absondernden Theile, wodurch die Absonderung vermehrt wird, betrachtet werden.

§. 1111.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Es kommt Alles darauf an, den Kranken von der Onanie und den Reitzungen der Geschlechtstheile durch die Phantasie abzuhalten. Hierzu ist es zweckmässig, um die Willenskraft des Kranken zu erregen, demselben die grossen Gefahren, welche die zu häufigen Saamenentleerungen nach sich ziehen können, zu offenbaren. Der Kranke gebe dem Spiel der Phantasie keinen Raum, er vermeide böse Gesellschaft und das Lesen schlüpfriger Bücher, er beschäftige sich andauernd mit andern Gegenständen, die die Aufmerksamkeit fesseln, er ermüde sich durch geistige und körperliche Arbeiten, so dass sich Abends der Schlaf gewaltsam seiner bemächtigt, er bediene sich einer etwas sparsamen Nahrung, besonders am Abend, er schlafe auf einem nicht zu weichen Lager, er suche sich morgens aus dem Halbschlafe, in welchem am häufigsten die Pollutionen eintreten, zu erwecken und stehe sodann sogleich auf. Um bei beginnenden Erectionen Aufwachen zu bewirken, hat man das Einbinden der Hoden sammt dem Gliede in einen Tragbeutel empfohlen. Oft ist es gut, in das Schlafzimmer des Kranken noch ein anderes Individuum zu legen,

damit er aus Scheu vor demselben die Selbstbefleckung unterlasse und auch um ihn zur geeigneten Zeit aus dem Schlafe zu wecken. — Würmer, Anhäufung von Koth in dem Darmkanale und andere Reitze müssen entfernt werden. — Um die stete Aufregung der Phantasie zu vermeiden, ist im gehörigen Alter der mässige Genuss der physischen Liebe oft das beste Mittel.

§. 1112.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die erhöhte Reitzbarkeit der Geschlechtstheile herabzustimmen, ist der Kampher innerlich und äusserlich als Einreibung etc. gebraucht als specifisches Mittel empfohlen worden, doch ist die Wirkung dieses Mittels nicht sehr bedeutend. Das ebenfalls empfohlene Opium kann durch die auf seinen Gebrauch nachfolgende Schwäche schaden, und ist wohl nur anzuwenden, wenn besondere Zufälle seinen Gebrauch anzeigen. Zu demselben Zwecke und um die Absonderung des Saamens zu beschränken, dienen kühlende Getränke, die Mineralsäuren, das Fluss- und Seebad, welche auch durch die bewirkte Ermüdung nützen, kalte Umschläge auf das Mittelfleisch und kalte Waschungen der Geschlechtstheile, wiewohl es in der Regel rathsamer ist, keine örtlichen Mittel anzuwenden, um nicht hierdurch die Phantasie des Kranken in Thätigkeit zu setzen, bei grosser Atonie und beständiger Absonderung der Saamenflüssigkeiten sind auch tonische und die balsamischen Mittel in Anwendung zu bringen. Endlich hat man auch die Castration vorgeschlagen.

§ 1113.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Bei andauernder Schlaflosigkeit und bei grosser Aufregung im Nervensystem leistet das Opium oft sehr gute Dienste. Bei stark sinkenden Kräften sind gut nährende, aber nicht erhitzende Nahrungsmittel und der vorsichtige Gebrauch der stärkenden Heilmittel angezeigt. Ueber die

Behandlung der aus zu starken Saamenentleerungen entspringenden Krankheitszufälle ist übrigens das Kapitel von der Rückendarre zu vergleichen.

Der Tripper.

(*Schleimfluss der Harnröhre, Blennorrhoea urethralis, Gonorrhoea.*)

Allen (Diss Lugd. Bat. 1751) — *Tode* (1te Aufl. 1774, 5te Aufl. 1790, 2 Bde.). — *Baldinger* (lat. Göttingen 1778). — *Murray* (lat. Gött. 1785, a. d. lat. Gött. 1794). — *Hecker* (Erf. 1802). — *Whately* (aus d. Engl. v. Töpelmann, mit 1 K. Leipzig 1806). — *Töpelmann* (Lpz. 1809). — *Cullerier* (m. Zusätzen v. Renard, Mainz 1815). — *Ritter* (Lpz. 1819). — *Eisenmann* (Erlang. 1830, 2 Bde.).

§. 1114.

Der Tripper ist ein mit entzündlichen Zufällen verbundener, schleim- oder eiterartiger Ausfluss aus der Harnröhre und beim weiblichen Geschlecht zugleich aus der Scheide, welcher Ansteckungsfähigkeit besitzt.

§. 1115.

Gewöhnlich 6 — 8 Tage nach einem unreinen Beischlaf entsteht ein Jucken und Brennen in der Harnröhre, vorzüglich an der Mündung derselben und in der Gegend der kahnförmigen Grube, und es zeigt sich dieselbe an ihrer Oeffnung geröthet und etwas angeschwollen (urethritis). Es beginnt nun eine zuerst dünne, schleimige und bald dick und eiterartig werdende, gewöhnlich gelblich, zuweilen auch grünlich aussehende und manchmal auch mit Blutstreifen gemischte Materie auszufliessen. Bei dem Wasserlassen nimmt das schmerzhafte Gefühl zu, besonders empfindet der Kranke bei demselben ein sehr

heftiges Brennen, er hat sehr häufige und oft mehr anhaltende, schmerzhafte Erectionen, wobei, wenn die schwammigen Körper entzündet sind, wegen der an der entzündeten Stelle nicht stattfindenden Ausdehnung des Gliedes eine schmerzhafte Krümmung desselben (Chorda) entsteht. Wegen der mehr oder weniger statt findenden Anschwellung der innern Haut der Harnröhre fliesst oft der Harn nur in einem dünnen Strahle aus. Zuweilen ist auch die äussere Fläche der Eichel entzündet und sondert eine eiterartige Flüssigkeit ab (der Eicheltripper), wobei oft oberflächliche Excoriationen statt finden. Ziemlich häufig entzündet sich die Vorhaut, schwillt an und kann nicht mehr hinter die Eichel zurückgebracht werden (Phimosis); tritt aber die Entzündung der Vorhaut ein, wenn sie sich hinter die Eichel zurückgezogen befindet, so kann sie nicht mehr über die Eichel vorgezogen werden, schnürt diese ein und veranlasst Anschwellung und selbst Brand derselben (Paraphimosis). Manchmal schwellen auch die Leistendrüsen an (consensuelle Bubonen) und auch zuweilen ein Hode.

Beim weiblichen Geschlechte findet ebenfalls Brennen in der Harnröhre statt, der schleim- und eiterartige Ausfluss kommt aber zugleich aus der Scheide und diese ist geröthet und oft beträchtlich angeschwollen.

Erreicht bei dem Tripper der entzündliche Zustand einen sehr hohen Grad, so wird die Absonderung oft ganz unterdrückt (der trockene Tripper), es werden die Schmerzen hierbei sehr beträchtlich, es schwellen auch in diesem Falle besonders leicht die Leistendrüsen und die Hoden an, es entsteht zuweilen eine sehr gefährliche Augenentzündung und auch Entzündungen der Gelenke und es gesellt sich selbst Fieber hinzu.

§. 1116.

Die Dauer des Trippers ist sehr verschieden. In den leichtern Fällen 3 — 4 Wochen, wo sodann die

Schmerzen beim Harnlassen geringer werden, der Ausfluss wieder mehr schleimartig wird und sich zuletzt die Zufälle ganz verlieren; zuweilen wird der Tripper aber ganz langwierig, die Heftigkeit der Zufälle lässt hierbei zwar ebenfalls nach, es fliesst aber noch Monate und selbst Jahre lang eine dünne, weissliche, schleimige Flüssigkeit, besonders beim Harnlassen, in geringer Menge aus (der Nachtripper). Folgekrankheiten des Trippers sind Verengerungen (stricturae) der Harnröhre, durch Verdickung der die Harnröhre umkleidenden Haut und durch Auswüchse erzeugt, Anschwellung der Vorsteherdrüse und auch zuweilen ein langwieriges Blasenleiden und daher Beschwerden beim Harnlassen.

§. 1117.

Die *Unterscheidung* des Trippers vom weissen Flusse ist oft schwierig. Das Vorhandensein des Trippers muss angenommen werden, wenn der Ausfluss sogleich mit Brennen beim Harnlassen beginnt und die Scheide, besonders in der Gegend der Oeffnung der Harnröhre sich entzündet zeigt, es ist dagegen die Krankheit als weisser Fluss anzuerkennen, wenn der Ausfluss unmerklich beginnt und nur allmählig zunimmt und wenigstens im Anfange mit keinem Brennen verbunden ist, und wenn er dagegen mit Ziehen im Kreuze und mit einer allgemeinen Cachexie in Verbindung steht und nicht anhaltend ist, sondern nur vor oder nach der monatlichen Reinigung erscheint, oder die Stelle derselben vertritt. Es kann übrigens der weisse Fluss auch anhaltend sein, mit keiner Cachexie in Verbindung stehen, mit keinen Kreuzschmerzen verbunden sein und eine scharfe Beschaffenheit erhalten haben.

§. 1118.

Als Ursachen des Trippers werden dreierlei Arten von schädlichen Einflüssen beschuldigt.

1) Reitze, die auf die Harnröhre wirken, aber keine ansteckenden Stoffe sind. Hieher gehören scharfe Substanzen, welche durch Einspritzungen oder auf Bougies in die Harnröhre gebracht worden sind, Quetschungen der Harnröhre, Reitzung der Blase und der Geschlechtstheile durch den Genus von scharfen Stoffen, wie von Canthariden, Terpenthin, jungem Wein und Bier etc., Metastasen von Flechten, die scrophulöse und gichtische Dyscrasie u. s. w., auch wird der Beischlaf mit einer unreinlichen oder gerade mit dem Monatlichen behafteten Person beschuldigt. Von diesen Ursachen wirken einige nur höchst selten ein, andere vermögen wohl kaum eine schleim- oder eiterartige Absonderung in der Harnröhre hervorzubringen, und wenn dieses auch geschieht, so ist die Frage, ob diese Eiterung dieselbe Krankheit wie der eigentliche Tripper sei, in welchem ein eigenthümlicher, ansteckender Stoff gebildet wird. Ich glaube z. B. nicht, dass Eiter, welcher durch eine Quetschung der Harnröhren entstanden ist, anstecke.

2) Ein eigenthümliches Trippercontagium. Es scheint dieses von dem syphilitischen verschieden zu sein, da so höchst selten auf den so häufig vorkommenden Tripper die Lustseuche folgt, in welchen Fällen selbst noch immer die Möglichkeit angenommen werden kann, dass neben der Ansteckung durch den Tripper auch eine Mittheilung von syphilitischem Gifte statt fand, und da auch der Tripper eine ganz andere Behandlung erfordert, als die Lustseuche.

3) Das syphilitische Gift. Es lässt sich wohl annehmen, dass das Schankergift, wie ein anderer Reitz, eine schleim- und eiterartige Absonderung in der Harnröhre hervorbringen könne, doch geschieht dieses gewiss sehr selten, da in der Regel der Schanker nur den Schanker fortpflanzt. Auch kann, wo scheinbar durch den Schanker der Tripper hervorgebracht worden ist,

auch zugleich eine Ansteckung durch Trippercontagium geschehen sein.

§. 1119.

Der Tripper scheint seinem **Wesen** nach eine durch einen eigenthümlichen Ansteckungsstoff erzeugte Entzündung und schleim- und eiterartige Absonderung in der Harnröhre, wodurch derselbe ansteckende Stoff von Neuem erzeugt wird, zu sein. Eiterungen in der Harnröhre, die nicht ansteckend sind, sollten nicht als dieselbe Krankheit betrachtet werden.

§. 1120.

Die **Vorhersage** ist, wenn der Tripper vor kurzem entstanden ist, günstig, ein schon sehr lange dauernder Tripper ist dagegen oft schwer zu heilen und hinterlässt auch leicht bleibende Nachtheile.

§. 1121.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Es muss alles das vermieden werden, was reitzend auf die Harnröhre wirkt und was Erectionen veranlasst, daher der Beischlaf und der Genuss stark gesalzener Speisen, des Weines, des Bieres, heftige Bewegung durch Reiten etc. Die Hoden können durch einen Tragbeutel unterstützt werden, damit sie weniger leicht anschwellen.

§. 1122.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Da das Leiden entzündlicher Natur ist, so ist eine nur sparsame Kost zu gestatten. Selten sind innerliche antiphlogistische Mittel nothwendig, und es ist selbst vortheilhafter als Salze, blos einhüllende Getränke, z. B. Mandelmilch oder Molken zu geben. Blutegel an das Glied gesetzt oder allgemeine Blutentziehungen sind nur bei einem hohen Grade des entzündlichen Characters der Krankheit erforderlich und es genügt in der Regel die örtliche Anwendung von einhüllenden und besänftigenden

Mitteln, z. B. durch Baden des Gliedes in lauer Milch und, was ich zu diesem Zwecke mit Vortheil anwende, das Einbringen von frischem Schweinefett in die Harnröhre. Bei starker Entzündung, z. B. bei der Chorda, sind, nebst den örtlichen Blutentziehungen, auch erweichende Umschläge in Anwendung zu bringen. Ist das Entzündliche gemässiget, so werden die Mittel in Anwendung gebracht, welche auf specifische Weise auf die Schleimhaut der Harnwerkzeuge wirken und die Absonderung beschränken. Die gebräuchlichsten sind der Copaivbalsam (Nro. 65) und die Cubeben, auch sind Balsamum peruvianum, Balsamum tolutanum, das Terpenthinöl, das Roob Juniperi, Resina Guajaci, Tinctura Jodinae etc. empfohlen worden. Bei grosser Schlaffheit sind bei dem Nachtripper China, Gummi Kino, Rathanhia, Eisen etc. anzuwenden, scheint dagegen ein sehr sensibler Zustand Schuld des fortdauernden Schleimausflusses zu sein, so sind vorzüglich die Mineralsäuren in Verbindung mit Opium anzuwenden. Die Wirkung dieser innerlichen Mittel unterstützt man durch Einspritzungen von Bleiwasser mit Opium, Kalkwasser, gehörig verdünnter Schwefelsäure, Auflösungen von Zink oder Sublimat, Abkochungen von Eichenrinde, Weidenrinde etc., auch kann man das Glied in kaltem Wasser baden lassen und aromatische Spiritus einreiben lassen.

§. 1123.

Nach einer neuern Behandlungsweise, die vorzüglich *Delpech*[1]) eingeführt hat und welche auch ich sehr vortheilhaft finde, wendet man, ohne auf den entzündlichen Zeitraum Rücksicht zu nehmen, sogleich und zwar in sehr grossen Gaben ein Mittel an, das sonst nur im zweiten Zeitraum und in kleinern Gaben gebraucht wurde, das

1) Mémoire sur l'emploi du piper cubeba dans le traitement de la gonorrhée, Revue méd. 1822, Mai und Juni.

aber den Krankheitsprozess auf eine noch unerklärte Weise oft sehr schnell beschränkt, die Cubeben. Man giebt dieses Mittel als Pulver wenigstens zu einer halben Unce täglich in vier Portionen getheilt, man steigt auch mit der Gabe viel höher, wie z. B. *Delpech* es that, der in manchen Fällen selbst zwei und drei Drachmen viermal täglich nehmen liess. Erregt das Mittel blos eine leichte Wärme im Unterleibe, so kann man dasselbe fortgebrauchen lassen, entstehen nur vorübergehende Leibschmerzen, so kann man ebenfalls das Mittel noch gebrauchen lassen, werden diese aber mehr anhaltend oder sehr heftig und entstehen Durchfälle, so muss man mit dem Mittel einige Tage aussetzen, wornach man sodann wiederum mit kleinern Gaben beginnt. Man bewirkt oft auch, dass das Mittel besser ertragen wird, wenn man zugleich mit demselben einige Nahrungsmittel geniessen lässt. Das Mittel muss noch nach dem Verschwinden aller Erscheinungen ungefähr acht Tage fortgebraucht werden.

§. 1124.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Sind die Schmerzen sehr bedeutend, so dienen, nebst den gegen das Wesen der Krankheit selbst gerichteten Mitteln, ein angemessener innerlicher Gebrauch des Opiums und schmerzstillende Umschläge. — Gegen die Phimosis sind, wenn die Entzündung bedeutend ist, Blutentleerungen anzuwenden, in den gelinden Fällen aber reichen einhüllende und besänftigende Umschläge mit Zusatz von Bleiwasser, öfteres Baden des Gliedes in milden Flüssigkeiten, Anbringung von kühlem Fette und Einspritzungen zwischen die Vorhaut und die Eichel von erweichenden Dingen hin. Sind Schankergeschwüre unter der Vorhaut, so müssen zugleich Mittel, die gegen dieselben dienlich sind, zwischen dieselbe und die Eichel gebracht werden, z. B. vermittelst Einspritzung eine schwache Sublimat-

auflösung. Nur selten ist die Operation angezeigt, indem Harn und Eiter in der Regel einen gehörigen Abfluss finden; ist dieses nicht der Fall, so ist, so wie auch bei zurückbleibenden Verhärtungen und Verengungen, chirurgische Hülfe nothwendig. Bei ödematöser Geschwulst der Vorhaut sind aromatische Kräutersäckchen mit Kampher anzuwenden. — Die Paraphimosis wird zuweilen schon dadurch gehoben, dass man die Eichel mit der kalten Hand, auf welche man auch Schnee oder zerstossenes Eis legen kann, anfasst, oder kalte Umschläge auf dieselbe anbringt, wo sodann die Geschwulst der Eichel sich vermindert und die Vorhaut wiederum vorgezogen werden kann. Genügt dieses nicht, so müssen Blutegel gesetzt und bei krampfhaftem Zustand Opium angewandt werden. Schwillt ein Hode an, so sucht man die Ausbildung der Geschwulst und Entzündung durch kalte Umschläge von Bleiwasser zu unterdrücken, wobei man zugleich, wenn der Tripper trocken wird, erweichende Umschläge um das Glied machen lässt. Ist der Hode schon geschwollen und stark entzündet, so setzt man Blutegel an den Damm und macht erweichende und besänftigende Breiumschläge. Auch kann man innerlich Calomel geben und nach gemässigter Entzündung bei grosser Schmerzhaftigkeit Opium damit verbinden. Bleibt eine Anschwellung und Härte des Hodens zurück, so kann man wiederholte Breiumschläge umlegen und die graue Quecksilbersalbe mit Campher einreiben lassen, wobei der Kranke stets den Tragbeutel beibehalten muss. Nicht leicht möchte die ebenfalls empfohlene örtliche Anwendung scharfer und reitzender Mittel, wie der Abkochung von Cortex Mezerei, der Auflösung von Gummi Ammoniacum in Meerzwiebelessig, der Electricität etc., passen, indem hierdurch der Uebergang in Eiterung oder krebsartige Entartung des Hodens befördert werden kann. Auch hat man vorgeschlagen, einen neuen Tripper durch Einbringung von Kerzen,

welche mit rother Praecipitatsalbe bestrichen sind, hervorzubringen. Nach *Delpech* werden entzündliche Geschwülste und Verhärtungen der Hoden, wenn sie durch den Tripper entstanden sind, ebenfalls durch Cubeben geheilt. Ist der Uebergang in Eiterung oder krebshafte Entartug erfolgt, so ist chirurgische Hülfe nothwendig.

Die nach dem Tripper zurückgebliebene Verengerung der Harnröhre erfordert ebenfalls chirurgische Mittel.

Der weisse Fluss.
(*Fluor albus, Leucorrhoea, Medorrhoea.*)

Raulin (Tom. II. 1766, aus dem Franz. v. Riederer, mit einer Vorrede v. Ackermann, Nürnb. 1793). — *Trnka de Krzowitz* (Wien 1781). — *Mansfield Clarke* (Lond. 1814, a. d. Engl. v. Heinecken, Hannov. 1818—1823, 2 Bde.). — *Sporer* (lat. Wien, 1819). — *Dubouchet de Romans* (Paris 1825).

§. 1125.

Weisser Fluss wird der Ausfluss einer weisslichen, schleimigten Materie aus den weiblichen Geschlechtstheilen genannt, insofern derselbe nicht aus der Blase kommt oder der Tripper ist.

§. 1126.

Im Beginne des Uebels fliesst, ohne eine bemerkbare Veränderung in dem Allgemeinbefinden der Kranken nur von Zeit zu Zeit eine geringe Menge einer milden, blassweisslichen, schleimigten Flüssigkeit ohne allen Schmerz aus. Zuweilen stellt sich dieser Ausfluss nur unmittelbar vor oder nach dem Eintreten der monatlichen Reinigung ein, in welchem Falle er weniger aus der Scheide, als aus der Gebärmutter zu kommen scheint. Allmählig wird dieser Ausfluss reichlicher und oft auch

andauernd. Kommt er nur zur Zeit der Reinigung vor, so verdrängt er oft theilweise oder ganz dieselbe, indem statt reinen Blutes, nur eine röthliche, schleimigte Flüssigkeit ausfliesst (der Blutschleimfluss oder die missfarbige Menstruation), oder auch reiner Schleim in beträchtlicher Menge abfliesst, endlich wird er auch in diesem Falle mehr anhaltend und die monatliche Periode deutet sich nur durch Vermehrung des schleimigten Abganges an. Die abgehende Materie erhält auch allmählig eine andere Beschaffenheit, sie wird oft ganz dicklicht, gelblicht, grünlich oder mehr bräunlich, oft auch sehr dünn, fressend scharf, und erhält einen eigenthümlichen, widerlichen, käseartigen Geruch. Hiebei stellen sich nun ein Jucken und Brennen in der Scheide und den äussern Geschlechtstheilen, und wenn der Ausfluss aus der Gebärmutter kommt, öftere Stiche in diesem Theile und oft auch ziehende Schmerzen im Kreuze ein, und bei der Untersuchung findet man die Schleimhaut der Scheide geröthet und geschwollen, wegen der angeschwollenen Drüschen etwas körnigt anzufühlen und in den äussern Theilen Frattsein. Vermittelst des Speculums erkennt man oft auch Geschwüre und andere Entartungen am Grunde der Scheide und an der Gebärmutter. Bei so hohem Grade des weissen Flusses verändert sich nun auch das Aussehen der Kranken, sie wird blass, aufgedunsen, erhält dunkle Ringe um die Augen, sie fühlt sich matt, leidet leicht an Nervenzufällen, die Verdauung wird gestört und es gesellen sich zuletzt selbst hektisches Fieber oder wassersüchtige Anschwellungen hinzu.

Heilt der weisse Fluss, so wird er allmählig geringer und die monatliche Reinigung kommt wieder in Ordnung, zuweilen geschieht dieses, indem Hautausschläge ausbrechen, frühere Fussschweisse wieder zu Stande kommen etc. Den Tod kann er durch die grosse Menge des Ausflusses und Jahre lange Dauer durch Erschöpfung

herbeiführen. Er hat auch leicht Unfruchtbarkeit und zuweilen Neigung zu Missfällen, die Bildung von Polypen, Verhärtungen etc. zur Folge.

§. 1127.

Anlage zum weissen Flusse haben sowohl solche Personen, welche ein schwammiges Fleisch haben, an der Bleichsucht, an Scropheln, an Verschleimung der ersten Wege etc. leiden, als auch sehr reitzbare Individuen und insbesondere solche mit sehr regem Geschlechtstriebe.

Gelegenheitsursachen sind viele schwächende Einflüsse, wie andauernder Kummer, sclechte, fade, schleimige Nahrungsmittel, der Aufenthalt in einer feuchten Athmosphäre, der zu reichliche Genuss erschlaffender Getränke, öftere Blutflüsse, besonders bei Missfällen, eine sitzende Lebensart, langes Schlafen etc., so wie auch verschiedene Reitze, welche auf die Schleimhaut der Scheide und der Gebärmutter wirken, wie Onanie, wollüstige Phantasie, zu häufiger Beischlaf, der Missbrauch der Feuerstübchen, Verletzung bei schweren Geburten, der Hämorrhoidalreitz, auf die Geschlechtstheile sich werfende Flechten, zurückgetretene Fussschweisse, Fussgeschwüre, Gicht, consensuelle Reitzung durch Würmer, vielleicht auch durch starke Kothansammlung in den Gedärmen, in die Scheide gelangte Ascariden, in derselben liegen gebliebene Mutterkränzchen, Polypen in der Gebärmutter, Krebs und Markschwamm in derselben oder in der Scheide etc.

§. 1128.

Wesen. Es scheint der weisse Fluss auf zweierlei Weise entstehen zu können, durch Cacochymie, vielleicht durch überwiegend venöse oder wässerige Beschaffenheit des Blutes, Stockungen des Blutes in den Gefässen der Pfortader etc., wodurch dem absondernden Organ fehlerhafte Stoffe zu den biochemischen Prozessen dargeboten

werden und die Absonderung verändert wird, und zweitens Reitzung, und zwar mehr oder weniger ein entzündlicher Zustand der Schleimhaut, entweder durch unmittelbar auf dieselbe wirkende Reitze oder durch consensuelle oder antagonistische Erregung, wodurch, ohne alle ursprüngliche Entmischung in den Säften, die Schleimabsonderung vermehrt und verändert werden kann.

§. 1129.

Vorhersage. Der weisse Fluss wird höchst selten lebensgefährlich, er widersteht aber öfters hartnäckig den Heilversuchen. Ein von Desorganisation in der Scheide oder der Gebärmutter herrührender weisser Fluss ist in der Regel unheilbar. Zuweilen verliert sich das Uebel bei grossen Umänderungen in der Lebensthätigkeit, z. B. bei eintretender Schwangerschaft, in Wechselfiebern etc. Ist die ausfliessende Materie mild, so ist eher Heilung zu erwarten, als wenn dieselbe jauchigt und scharf ist.

§. 1130.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man ordne die gehörige Lebensweise an, empfehle insbesondere viele Bewegung im Freien, eine einfache und nahrhafte Kost, suche auf eine angemessene Weise nachtheiligen Geschlechtsreitzungen vorzubeugen, suche Verstopfungen und Stockungen im Pfortadersystem zu heben, Würmer zu entfernen, wirke dem etwa vorhandenen herpetischen Leiden entgegen und untersuche in hartnäckigen Fällen die Geschlechtstheile, indem zuweilen in ihnen selbst die entferntere Krankheitsursache aufgefunden wird.

§. 1131.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Man empfiehlt gewöhnlich, wenn sich bei dem weissen Flusse ein Zustand von Reitzung bemerkbar macht, einhüllende Einspritzungen, Bähungen und Bäder in Anwendung zu bringen, innerlich ein antiphlogisti-

sches Verfahren eintreten zu lassen und im Nothfalle selbst Blut zu entziehen. Letzteres Mittel hat sich allerdings zuweilen hülfreich bewiesen, doch möchte es selten angezeigt sein, und erstere Mittel vermögen allerdings die Reitzung zu mässigen, aber sind wohl selten im Stande, den weissen Fluss zur Heilung zu bringen. — Bei mehr atonischem Zustande empfiehlt man die tonischen Mittel, das Extractum Millefolii, Trifolii fibrini, Quassiae, Gentianae, die China, die Rathanhia, die Mineralsäuren, Eisenmittel etc. Die grösste Wirkung äussern übrigens die balsamischen und gewisse scharfe auf die Geschlechtsorgane wirkenden Mittel, wie Balsamum Copaivae, die Cubeben, die Sabina und die Canthariden. Mir scheinen die Cubeben das Hauptmittel in dieser Krankheit zu sein und auch da angewandt werden zu können, wo die Schleimhaut der Scheide in einem gereitzten, entzündlichen Zustande sich befindet.

Mit diesen innerlichen Mitteln müssen zugleich äusserliche in Gebrauch gezogen werden, bei sehr scharfem Ausflusse Einspritzungen und Waschungen mit lauwarmer Milch, einer Abkochung von Mohnköpfen, etwa mit Zusatz von Quittenschleim etc., welche Mittel auch vermittelst eines Schwammes in die Scheide gebracht werden können, ausserdem aber Einspritzungen von kaltem Wasser, Kalkwasser, Bleiwasser oder Auflösungen von Zincum sulphuricum, Alaun etc., mit Zusatz von Opium, oder von einer Abkochung von Eichenrinde, Weidenrinde oder der Rathanhia. Auch sind örtliche und allgemeine Bäder, insbesondere Schwefel und Stahlbäder, Waschungen des Unterleibs, des Dammes, der Kreuzbeingegend etc. mit Camphergeist oder aromatischen Geistern und auch Räucherungen der Geschlechtstheile mit Weihrauch, Bernstein, Mastix etc. empfohlen worden.

ZWEITE ORDNUNG DER KRANKHAFTEN ABSONDERUNGEN.

Verminderte und unterdrückte Absonderungen.

Die verminderte Hautausdünstung.

§. 1132.

Die krankhaft verminderte Hautausdünstung giebt sich, wenn sie mehr audauernd ist, durch eine besondere Trockenheit und Sprödigkeit der Haut zu erkennen, wobei die Epidermis sich gerne lostrennt, zuweilen ist auch die Haut in einem entzündeten Zustand, und oft auch entartet, wie z. B. in dem Fischschuppenausschlag und andern Hautkrankheiten. Meistens ist die andauernd verminderte Hautausdünstung mit innern Krankheiten verbunden, von denen sie meistens Symptom ist, namentlich mit Wassersucht, Harnruhr, Durchfällen, Lähmung etc.

§. 1133.

Die verminderte Hautausdünstung kommt nicht leicht als selbstständige Krankheit vor und gehört daher mehr in die Symtomatologie als in die specielle Krankheitslehre, und in so fern sie durch äussere Einflüsse erzeugt ist und Krankheiten hervorbringt in die Aetiologie und ist daher Gegenstand der allgemeinen Krankheitslehre. — Die Erregung einer vermehrten Hautausdünstung (Methodus diaphoretica) wird in der allgemeinen Therapie gelehrt.

Die verminderte und die unterdrückte Milchabsonderung.

(*Agalactia.*)

Bergius (Samml. auserles. Abhandl. 2ter Bd.). — Die Schriftsteller über Weiberkrankheiten.

§. 1134.

Die angeführte Benennung wird der Krankheit gegeben, in welcher zur gewöhnlichen Zeit des Stillens die Milch im Verhältniss zum Bedürfniss des Kindes zu gering ist oder ganz fehlt.

§. 1135.

Die Milch erscheint nach der Niederkunft der Frau nur in geringer Menge in den Brüsten, so dass das Kind neben der Muttermilch nothwendig noch andere Nahrung erhalten muss, oder die Milchabsonderung kommt gar nicht zu Stande, oder sie vermindert sich wieder, oder bleibt aus, wenn sie schon in hinreichender Menge floss, was bald nach der Entbindung oder auch mehrere Wochen und Monate nachher geschehen kann. Gewöhnlich werden hierbei die Brüste klein, welk und wenig reitzbar, doch können sie auch hart und schmerzhaft sein. Verliert sich die Milch allmählig, so hat dieses gewöhnlich für die Frau keinen Nachtheil, wird die Absonderung aber plötzlich unterdrückt, so kann dieses Entzündung, Verhärtung und Eiterung in der Brustdrüse nach sich ziehen, so wie auch Entzündungen, Ausschwitzungen und Eiterungen in andern Theilen (Milchmetastase Milchversatz, Milchdepot, Metastasis lactis) zur Folge haben.

§. 1136.

Anlage zur Agalactia haben besonders Weiber von phlegmatischem Temperamente und schlaffem und

fettem Körperbau und solche, die erst in vorgerücktem Alter geheurathet haben oder in frühern Kindbetten nicht gestillt haben; auch soll die Anlage zur sparsamen Milchabsonderung oft ererbt sein.

Gelegenheitsursachen sind vorzüglich allgemein schwächende Einflüsse, insbesondere anhaltender Kummer, wenige und schlechte Nahrungsmittel, öfteres Nachtwachen und Krankheiten, die allgemein schwächend wirken, insbesondere die Schwindsucht, ferner erhöhte Thätigkeit in einzelnen Theilen des Körpers, die antagonistisch die Lebensthätigkeit in den Brustdrüsen beschränken, wie öfterer Beischlaf, neue Schwangerschaft, Entzündung der Gebärmutter, des Bauchfells (Kindbettfieber), starker weisser Fluss, Durchfälle etc.; endlich Einwirkungen auf die Brustdrüse, die einen zu hohen Grad der Reitzung und wirkliche Entzündung hervorzubringen vermögen, wie z. B. Verkältung oder stockende Milch wegen unterlassenem Anlegen des Kindes.

§. 1137.

Wesen. Der krankhafte Zustand der Brustdrüsen, der der Unterdrückung der Milchabsonderung zum Grunde liegt, ist in dem einen Falle verminderte Lebensthätigkeit wegen geschwächter Nervenkraft oder Säftemangel, in dem andern Falle Entzündung.

§. 1138.

Die Vorhersage. Lebensgefährlich wird diese Krankheit wohl nur durch Metastasen und auch zuweilen dadurch, dass sie Verhärtungen in den Brustdrüsen zur Folge hat, die späterhin den Krebs nach sich ziehen können. Oft hält es sehr schwer, die Absonderung der Milch reichlicher zu machen.

§. 1139.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man suche der stillenden Frau, welcher die

Milch auszubleiben droht, die gehörige Nachtruhe zu verschaffen, indem man das Kind in der Nacht der Pflege einer zuverlässigen Wärterin übergiebt und nur der Mutter bringen lässt, wenn es an die Brust gelegt werden soll. Man untersage den Beischlaf. Sind Durchfälle, Blutflüsse, innere Entzündungen vorhanden, so müssen gegen dieselben die geeigneten Mittel angewandt werden. — Droht Verhärtung der Brustdrüsen zu entstehen, weil die Milch nicht gehörig entleert wird, was besonders bei Erstgebärenden gleich nach der Entbindung wegen schlechter Beschaffenheit der Brustdrüsen öfters der Fall ist, so suche man mit grösster Beharrlichkeit das Kind zum Trinken zu bringen, lasse durch erwachsene Personen, vermittelst Sauggläser, die Milch entleeren und gelingt dieses nicht, so lege man ein schon etwas älteres Kind, das stark zieht, so lange und so oft an die Brust, bis dieselbe weich wird und die Brustwarzen besser hervorgehoben sind.

§. 1140.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Liegt verminderte Lebensthätigkeit in den Brustdrüsen der verminderten Absonderung zum Grunde, so sucht man diese dadurch zu erhöhen, dass man die Nerventhätigkeit erregt und die Säftemasse vermehrt. Zu ersterm Zwecke dient vor allem der Reitz vom Saugen des Kindes, welches daher sehr fleissig angelegt werden muss, und damit es stark ziehe, keine oder möglichst wenige Nahrung neben der Muttermilch erhalten darf, auch sollen Fenchel, Anis, Kümmel, Körbel etc. specifisch auf die Brustdrüsen erregend wirken. Zum zweiten Zwecke empfehle man den reichlichen Genuss von kräftigen Nahrungsmitteln, von Fleischbrühe, von Eiern, Fleisch, frisch gemolkener Milch, einem nahrhaften Biere etc.

Ist die Unterdrückung der Milchabsonderung durch einen entzündlichen Zustand bedingt, so werden örtliche

und selbst allgemeine Blutentleerungen vorgenommen, erweichende Umschläge auf die Brüste gemacht oder Baumwolle auf dieselbe gelegt und innerlich kühlende und eröffnende Mittel gegeben.

§. 1141.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Ist eine Metastase erfolgt, so sucht man die Lebensthätigkeit wieder nach den Brüsten hinzuleiten, indem man das Kind fleissig anlegt, reitzende Umschläge auf die Brüste legt, dieselben reiben lässt, Ventosen auf dieselben oder ein Blasenpflaster zwischen die Brüste setzt.

Die verminderte Gallenabsonderung und die gehemmte Ablagerung der Galle in die Gedärme.

§. 1142.

Gelangt zu wenig Galle in den Darmkanal, so werden die Stuhlentleerungen sparsamer und das Entleerte hat eine festere Beschaffenheit und eine mehr ins Gräuliche spielende Farbe, fehlt die Galle ganz, so wird der Stuhlgang noch fester und erhält eine vollkommen graue Farbe; auch leidet mehr oder weniger die Verdauung, und es bildet sich leicht die krankhafte Säure des Magensaftes. Durch zu geringe Reinigung des Blutes in der Leber entstehen bei verminderter Gallenabsonderung eine vermehrte venöse Beschaffenheit des Blutes und Stockungen im Pfortadersystem und daher auch leicht Hämorrhoiden; indem aber andere Organe für die Leber in Thätigkeit treten und galligte Stoffe absondern, entsteht Gelbsucht und nach Umständen Gallenfieber. Die gleichen Zufälle entstehen auch, wenn

die Galle keinen Abfluss aus der Gallenblase in den Zwölffingerdarm findet, nur bildet sich hier noch leichter die Gelbsucht und das Gallenfieber aus, es entstehen leicht in der Gallenblase Gallensteine und die Anfüllung der Gallenblase und der Gallengänge veranlasst verschiedene örtliche Beschwerden. Zugleich mit den, durch die verminderte Absonderung der Galle oder die gehemmte Ablagerung der Galle hervorgebrachten Symptomen, die die Verstopfung, die Plethora abdominalis den Status atrabilarius und die Gelbsucht, so wie das Gallenfieber begleiten, sind mit diesen Zuständen die Erscheinungen, die die Krankheit der Leber characterisiren, verbunden, die Symptome der Entzündung, der Physconie, der Verhärtung der Leber etc.

Die Entscheidung zur Gesundheit geschieht durch den Wiedereintritt der Gallenabsonderung und Ablagerung der Galle in den Darmkanal. Der Tod wird herbeigeführt durch Gallenfieber, Gelbsucht und die auf Desorganisationen in der Leber leicht folgenden Nachkrankheiten, insbesondere Wassersucht.

§. 1143.

Die Ursachen, die Vorhersage und die Behandlung der verminderten Gallenabsonderung und der gehemmten Gallenablagerung in die Gedärme werden bei der Darstellung der Gelbsucht, der Krankheitsform, in welcher die erwähnten Krankheitszustände der Leber vorzüglich vorkommen, angegeben werden.

Die Verminderte Absonderung der Darmsäfte und des Saftes der Bauchspeicheldrüse.

§. 1144.

Die Haupterscheinung der verminderten Absonderung der Darmsäfte und des pancreatischen Saftes ist die Verstopfung, von welcher in einem besondern Kapitel die Rede sein wird. Ausserdem kann auch die Hemmung dieser Absonderungen verschiedene andere Zufälle zur Folge haben, wie z. B. die Unterdrückung der Absonderung des pancreatischen Saftes den Speichelfluss und die Hemmung aller genannten Absonderungen Congestionen nach dem Gehirne und den Lungen etc. Auch kommt die Unterdrückung der erwähnten Absonderungen häufig nur als Symptom anderer Krankheiten vor und tritt daher in Verbindung mit sehr verschiedenartigen Krankheitszufällen auf, mit den Zufällen der Darmentzündung, des Scirrhus der Bauchspeicheldrüse, der Wassersucht, des übermässigen Schwitzens, der Lähmung eines Theiles des Rückenmarkes etc.

§. 1145.

Die Ursachen der Unterdrückung der Absonderung der Darmsäfte und des pancreatischen Saftes, so wie die Prognose und die Behandlung dieser Krankheitszustände, werden in dem Kapitel von der Verstopfung angegeben werden.

Die verminderte Absonderung des Harnes.

(*Unrichtig: Ischuria renalis.*)

§. 1146.

Der Harn geht ganz sparsam oder längere Zeit gar nicht mehr ab und ist in der Regel auch in seiner Beschaffenheit verändert, meistens dunkelbraun gefärbt und trübe. Hiebei fehlen die Symptome der Harnverhaltung (Ischuria und Dysuria) und es entstehen krankhafte Absonderungen in andern Organen, als den Nieren, und zwar vorzugsweise Wassersucht, oder es bestehen schon solche Absonderungen, wie Wasserergiessungen in die Gewebe, Schweisse etc. und die verminderte Harnabsonderung stellt sich erst im Gefolge dieser Krankheiten ein. Auch sind bei dieser gehemmten Absonderung öfters die Symptome der Nierenentzündung oder einer anderen Krankheit der Nieren, von welcher die Störung der Absonderung nur Symptom ist, vorhanden.

§. 1147.

Ursachen. Die Verminderung der Harnabsonderung ist oft keine Krankheit der Nieren, indem sie oft dadurch entsteht, dass weniger Absonderungsstoffe den Nieren zur Ausleerung dargeboten werden, wie bei Verminderung des Getränkes und starker Ausleerung flüssiger Stoffe durch andere Theile als die Nieren, wie dieses bei dem übermässigen Schwitzen und vorzüglich bei der Wassersucht der Fall ist, oft ist sie aber auch Krankheit der Nieren und kommt vor bei Entzündung der Nieren, bei Desorganisationen derselben, besonders Vereiterung, bei Krampf und bei Lähmung.

§. 1148.

Behandlung. *Nach den Anzeigen aus den Ursachen* haben wir die Aufgabe, die krankhaft vermehrte

Absonderung, welche die Harnabsonderung beschränkt, so wie auch die Krankheit der Nieren, wie Entzündung, Vereiterung, Krampf derselben etc. zu heben. Nach dem Wesen der Krankheit müssen wir, insofern der Zustand der Nieren kein Hinderniss in den Weg legt, die Absonderungsthätigkeit in den Nieren zu erhöhen suchen. Es wird übrigens dieses Verfahren in dem Kapitel von der Wassersucht beschrieben werden.

Anhang zu den krankhaften Ausscheidungen.

§. 1149.

Es giebt gewisse so hervorstehende Krankheitszufälle, dass eine einzelne solche Erscheinung oft vorzugsweise die Krankheitsform darstellt. Diese Hauptzufälle sind aber oft das Symptom sehr verschiedenartiger Krankheitszustände, die also dem Gesammtausdrucke nach als eine einzige Krankheitsform erscheinen und so kommt es, dass einzelne Krankeitserscheinungen als besondere Krankheitsarten in der Kranheitslehre anerkannt werden, die eigentlich nur einzelne Symptome verschiedener Krankheiten sind. Zu diesen Krankheitssymptomen gehören die Verstopfung, die Harnverhaltung, das Unvermögen den Urin zu halten und auch die zurückgehaltene Menstruation. Da es für die Therapie von Nutzen ist, eine Uebersicht über die den angegebenen Störungen in den Ausleerungen zum Grunde liegenden krankhaften Zustände im Körper zu haben, so will ich den alten Gebrauch beibehalten und den erwähnten Krankheitssymptomen, gleich den eigentlichen Krankheitsarten, besondere Kapitel widmen.

Die Hartleibigkeit und die Verstopfung.

Ludwig (lat. Lpz. 1770). — *Wedekind* (Abhandl. von d. wahren Kenntniss u. Kur d. Krankh. d. ersten Wege. A. d. Lat. Nürnberg 1795). — *Röschlaub* (in s. Magaz. B. 4).

§. 1150.

Längere Zurückhaltung und Verhärtung der Excremente wird Hartleibigkeit (adstrictio alvi), gänzlicher Mangel des Stuhlgangs, Stuhlverhaltung oder Verstopfung (obstipatio, obstructio alvi), genannt.

§. 1151.

Verlauf. Die Hartleibigkeit kann oft mehr andauernd sein und die vollkommene Verstopfung 4 bis 6 Tage und länger dauern, ohne mit Beschwerden verbunden zu sein, oft veranlasst aber auch schon ein geringer Grad von Hartleibigkeit Nachtheile und eine längere Zeit andauernde Verstopfung wird nicht selten lebensgefährlich. Der Leib ist mehr oder weniger voll und der Kranke hat das Gefühl von Völle und Aufblähung, und es stellen sich leicht Apetittlosigheit, Eingenommenheit des Kopfes und Mattigkeit ein. Bei höherem Grade des Uebels entstehen Koliken und Kollern im Leibe, der Unterleib wird stark aufgebläht und gespannt, zuletzt sehr empfindlich, es treten immer mehr die Symptome von Darmentzündung hervor, und es stellt sich ein heftiges galligtes Erbrechen und zuletzt Kothbrechen ein. Der Puls ist gereitzt und die Wangen sind heiss, oft aber auch, besonders bei den heftigen Kolikanfällen sind Wangen, Stirne und die Hände kalt und die Stirne mit einem kalten Schweisse bedeckt.

Zur Gesundheit geht das Leiden über, indem nach wiederholten Koliken und starkem Kollern im Leibe Blähungen anfangen abzugehen und hierauf die Entleerung

von zuerst ganz hartem und sodann breiartigem Kothe folgt, worauf sodann sich noch gewöhnlich Durchfälle einstellen. Mit dem Eintritt der Stuhlentleerungen verschwinden die Schmerzen und die übrigen Krankheitserscheinungen in der Regel sehr schnell; es bleibt jedoch eine grosse Anlage zur Wiederkehr der Verstopfung zurück.

Der Tod wird bei langer Dauer der Krankheit durch Erschöpfung der Kräfte in Folge der heftigen Koliken, des Erbrechens und des Fiebers, so wie auch durch die Entstehung von Darmentzündung, Brand und Zerreissung der Gedärme und Entleerung des Kothes in die Unterleibshöhle herbeigeführt.

§. 1152.

Anlage zur Verstopfung haben insbesondere Individuen von höherem Alter, solche von phlegmatischem Temperamente, so wie auch solche von sehr straffem Körperbau, Schwangere und mehr Personen vom weiblichen als solche vom männlichen Geschlechte.

Die Gelegenheitsursachen können nach der Verschiedenheit des Körperzustandes, welcher der Verstopfung zum Grunde liegt, in folgende drei Reihen getheilt werden:

1) Die Reihe derer, welche die Absonderung der Darmsäfte, der Galle und des pancreactischen Saftes vermindern oder diese Säfte in ihren Kanälen zurückhalten, oder sie zäher machen und die nothwendige Verdünnung des Kothes verhindern. Hierher gehören ein zu starker Verbrauch der Säfte in andern Organen als dem Darmkanale, bei starken Körperanstrengungen, starken Schweissen, längere Zeit andauerndem Fieber, vermehrtem Urinabgang, Wassersucht etc., ferner allgemeine Schwäche und Lähmungen, die Darmentzündung, Stockungen im Pfortadersystem, Verschliessung des Ductus choledochus durch Steine, Krampf, Entzündung, Verschleimung

der ersten Wege, der Gebrauch des Opiums, Mangel an flüssiger Nahrung etc.

2) Solche, welche die peristaltische Bewegung der Gedärme fehlerhaft machen, und zwar entweder Trägheit und Mangel der Bewegung verursachen oder eine krampfhafte Zusammenziehung einer Stelle der Gedärme, oder eine antiperistaltische Bewegung veranlassen. Der erstere Fehler wird durch allgemeine und örtliche Schwäche, Lähmungen, Mangel des gewohnten Reitzes der Speisen, Mangel an Galle, Schleimüberzug der Gedärme, und durch gewisse Stoffe, die die Sensibilität der Gedärme herabstimmen, insbesondere Opium hervorgebracht, der zweite und dritte durch heftige Reitzung der Gedärme und Hervorbringung von Entzündung und Krämpfen durch scharfe in den Darmkanal gelangte Stoffe, Metastasen, allgemeine Krämpfe, vorhergegangenes anhaltendes Erbrechen, mechanische Hemmungen in der peristaltischen Bewegung.

3) Solche, welche der Kothentleerung ein mechanisches Hinderniss in den Weg legen: sehr harte und zusammengeballte Kothmassen, verschluckte Obststeine, zusammengeballte Würmer, sackartige Erweiterung der Gedärme, das Einschieben der Gedärme (volvulus, intussusceptio intestinorum), Umschlingung der Gedärme durch das Netz, Vedickung der Gedärme, scirrhöse Entartung, polypöse Auswüchse, der eingeklemmte Bruch, Druck der vergrösserten Leber auf den Zwölffingerdarm, Zurückbiegung der Gebärmutter und Druck derselben auf die Gedärme, grosse Hämorrhoidalknoten und Verschliessung des Afters durch Verwachsung.

§. 1153.

Vorhersage. Die Grösse der Gefahr hängt ganz von der Ursache der Verstopfung ab. Am wenigsten gefährlich ist die Verstopfung von fehlerhafter Absonderung, am ungünstigsten aber die durch mechanische Hindernisse

hervorgebrachte. Die Anlage zur Verstopfung ist oft schwer zu beseitigen.

§. 1154.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Die entfernteren Ursachen der Verstopfung müssen zuerst beseitigt werden. Gegen eine vorhandene Darmentzündung müssen die geeigneten Mittel angewandt werden, die Wirkung des Bleies muss durch die in dem Kapitel von der Bleikolik angegebenen Mittel aufgehoben werden, der Gebrauch des Opiums und anderer stopfenden Mittel muss, wenn nicht besondere Anzeigen für denselben vorhanden sind, ausgesetzt werden, bei vorhandenen Würmern müssen zugleich Wurmmittel gegeben werden, einen eingklemmten Bruch (der oft von dem Patienten verschwiegen wird) entfernt man durch die Operation, zuweilen verstopfen Kirschensteine und Kothmassen so sehr die untere Darmöffnung, dass mechanische Hülfe nothwendig ist etc.

§. 1155.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Der Krankeitszustand der Gedärme, welcher zunächst der Verstopfung zum Grunde liegt, ist verminderte Absonderung und fehlerhafte peristaltische Bewegung. In der Regel ist es nothwendig, gegen beide Krankheitszustände zugleich zu wirken, doch haben wir in dem einen Falle mehr die Aufgabe auf die Absonderungen, in dem andern aber die Aufgabe mehr auf die peristaltische Bewegung zu wirken.

Um vorzüglich auf die Absonderungen zu wirken, giebt man die Salze, wie Magnesia sulphurica, Natrum sulphuricum, Kali sulphuricum, Natrum phosphoricum, Tartarus tartarisatus, Tartarus natronatus, Cremor tartari etc., so wie auch Tamarinden und Manna, und in gefährlichen Krankheiten, wenn der Darmkanal die Salze nicht erträgt und man stark verflüssigend wirken will, das Calomel,

so wie in Fällen, in welchen man zugleich mehr erregend und tonisch wirken will, die Rhabarber und die Aloe. Will man vorzugsweise die Gallenabsonderung befördern, so giebt man Tartarus tartarisatus, die auflösenden Extracte, die Rhabarber, die Aloe und in dringenden Fällen, wenn man die erregende Wirkung der zuletzt genannten Mittel scheut, das Calomel. Zugleich sucht man die mangelnde Absonderung zu ersetzen und die Wirkung der abgesonderten Flüssigkeit zu unterstützen durch reichlicheres Getränk und durch schlüpfrig machende Mittel, wie die milden, fetten Oele und grössere Portionen frischer Butter.

§. 1156.

Um die peristaltische Bewegung zu befördern, muss, wenn eine krampfhafte Bewegung der Gedärme dieselbe hindert, dieser gemildert werden durch Oelmixturen, Bäder, Umschläge und in dringenden Fällen selbst durch Opium. Ist Trägheit in der peristaltischen Bewegung vorhanden, so sucht man diese zu heben, wozu schon die Gewöhnung der Natur zum täglichen Stuhlgange zu einer bestimmten Zeit vieles beiträgt. Unter den Abführungsmitteln wählt man vorzüglich die Senne, die Jalappe, die Rhabarber, die Aloe, das Ricinusöl, das Oleum Crotonis, das Oel von Euphorbia Lathyris etc., und unterstützt diese Mittel durch Klystiere von einer Kleienabkochung oder einem Chamillenaufguss mit Zusatz von Oel und etwas Kochsalz oder Saife oder Honig oder einem Aufguss von Senneblättern und selbst in dringenden Fällen durch Tabacksrauchklystiere, so wie auch durch Stuhlzäpfchen von Honig, Saife etc. (Nro. 40—51).

§. 1157.

Nach den einzelnen Fällen ist bald das eine, bald das andere der angegebenen Abführungsmittel vorzugsweise passend, so z. B. bei einer Darmentzündung Calomel und Ricinusöl, bei vorhandenen Würmern Calomel, Jalappe etc.

Gewöhnlich ist es zuträglich, besonders bei Mitteln, die die eine der oben angegebenen Wirkungen besitzen, und die andere mehr entbehren, ein Mittel zuzusetzen, das die andere Wirkung vorzüglich besitzt; so z. B. ist es oft nothwendig, zum Calomel die Jalappe zu fügen, damit die durch das Calomel bewirkten abgesonderten Stoffe auch schleunig ausgeleert werden; man verbindet gerne die Salze und die Senne mit einander, obgleich beide Arzneimittel die beiden Wirkungen der Abführungsmittel, nämlich Erregung der Absonderungen und der peristaltischen Bewegung in ziemlich hohem Grade besitzen, da doch die Salze mehr die Absonderung und die Senne mehr die peristaltische Bewegung befördern.

§. 1158.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Tritt zur Verstopfung heftige Kolik hinzu, so müssen die besänftigenden Mittel mit den eröffnenden verbunden werden und namentlich ist es oft sehr nützlich, zugleich mit den Abführungsmitteln etwas Opium zu geben; das Erbrechen bekämpft man durch die gewöhnlichen Mittel und eine beginnende Darmentzündung sucht man durch Blutentleerugen, besänftigende Umschläge etc. zu unterdrücken.

Die Harnverhaltung.
(*Ischuria, Retentio urinae.*)

Wichmann (Ideen z. Diagnostik). — *Heinlein* (in Harless Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir. B. I. u. B. III.). — *Civiale* (Par. 1823). — *Segalas* (Par. 1828). — Ausserdem die Schriftsteller über die Krankheiten der Urinwerkzeuge überhaupt, namentlich *Chopart*, *Desault*, *F. A. Walter*, *Sömmering*, *W. Schmidt*, *Bell*, *Howsip*, *Lallemand*, und die über die Krankheiten der Urinblase, insbesondere *Troja*, *Nauche* und *Bingham*.

§. 1159.

Die **Harnverhaltung** ist die Zurückhaltung des Harnes in seinen Ausführungswegen. Geht der Harn mit Beschwerden ab, so wird dieser Zufall beschwerliches Harnen (Dysuria) genannt, geht insbesondere der Harn nur tropfenweise, unter brennenden und zusammenschnürenden Schmerzen ab, so belegt man diesen Zustand mit dem Namen Harnzwang oder Harnstrenge (Stranguria).

§. 1160.

Der Harn ist entweder in den Nierenkelchen oder dem Nierenbecken oder in den Harnleitern oder in der Blase zurückgehalten.

Am seltensten kommt Ansammlung des Urins in den Nierenkelchen (Ischuria renalis vera) und dem Nierenbecken vor. Diese Ischurie ist meistens mit Schmerzen in der Nierengegend und mit Abgang eines rothen oder auch eiterartigen Urines verbunden. In einem von mir beobachteten Falle war die Ausdehnung des Nierenbeckens so gross, dass der Unterleib stark ausgedehnt wurde, Schwappen statt fand und die Krankheit vollkommen einer freien Bauchwassersucht glich.

§. 1161.

Die Harnverhaltung in den Harnleitern (Ischuria

ureterica). Nur in seltenen Fällen sind beide Harnleiter verschlossen, wo sodann durchaus kein Harn abgeht. Ist nur in *einem* Harnleiter der Urin zurückgehalten, so geht etwas, meistens stark gefärbter Harn ab, der Kranke hat aber heftige Schmerzen nach dem Verlaufe des leidenden Harnleiters und dieser stellt oft eine Geschwulst in der Form eines angefüllten Darmes dar. Findet der Harn keinen Abfluss, so entsteht auch Harnansammlung in dem Nierenbecken und den Nierenkelchen. Die Krankheit kann tödten durch Zerreissung des Harnleiters und Ergiessung des Urins in die Unterleibshöhle, so wie auch durch den Hinzutritt von Entzündung und Vereiterung in den Harnwerkzeugen und darauf folgende Wassersucht oder Abzehrung.

§. 1162.

Die Harnverhaltung in der Blase (Ischuria vesicalis). Die Blase wird ausgedehnt und ist in Gestalt eines Straussencies über dem Schossbogen zu fühlen. Dabei hat der Kranke einen heftigen Trieb zum Harnlassen, grosse Angst und heftige Schmerzen, die durch Berührung der Unterleibsgegend vermehrt werden. Das Athmen ist erschwert und es stellen sich kalte Schweisse und Ohnmachten ein. Liegt die Ursache der Harnverhaltung nicht in Verschliessung der Wege, wodurch der Harn abgeht, so bleibt oft die Ausdehnung der Harnblase bei einem gewissen Grade stehen und der aus den Harnleitern neu hinzufliessende Harn geht nun auf dem gewöhnlichen Wege tropfenweise ab.

In Gesundheit geht das Uebel durch Entleerung des Urins auf dem gewöhnlichen Wege über, wobei aber längere Zeit eine Neigung zu einer neuen Verhaltung zurückbleibt. Zuweilen entsteht Entzündung und Durchlöcherung der Blase, wobei sich der Urin einen Weg in das Zellgewebe bahnt und an irgend einer Stelle der Oberfläche, bei Männern insbesondere im Hodensack,

eine Geschwulst, Entzündung und Brand verursacht, wodurch dem Urin ein Ausweg nach aussen gebahnt wird und Heilung bewirkt werden kann. Oft bleiben nach diesen Vorgängen unheilbare Urinfisteln und bei Durchlöcherung des Mastdarms auch Kothfisteln zurück. Zuweilen bahnt sich auch der Harn einen Weg durch den Harnstrang und wird durch den Nabel ausgeleert. Manchmal dringt das Wasser in die Harnleiter, dehnt diese, so wie auch das Nierenbecken aus und veranlasst die Folgen der Ischuria ureterica. Zum Tode führt das Leiden durch Entzündung und Brand und die hierdurch bewirkte, so wie auch zuweilen ohne Brand erfolgende Zerreissung der Blase und Ergiessung des Urins in die Unterleibshöhle, so wie auch durch Abzehrung, welche in Folge der Urinfisteln sich entwickelt.

§. 1163.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man sah die Nieren einer zweiten Urinblase gleichen, ihre Substanz verzehrt und die Ureteren bis zur Dicke des Grimmdarms ausgedehnt (*Walter*). In einem Falle fand ich das Nierenbecken der linken Niere in einen Sack, der 36—37 Pfunde Wasser enthielt, ausgedehnt und die Niere selbst in 7 Säcke (ehemalige Nierenkelche), jeden von der Weite von 2—3 Uncen Flüssigkeit, verwandelt, welche mit einer dünnen Lage von Nierensubstanz umgeben waren; an der Seite dieses Sackes entsprang der Harnleiter, welcher seinen normalen Durchmesser hatte und die verdickte Haut desselben in schiefer Richtung durchdrang, so dass dadurch eine Art Klappe gebildet wurde, welche den Ausfluss des Urins hinderte. In einem andern Falle fand ich in beiden Nieren mehrere Aushöhlungen (ehemalige Nierenkelche), welche einige Uncen Flüssigkeit enthielten, die diese Säcke, so wie das Nierenbecken, die Harnleiter und die Blase auskleidende Schleimhaut entzündet und mit einer eiter-

artigen Flüssigkeit bedeckt. Die Blase selbst hat man zu einem grossen, über den Nabel heraufreichenden und beinahe die ganze Unterleibshöhle ausfüllenden Sack ausgedehnt angetroffen.

§. 1164.

Ursachen. Die Harnverhaltung in den Nierenkelchen, dem Nierenbecken und den Harnleitern wird durch Verschliessung an irgend einer Stelle hervorgebracht, und diese wird bewirkt durch einen Blutpropf, Ansammlung von dickem Schleime, einen Nierenstein, Entzündung und dadurch hervorgebrachte Verdickung und Verwachsung der Häute der Harnleiter etc. Die Harnverhaltung in der Blase ist entweder die Folge einer Verhinderung der Zusammenziehung der Blase oder eines Hindernisses in dem Ausführungsgange der Blase. Die *Zusammenziehung der Blase wird gehemmt* durch Lähmung der Blase (Ischuria paralytica) in Folge einer Verletzung des Rückenmarkes, des Schlagflusses, von übermässiger Ausdehnung der Blase und dadurch bewirkter Dehnung der Muskelhaut derselben bei zu lange zurückgehaltenem Urin, Entartung der Gewebe der Blasenhäute, in Folge von schleichenden Entzündungen etc. Der *Ausführungskanal der Blase ist verschlossen* in Folge eines Krampfes (Ischuria spasmodica) oder einer Entzündung (Ischuria inflammatoria) im Blasenhalse, und diese beiden Krankheitszustände werden hervorgebracht durch verschiedene Reitze, die auf die Blase wirken, wie z. B. durch den zu starken Genuss von jungem Weine, eines schlechten Bieres, zu starken Gebrauch der harntreibenden Mittel, insbesondere der Canthariden, welche auch schon bei der äusserlichen Anwendung in Blasenpflastern zuweilen dieselbe Wirkung hervorbringen, einen scharfen, an salzigen Theilen reichen Urin, Harnsteine, Hämorrhoidalbeschwerden, die sich auf die Blase ausdehnen, die auf den Blasenhals

sich ausbreitende Tripperentzündung, Verkältung, unterdrückte Hautausschläge, unterdrückte Gicht, allgemeine krampfhafte Affectionen etc., — ferner in Folge von blos mechanischen Hindernissen im Blasenhalse und der Harnröhre, durch Verstopfung des Blasenhalses, durch Blutgerinnsel, Schleim, einen Stein, varicöse Ausdehnung der Gefässe, Verdickung der Wände, Verhärtung der Vorsteherdrüse, Zusammendrückung des Blasenhalses durch Rückwärtsbeugung oder einen Vorfall der Gebärmutter, die Schwangerschaft, Fleischgewächse etc., so wie durch Verengerung und Verschliessung der Harnröhre (Ischuria urethralis) durch Fleischwärzchen, welche in Folge des Trippers entstanden sind etc.

§. 1165.

Vorhersage. Die Harnverhaltung in den Nierenkelchen, dem Nierenbecken und den Harnleitern ist meistens tödtlich, die Ischurie der Harnblase ist, wenn sie von nicht erfolgender Zusammenziehung der Blase herrührt, nicht gefährlich, es ist aber das ihr zum Grunde liegende Leiden der Blase oft schwer zu heben; gefährlicher ist die durch einen Fehler in dem Ausführungsgange der Blase bedingte Urinverhaltung, doch ist die von einem Krampf und von Entzündung in dem Blasenhals herrührende oft schnell zu entfernen, schwerer dagegen ist die von Desorganisationen in dem Blasenhals der Harnröhre oder den benachbarten Theilen entstandene Harnverhaltung zu heben.

§. 1166.

Behandlung. Nach Verschiedenheit des Krankheitszustandes, der die Harnverhaltung bedingt, müssen bald Mittel angewandt werden, die den lähmungsartigen Zustand der Blase heben, bald solche, die den Krampf, so wie die etwa vorhandene Entzündung im Blasenhalse beseitigen, so wie auch solche, welche die rein mechanischen Hindernisse entfernen.

Um die Lähmung der Blase zu heben und der Blase die Zusammenziehungsfähigkeit wieder zu geben, ist es vorerst nothwendig, den Urin von Zeit zu Zeit vermittelst des Catheters zu entleeren, um der Blase die Contraction zu erleichtern. Am wirksamsten sind sodann örtlich angebrachte Mittel, Einreibungen in die Blasengegend und das Kreutz von ätherischen Geistern mit ätherischen Oelen, Balsamen, dem Liquor ammonii caustícus, der Tinctura Cantharidum u. A. Umschläge und Bäder von erregenden Stoffen, Dampfbäder, insbesondere der Strahl des Dampfes auf die Blasengegend und auf das Kreuz geleitet, und auch kalte Umschläge, reitzende Klystiere, Senfteige und Blasenpflaster auf die Blasengegend, den Damm oder das Heiligenbein gelegt, mit Vorsicht unternommene Einspritzungen in die Blase von zusammenziehenden Stoffen, endlich auch die Electricität und die Moxen. Innerlich giebt man zugleich erregende und insbesondere auf die Harnwerkzeuge reitzend wirkende Mittel, wie die Arnica, den peruvianischen Balsam, das Terpenthinöl, die Canthariden, die Folia Rhois Toxicodendri etc.

§. 1167.

Um den Krampf in dem Blasenhalse aufzuheben, dienen besänftigende Umschläge auf die Blasengegend von einer Cicutaabkochung, Chamillen etc., Umschläge von erwämtem Fett, Einreibungen von Oleum Hyoscyami oder Opiatsalbe, Dämpfe an den Unterleib geleitet, warme Bäder, so wie auch Senfteige und andere Ableitungsmittel, jedoch keine Blasenpflaster. Innerlich gebe man Mandelmilch und andere einhüllende Getränke, Opium und andere Narcotica und auch den Campher, besonders wenn Canthariden die krampfhafte Harnverhaltung veranlasst haben. — Liegt eine Entzündung des Blasenhalses der Harnverhaltung zum Grunde, so muss das gegen die Blasenentzündung dienliche Verfahren in Anwendung

gebracht werden. — Mechanische Hindernisse müssen auf die passende Weise entfernt werden.

Gelingt es nicht, auf die angegebene Weise dem Harne einen freien Abfluss zu verschaffen, so muss der Catheter eingebracht werden; ist die Anwendung desselben aber unmöglich, so muss bei dringender Gefahr die Paracentese der Blase vorgenommen werden.

Der unwillkührliche Harnabgang.

(Das Unvermögen den Harn zu halten, Enuresis, Incontinentia urinae.)

§. 1168.

Der unwillkührliche Harnabgang ist der Abgang des Urins, welcher gegen den Willen des Kranken geschieht. — Ein im bewusstlosen Zustande eines Individuums, wie z. B. im Schlafe (Enuresis nocturna), im Rausche und in gewisen Fiebern erfolgender Urinabgang, der also nicht durch eine Krankheit der Blase bedingt ist, kann nicht hierher gerechnet werden.

§. 1169.

Der Urinabgang erfolgt entweder aus *dem* Grunde unwillkührlich, dass die Theile, durch welche der Harn seinen Weg nach aussen nimmt, nicht unter dem Einflusse des Willens des Kranken stehen, oder aus *dem*, dass die austreibenden Kräften so stark sind, dass hierdurch das dem Harnausfluss durch den Willen entgegengesetzte Hinderniss überwältigt wird.

Die erste Art des unwillkührlichen Urinabganges kann man den *passiven Harnabgang* nennen, da hier der Mangel an dem normalen Widerstand die Ursache des Harnabganges ist, und der Urin oft nur den Gesetzen der

Schwere folgend entleert wird. Es fliesst in diesem Falle der Urin meistens tropfenweis und oft ohne dass der Kranke ein Gefühl davon hat, ab. — Dieses Uebel ist häufig durch eine Schwäche und Lähmung des Schliessmuskels der Blase bedingt (Enuresis paralytica) und kommt vor in Folge von Altersschwäche, Lähmung des untern Theiles des Rückenmarkes, Schlagfluss, Quetschung des Blasenhalses bei schweren Geburten, Ausdehnung beim Steinschnitt und Verziehung desselben bei Vorfall der Gebärmutter etc.; ferner durch Zerstörung des Schliessmuskels des Blasenhalses in Folge von Verschwärungen, so wie auch durch Zerstörung eines andern Theiles der Blase, in deren Folge sich Fisteln gebildet haben und der Harn auf einem ungewöhnlichen Wege abgeht. — Bei einem lähmungsartigen Zustand der Blase sammelt sich oft der Harn wegen Mangel an austreibenden Kräften bis zu einem gewissen Grade an und geht sodann, wenn die Blase sich nicht noch mehr ausdehnt, so oft neuer Urin zufliesst, tropfenweis ab, so dass hier Harnverhaltung und Unvermögen den Urin zu halten zugleich vorhanden sind (Enuresis paradoxa).

§. 1170.

Die zweite Art ist *der durch einen Krampf der Blase bedingte unwillkührliche Harnabgang* (Enuresis spastica). Bei dieser Art des unwillkührlichen Harnabganges wird der Urin plötzlich mit Gewalt ausgespritzt, wobei auch zuweilen Schmerzen in der Blase statt finden. — Es wird dieser Zufall erregt durch Reitze, die auf die Blase wirken, durch scharfen Harn, einen Stein, Würmer, den Hämorrhoidalreitz, Erkältung, anomale Gicht, Geschwüre in der Blase etc., so wie durch allgemeine krampfhafte Affectionen, namentlich epileptische Krämpfe.

§. 1171.

Ausser der beständigen Nässe der Kleidungsstücke und dem übeln Geruch hat der unwillkührliche Abgang

des Urins die nachtheiligen Folgen, dass die Theile, auf welche der Harn gelangt, sich etwas entzünden, wund werden und selbst verschwären, welches Leiden mit Jucken und Brennen verbunden ist.

§ 1172.

Die **Prognose** hängt von dem Krankheitszustand, der dem unwillkührlichen Harnabgang zum Grunde liegt, ab. Am leichtesten ist in der Regel die Enuresis spastica zu heben.

§. 1173.

Die **Behandlung** richte sich nach dem krankhaften Zustand der Blase, der den unwillkührlichen Harnabgang veranlasst. Ist dieser durch Schwäche und Lähmung der Blase bedingt, so dienen, wie bei der Ischuria paralytica erregende Umschläge und Einreibungen, Dampfbäder, Tropfbäder, kalte Umschläge und Einspritzungen von tonischen Mitteln, so wie innerliche erregende und tonische Mittel, wobei auch auf den Zustand des Nervensystems im allgemeinen und insbesondere auf das Rückenmark die gehörige Rücksicht genommen werden muss. — Sind Desorganisationen und insbesondere Fisteln da, so müssen diese auf die geeignete Weise behandelt werden, wobei oft chirurgische Hülfe nothwendig wird. — Bei der krampfhaften Enuresis passen dieselben Mittel, die in dem Kapitel von der krampfhaften Harnverhaltung angegeben worden sind. — Um die durch den unwillkührlichen Abfluss des Harnes verursachten Unannehmlichkeiten zu beseitigen, dienen die Harnhalter; auch kann man bei dem weiblichen Geschlechte die Harnröhre durch einen Druck gegen die Schambeine vermittelst eines in die Scheide gebrachten Schwammes oder eines Mutterkränzchens zusammendrücken und dadurch den Weg für den Abfluss des Harnes schliessen.

Der Mangel der monatlichen Reinigung.

(*Amenorrhoea.*)

Freind (Oxon. 1703). — *Osthoff* (Lemgo 1804).

§. 1174.

Der krankhafte Mangel des Monatsflusses ist entweder eine, aus innern Ursachen erfolgende Zurückhaltung der Reinigung in den Jahren, in welchen sie erscheinen sollte, oder, wenn sie schon früher vorhanden war, in der Zeit, in welcher sie eintreten sollte, in so fern nicht eine Schwangerschaft oder das Säugen eines Kindes hiervon die Schuld trägt (Retentio, Emansio mensium, Amennorrhoea emansionis) oder sie ist die Unterdrückung des Monatsflusses, wenn derselbe schon begonnen hatte (Suppressio mensium, Amenorrhoea suppressionis, Menostasia). Oft wird zwar Blut entleert, aber nicht in genügender Menge (Menstruatio parca) und oft ist der Blutabgang, besonders wenn er zu sparsam ist, mit ähnlichen Beschwerden, als bei der vollkommenen Amenorrhoea stattfinden, verbunden (Menstruatio difficilis, Dysmenorrhoea).

§. 1175.

Zuweilen fehlt die monatliche Reinigung geraume Zeit, ohne dass Krankheitszufälle damit verbunden sind, häufiger ist aber die Ammenorrhoea von mehr oder weniger bedeutenden Krankheitserscheinungen begleitet. Diese Zufälle sind ein Gefühl von Schwere in den untern Gliedmassen, ein drückender und reissender Schmerz im Kreuze, kolikartige Leibschmerzen, nur gewöhnlich mehr in dem untern Theil des Leibes, ein Gefühl von Drängen gegen die Geschlechtstheile, ferner Schwindel und Röthe des Gesichtes, Brustbeklemmung, Herzklopfen, Mangel an Appetit, gastrische Unreinig-

keiten, Erbrechen, öfters auch Blutflüsse, namentlich Bluthusten, Blutbrechen, Nasenbluten, Hämorrhoiden, Blutungen aus Geschwüren, unmittelbar aus der Haut, in Form eines blutigen Schweisses, erfolgende Blutentleerungen, Blutergiessungen aus den Augen, den Brüsten etc., welche Blutflüsse man die Menstruation auf ungewöhnlichen Wegen (Menses aberrantes, Mensium insolitae viae) nennt. Oft tritt statt des Blutes ein Schleimfluss aus den Geschlechtstheilen ein.

Bei andauerndem Mangel der Menstruation entwickelt sich häufig ein cachectischer Zustand. Häufig ist mit der Anenorrhoea Bleichsucht verbunden, welche übrigens in der Regel nicht die Folge, sondern vielmehr die Ursache des Mangels des Monatsflusses ist. Durch die Stockungen des Blutes in den Gefässen des Unterleibes entstehen chronische Verdauungsbeschwerden, Leberleiden und Gelbsucht, Hypochondrie, Gicht und selbst zuweilen Wassersucht. Bei andauerndem Mangel der Menstruation entwickelt sich auch öfters Lungenschwindsucht, wiewohl auch diese Krankheit häufiger die Ursache als die Folge des Mangels der monatlichen Reinigung ist. Endlich kommen oft auch chronische Hautausschläge, Nervenkrankheiten, Seelenstörungen und andere Krankheiten in Folge der Amenorrhoea vor.

§. 1176.

Ursachen. Die häufigste Ursache ist wohl allgemeine Schwäche, welche entweder durch Verminderung und Entmischung der Säfte oder durch Verzehrung der Nervenkräfte erzeugt ist, daher kommt die Amenorrhoe vor in Folge von Blutflüssen, langwierigen, krankhaften Absonderungen, z. B. dem weissen Flusse, von Cachexien, wie die Bleichsucht, die Wassersucht, die Schwindsucht, Rhachitis und Scropheln und bei dem diesen Cachexien sich nähernden schwächlichen Körperbau, so wie auch bei Hysterie, Hypochondrie, anhaltenden Kummer etc.

— Eine zweite Ursache ist blos örtliche Schwäche und verminderte Lebensthätigkeit, und diese kann hervorgebracht sein durch Stockungen im Pfortadersystem, langwierigen weissen Fluss, eine sitzende Lebensart, ganz schlummernden Geschlechtstrieb, Entartungen des Gewebes der Gebärmutter, wie Verhärtung, Wassersucht derselben oder der Eierstöcke etc. — Eine dritte Reihe von Ursachen sind Krampf und Entzündung der Gebärmutter, welche hervorgebracht sein können durch Verkältung, Zorn, zu starken Genuss reitzender Getränke, besonders bei schon vorhandener Vollblütigkeit, consensuelle Reitzungen durch Würmer, gallichte Unreinigkeiten, Kothansammlungen etc. — Eine vierte Ursache endlich sind mechanische Hindernisse, die dem Blute den Ausfluss nicht gestatten, namentlich ein vollkommen geschlossenes Hymen und Verwachsung des Muttermundes.

§. 1177.

Die Vorhersage muss sich zum Theil nach dem Krankheitszustande, welcher der Amenorrhoea zum Grunde liegt und zum Theil nach den Zufällen, die durch dieselbe hervorgebracht sind, richten.

§. 1178.

Behandlung. Hat der Mangel der monatlichen Reinigung keine nachtheiligen Folgen, so ist es rathsam, keine Mittel anzuwenden, die unmittelbar auf den Monatsfluss treiben, da die Natur das durch die Reinigung abgehende Blut oft zu andern Zwecken verbraucht. Hiebei muss man nicht vergessen, dass oft eine Schwangerschaft verheimlicht wird.

Oft ist der Krankheitszustand des Körpers von der Art, dass er die Anwendung der auf die Menstruation unmittelbar treibenden Mittel nicht gestattet oder nur die Anwendung einiger Mittel aus dieser Klasse, z. B. die der nicht erhitzenden Emmeniagoga zulässt, und es

muss daher vorerst untersucht werden, ob nicht der Amenorrhoea ein derartiger Krankheitszustand zum Grunde liegt und die Anwendung der Mittel eintreten muss, die dieser Krankheit entgegenwirken. Ist Vollblütigkeit und ein entzündlicher Zustand vorhanden, so müssen Blutegel an die Geschlechtstheile gesetzt und zuweilen selbst eine Aderlässe unternommen werden. — Liegen Stockungen im Pfortadersystem dem Ausbleiben des Monatsflusses zum Grunde, so sind die auflösenden Mittel Tartarus tartarisatus, Tartarus natron., die auflösenden Extracte und nach Umständen auch stärkere Abführungsmittel angezeigt. — Ist ein krampfhafter Zustand die Ursache, so dienen warme Bäder, Dämpfe an die Geschlechtstheile geleitet, besänftigende Umschläge und Einreibungen und der Gebrauch der Narcotica, insbesondere des Opiums, so wie auch nach Umständen der der Antihysteria. — Ist eine grosse Körperschwäche vorhanden, so wendet man die tonischen Mittel, insbesondere die China und das Eisen, innerlich gebraucht und in Stahlbädern an. — Desorganisationen in der Gebärmutter sucht man zu heben. — Ist das Hymen verschlossen, so muss die Operation unternommen werden.

§. 1179.

Ist der Körperzustand von der Art, dass er die Anwendung der auf die Menstruation treibenden Mittel gestattet und liegt der Amenorrhoea eine verminderte Lebensthätigkeit in der Gebärmutter zum Grunde, so sind die specifisch auf die Gebärmutter wirkenden und den Trieb des Blutes nach ihr hinleitenden Mittel angezeigt. Hieher gehören: der Borax (Nro. 66), der Tartarus boraxatus, die fixe Luft, das Millefolium, die Färberröthe, der Crocus, die Myrrhe, das Terpenthinöl, der Capaivbalsam, die Aloe, die Coloquinten, die Niesswurz, die Sabina (Nro. 67) etc. Mit diesen innerlichen Mitteln verbindet man Butegel an die Geschlechtstheile gesetzt,

Schröpfen an der innern Seite der Schenkel, Fussbäder mit Zusatz von Senf, Salz oder Asche, Dampfbäder, Halbbäder, Senfteige oder Blasenpflaster an die innere Seite der Schenkel gesetzt, das Zusammendrücken der Schenkelschlagader, die Electricität etc. — Es werden die treibenden Mittel am schicklichsten zu der Zeit angewandt, wann die monatliche Reinigung naturgemäss eintreten soll.

§. 1180.

Die übeln Zufälle, die der Mangel der Menstruation veranlasst, werden am besten durch die schnelle Herstellung der unterdrückten Blutentleerung gehoben, sind sie aber von Bedeutung, so dass die Herstellung der monatlichen Reinigung nicht genügen würde oder der Eintritt derselben nicht abgewartet werden kann, so muss eine künstliche Blutentleerung, gewöhnlich eine Aderlässe, vorgenommen werden. Im übrigen behandelt man diese Zufälle nach ihrer Natur. — Was insbesondere die gewöhnlichen Mestruationsbeschwerden betrifft, so sind warme Bäder, Dampfbäder, besänftigende Umschläge und Einreibungen, besänftigende Klystiere, örtliche Blutentziehungen und innerlich vorzüglich Opium in Anwendung zu bringen.

SECHSTE KRANKHEITS-FAMILIE.

Die Hautausschläge.

ERSTES HAUPTSTÜCK.

Von den Hautausschlägen im allgemeinen.

Schriftsteller.

Plenk (lat. Wien 1776, deutsch v. Wasserberg 1777 u. Dresden 1797). — *Lorry* (lat. Par. 1777, deutsch v. Held, Lpz. 1778). — *Willan* (Lond. 1798—1805, improved by Bateman 1815, a. d. Engl. v. Friese, Bresl. 1799—1816, 4 Bde. m. ill. K.). — *Alibert* (Descript. des malad. de la peau, Par. 1806—26. Fol. m. ill. K., neue Ausg. Par. 1833. — Eb. précis théorique sur les maladies de la peau. Vol. 2. Par 1822). — *Bateman* (a practical synopsis of cutaneous diseases Lond. 1808 u. 1817, a. d. Engl. v. Hanemann mit einer Vorrede v. Kurt. Sprengel m. 1 ill K. Halle 1815. — Eb. delineat, of cutan. diseases exhib. the characterist. appear, of the princip. gen. et spec., compris. in the classificat. of the late Dr. Willan and completing the series of engravings, began by that author. Lond. 1817. Fasc. XII in 4 maj., a. d. Engl. Weimar 1829). — *Plumbe* (Lond. 1829, a. d. Engl. Weimar 1825). — *Rayer* (Vol. 2. Par. 1827. 8. m. K.). — *Struve* (Berl. 1829. Fol. m. K.).

§. 1181.

Hautausschläge sind die Veränderungen im Gewebe der Haut, welche sich als Entzündungen und Ablagerungen verschiedenartiger Stoffe darstellen und nicht die unmittelbare Folge einer äussern Verletzung sind.

§. 1182.

Verlauf. Dem Ausbruche des Ausschlags gehen häufig allgemeine Krankheitserscheinungen und auch Störungen in einzelnen andern Theilen, als die Haut, voraus. Einigen Hautausschlägen, wie z. B. den Blattern und dem Scharlach, geht immer ein Fieber von bestimmter Dauer vorher, welches sich meistens durch den bei den entzündlichen Fiebern vorkommenden Orgasmus im Blute characterisirt und das durch den Ausbruch des Ausschlags meistens sehr gemildert und selbst entschieden wird, in andern Fällen tritt der Ausschlag auch während des Verlaufes eines Fiebers hervor, es geschieht dieses aber weder an einem bestimmten Tage, noch hat gewöhnlich das Erscheinen des Exanthems einen grossen Einfluss auf das Fieber und es erscheint überhaupt der Ausschlag in Beziehung zum Fieber als eine mehr zufällige Erscheinung, in andern Fällen fängt das Kranksein nicht mit einem Fieber an, sondern mit verschiedenen andern innern Störungen, mit Zufällen gastrischer Unreinigkeiten, mit Mattigkeit, Beengung, Angst, Ziehen in den Gliedern, fehlerhaften Absonderungen etc., der Ausschlag bricht nach kürzerer oder längerer Zeit hervor und entscheidet entweder die vorangegangenen Zufälle oder hat keinen Einfluss auf dieselben und nimmt allmählig mit denselben zu oder ab. Endlich giebt es Fälle, in welchen keine deutlichen innerlichen, dem Ausschlag vorhergehenden Affectionen wahrgenommen werden, sondern das Exanthem plötzlich erscheint. In der Haut selbst kündigt sich der Ausschlag oft durch verschiedene Krankheitserscheinungen an, wie durch das Gefühl von Jucken und Brennen, durch einen gewissen Turgor in der Haut und selbst entzündete Stellen, durch Schweisse etc., oder er bricht ohne diese Begleiter unmerklich hervor, so dass der Kranke sein Vorhandensein nur vermittelst des Anschauens wahrnimmt.

§. 1183.

Der Ausschlag nimmt gewöhnlich von seinem Erscheinen bis zum Verschwinden verschiedene Formen an. Viele Aussshläge stellen bei ihrem Entstehen kleine Entzündungshärten dar, sodann bildet sich in denselben eine durchscheinende, mehr farblose Flüssigkeit, diese geht in Eiter über (so dass das Knötchen zur Pustel wird) und endlich entstehen hieraus Krusten, andere erscheinen zuerst als oberflächliche seröse Entzündungen, es bilden sich sodann auf denselben kleinere oder grössere, mit seröser Flüssigkeit gefüllte Bläschen, und zuletzt bilden sich ebenfalls wiederum Schuppen und Borken, zuweilen entstehen solche Bläschen ohne offenbare Hautentzündung und verwandeln sich hierauf in Schuppen, auch gehen oft Blattern und Bläschen in Hautgeschwüre über etc. Die vorzüglichsten Formen, unter welchen die Hautausschläge erscheinen, sind folgende:

1) *Flecken* (Maculae). Es sind dieses einfache Veränderungen der Hautfarbe, an mehr oder weniger umschriebenen Stellen der Haut. Es kann bei dem Fleck auch das Gewebe der Haut verändert sein, doch nennt man die Veränderung Fleck, wenn die Veränderung in der Farbe der Haut vorzüglich hervortritt. Ist der Fleck roth und ist diese Farbe durch eine Entzündung in der Haut begründet, so werden diese Flecken von manchen Schriftstellern, nach *Willans* Vorgang, Exantheme (im engsten Sinne des Wortes) genannt. Ist der Fleck sehr klein, nur wie ein Punkt, so nennt man ihn Stippe (Stigma), die sehr ausgebreiteten Flecken wurden früher Maalplätze (Panni) genannt.

2) *Knöthchen* und *Blätterchen* (Papulae). Die erstern sind sehr kleine, rundliche, zugespitzte, rothe und harte Erhabenheiten in der Haut, welche an der Spitze noch keine Lymphe enthalten, Blätterchen aber sind diese Erhabenheiten, wenn sie schon etwas Lymphe enthalten.

Gewöhnlich nimmt man die Ausdrücke Knötchen und Blätterchen für gleichbedeutend, doch liegt ein Unterschied in ihrer Bedeutung, indem das Blätterchen eine kleine Blatter ist, was bei dem Knötchen noch nicht der Fall ist.

3) *Blattern* (Pustulae). Es sind dieses grössere, rundliche Erhabenheiten in der Haut, welche an ihrem Grunde eine Entzündungshärte haben, in dem obern Theile aber aus der von der harten entzündeten Stelle losgetrennten Epidermis, die mit einer meistens eiterartigen Flüssigkeit gefüllt ist, bestehen. Pustel nennen Manche auch die mit einer eiterartigen Flüssigkeit gefüllte Blase.

4) *Blasen* (Vesiculae et Bullae). Dieselben sind die Erhabenheiten in der Haut, welche blos in der Epidermis, unter welche eine Flüssigkeit ergossen ist, bestehen. Es unterscheiden sich die Blasen von den Blattern dadurch, dass ihr unterer Theil nicht in einer entzündlichen Verhärtung der Haut besteht. Die Blase kann zwar auch auf einer entzündeten Stelle der Haut stehen, doch ist diese Entzündung keine Entzündungshärte und dieselbe bildet jedenfalls nicht einen Theil der diese Form des Ausschlags darstellenden Erhabenheit der Haut; auch ist meistens in der Blase kein Eiter enthalten, wo hingegen die Flüssigkeit in der Blatter in der Regel eiterartig wird. Der Inhalt der Blase ist meistens eine farblose oder perlfarbige oder gelbliche, seröse Flüssigkeit (die Lymphbläschen), zuweilen jedoch auch eine gelbliche, eiterartige Materie (die Eiterbläschen) und manchmal auch eine blutige Flüssigkeit (die Blutblasen). Oft sind die Blasen sehr klein, z. B. von der Grösse eines Hirsekorns bis zu der einer Erbse, in welchem Falle sie Bläschen (Vesiculae, Phlyctaenae) genannt werden, oder sie sind von bedeutender Grösse, z. B. wie eine wälsche Nuss, in welchem Falle man sie Blasen (Bullae) heisst.

5) Die *Beulen* und *Knoten* (Phymata, Tubercula). Sie sind harte, begränzte Erhabenheiten der Haut, welche grösser sind, als die Knötchen, und sich nicht sowohl, wie diese, an der Spitze mit Lymphe füllen, welche die Epidermis von der unter ihr befindlichen Hautstelle trennt, sondern, wenn sie entzündet sind, in kleine Abscesse übergehen, oder sich allmählig zertheilen, oder auch, wenn sie nicht entzündet sind, unverändert stehen bleiben.

6) Die *Auswüchse* (Excrescentia). Es sind dieses Gebilde verschiedener Art, welche aus der Haut wuchernd hervorwachsen. Die Gewebe dieser Gebilde sind von dem der Haut verschieden; oft sind es mehr weiche, fleischartige Auswüchse, oft sind sie warzenartig, zuweilen hornartig etc. Die Auswüchse sind zuweilen Knoten, insofern sie nämlich harte Erhabenheiten der Haut darstellen, es sind übrigens nicht alle Knoten oder Beulen Auswüchse, indem dieselben häufig keine neue Gebilde sind, sondern oft nur in einer in entzündlicher Verhärtung begriffenen Hautstelle bestehen.

7) Die *Schuppen* (Squamae). Zuweileu blättert sich die Epidermis in ganz kleinen, mehl- oder kleienartigen Schuppen los (die Kleien, Furfura), in andern Fällen bilden sich etwas grössere, festere, halbdurchsichtige Lamellen (die Schuppen, Squamae), in andern Fällen endlich entsteht aus dem in dem Ausschlag enthaltenen und eintrocknenden Eiter und aus ausgeschwitzter Lymphe eine dicke, harte, undurchsichtige Substanz (die Borke oder der Grind, Crusta).

§. 1184.

Die so eben beschriebenen Veränderungen in der Haut bleiben oft nur eine kurze Zeit, z. B. wenige Tage, oft aber auch sehr lange stehen und können selbst unverändert das ganze Leben eines Individuums hindurch andauern. Es heilen die Hautausschläge, indem sie

gewisse Veränderungen durchlaufen, wornach sie entweder verschwinden, ohne dass Etwas auf der Haut losgestossen wird, oder indem gewisse Substanzen, meistens in der Form von Schuppen, auf die Oberfläche der Haut abgelagert und losgestossen werden, wobei häufig auch die Haut in vermehrte Ausdünstung versetzt wird, und indem meistens zugleich das Allgemeinbefinden sich verändert, nämlich das vorhandene Fieber verschwindet, eine Cachexie zur Heilung gelangt, gastrische Unreinigkeiten ausgeleert werden etc. Meistens geschehen diese Verbesserungen des Allgemeinbefindens unter kritischen Ausleerungen, namentlich Schweissen und kritischem Harne.

§. 1185.

Nachkrankheiten der Hautausschläge sind zum Theil Affectionen in den Theilen, in welchen der Ausschlag seinen Sitz hatte, wie z. B. Geschwüre auf der Cornea, Leucome etc., wenn der Ausschlag die Conjunctiva des Auges befallen hatte, zum Theil Störungen in den innern Theilen des Körpers. Die letztern können hervorgebracht werden, sowohl durch das Leiden des Körpers, das mit dem Ausschlag zugleich bestand, z. B. durch das ihn begleitende Fieber oder die mit ihm verbundene Cachexie, als auch durch unvollkommene Entwicklung oder den Zurücktritt des schon gebildeten Hautausschlags.

§. 1186.

Den **Tod** führt der Hautausschlag durch sich selbst in der Regel nur dann herbei, wenn die Ablagerung von Stoffen auf die Haut so bedeutend ist, dass hierdurch Abzehrung bewirkt werden kann, wie dieses z. B. in dem schuppigen Aussatze öfters der Fall ist, gewöhnlicher tödtet die Krankheit durch das allgemeine Leiden, von dem der Hautausschlag nur die Folge oder ein Theil ist, insbesondere durch Fieber oder eine Cachexie, oder

dadurch, dass die Entwicklung des Hautausschlags nicht zu Stande kommt oder der Krankheitsprozess sich von den äussern auf die innern Theile wirft.

§. 1187.

Eine besondere Anlage zu Hautausschlägen, insbesondere zu gewissen Arten von Exanthemen, haben Kinder, welche von syphilitischen und überhaupt von cachectischen Eltern stammen, es hat aber, wenn die Eltern an der Lustseuche litten, desshalb das Exanthem bei dem Kinde nicht gerade den syphilitischen Character. Oft bleibt die Anlage zu Hautausschlägen bei mehrern Generationen *erblich*. — Wie bei Kindern, findet man auch häufig bei Personen vom Greisenalter Hautkrankheiten; ebenso trifft man sie oft in der Periode des Mannbarwerdens, der monatlichen Reinigung und der Schwangerschaft an. Im allgemeinen sind Personen mit sehr zarter, verweichlichter Haut und auch solche mit sehr derber, trockener Haut mehr als andere zu diesen Krankheitsformen geneigt, vorzüglich leiden aber daran Individuen von dyscrasischem Körper, insbesondere syphilitische und scrophulöse. Die specifischen, fieberhaften Hautausschläge heben durch den Krankheitsprozess selbst die Anlage zur Erneuerung der Krankheit mehr oder weniger vollkommen auf.

§. 1188.

Als Gelegenheitsursachen werden zum Theil genannt: rein örtlich wirkende Ursachen, welche den normalen Hautausdünstungsprozess hemmen, wie z. B. grosse Unreinlichkeit der Haut, so wie auch Dinge, die die Haut in einen gereitzten Zustand versetzen, wie z. B. reitzende Salben und Pflaster, doch gehören diejenigen Veränderungen der Haut, die die unmittelbare Folge äusserer Einwirkungen sind, wie z. B. die Blasen nach dem Auflegen der Blasenpflaster, eigentlich nicht zu den Hautausschlägen, ferner die Ansteckungsstoffe, welche

stets specifische Hautausschläge hervorbringen, so wie die Ursachen allgemeiner Mischungsausartung der Säfte, namentlich der Scropheln, des Scorbutes und der Lustseuche, zum Theil auch die Unterdrückung der Absonderungen, z. B. der Galle oder des Harnes, auch die Ursachen allgemeiner Nervenzerrüttung, z. B. Onanie. Sehr häufig sind die consensuell und antagonistisch wirkenden Ursachen reitzende Stoffe im Magen und den Gedärmen, wie Galle, Schleim, Würmer, der Genuss von Krebsen, Käse etc., auch zum Theil die Unterdrückung von Absonderungen, die Unterdrückung des monatlichen Blutabganges etc.

§. 1189.

Wesen. Die ältern Aerzte sehen als den Grund der Hautausschläge eigenthümliche Schärfen an, und zwar wird zum Theil angenommen, dass jede Art von Exanthem durch eine bestimmte Schärfe bedingt sei. (Diese Schärfen können übrigens immer nur als eine entferntere Ursache der Ausschläge angesehen werden). *Authenrieth* [1]) nimmt eine zu starke Oxydation der Lymphe an, *Reil* [2]) setzt die nächste Ursache der Exantheme in eine Störung der respiratorischen Hautthätigkeit, *Henke* [3]) in krankhafte Reproduction der Haut, *Marcus*, [4]) *Haase* [5]) u. A. in Entzündung der Haut, *Kieser* [6]) erklärt die Exantheme, unter welcher Benennung derselbe jedoch nur die Blattern, die Masern, den Scharlach und das Fleckfieber versteht, für die äussern Reflexe innerer Entwicklungsprozesse, wodurch das Individuum auf eine höhere Stufe des Lebens gehoben werde, und *Danzer* [7]) sieht sie wie eigene Orga-

1) Hildenbrand institut. pract. med. Tom. IV. — 2) Fieberlehre B. V. S. 37. — 3) Handbuch d. spec. Pathologie B. II. pag. 386. — 4) Spec. Therap. B. III. pag. 10. — 5) Chron. Krankh. B. 3. §. 882. — 6) Ueber das Wesen der Exantheme, pag. 7 u. 25. — 7) Synopsis der Hautkrankheit. S. 17.

nismen an, die ähnlich den Zoohpyten ein parasitisches Leben führen.

§. 1190.

Sowohl was die Veränderungen in der Haut selbst betrifft, als auch was die Störungen im Allgemeinbefinden anbelangt, welche die Hautausschläge begleiten, sind es dem Wesen nach sehr verschiedenartige Krankheitsprozesse, welche die den Ausschlag darstellenden Abweichungen in der Farbe und in der Form der Haut hervorbringen; es haben daher auch manche Aerzte, namentlich *Sauvages*, *R. A. Vogel*, *Swediaur* und *Sagar*, die Hautausschläge in verschiedene Krankheitsfamilien, z. B. in die der Fieber, der Cachexien und der örtlichen Krankheiten vertheilt.

Die Krankheitsprozesse in der Haut, welche den Ausschlag darstellen, sind entweder

1) *wahre Entzündungen* (Erhärtungsentzündungen). Sie haben meistens mehr oder weniger tief in der Lederhaut ihren Sitz und stellen harte entzündete Knötchen (Papulae) und zuweilen auch grössere ertzündliche Beulen dar und gehen meistens in Eiterung über. Hieher gehören die Blattern, die Finnen, die Furunkel etc. oder

2) *seröse Entzündungen*. Dieselben haften in den mehr auf der Oberfläche sich befindenden Capillargefässen der Lederhaut und stellen rothlaufartige Flecken dar, die entweder, ohne eine andere Veränderung der Haut als eine etwa nachfolgende Abschuppung zurückzulassen, wieder verschwinden oder durch den Uebergang in Ausschwitzung unter die Epidermis eine andere Form von Ausschlägen (die Blasen) hervorbringen. Hierher gehören der Scharlach, das Erythema, die rothen Flecken, die dem Pemphigus und andern blasenartigen Ausschlägen oft vorhergehen etc.

3) *Absonderungen*. Die Absonderung geschieht vorzüglich in den oberflächlich liegenden Capillargefässen

der Lederhaut und zum Theil vielleicht auch in der Substanz der Haut bei der rückschreitenden Metamorphose. Oft werden Flüssigkeiten secernirt, die sich zwischen der Lederhaut und der Epidermis ansammeln und hierdurch Blasen bilden, zuweilen hat sich die Epidermis schon abgeblättert und es entsteht eine nässende Fläche oder die mehr dicklichte Flüssigkeit verdichtet sich zu Schuppen und Krusten, manchmal werden auch nur gewisse Pigmente secernirt und unter die Epidermis abgelagert, wodurch verschiedene Flecken entstehen. Auf dem Wege der Secretion entstehen mit oder ohne Entzündung die blasenartigen Ausschläge, die flechtenartigen Ausschläge (der Salzfluss), die Sommersprossen etc.

4) *Blutflüsse.* Die Petechien und die grössern Ecchymosen sind Blutergiessungen unter die Epidermis.

5) *Nicht entzündliche Erhärtungen* der Gewebe. Diese Verhärtungen sind eine krankhafte Stoffanlagerung und zum Theil auch Verschmelzung der im Gewebe des Organs sich befindenden Similartheile zu einer festern Substanz. Es gehören vorzüglich hierher die Warzen, die Knollen im arabischen Aussatz und mancherlei nach Hautausschlägen zurückbleibende und sie begleitende Callositäten der Haut, doch sind die angeführten Verhärtungen zum Theil zugleich Aftergefilde.

6) *Erweichung der Gewebe.* Es verschmelzen die im Organ befindlichen Similartheile zu einer gleichförmigen weichen Masse, die bei den verschiedenen Arten der Erweichung von sehr verschiedener Beschaffenheit ist. Hieher gehören die weisse und die dunkle Morphea in dem Aussatz und manche Verschwärungen, die aus Pusteln, Blasen etc. zuweilen entstehen.

7) *Afterbildungen.* Sie bestehen in eigenthümlichen Umänderungen in den reproductiven Prozessen, die, so wie die andern angeführten Krankheitsprozesse, in besonderen Kapiteln der besondern Krankheitslehre näher

erörtert werden sollen. Es gehören hieher z. B. die himbeerartigen Auswüchse in der Framboesia.

§. 1191.

Die Krankheitsvorgänge im übrigen Körper, welche bei manchen Hautausschlägen wesentlich zur ganzen Krankheit gehören, sind insbesondere Fieber und Cachexien.

§. 1192.

Die Krankheitsprozesse in der Haut, die den Hautausschlag bilden, können auf zwei Wegen hervorgebracht werden:

1) Durch primäre Affection des Nervensystems. Eine veränderte Einwirkung der Nerven auf das Blut und auf das Organengewebe kann all die oben angeführten krankhaften Prozesse, die die Hautausschläge unmittelbar bedingen, wie wahre Entzündung, seröse Entzündung, krankhafte Absonderung etc. hervorbringen. Von primärer Affection des Nervensystems entstehen diese Krankheitsprozesse 1) bei Hautausschlägen, welche durch örtliche Reitzung hervorgebracht werden, wie z. B. durch scharfe Pflaster; 2) bei Hautausschlägen, die auf consensuelle oder antagonistische Weise sich bilden, welche Entstehungsweise z. B. da angenommen werden muss, wo an einem entfernten Theil solche Reitze wirken, die nicht als fremde Stoffe in die Wege der Circulation gelangen können, z. B. wenn Hautausschläge durch den Wurmreitz entstehen, so wie da, wo Hautausschläge sich nur an bestimmten, mit dem primär leidenden Organ in Consens stehenden Stellen bilden, wie z. B. die Bläschen an den Lippen bei gastrischen Reitzungen, und 3) bei Hautausschlägen, die im Gefolge eines allgemeinen Nervenleidens auftreten, wie zuweilen der Pemphigus bei Hysterie, doch kann bei allgemeinem Nervenleiden sich die Säftemasse verändern und die Entstehung des Ausschlags auch in solchen Fällen durch einen Fehler der Säfte bedingt sein.

§. 1193.

2) Durch eine fehlerhafte Beschaffenheit des Blutes. Ist das Blut fehlerhaft, so tritt es in den Capillargefässen mit dem Nervensysteme und mit dem ganzen Organengewebe in eine fehlerhafte Wechselwirkung, wodurch in der Haut mancherlei Veränderungen hervorgebracht werden. Zuweilen ist das Blut zu dünnflüssig und es dringen kleine Blutstropfen oder wenigstens färbende Theile des Blutes durch das Gewebe und lagern sich unter die Epidermis ab, wodurch Petechien und grössere Ecchymosen entstehen; oft mag das Blut durch eine fehlerhafte Beschaffenheit veranlassen, dass krankhafte Stoffe in das Gewebe der Haut abgelagert werden und somit dieselbe fehlerhaft ernährt wird; häufig scheinen scharfe Stoffe in dem Blute vorhanden zu sein, welche in das Capillargefässnetz der Haut gelangen und Entzündungen mit verschiedenen Produkten, fehlerhafte Absonderungen etc. erregen. In solchen Fällen sind im Krankheitsprozess verwickelt: 1) das in den Nerven wirkende Prinzip, 2) das Blut, so wie auch in gewissen Fällen das Gewebe der Haut und 3) der in das Blut oder in das Gewebe der Haut gelangte fremdartige Stoff. Ist dieser fremde Stoff ein Contagium, so wird er durch den biochemischen Prozess zwischen den so eben bezeichneten drei Factoren vervielfältigt und ausgeschieden. Die Art des Hautausschlages hängt ab: 1) von der Stimmung der Nerven, 2) von der Beschaffenheit des Blutes und zuweilen von der des Gewebes der Haut und 3) in gewissen Fällen von der Beschaffenheit des von aussen eingedrungenen Stoffes. Dass zuweilen Schärfen im Blute Hautausschläge hervorbringen, wird schon dadurch bewiesen, dass öfters Arzneimittel, die man in verschiedenen Absonderungen wieder findet, Hautausschläge veranlassen, wie z. B. das Terpenthinöl.

§. 1194.

Die **Vorhersage** richte sich in Hinsicht auf die zu erwartende Heilung, 1) nach der Art des Exanthems, indem es Ausschläge giebt, welche ganz von selbst in einer gewissen Zeit verschwinden, und andere, die in der Regel nicht geheilt werden, 2) nach den Ursachen des Exanthems, indem bei leicht zu entfernender Ursache in der Regel auch der Ausschlag leicht geheilt wird, 3) nach der Dauer der Krankheit, indem erst vor kurzem entstandene Ausschläge meistens leichter zu beseitigen sind, als schon lange bestehende, die oft sehr hartnäckig sind, und die man wegen der übeln Folgen, die ihre Entfernung haben kann, nicht immer heilen darf, 4) nach der Ausbreitung des Exanthems, indem ein allgemein über den Körper verbreiteter Ausschlag meistens schwierig zu beseitigen ist und oft nicht ohne nachtheilige Folgen zur Heilung gebracht wird, doch gilt dieses nur von chronischen Ausschlägen und nicht von den fieberhaften, 5) nach dem Alter des Kranken, indem Ausschläge bei Personen vom Greisenalter im allgemeinen hartnäckig sind und auch ihre Entfernung, wegen leicht entstehenden innern Krankheiten, Vorsicht erfordert, während die Kinder befallenden Hautausschläge meistens von selbst verschwinden, insbesondere bei dem Uebertritt des Individuums von dem Knaben- in das Jünglingsalter und 6) von dem Vorhandensein specifischer Mittel. — Die Gefahr der Krankheit hängt vorzüglich von der Art des Ausschlags ab.

§. 1195.

Behandlung der Hautausschläge. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Es ist darauf zu sehen, dass die normale Hautausdünstung nicht gehemmt werde und es sind desshalb reine Wäsche, öfteres Waschen des Körpers mit lauwarmem Wasser und Bäder anzuempfehlen; der Kranke muss alle scharfen Stoffe in der

Nahrung, die auf die Haut wirken können, wie eingesalzenes und geräuchertes Fleisch, Käse etc., vermeiden und sich dagegen milder Nahrungsmittel, namentlich der Milchspeisen, bedienen, sind gastrische Reitze vorhanden, so müssen sie entfernt werden, die monatliche Reinigung sucht man wieder herzustellen etc.

§. 1196.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Da manche Ausschläge nur die Krise eines innern Leidens sind, so darf ihre Entwicklung nicht immer gehemmt werden, und es muss selbst zuweilen ihre Entstehung befördert und für ihr Fortbestehen Sorge getragen werden.

Manche Hautausschläge, namentlich die fieberhaften, heilen von selbst, nachdem sie gewisse Veränderungen durchlaufen haben, und es hat daher der Arzt nur dafür zu sorgen, dass dieses nicht unter zu stürmischen Bewegungen geschehe.

§. 1197.

Um den Krankheitsprozess, der den Hautausschlag bildet, zur Heilung zu führen, haben wir die doppelte Aufgabe, die etwa vorhandenen fehlerhaften Stoffe, die in den Krankheitsprozess eingehen, zu tilgen und unmittelbar die Nerventhätigkeit in der Haut umzustimmen und auf ihren Normalgrad zurückzuführen. Zum erstern Zweck dienen die unter dem Namen mischungsändernde Mittel bekannten Arzneistoffe, sei es, dass sie gewisse, in den Körper gelangte specifische Stoffe zu neutralisiren vermögen, oder nur im allgemeinen eine Veränderung in der Mischung der festen und flüssigen Theilen hervorbringen. Zu diesen Mitteln gehören vorzüglich die Quecksilberpräparate, welche sowohl specifisch bei gewissen contagiösen Hautkrankheiten, insbesondere den syphilitischen, wirken, als auch eine allgemeine, der scorbutischen ähnliche Auflösung der Säfte hervor-

bringen, mehr oder weniger die Antimonialien bei herpetischen Ausschlägen, wie es scheint, der Schwefel bei der Krätze, die Mineralsäuren bei scorbutischen Ausschlägen etc. Ebenso wirken wir mischungsändernd, indem wir gewisse Stoffe, aus welchen bestimmte Bestandtheile des Blutes bereitet werden, in vermehrter Menge dem Körper darbieten oder sie ihm entziehen, so ist z. B. reichliches Getränk oft sehr wohlthätig, die Entziehung stark nährender Speisen ist bei Ausschlägen mit wuchernder Vegetation nothwendig und dagegen sind bei Exanthemen, welche aus einer gewissen Auflösung der Säfte entspringen, China und Eisen nützlich, indem dieselben zur Vermehrung des Blutrothes und Faserstoffes im Blute beitragen etc. Zu dem zuletzt angegebenen Zwecke dienen überhaupt die Mittel, welche eine kräftigere Verdauung und dadurch eine bessere Bereitung der Lymphe bewirken. — Diese verschiedenen, auf die Mischung wirkenden Mittel können sowohl innerlich gegeben, als auch unmittelbar auf die Haut, in Form von Bädern, Waschwassern und Salben angewandt werden, wo sie nach erfolgter Resorption wirken. Hieher gehören die Bäder und Waschwasser mit Sublimat, Mineralsäuren, Schwefelleber etc. und die verschiedenen Quecksilbersalben, Schwefelsalben, Graphitsalben etc.

§. 1198.

Wie wir dadurch mischungsändernd wirken, dass wir gewisse, zur Veränderung der Mischung beitragende Stoffe in die Säfte bringen, so bewirken wir auch dadurch eine Umwandlung in den Mischungsverhältnissen, dass wir gewisse, in den Säften oder im Gewebe der Organe befindliche Stoffe entfernen.

Zu diesem Zwecke dienen sowohl Mittel, die auf die Resorption wirken und daher zur Aufsaugung der in das Gewebe der Haut und in andere Theile abgelagerten Stoffe beitragen, wie die Antimonalien (Nro. 68),

die Mercurialien, Baryta muriatica, das Jod, die auflösenden, narcotischen Mittel, wie Belladonna, Cicuta, Blausäure etc., als auch Mittel, die auf die Absonderungen wirken und dadurch die Ausscheidung von Stoffen aus den Wegen der Circulation bewirken, hieher gehören insbesondere die schweisstreibenden Mittel, welche aus dem leidenden Organe selbst Stoffe ausscheiden, aber auch urintreibende Mittel, die auf die Absonderung der Galle wirkenden Mittel etc. Mehrere, der zu diesem Zwecke gebräuchlichen Mittel wirken auf mehrere Absonderungen zugleich, und man unterstützt ihre Wirkung, indem man sie in flüssiger Form mit reichlichem Wasser giebt. Die meisten, der unter dem Namen blutreinigenden Mittel bekannten Arzneistoffe gehören hieher, namentlich das Guajack, Herba Jaceae, Radix Sarsaparillae, Caricis arenariae, Bardanae, Stipites Dulcamarae, Turiones et Lignum Juniperi, Pini, cortex Ulmi, die Extracte und frisch ausgepressten Säfte von radix Graminis, Taraxaci, Saponariae, Herba Chaerefolii, Fumariae, Nasturtii aquatici, Cochleariae etc. Um die Ausscheidungen aus der Haut zu vermehren, wendet man auch warme, einfache Bäder, Schwefelbäder, Dampfbäder etc. an.

§. 1199.

Die zweite Aufgabe ist, die Nerventhätigkeit in der Haut auf ihren Normalgrad zurückzuführen. In der Regel ist die Haut in einem Zustand von Reitzung und selbst von Entzündung, und es leisten aus diesem Grunde die besänftigenden Mittel oft so vortreffliche Dienste in Hautausschlägen. Die besänftigenden Mittel innerlich gegeben haben in der Regel eine geringere Wirkung, als die äussern, doch sind Oelmixturen und einhüllende Getränke, so wie die ein narkotisches Princip habenden Stipites Dulcamarae, das Aconitum Napellus, die Blausäure und zuweilen auch das Opium von Nutzen. Die

äusserlichen besänftigenden Mittel sind vorzüglich: das Bestreichen der kranken Hautstellen mit frischem Schweinefett, Butter oder einem milden Oel, das Waschen derselben mit lauwarmem Wasser und Milch, mit einer Abkochung von Kleien, Eibischwurzel, Mohnköpfen, das Bähen der Theile mit solchen Abkochungen, so wie auch lauwarme Bäder mit Milch, Kleien, das Malzbad, das Thierbad.

§. 1200.

Zuweilen ist auch die Haut in einem Zustand von Reitzlosigkeit und Atonie. In diesen Fällen passen innerlich zum Theil erregende und zum Theil tonische Mittel, und äusserlich Salben mit reitzenden Stoffen, z. B. Salben mit weissem oder rothem Quecksilberpraecipitat, mit Schwefelblumen, Salmiak, Lorbeeröl etc., Waschwasser und Bäder mit Zusatz von Alkalien, Salzen (das Seebad), Schwefelleber, Sublimat, Eisen, Mineralsäuren, scharfen oder aromatischen und tonisch wirkenden Pflanzen, Räucherungen mit schweflichter Säure etc.

§. 1201.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Ist der Hautausschlag unter nachtheiligen Zufällen zurückgetreten, so hat man zunächst die Ursache dieses Zurücktrittes aufzusuchen und zu entfernen; insbesondere ist Verkältung zu vermeiden; trägt ein erhöhter Lebensprozess, insbesondere Entzündung in innern Theilen, die Schuld an dem schnellen Erlöschen des Krankheitsprozesses auf der Haut, so bewirken oft Mittel, die gegen jene Krankheit gerichtet sind, z. B. eine Aderlässe, das Wiedererscheinen des Ausschlags. Setzt die Ursache des Zurücktrittes des Ausschlages keine Hindernisse entgegen, so wendet man Mittel an, die auf die Haut treiben, den Spiritus Mindereri, schweisstreibende Thee, den Campher, das Doversche Pulver, warme Bäder, Bäder mit Schwefelleber etc., so wie auch Hautreitze, Senf-

teige, Blasenpflaster, Seidelbast, die Brechweinsteinsalbe, in gewissen Fällen selbst die Moxen oder auch die neue Einimpfung des verschwundenen Ausschlags. Zugleich behandelt man das durch den Zurücktritt des Ausschlags entstandene innere Leiden nach den Anzeigen, die die Natur des Uebels giebt.

§. 1202.

Eintheilung der Hautausschläge. Schon die ersten Versuche, die gemacht worden sind, die Hautausschläge einzutheilen, unterscheiden sich von einander darin, dass in dem einen die Verschiedenheit der Form des Exanthems und in dem andern die nächsten und die entferntern Ursachen desselben das Eintheilungsprinzip waren. *Plenk* war der erste, welcher die Hautausschläge nach ihrer Form ordnete, und *Lorry* (beinahe gleichzeitig) der erste, welcher dieselben nach ihrer Entstehungsweise eintheilte.

Nach der Form der Krankheit wurden die Exantheme auf eine zweifache Weise eingetheilt, von den Einen nach bestimmten einzelnen Merkmalen in den Veränderungen in der Haut selbst (künstliche Systeme), nach den andern nach dem Gesammtausdruck der ganzen Krankheit. Die erstere Eintheilungsart wählte *Plenk* und ordnete die Hautkrankheiten in folgende Klassen: 1) Maculae, 2) Pustulae, 3) Vesiculae, 4) Bullae, 5) Papulae, 6) Crustae, 7) Squamae, 8) Callositates, 9) Excrescentiae cutaneae, 10) Ulcera cutanea, 11) Vulnera cutanea, 12) Insecta cutanea, 13) Morbi unguium, 14) Morbi pilorum. Ihm folgten im Wesentlichen die meisten neuern Schriftsteller, namentlich auch *Willan* und *Bateman.* Ersterer nimmt folgende Ordnungen an: 1) *Papulae* mit den Gattungen Strophulus, Lichen und Prurigo, 2) *Squamae* mit den Gattungen Lepra, Psoriasis, Pityriasis und Ichthyosis. 3) *Exanthemata* mit den Gattungen Rubeolae (Masern), Scarlatina, Urticaria, Roseola, Purpura (Petechien), Erythema. 4) *Bullae* mit den Gattungen

Erysipelas, Pemphigus, Pompholyx, Herpes, Varicellae Miliaria, Eczema, Aphthae. 5) *Pustulae* mit den Gattungen Impetigo, Ecthyma, Variolae, Scabies, Porrigo. 6) *Tubercula* mit den Gattungen Phymata, Verrucae, Acne, Lupus, Elephantiasis, Framboesia und 7) *Maculae* mit den Gattungen Ephelis, Naevus und Spilus. *Bateman* trennte die Ordnung Bullae in die der Bullae und Vesiculae. Zu den Eintheilungen der Ausschläge nach ihrem Gesammtausdruck kann die von *P. Frank* u. A. angenommene Eintheilung derselben in Exantheme (die acuten, mehr oder weniger mit Fieber vorkommenden Hautausschläge) und Impetigines (die chronischen mit einem cachectischen Habitus verbundenen Ausschläge) gerechnet werden. Auch gehört hierher *Alibert's* Eintheilung, nach welcher es folgende Familien von Hautkrankheiten giebt: 1) Dermatoses eczémateuses, 3) Derm. exanthémateuses, 3) Derm. teigueuses, 4) Derm. dartreuses, 5) Derm. cancéreuses, 6) Derm. lépreuses, 7) Derm. véroleuses, 8) Derm. strumeuses, 9) Derm. scabieuses, 10) Derm. hémateuses, 11) Derm. dyschromateuses, 12) Derm. hétéromorphes.

§. 1203.

Nach dem Wesen und den Ursachen theilte *Lorry* die Hautkrankheiten in folgende Klassen: I. Krankheiten, welche auf die Haut geworfen werden, durch ein im Innern liegendes Leiden und II. Krankheiten, welche in der Haut selbst entstehen. Die erste Klasse zerfällt in folgende Abtheilungen: 1) Krankheiten, welche auf die ganze Haut abgelagert werden. Es sind dieses entweder hitzige Krankheiten, bei welchen nicht kritische Ausbrüche auf der Haut geschehen (die symptomatischen Hautausschläge in manchen Fiebern), oder hitzige Krankheiten, deren Krise nach der Haut geht (wie z. B. bei dem Scharlach und den Masern), oder nicht hitzige Reinigungskrankheiten, die nach der Haut gehen (wohin

z. B. Lichen, Krätze, Flechten und Aussatz gehören) und 2) reinigende Hautkrankheiten, welche nur einen einzelnen Theil befallen (wie der Gürtel, der Kopfgrind etc.). Die zweite Klasse wird getheilt: 1) in die Krankheiten, welche in der ganzen Haut entstehen können (wie zu grosse Dichtheit der Haut, Flecken auf der Haut, einzig von einem Fehler der Haut abhängend, wie z. B. Sommersprossen etc.) und 2) Krankheiten, welche einzelnen Theilen eigen sind (wie der Kahlkopf, der Kupferhandel etc.)

Nach der wesentlichen Verschiedenheit der in der Haut selbst vor sich gehenden Krankheitsprozesse theilte *Rayer* die Hautkrankheiten ein: 1) in Entzündungen der Haut, 2) Congestionen und Blutflüsse der Haut, 3) Nevrosen der Haut, 4) Veränderungen der Farbe der Haut, 5) krankhafte Absonderungen und 6) Fehler der Bildung. Die meisten Ausschläge zählte derselbe zu den Entzündungen und nahm als verschiedene Ordnungen Inflammations exanthémateuses, bulleuses, vésiculeuses, pustuleuses etc. an, wodurch im Ganzen dieselben Familien gebildet werden, wie sie *Plenk* und *Willan* annehmen.

§. 1204.

Unter den angeführten Eintheilungsmethoden der Ausschläge hat im Ganzen die von *Willan* am meisten Beifall erhalten, indem sie die Diagnose der Hautausschläge erleichtert; es hat jedoch diese Methode folgende bedeutende Mängel: 1) sie stellt Krankheiten in verschiedene Klassen, die offenbar natürliche Familien bilden, und auch ihrem Wesen nach ganz mit einander verwandt sind, so z. B. werden die ansteckenden fieberhaften Exantheme in der 3ten, der 4ten und der 5ten Klasse, ja die Varicellen, die vielleicht nur eine Modification der Variola sind, in einer andern Klasse als diese Krankheit abgehandelt, der schuppige Aussatz steht in der 2ten und der knotige Aussatz in der 6ten Klasse etc. 2) Ausschläge, die ihrer Be-

deutung nach weit von einander verschieden sind, bilden *eine* Familie, so die Flechten und die Varicellen, die gewöhnliche Warze und die Elephantiasis etc. 3) Es gehört nach diesem Eintheilungsprinzip ein und dieselbe Ausschlagsart in verschiedenen Stadien der Krankheit und nach verschiedenen Modificationen, unter welchen sie oft zu gleicher Zeit auf dem nämlichen Individuum erscheint, ganz verschiedenen Klassen an, so z. B. müsste die Variola sogleich nach ihrem Ausbruch in die erste Klasse, im Zeitraum der Füllung in die 5te Klasse und im Zeitraum der Abschuppung in die 2te Klasse gestellt werden, die Flechten gehören in ihrem Beginnen zur 4ten, und bei längerer Dauer zur 2ten Klasse, und die die Krätze darstellenden verschiedenen Veränderungen in der Haut, welche oft zugleich an *einem* Individuum angetroffen werden, müssen so weit sie in Blätterchen bestehen, in die 3te, in so fern sie aber Bläschen und Pusteln darstellen in die 4te und 5te Klasse gereiht werden; 4) endlich gewährt diese Eintheilung für die Therapie durchaus keine Vortheile.

§. 1205.

Viel mehr nach dem Wesen der Gesammtkrankheit und also auch mit grösserem Gewinn für die Therapie ordnen wir die Hautausschläge (nach dem Vorgange von *Lory*) nach ihrer *Entstehungsweise*, nämlich nach den im Körper selbst liegenden Ursachen des krankhaften Zustandes der Haut. Nach diesem Eintheilungsgrunde theile ich die Hautausschläge in folgende Ordnungen ein, die zugleich natürliche Familien darstellen:

Erste Ordnung: *Die specifischen fieberhaften Hautausschläge.* Es ist der Ausschlag stets das Erzeugniss eines ansteckenden Fiebers, von dem er einen wesentlichen Bestandtheil ausmacht und zwar hat er bei jeder Art der contagiösen Fieber eine ganz bestimmte Form. Immer geht einem solchen Ausschlag ein Fieber von bestimmter

Dauer und mit eigenthümlichen Erscheinungen vorher, sodann bricht der Ausschlag hervor und hat mehr oder weniger die Eigenschaft der Krisen und die durch ihn hervorgebrachten Stoffe pflanzen stets die nämliche Krankheitsart fort. Hieher gehören der Scharlach, die Rötheln, die Masern, die Blattern, die Varicellen, das Typhusexanthem und die Pestcarbunkeln.

§. 1206.

Zweite Ordnung: *Die symptomatischen Hautausschläge.* Diese Ausschläge sind Symptome verschiedenartiger Krankheitszustände, und zwar kommt jede einzelne Art derselben im Gefolge von sehr verschiedenen Krankheiten vor. Oft geschieht der Ausbruch dieser Exantheme mit Erleichterung, oft aber auch ohne dieselbe und niemals ist das Erscheinen des Ausschlags eine nothwendige Bedingung der Heilung der bestehenden Krankheit.

§. 1207.

Man kann zwei Gruppen symptomatischer Hautausschläge unterscheiden. In der einen bemerken wir Exantheme, von denen jedes bald mit, bald ohne Fieber vorkommt, die in der Regel schnell entstehen und nie festwurzeln, nämlich die einzelne Veränderung in der Haut, während durch immer sich wiederholende Ausbrüche die Krankheit ziemlich langwierig werden kann, und welche niemals ansteckend werden. Wegen der kürzeren Dauer der einzelnen Veränderungen auf der Haut möchte ich diese Gruppe der Ausschläge *die flüchtigen symptomatischen Exantheme* nennen. Zu dieser Gruppe gehören die Hautröthe (Erythema), das Röschen (Roseola), die Nesselsucht (Urticaria), die Hitzblätterchen (Strophulus), die Schwindflechte (Lichen), die Petechien (Petechiae), der Friesel (Miliaria), die Hitzbläschen (Eczema), der Gürtel (Zona), der Blasenausschlag (Pemphigus), die Eiterblase (Ecthyma), die Schmutzrufe (Rhypia), das Bluteisen (Furunculus), der Karfunkel (Anthrax) und die Schwämmchen (Aphthae).

§. 1208.

Die zweite Gruppe der symptomatischen Ausschläge bilden solche Exantheme, die nie als ein bloses Fiebersymptom, sondern immer im Gefolge eines chronischen Leidens auftreten und auch nicht eine flüchtig vorübergehende Veränderung in der Haut sind, sondern in derselben festere Wurzel schlagen, so dass sie zu einem selbstständigen Leiden der Haut werden können. Diese Hautausschläge bilden den Haupttheil der Krankheit oder stellen selbst eine selbstständige Krankheitsform dar, sie sind dem Ausdruck der Krankheit nach mit der dritten Ordnung der Hautausschläge, der specifischen fieberlosen Ausschläge verwandt und erhalten zum Theil bei besonderer Bösartigkeit eine Ansteckungsfähigkeit, so dass sie in die eben bezeichnete Ordnung der Exanthemen übergehen. Ich möchte diese Gruppe von Ausschlägen die *festwurzelnden symptomatischen Exantheme* nennen. Hieher gehören die Finnen (Acne), die Juckknötchen (Prurigo), die Hautkleie (Pityriasis), der Leibgrind (Impetigo), die Flechten (Herpes) und der Kopfgrind (Tinea).

§. 1209.

Dritte Ordnung: *Die specifischen fieberlosen Hautausschläge.* Es sind chronische Krankheiten, welche der Erscheinung nach entweder nur in dem Hautausschlag bestehen, oder in welchen derselbe doch als der Haupttheil der Krankheit sich darstellt; das Leiden der Haut ist ein fortschreitender Krankheitsprozess, der am Ende den ganzen Organismus in Mitleidenschaft zieht, insbesondere Cachexie hervorbringt, und dadurch als ein specifischer Prozess sich beurkundet, dass er ansteckend ist. Hieher gehören die Krätze, der Aussatz, der Weichelkopf und die Frambösia.

§. 1210.

Vierte Ordnung: *Die unverändert bleibenden ausschlagsartigen Hautfehler.* Es sind dieses Veränderungen

in der Farbe und dem Gewebe der Haut, von denen es zum Theil zweifelhaft ist, ob sie nach Art der Hautausschläge entstanden sind und die auch meistens kein fortschreitender Krankheitsprozess, sondern unverändert bleibende Structurveränderungen sind, die auch in der Regel mit keinem innern Leiden in Verbindung stehen. Hieher müssen gestellt werden: die Sommersprossen (Ephelis), die Leberflecken (Chloasma), die Warze (Verruca), der Fischschuppenausschlag (Ichthyosis), das Muttermaal (Naevus maternus) etc.

ERSTE ORDNUNG DER HAUTAUSSCHLÄGE.

Die specifischen fieberhaften Hautausschläge.

Da der Hautausschlag einen Theil des Fiebers ausmacht, die mit diesen Hautausschlägen verbundenen Fieber aber schon in der Fieberlehre in dem Abschnitt von den ansteckenden Fiebern beschrieben worden sind, so wird hier auf jenes Kapitel der Krankheitlehre verwiesen.

Die besten Abbildungen vom Scharlachexanthem findet man bei *Willan* und *Bateman*, Tab. 22 u. 23, die von den Masern bei *Will.* u. *Bat* Tab. 19, 20 u. 21, die von den Blattern bei *Alibert* Tab. 8, die von den Varicellen bei *Will.* u. *Bat.* Tab. 47 u. 48 und *Alibert.* Tab. 9, und die von den Pestkarbunkeln bei *Will.* u. *Bat.* Tab. 39.

ZWEITE ORDNUNG DER HAUTAUSSCHLÄGE.

Die symptomatischen Ausschläge.

Erste Gruppe: die flüchtigen symptomatischen Hautausschläge.

Die Hautröthe.
(*Erythema.*)

Abbildungen von *Will.* und *Bat.*, Tab. 31 und 32, und *Alib.*, Tab. 2 und 3.

§. 1211.

Die **Hautröthe** ist der symptomatische Ausschlag, welcher in entzündlichen Flecken der Haut besteht, die, ähnlich dem Rothlauf, auf den Druck mit dem Finger an der berührten Stelle auf einen Augenblick verschwinden und ohne scharfe Begrenzung sich in die gesunde Hautfarbe verlieren.

§. 1212.

Meistens gehen dem Erythem innere Störungen voraus, es erscheint aber dasselbe selten kritisch. Der Ausbruch selbst geschieht nur mit geringer schmerzhafter Empfindung in der Haut, gewöhnlich nur unter etwas Brennen der Haut. Oft entstehen rothe Flecken von unregelmässiger Form, welche schnell wieder verschwinden und gern wiederkehren (Er. fugax. W.), manchmal entstehen, besonders an ödematösen Stellen, ganz gleichförmige und glänzende Flecken (Er. laeve W.),

zuweilen ist die Hautröthe auf der einen Seite durch einen harten, erhabenen und an einzelnen Stellen mit kleinen Blätterchen besetzten rothen Rand begrenzt, während die andere Seite offen ist und die Röthe sich unbestimmt verliert (Er. marginatum *W.*); manchmal ist das Erythem auf seiner Oberfläche mit kleinen Blätterchen besäet (Er. papulatum), auch zeigt sich das Erythem als unregelmässige, rothe Flecken, welche um kleine, leicht erhabene Geschwülste (wie sie in der Nesselsucht vorkommen) sich ausbreiten (Er. tuberculatum *W.*), endlich giebt es eine Hautröthe, die in grossen, abgerundeten, rothen Flecken besteht, welche sich in ihrem Mittelpunkt erheben und schmerzhafte Knoten bilden, die aber wieder weich werden und sich senken, ohne in Eiterung überzugehen (Er. nodosum. *W.*).

§. 1213.

Der Verlauf des Erythems ist oft so schnell, dass in wenigen Stunden die ganze Erscheinung vorüber ist, bei fortdauernder Ursache kann aber auch die Krankheit chronisch werden. Es verschwindet die Hautröthe unter einer leichten Abschuppung der Oberhaut. Zuweilen entsteht aus dem Erythem eine Verschwärung und selbst Brand.

§. 1214.

Ursachen und Bedeutung. Das Erythema fugax kommt bei gallichten Diarrhöen, schleichenden Nervenfiebern, beim Typhus, Kindbettfieber, Lungenentzündungen etc. vor und deutet im allgemeinen auf einen gefährlichen Gang der Krankheit; auch ist es oft die Folge von chronischen Krankheiten, Hysterie, Unterleibsstörungen, Urin- und Steinbeschwerden etc. Das Er. laeve wird bei stark gespannter Haut in der Hautwassersucht angetroffen, bei gallichten Affectionen, Schwächefiebern etc., und deutet überhaupt auf Schwäche und auf Säfteentmischung. Das Er. marginatum kommt

besonders in Krankheiten alter Personen vor und ist im Ganzen ein ungünstiges Zeichen. Das Er. papulatum findet man bei Handarbeitern, deren Arme sorglos dem plötzlichen Wechsel der Temperatur blosgestellt sind und bei Personen, die im Uebermaass geistige Getränke geniessen. Das Er. nodosum hat man vorzüglich bei Frauenspersonen an dem vordern Theil des Unterschenkels beobachtet; es steht zuweilen mit der monatlichen Reinigung in Verbindung.

§. 1215.

Behandlung. Man hat hier in der Regel nur die Aufgabe, das innere Leiden, von dem die Hautröthe ein Symptom ist, zu behandeln. Sollte ein Verfahren gegen das Hautleiden selbst nothwendig werden, so kann dieses nach den bei dem Rothlauf angegebenen Regeln eingerichtet werden.

Das Röschen.

(*Roseola W.*)

Abbildungen von *Will.* u. *Bat.*, Tab. 25, 26 u. 27, und *Alib.* Tab. 10.

§. 1216.

Das **Röschen** ist der symptomatische Ausschlag, der in einer rosenfarbigen, verschiedentlich gestalteten (mehr begrenzten) Röthe der Haut besteht, welche weder Blasen, noch Hautknötchen enthält.

§. 1217.

Willan beschreibt folgende Arten der Roseola: 1) Die Roseola aestiva, welche nach vorhergegangenen Fiebersymptomen ausbricht, in grössern und unföm-

lichern Flecken, als die der Masern besteht, Jucken erregt und mit Anschwellung der Mandeln verbunden ist. Es stimmt die Beschreibung *Willans* in manchem mit der *Heims* von den umschriebenen Rötheln überein, doch beschuldigt *Willan* nicht ein Contagium, sondern Fatiguen, den plötzlichen Wechsel der Temperatur etc. 2) Die Roseola autumnalis. Es besteht dieselbe in einzelnen, nicht über die Haut hervorgehenden Flecken, welche eine ovale, oft fast kreisförmige Gestalt haben, nach und nach bis zur Grösse eines Schillings wachsen und von so dunkelrother Farbe sind, dass man in einiger Entfernung glaubt, die Haut sei mit dem Safte schwarzer Kirschen oder Maulbeeren bestrichen worden. Der Ausschlag erregt wenig Jucken, ist mit keinem deutlichen Allgemeinleiden verbunden und endigt sich meistens durch Abschuppung. Er kommt bei Kindern von 5 — 10 Jahren vorzüglich zur Herbstzeit vor. — 3) Die Roseola annulata. Sie besteht in rosenfarbigen Ringen, innerhalb welchen die Haut die natürliche Farbe behält. Der Ausschlag kommt mit und ohne Fieber vor und wurde in Verbindung mit verschiedenen Krankheiten beobachtet, mit Unordnung in den Regeln, mit der Gicht etc. — 4) Die Roseola infantilis, welche in kleinen, rothen, in einander gedrängten Flecken besteht, und während der Zahnperiode, bei Fiebern und Unordnungen im Unterleibe bei Kindern vorkommt. — 5) Die Roseola variolosa. Dieselbe besteht in unregelmässigen, länglichten, in einanderlaufenden und mit kleinen Punkten untermischten Flecken und bricht zuweilen bei geimpften und zufälligen Blattern während des Eruptionsfiebers aus. 6) Die Roseola vaccina. Es kommt bei den Kuhpocken zuweilen eine ähnliche Efflorescenz, wie bei den wahren Blattern, vor, zuweilen kommen aber Massen von kleinen Punkten und Flecken zum Vorschein, die etwas über die Hautfläche hervorragen. Dieser Ausschlag

erscheint am häufigsten am 9ten oder 10ten Tag nach der Impfung und breitet sich von der Gegend der Impfstelle mehr oder weniger über den ganzen Körper aus. — 7) Die Roseola miliaris. Mit Frieselbläschen verbundene rothe Flecken. Kommt im Typhus vor.

§. 1218.

Die Behandlung der Roseola sei vorzüglich auf das innere Leiden gerichtet. Meistens möchten kühlende Getränke aus reichlich verdünnten Mineralsäuren etc. passen. Eine gegen das Hautleiden unmittelbar gerichtete Behandlung ist nicht nothwendig.

Die Nesselsucht.

(Der Nesselausschlag, Urticaria, Uredo, Exanthema urticatum Burser., Febr. rubra pruriginosa, nach Sauvages.)

Heberden (med. Transact. B. II. und in Comment. de morb. hist. et. cur. p. 151. — *Koch* (lat. Leipz. 1792). — *Wichmann* (Ideen z. Diagnost.).

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 24.

§. 1219.

Die Nesselsucht ist der symptomatische Ausschlag, der in schnell entstehenden und schnell wieder verschwindenden, rundlichen oder striemenartigen, härtlichen, sich nie mit Eiter oder Lymphe füllenden Geschwülsten in der Lederhaut, deren Rücken gewöhnlich weisser, als die Seitentheile und die sie umgebende Haut ist, und welche überhaupt denen Veränderungen in der Haut, die durch die Brennesseln hervorgebracht werden, ähnlich sind (Quaddeln), besteht, und mit heftigem Jucken und Brennen verbunden ist.

§. 1220.

Häufig gehen dem Ausbruch des Nesselausschlages gastrische Affectionen und ein Fieber vorher, und der Ausschlag erscheint unter besonders starkem Brennen und Stechen und mit entzündlicher Röthe um jede einzelne Quaddel (Urt. febrilis W.); in andern Fällen erscheint das Exanthem ohne Fieber, die Haut ist ohne Entzündung und die Quaddeln sind sehr blass, auf ihrem Rücken selbst weisser als die normale Hautfarbe und erscheinen und verschwinden mehreremal den Tag hindurch (Urt. evanida W.); in seltenen Fällen verweilt der Ausschlag eine längere Zeit an ein und derselben Stelle, auf welche er auch meistens beschränkt ist, so dass diese Hautstelle oft zwei und selbst drei Wochen leidend sein kann (Urt. perstans); zuweilen sind die Quaddeln besonders zahlreich und stehen so dicht beisammen, dass sie in einander fliessen und dadurch eine sehr unregelmässige Form erhalten (Urt. conferta W.); manchmal erscheint der Ausschlag nur nach langen Zwischenräumen und dauert jedesmal nur wenige Tage, in der Zwischenzeit empfindet aber der Kranke dasselbe Brennen und Stechen in der Haut, wie wenn der Ausschlag vorhanden wäre (Urt. subcutanea W.), in seltenen Fällen erreichen die Schwielen eine so beträchtliche Grösse, dass sie wie harte Knoten tief in die Muskelsubstanz einzudringen scheinen und eine Contraction der sehnigten Theile mit gänzlichem Unvermögen zur Bewegung und selbst Schmerzen in den Knochen hervorbringen, aber es dauern diese Geschwülste nur wenige Stunden, indem sie meistens zur Nachtzeit entstehen und am Morgen verschwinden (Urt. tuberosa *Will.* u. *Peter Frank*). — Endlich giebt es einen Nesselausschlag mit sehr breiten Quaddeln, welcher von Manchen als eine eigene Ausschlagsart angesehen und unter dem Namen

Essera (Porcellanfieber, Sora, Morbus porcinus) beschrieben wurde.

§. 1221.

Die Dauer des Bestehens des Ausschlages ist in der Regel nur kurz, nur wenige Tage und selbst nur wenige Stunden, doch erscheinen die Nesseln oft nach so kurzen Zwischenräumen von Neuem, dass dieses wiederholte Auftreten nur als *eine* Krankheit angesehen werden kann, welche zuweilen langwierig ist. Das Exanthem verschwindet gewöhnlich ohne alle Abschuppung und meistens ohne kritische Ausscheidungen. Man schreibt dem schnellen Zurücktritt des Nesselausschlages das Entstehen innerer Krankheiten zu, doch ist ein ziemlich schnelles Verschwinden des Exanthems die gewöhnliche Art der Heilung dieser Krankheit.

§. 1222.

Ursachen und Bedeutung. Die Urticaria entsteht oft schnell nach dem Genusse von Austern, geräucherten Fischen, Krebsen, Erdbeeren etc., sie steht oft mit Stockungen im Pfortadersysteme, mit Leberaffectionen, Gicht etc., in Verbindung; meistens liegt übrigens der Nesselsucht kein sehr schweres Leiden zum Grunde und der Ausschlag für sich ist ohne Gefahr.

§. 1223.

Behandlung. Es muss die Diät sorgfältig geordnet werden. Oft leisten Abführungsmittel Nutzen. Im allgemeinen ist eine milde Beförderung der Hautausdünstung zuträglich. Um das Jucken zu mässigen, dienen vorzüglich lauwarme Bäder; auch ist das Waschen des Körpers mit Weingeist empfohlen worden.

Die Hitzblätterchen.

(Schälblätterchen, das rothe Ausfahren, Strophulus, nach Willan.)

Abbildungen von *Will.* u. *Bat.*, Tab. 1, 2 u. 3.

§. 1224.

Die **Hitzblätterchen** sind der symptomatische Ausschlag, welcher in rothen und zuweilen in weisslichen Blätterchen besteht, die etwas grösser als ein Magsaamenkorn sind, ganz oder beinahe ohne Jucken bestehen und vorzüglich bei Kindern vorkommen.

§. 1225.

Die Blätterchen brechen meistens, ohne dass sich dieses durch ein schmerzhaftes Gefühl kund giebt, vorzüglich an den Wangen, dem Rücken der Hände und den Vorderarmen hervor, oft sind sie lebhaft roth, stehen von einander abgesondert und sind mit kleinen erythemartigen Flecken untermischt (St. intertinctus *W.*), zuweilen haben sie eine blässere Farbe (St. albidus *W.*); oft sind die Blätterchen sehr zahlreich zusammengedrängt (St. confertus *W.*, der Zahnausschlag); manchmal entstehen zirkelförmige Flecken und es brechen die Blätterchen truppweise hervor, so dass auf jedem Häufchen bis 12 derselben sich befinden, nach etwa 4 Tagen schuppen sie sich ab, es erscheint aber, so wie ein Fleck verschwindet, in geringer Entfernung davon ein anderer (St. volaticus *W.*). Endlich giebt es Blätterchen, die grösser als die bisher angeführten sind, ohne Entzündung am Grunde, und auf ihrer Oberfläche glatt und glänzend sind, sie erscheinen zerstreut, beinahe nur an den Lenden, Schultern und Oberarmen (St. candidus *W.*). Die Hitzblätterchen füllen sich an ihrer Spitze nur wenig mit einer hellern Lymphe, sie verschwinden in unbestimmter

Zeit wieder unter einer sehr geringen Abschuppung der Epidermis. Der Zurücktritt derselben soll innere Entzündungen, Diarrhoea etc. veranlassen können.

§. 1226.

Diagnose. Die Hitzblätterchen sind kleiner als die Blätterchen der Schwindflechten, des Hautjuckens und der Krätze, weniger conisch als die Schwindflechten und die Krätze, weniger hart, aber in der Regel röther, als die drei genannten Ausschläge und beinahe mit keinen Beschwerden verbunden, während diese Ausschläge stark jucken.

§. 1227.

Ursachen und Bedeutung: Einwirkung starker Sonnenhitze auf die blose Haut, zu warmes Verhalten, der zu reichliche Genuss von Milch, so wie gastrische Reitze verschiedener Art, das Zahnen. — Die Hitzblätterchen für sich sind ein unbedeutendes und leicht wieder verschwindendes Uebel und stehen auch in der Regel mit keinem bedeutenden innern Leiden in Verbindung.

§. 1228.

Behandlung. Ausser der Entfernung der Gelegenheitsursachen hat man hier in der Regel Nichts zu thun. Oefteres Waschen der Haut mit lauwarmem Wasser und lauwarme Bäder werden empfohlen.

Die Schwindflechte.

(Schwindflecken, Hautmoos, der Flug, Lichen nach Willan.)

Abbildungen von *Wilt.* und *Bat.*, Tab. 4 und 5.

§. 1229.

Die Schwindflechte ist der symptomatische Ausschlag, welcher in zugespitzten, meistens etwas röthlichen, ziemlich stark juckenden, weit verbreiteten Knötchen und Blätterchen, ungefähr von der doppelten bis dreifachen Grösse der Hitzblätterchen besteht, die oft verschwinden und leicht wieder kehren, von innern Ursachen abhangen und vorzüglich bei Erwachsenen vorkommen.

§. 1230.

Der Ausschlag bricht meistens nach vorhergegangenen allgemeinen Beschwerden, insbesondere Mattigkeit, gastrischen Erscheinungen, Kopfweh und Fieberbewegungen unter starkem Jucken hervor. Meistens besteht derselbe in einzeln stehenden, mehr oder weniger über den ganzen Körper verbreiteten Knötchen und Blätterchen (L. simplex *W.*), zuweilen sind die Blätterchen statt ausgebreitet zu sein, auf umschriebene Flecken beschränkt (L. circumscriptus), wobei oft die Grundfläche entzündet und schmerzhaft und selbst rissig wird, und sich die Knötchen mit serös-eiteriger Flüssigkeit füllen, die sich ergiesst und Schorfen bildet (L. agrius *W.*). Zuweilen entstehen die Knötchen blos an den Wurzeln der Hauthaare und werden wahrscheinlich durch die Anschwellung der Haarzwiebeln gebildet, aus der Mitte eines jeden Knötchens ragt ein Hauthaar hervor (L. pilaris *W.*). In den heissen Klimaten ist mit dem Exanthem, das in Knötchen und Blätterchen von der Grösse eines Stecknadelknopfes besteht, ein äusserst heftiges Jucken

und ein Stechen verbunden, wie wenn eine Menge von Nadeln in die Haut gestochen würde (L. tropicus *W.*). *Biett* sah die Knötchen zu Gruppen vereinigt, welche wie ein Band von der vordern Seite der Brust auf die innere Seite des Vorderarms und nach dem Verlauf des Nervus cubitalis bis zum kleinen Finger hinzogen (L. gyratus), und *Batemann* beschreibt breitere entzündete, heftiges Brennen erregende Knötchen (L. urticatus). — Zuweilen kommen gleichzeitig mit den Lichen kleine Bläschen, wie im Eczema oder etwas grössere und mit einer eiterartigen Flüssigkeit gefüllte Bläschen, wie im Ecthyma und Impetigo, vor.

§. 1231.

Der Verlauf dauert 1 — 3 Wochen, kann aber auch, indem der Lichen immer von neuem wieder zurückkehrt, sich auf mehrere Monate ausdehnen. Der Ausschlag schuppt sich kleinartig ab und verschwindet gewöhnlich, ohne eine Spur zurückzulassen, doch bleiben manchmal kleine Narben und eine Verdickung der Haut zurück. Der Lichen agrius geht zuweilen in eine chronische Hautkrankheit über, die sich von den Flechten nicht mehr unterscheiden lässt. Durch Metastase soll zuweilen die Krankheit gefährlich werden.

§. 1232.

Diagnose. Die Unterscheidung der Schwindflechten von den Hitzblätterchen und der Krätze ist in den Kapiteln über diese Hautausschläge angegeben, von den Juckknötchen ist dieser Ausschlag dadurch zu unterscheiden, dass die Knötchen in der Regel zugespitzter und röther sind und sich dagegen nicht leicht die schwärzlichen kleinen Krusten vorfinden, und vorzüglich dadurch, dass er leicht verschwindet und wiederkehrt, da jene mehr bleibend sind.

§. 1233.

Ursachen und Bedeutung. Man beschuldigt gastrische Störungen, scharfe und erhitzende Getränke und Speisen, grosse Sonnenhitze, das gichtische und scorbutische Leiden etc. — Der Ausschlag ist zwar beschwerlich, aber nicht leicht Gefahr bringend; er zeigt meistens ein tieferes Leiden als die Hitzblätterchen an, doch ist in der Regel das Allgemeinbefinden ebenfalls nicht im hohen Grade gestört.

§. 1234.

Behandlung. Nebst den Mitteln, die zur Entfernung der Ursachen dienen, wendet man kühlende Getränke, besonders mit Zusatz von Mineralsäuren, kühlende Abführungsmittel, lauwarme Bäder und besänftigende, kühlende Salben an. Der Lichen agrius kann wie die entzündlichen Flechten behandelt werden. Die bei dem Lichen empfohlene Quecksilber-Jod und Arsenikpräparate sind wohl überflüssig.

Die Petechien und grössern Ecchymosen.

(*Peteschen*, *Petechiae*, *Peticulae*, *Purpura Willan.*)

In den zahlreichen Monographien über die Petechien ist nicht sowohl dieser Ausschlag für sich, als das Petechialfieber, das ist entweder das Faul- und das Nervenfieber oder der Typhus, abgehandelt.

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 28, 29 und 30.

§. 1235.

Die **Petechien** sind der symptomatische Ausschlag, welcher in blutrothen und zum Theil ins Schwärzliche gehenden unschmerzhaften Flecken der Haut, die auf

einen Druck mit dem Finger sich nicht verändern und mehr oder weniger deutlich das Ansehen darbieten, wie wenn Blut unter das Oberhäutchen ergossen wäre, besteht.

§. 1236.

Die Petechien kommen meistens erst zum Vorschein, wenn schon einige Zeit eine Krankheit besteht. Häufig ist diese Krankheit ein Fieber, in welchem Falle die Petechien in der Regel nicht an einem bestimmten Tage, wie die eigentlichen fieberhaften Hautausschläge, sondern zu einer unbestimmten Zeit, zuweilen eingestreut zwischen ein schon bestehendes fieberhaftes Exanthem und meistens ohne Erleichterung hervorbrechen. Oft sind die primäre Krankheit ein fieberloses Leiden, insbesondere der Scorbut, und oft gastrische Störungen, bei welchen Affectionen die Petechien und grössern Ecchymosen ebenfalls ohne Erleichterung zu verschaffen sich entwickeln. Die Veränderungen in der Haut bestehen entweder in dunkelbraunen Punkten oder in Flecken von mehr hellrother Farbe und der Grösse eines frischen Flohstiches (von dem sie sich durch den Mangel des Stigma's in der Mitte unterscheiden) oder in Flecken von dunkelblaurother und schwärzlicher Farbe, oder von grüngelblicher und bläulicher Farbe, wie oft die Farbe der Haut nach Contusionen ist, welche oft unter der Grösse eines frischen Flohstiches sind, oft aber sehr ausgebreitet sind und zuweilen in der Form von Striemen (vibices) erscheinen. In seltenen Fällen bildet die Epidermis an

*) *Willan* nimmt vier Arten der Petechien an. Die Purpura simplex, P. haemorrhagica, P. urticans und die P. contagiosa. Die Werlhofische Blutfleckenkrankheit besteht, was die Veränderungen in der Haut betrifft, in Petechien, sie wird aber von mir in dem Kapitel von dem Scorbut abgehandelt werden.

den blutrothen Flecken, genauer betrachtet, kleine Erhöhungen, welche kleine Blutblasen sind.

§. 1237.

Die Dauer des einzelnen Petechialfleckes ist gewöhnlich einige Tage, innerhalb welchen derselbe (auf dem Wege der Resorption) meistens ohne Abschuppung wieder verschwindet, doch bilden sich in der Regel zur gleichen Zeit neue Flecke und die Krankheit wird auf diese Weise zuweilen chronisch. Grössere Ecchymosen haben zu ihrem Verschwinden eine Woche und längere Zeit nothwendig.

§. 1238.

Ursachen und Bedeutung. Die Petechien, welche ihrem Wesen nach in kleinen Blutergiessungen unter die Epidermis bestehen, sind durch zweierlei Krankheitszustände bedingt, entweder durch eine gewisse Auflösung des Blutes und Erschlaffung der Haut oder durch einen heftigen Andrang des Blutes nach der Peripherie und zuweilen auch durch beide Krankheitszustände zugleich; sie kommen vor im Scorbut, im Faulfieber, im Typhus, in der Pest, in den Blattern, dem Scharlachfieber und den Masern, besonders wenn diese Krankheiten den fauligten Character haben, bei Unterdrückung der monatlichen Reinigung, bei Stockungen im Pfortadersystem, gastrischen Reitzen, innern Entzündungen etc. — Die Petechien für sich sind nie lebensgefährlich, zeigen aber meistens ein bedeutendes Kranksein an.

§. 1239.

Die Behandlung der Petechien muss gegen die denselben zum Grunde liegende Krankheit gerichtet sein. Am häufigsten passen die gegen den Scorbut gebräuchlichen Mittel, insbesondere verdünnte Mineralsäuren, zuweilen aber, wenn nämlich die Krankheit von der Unterdrückung einer Blutentleerung herrührt, sind auch

Blutentziehungen angezeigt. Um der Haut mehr Tonus zu geben, dienen Waschungen mit kaltem Wasser oder mit Wasser mit einem Zusatz von Mineralsäuren.

Der Friesel.

(*Miliaria, Exanthema miliare, Purpura.*)

Welsch (lat. Lpz. 1655). — *Salzmann* (lat. Argent. 1736). — *Allioni* (Turin 1758, aus d. Lat. v. Wigand, Mühlhausen 1792 und von Römer, Winterthur 1794). — *Molinari* (lat. Wien 1764). — *Damilano* (Mandov. 1774, aus d. Ital. v. Lentin, Gött. 1782). — *Kreysig* (in Hufeland's Journ., 12ter Bd.). — *Rayer* (Par. 1822). — *Fodéré* (Strassb. 1828).

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 55.

§. 1240.

Der Friesel ist der symptomatische Hautausschlag, der in hirsenförmigen und oft etwas kleinern oder grössern, meistens mit heller Lymphe gefüllten und oft truppweise beisammenstehenden Bläschen besteht, welche meistens ohne ein bedeutendes schmerzhaftes Gefühl in der Haut, aber unter reichlichen Schweissen hervorbrechen und sich in der Regel bald kleienartig abschuppen.

§. 1241.

Verlauf. Der Friesel hat sehr häufig folgende Vorläufer: Angst und Beklemmung mit einem zusammenschnürenden Gefühle in der Herzgrube, Schwindel, Kopfweh, rheumatische Schmerzen, ein Gefühl von Taubsein und selbst Zuckungen. Kommt der Friesel im Gefolge von einem Fieber vor, so erscheint er häufig zu der Zeit, in welcher das Fieber einen bösartigen Character annimmt (ins Nervöse übergeht), beinahe

regelmässig aber bricht der Friesel nur dann aus, wenn sehr profuse sauer- und schimmlich riechende Schweisse vorhanden sind. Oft aber auch entsteht der Friesel ohne so bedeutende Vorgänge bei ziemlicher Unverletztheit des Wohlbefindens nur bei schwitzender Haut und unter dem Gefühl eines ganz leichten, stechenden oder juckenden Schmerzes in der Haut. Gewöhnlich erscheinen die Frieselbläschen truppweise, vorzüglich auf der Brust, aber auch an dem Rücken, den Armen, dem Unterleibe etc. nicht wohl aber im Gesichte, oft sind sie auch mehr gleichmässig allgemein verbreitet. Sie sind meistens so gross, wie Hirsekörner und von einander getrennt stehend, oft fliessen sie aber auch zusammen (M. confluentia) und bilden theilweise grössere Bläschen (der Blasenfriesel). Meistens sind die Bläschen mit einer wässerigen, krystallhellen Flüssigkeit gefüllt (M. aquosa, crystallina) und stehen zuweilen auf einer rothen Hautfläche, wodurch sie selbst roth erscheinen (M. rubra, s. Purpura), doch fehlt meistens diese Röthe (M. alba), oft sind sie auch mit einer milch- oder eiterartigen Flüssigkeit gefüllt (M. lactea, M. purulenta).

Nach dem Ausbruch des Friesels lassen oft die bis dahin bestandenen Krankheitszufälle bedeutend nach, oft aber tritt nach dem Ausbruch des Exanthems keine Erleichterung ein und es verschlimmert sich selbst die Krankheit sehr häufig. Gewöhnlich trocknen die Bläschen in wenigen Tagen ein, worauf sich die Haut kleienartig abschuppt. Tritt der Friesel plötzlich zurück, so können bedeutende Krankheitszufälle entstehen.

§. 1242.

Ursachen und Bedeutung des Friesels. Man hat den mit Fieber vorkommenden Friesel für ein eigenthümliches Fieber, das Ansteckungsfähigkeit besitze (Frieselfieber) erklärt, es scheinen übrigens diese Fieber Fieber anderer Art zu sein, insbesondere Typhus und Scharlach-

fieber, und die Ansteckungsfähigkeit nicht sowohl dem Friesel, als der Krankheit, bei welcher er symptomatisch auftritt, zuzukommen. — Der Friesel kommt in allen *den* Körperzuständen häufig symptomatisch vor, in welchen sehr reichliche Schweisse sich einstellen, besonders wenn sie sauer reagiren, namentlich im Typhus, im Scharlachfieber, in rheumatischen und catarrhalischen Fiebern, bei Kindbetterinnen (bei welchen man denselben, wenn er mit einer weisslichen Lymphe gefüllt ist, *Milchfriesel* nennt, indem man eine Versetzung der Milch annimmt), bei Individuen, die sich durch zu starke Bedeckung im Bette, andauernd starke Körperbewegung bei grosser Hitze der Athmosphäre etc., in starke Schweisse versetzen; auch scheint der Friesel durch gastrische Reitze hervorgebracht werden zu können und auch zuweilen durch Schärfen im Blute zu entstehen, z. B. nach starkem Gebrauche des Sublimates. — Es wird der Frieselausschlag für sich nicht leicht gefährlich, und oft ist derselbe auch in semiotischer Hinsicht beinahe ohne Bedeutung, doch kommt dieses Exanthem sehr häufig in ganz bösartigen Fiebern vor und es ist in denselben im allgemeinen kein gutes Symptom.

§. 1243.

Behandlung. Das Exanthem selbst erfordert in der Regel wenig Berücksichtigung und das ganze Heilverfahren muss gegen die Hauptkrankheit gerichtet werden. Ein zu warmes Verhalten und eine stark schweisstreibende Methode müssen vermieden und dagegen mehr kühlende Mittel gegeben werden, doch muss auch alles das vermieden werden, was ein schnelles Zurücktreten der Lebensthätigkeit aus der Haut herbeiführen würde, also insbesondere Verkältung. — Bei dem immer wiederkehrenden und dadurch mehr chronisch erscheinenden Friesel hat man die sogenannten blutreinigenden und

auch die tonischen Mittel, unter den letztern namentlich die China und das Eisen, innerlich und in Stahlbädern gebraucht, empfohlen.

Die Hitzbläschen.
(*Hidroa und Eczema.*)

Abbildungen des Eczema von *Will.* und *Bat.*, Tab. 55, 56, 57 und 58.

§. 1244.

Unter der Bezeichnung Hitzbläschen kann man die symptomatischen Lymphbläschen verstehen, die in Hinsicht der Grösse zwischen dem Friesel und dem Pemphigus stehen, und auf kleinern oder grössern unregelmässigen Plätzen der Haut angesammelt sich befinden.

§. 1245.

Hieher gehören die im Gefolge von Fiebern, z. B. gastrischen Fiebern und Wechselfiebern, an einzelnen Stellen der Haut, z. B. um die Mundöffnung herum ausbrechenden Bläschen (Hidroa febrile nach *P. Frank*), welche aber auch ohne Fieber, z. B. bei gastrischen Unreinigkeiten vorkommen, und welche ich nach ihrer wahrscheinlichen Entstehungsweise consensuelle Hitzbläschen (Hidroa consensuale) nennen möchte. Aehnliche Bläschen entstehen auch zuweilen auf einen Schrecken, so wie bei hysterischen und hypochondrischen Personen (Hidroa nervosum nach *P. Frank*). Die Bläschen trocknen nach einigen Tagen ein und bilden kleine, noch einige Zeit festsitzende Krusten.

Das Eczema nach *Willan* und *Bateman* besteht in kleinen, auf unregelmässigen und mehr oder weniger entzündeten Stellen der Haut sehr gedrängt stehenden

Bläschen, welche nach einigen Tagen eintrocknen und in Schüppchen oder dünne Grinde übergehen und zuweilen auch kleine Excoriationen veranlassen. Als Spielarten desselben werden angenommen das Eczema solare, welches durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf die entblösten Theile hervorgebracht wird und in Bläschen besteht, die unter stechenden Schmerzen und Jucken auf der etwas angeschwollenen Hautstelle zahlreich sich erheben, mit trübem Serum sich füllen und in kleine Schorfen übergehen. Der gleiche Ausschlag wird auch durch die Einwirkung der Hitze des Feuers, einer sehr heissen und scharfen Lauge beim Waschen etc. hervorgebracht. Ferner das Eczema pharmacorum externorum, welches dem Eczema solare sehr ähnlich ist und durch Pflaster und Salben hervorgebracht wird. Das Eczema impetiginodes bildet sich aus den so eben bezeichneten Arten des Eczemas, wenn die Ursachen nicht aufhören; es bilden sich sodann Krusten, die dem Leibgrind gleichen, aber sich dadurch von ihm unterscheiden, dass hiebei nicht sowohl Eiterbläschen als Lymphbläschen erscheinen. Das Eczema rubrum ist ein Eczem, das unter stärkerem Brennen und Spannen der Haut hervorbricht und bei welchem die Bläschen, die gewöhnlich die Grösse eines kleinen Stecknadelknopfes haben, auf einer lebhafteren Entzündungsröthe stehen. Das Eczema mercuriale endlich, welches sowohl nach dem innerlichen als dem örtlichen Gebrauch des Quecksilbers sich bilden kann, entsteht mit einer erythematösen Röthe, welche sich bei dem von dem innern Gebrauch des Mercurs verursachten Eczem oft in einem einzigen Tag über den grössern Theil des Körpers verbreitet, auf dieser Röthe erscheinen äusserst zahlreiche Bläschen, welche etwas in der Grösse zunehmen, sich mit einem trüben Serum füllen, und in dünne Grinde übergehen und zuweilen auch Excoriationen und Schrunden veranlassen.

§ 1246.

Es erscheinen zuweilen die Hitzbläschen mit Milderung der Zufälle meistens aber ohne dieselbe; sie werden wohl nie gefährlich und sind, wenn die Gelegenheitsursache nicht fortdauert, leicht zu beseitigen.

§. 1247.

Behandlung. Nach Hinwegräumung der entfernten Ursachen verschwinden in der Regel die Hitzbläschen von selbst; von Nutzen sind übrigens eine etwas magere Diät, kühlende Getränke mit etwas Pflanzen- oder Mineralsäure, kühlende Abführungsmittel, lauwarme Bäder, Bähungen und Waschungen der leidenden Theile mit einer Kleienabkochung, einer bittern Mandel-Emulsion, Bestreichen derselben mit frischem Schweinefett etc. Geht der Ausschlag in das Impetiginöse und Herpetische über, so müssen die gegen Impetigo und Herpes wirksamen Mittel in Gebrauch gezogen werden.

Die Eiterblase.

(Blasengrind, Ecthyma nach Willan, Phlyzacium nach Alibert.)

Abbildungen v. *Will.* u. *Bat.* Tab. 43 u. 44, von *Alib.* Tab. 7.

§. 1248.

Das Ecthyma ist ein, bald acutes, bald chronisches, symptomatisches Exanthem, das in dem, unter geringem Jucken erfolgenden Ausbruch von Eiterbläschen von dem Durchmesser von 2 – 3 Linien besteht, die gewöhnlich discret stehen, aber auf einem unregelmässigen Fleck der Haut ausbrechen, ihren Eiter ergiessen und in dicke Borken übergehen.

§. 1249.

Als Arten des Ecthyma's werden angenommen: Die milden Eiterbläschen (Ecthyma mite, vulgare). Es sind dieses kleine mit einem gelblichen Serum gefüllte Bläschen, die nach einigen Tagen platzen und einen gelblichbräunlichen Schorf bilden. Bei Erwachsenen kommen diese Eiterbläschen gewöhnlich nur an den Extremitäten, dem Halse und den Schultern vor, bei Kindern auch im Gesichte und dem behaarten Theile des Kopfes (Ecth. mite infantile). — Die schmutzfarbigen Eiterbläschen (Ecth. luridum). Dieselben sind grössere Blasen als das milde Ecthyma, welche sich auf einem dunkel-gerötheten, schmutzfarbigen, harten Hautplatze erheben. Die in den Bläschen enthaltene Materie ist mit Blut gemischt und es bilden sich Geschwüre, die mit dunkeln, braunen Schorfen sich bedecken. — Die cachectischen Eiterbläschen (Ecth. cachecticum). Dieselben sind dadurch characterisirt, dass immer von neuem Eiterbläschen erscheinen, während andere schon zu Krusten geworden oder schon abgetrocknet sind und dass sich daher der Ausschlag in verschiedener Entwicklung zur gleichen Zeit vorfindet. Die Schorfen sind immer kleiner als die in dem milden und schmutzigen Ecthyma.

§. 1250.

Es wird das Ecthyma hervorgebracht durch scharfen Staub, Einreibungen von scharfen Salben, z. B. Brechweinsteinsalbe, das Auflegen von scharfen Pflastern, Unreinigkeiten der ersten Wege, Geschlechtsausschweifungen und kommt auch vor in Begleitung des Scharlachs, der Blattern, der Krätze, eines cachectischen, insbondere eines scrophulösen Zustandes, vorzüglich bei Kindern und alten Leuten.

§. 1251.

Die **Behandlung** kann sich in der Regel auf die Beseitigung der äussern Ursachen und des dem Ecthyma

zum Grunde liegenden innern Leidens beschränken. Sollten eine etwas starke Entzündung der Haut, festaufsitzende Borken oder Geschwüre eine örtliche Behandlung nothwendig machen, so können die Mittel in Anwendung gebracht werden, die in dem Kapitel von dem Grinde angegeben werden sollen.

Die Schmutzrufe.

(*Rhypia.*)

Abbildungen von *Will.* und *Bat.*, Tab. 53 u. 54.

§. 1252.

Die **Rhypia** besteht in einzeln stehenden abgeflachten Blasen, welche mit einer trüben eiterartigen Flüssigkeit gefüllt sind und in dicke dunkle Rufen übergehen, unter welchen oft etwas Ulceration fortdauert. — Sie kann als eine Modification des Ecthyma's (Ecthyma luridum) angesehen werden.

§. 1253.

Man nimmt folgende Arten der Schmutzrufe an: Die einfache Schmutzrufe (Rhypia simplex). Es ist dieses die so eben beschriebene Veränderung in der Haut, bei welcher die Rufe mehr flach ist. — Die hervorragende Schmutzrufe (Rh. proëminens). Sie wird durch grössere Bläschen gebildet, die in kegelförmig hervorragende Rufen übergehen. — Die brandige Schmutzrufe (Rh. escharotica *W.*, Rh. gangraenosa). Sie scheint das Gleiche, wie der Pemphigus gangraenosus zu sein.

§. 1254.

Ursachen und Bedeutung. Es kommt die Schmutzrufe, besonders die hervorragende, bei alten

cachectischen Individuen vor, bei grosser Unreinlichkeit und Entbehrungen, die einfache Schmutzrufe auch in Folge des Scharlachs der Blattern etc. Die brandige Schmutzrufe kommt zuweilen bei Kindern, besonders während des Zahnens in Folge von Unreinlichkeit, schlechter Nahrung etc. vor. — Es ist die Schmutzrufe schon ein bedeutenderes Leiden, die gewöhnliche und die hervorragende Schmutzrufe werden zwar nicht leicht gefährlich, die brandige ist aber öfters tödtlich.

§. 1255.

Behandlung. Ausser den Mitteln, die zur Beseitigung der entfernteren Momente gebraucht werden müssen, ist nothwendig, unmittelbar gegen das Localleiden gerichtete Mittel anzuwenden. Oft reichen Bähhungen mit einem Chamillenaufguss hin, zuweilen sind, wenn die Vernarbung nicht eintreten will, leichte Cauterisationen mit Höllenstein nothwendig, bei dem Uebergang in den Brand Umschläge von erregenden und antiseptischen Mitteln.

Der Gürtel.

(*Das höllische Feuer*, *Zona*, *Zoster*, *Circinus*, *Ignis sacer*, *Erysipelas Zoster nach Sauvages*; *Erysipel. phlyctaenodes nach Cullen*; *Herpes Zoster nach Willan*).

Wichmann (Ideen zur Diagnost.). — *Behrnauer* (Diss. m. 1 K., Würzb. 1810).

Abbildungen von *Will.* u. *Bat.*, Tab. 50, und von *Alibert*, Tab. 6.

§. 1256.

Der **Gürtel** ist der symptomatische Ausschlag, welcher in truppweise beisammen stehenden und von Entzündungsrändern umgebenen Bläschen besteht, die sich an

irgend einer Stelle des Körpers, wie die Hälfte eines Gürtels, um den halben Theil des Leibes herumziehen.

§. 1257.

Dem Ausbruch des Ausschlags gehen oft verschiedene krankhafte Zufälle, gastrische Erscheinungen, Angst, Gliederschmerzen, Fieber vorher, sodann und auch ohne diese Zufälle zeigen sich unter Brennen und Prickeln rothe Flecken, auf welchen die Bläschen ausbrechen. Meistens, nach *Bietts* Beobachtungen unter 20 mal 19 mal, entsteht der Gürtel auf der rechten Körperhälfte und zwar meistens in dem Raume welcher ein 3 — 4 Finger breites Band einnehmen würde, das man von den Dornfortsätzen der mittlern Rückenwirbelknochen über den untern Theil des Schulterblattes und über die Lebergegend bis zur weissen Bauchlinie hinziehen würde. Hat sich der Ausschlag ausgebildet, so stellt er stahlgraue, ziemlich platte und selbst in der Mitte eingedrückte Bläschen von der Grösse einer Linse bis zu der einer kleinen Bohne dar, welche in der Regel nicht auf einem gemeinschaftlichen entzündeten Grunde stehen, von denen aber jedes einen Entzündungsrand von 1 bis $1\frac{1}{2}$ Linie Breite hat. Indem die Entzündungsränder der Bläschen und zuweilen die Bläschen selbst in einander fliessen, bilden sie mehr oder weniger ein zusammenhängendes Ganze und stellen gewissermassen ein Band dar, das aber viele Stellen in sich enthält, an welchen die Haut die gesunde Beschaffenheit zeigt.

§. 1258.

Die Dauer des Ausschlags beträgt in der Regel nicht viel mehr als 8 Tage. Innerhalb dieser Zeit werden die Bläschen welk, auch zum Theil aufgerissen und es bilden sich bald abschuppende Borken. Meistens bleiben noch einige Zeit Flecken und Schmerz an der ergriffenen Stelle und längere Zeit leichte Narben zurück. Nur selten brechen nach der Abschuppung wiederholt Bläschen aus,

wodurch der Gürtel chronisch werden kann, und in seltenen Fällen hinterlässt der Gürtel Verschwärungen.

§. 1259.

Ursachen und Bedeutung. Es entsteht der Gürtel (der mit Unrecht zum Rothlauf von *S. G. Vogel* und *Richter*, zum Pemphigus von *Hufeland* und zum Herpes von *Willan* gerechnet wurde) oft ohne erkennbares inneres Leiden und ohne eine äussere Ursache; man schreibt ihn häufig Diätfehlern, insbesondere dem Genuss geistiger Getränke und stark gesalzenen Speisen, Verkältung, einem eigenthümlichen Miasma (*Wichmann*) und in einzelnen Fällen einem Ansteckungsstoffe (*Conradi*), so wie auch der gichtischen, scorbutischen und scrophulösen Dyscrasie zu. Mir ist es wahrscheinlich, dass der Gürtel, wie auch das Hidroa consensuale am Munde, vorzugsweise auf eine consensuelle und antagonistische Weise und durch eine eigenthümliche Störung in den Verrichtungen irgend eines innern Organs bedingt sei. Entsteht, wie gewöhnlich, der Gürtel auf der rechten Seite des Körpers und zieht sich derselbe über die Lebergegend hin, so fällt der Verdacht des Ursprungs dieser Krankheit auf ein Leiden der Leber. — Der Gürtel ist immer eine gefahrlose Krankheit.

§. 1260.

Behandlung. Entdeckt man ein inneres Leiden, so suche man dieses zu heben; in der Regel verschwindet übrigens der Gürtel von selbst, und es ist daher zum Zwecke seiner Heilung gewöhnlich keine innere Behandlung nothwendig. Veranlasst der Ausschlag grosse Beschwerden, so kann man Cicutaumschläge verordnen oder die schmerzenden Stellen mit frischem Schweinefett bestreichen lassen, und wenn die Haut stark entzündet ist, selbst einige Blutegel auf die Umgegend des Gürtels setzen lassen.

Der Blasenausschlag.
(*Pemphigus*, *Pemphix*, *Pompholix*.)

Dickson (Samml auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte. B. 13.). — *Christie* (ebendaselbst). — *Wichmann* (Erf. 1791). — *Reil* (Memor. clin., fasc. II.). — *Braune* (mit 1 ausgemalten Kupf. Lpz. 1795). — *Sachse* (in Hufelands Journ. 1825).

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 33. *Alibert.* Tab. 5, und *Braune* im ang. Werke.

§. 1261.

Der **Blasenausschlag** ist der symptomatische Ausschlag, welcher in einzeln stehenden, meistens mit einer hellen, gelblichen Flüssigkeit gefüllten Blasen von der Grösse einer Erbse bis zu der einer Wallnuss oder eines Eies besteht.

§. 1262.

Oft geht dem Ausschlag ein Fieber voraus (Febr. bullosa, Pemph. febrilis), zuweilen gastrische Beschwerden, Krämpfe u. s. w., öfters erscheint er aber auch ohne Vorläufer. Es entstehen, unter Jucken und Brennen, einzelne kleine, erythemartige Flecke; auf jedem dieser Flecke bildet sich ein Bläschen, das in wenigen Stunden von der Grösse einer Erbse, bis zu der einer Kirsche oder einer welschen Nuss wächst und welches bei seiner vollkommenen Ausbildung ganz den Blasen von kleinen Stücken Blasenpflastern erzeugt, gleicht, und meistens einen kleinen, nur $\frac{1}{3}$ - 1 Linie breiten Entzündungsrand hat. Meistens bilden sich an einem bestimmten Körpertheile mehrere, in einer gewissen Entfernung von einander stehende Blasen, zuweilen erscheinen auch zugleich an andern Körpertheilen eine oder einige Blasen, in seltenen Fällen zeigt sich am ganzen Körper nur eine einzige Blase (Pemph. solitarius), welche aber oft eine so bedeutende Grösse erhält, dass sie selbst eine Thee-

tasse voll, meistens wasserheller, Lymphe enthält. Der Inhalt der Blasen bleibt meistens unverändert eine helle, gelbliche Flüssigkeit, doch wird derselbe zuweilen auch ein trübes, milchigtes oder wie mit Eiter gemischtes Wasser. Nach wenigen Tagen werden die Blasen runzlich und vertrocknen ganz und platzen auch zuweilen auf. Die sie bildende Epidermis löst sich sodann los und hinterlässt keine Narben, sondern nur noch einige Zeit einen röthlichen und bläulichen Fleck. Selten bleiben nässende Hautgeschwüre zurück und in seltenen Fällen geht die Hautstelle unter den Blasen in den Brand über.

§. 1263.

Es ist der Ausbruch des Exanthems in der Regel mit keiner bedeutenden Milderung des Allgemeinleidens verbunden, doch erzeugt der Ausschlag auch keine erheblichen Beschwerden, wenn nicht etwa in innern Theilen, namentlich im Munde und der Speiseröhre, gleichfalls Blasen sich bilden. Das Bestehen der einzelnen Blasen ist von kurzer Dauer, doch wird oft die ganze Krankheit, indem immer neue Blasen zum Vorschein kommen, langwierig (Pemph. chronicus).*)

§. 1264.

Ursachen und Bedeutung. Der Pemphigus soll mehr bei Kindern und beim weiblichen Geschlechte, als bei Männern vorkommen, und durch Verkältung, gastrische Unreinigkeiten, insbesondere schleimige und

*) *Willan* trennt den Blasenausschlag in zwei Krankheitsarten: 1) den Pemphigus oder das Blasenfieber, von welchem er drei Modificationen annimmt, den Pemph. vulgaris, den Pemph. contagiosus (welche beide Krankheiten derselbe aber nicht selbst gesehen hat) und den Pemph. infantilis, und 2) den Pompholyx oder fieberlosen Blasenausschlag, von welchem er ebenfalls drei Varietäten beschreibt, den Pompholyx benignus, den Pompholyx duitinus und den Pomph. solitarius.

galligte Stoffe, Störungen in der Harnabsonderung, Gicht, unterdrückte Hautausschläge, insbesondere die Krätze und die Flechten, und durch hysterische Krämpfe (Pemph. nervosus hystericus) veranlasst werden können, auch soll er zuweilen ansteckend sein, doch ist die Ansteckungsfähigkeit desselben nicht erwiesen. Die gestörte Harnabsonderung wird von manchen Aerzten, insbesondere *Braune*, als die Hauptursache des Pemphigus angesehen, und *Haase*[1]) leitet die Krankheit von einem Ueberwiegen der Phosphorsäure in den Säften her, welche meistens in einer unvollkommenen oder aufgehobenen Ausscheidung phosphorsaurer Salze durch den Urin bei Stein- und Gichtkranken begründet sei. — Der Pemphigus, als Hautkrankheit, wird wohl nie gefährlich, doch ist er meistens mit einem geschwächten Zustand des Körpers verbunden und soll zuweilen sehr hartnäckig sein.

§. 1265.

Behandlung. Nach Verschiedenheit der Ursachen hat man bald gastrische Stoffe zu entleeren, bald antihysterische Mittel in Anwendung zu bringen, öfters mögen, beim Ursprung der Krankheit aus Störungen in den Urinwegen, die vielfach gerühmten harntreibenden Mittel nützlich sein, so wie auch die, besonders von *Haase* (wegen der Annahme des Vorherrschens der Phosphorsäure) empfohlenen desoxydirenden Mittel, namentlich die Alkalien und die Schwefelleber, sich in einzelnen Fällen hülfreich bewiesen haben; endlich hat man auch im chronischen Pemphigus die gegen Hautkrankheiten im allgemeinen empfohlenen Mittel in Anwendung gebracht, Quecksilbermittel, Antimonialien, Guajak, Sarsaparill etc.

Eine örtliche Behandlung ist in der Regel nicht nothwendig. Sind die Blasen sehr gross und erregen

1) Handb. B. III. Abtheil. 2. S. 520.

sie ein heftiges Brennen, so kann man sie aufzwicken und die Flüssigkeit entleeren. Ist die Haut sehr empfindlich, so kann man lauwarme Bäder und Bähungen von einer Abkochung von Leinsamen, Malve etc. anwenden, auf geschwürige und entzündete Stellen bringt man etwas Quittenschleim, in Rosenwasser aufgelöst, ein Sälbchen von Eiweiss und süssem Rahm, milde Oele, das Campheröl; nur in hartnäckigen Fällen dürfen Bleiwasser und andere trocknende Mittel in Anwendung gebracht werden.

Das Blutschwär und der Karfunkel.

§. 1266.

Das Blutschwär (Furunculus, Jonthus Furunculus) und der Karfunkel (Carbunculus, Jonthus Carbunculus, Anthrax) entstehen nach Art der Exantheme und müssen daher unter den Hautausschlägen angeführt werden. Sie sind, insofern sie bei sehr verschiedenartigen Krankheiten vorkommen, symptomatische Exantheme, doch giebt es bestimmte Arten von Carbunkeln, welche von den übrigen getrennt und zu den specifischen Hautausschlägen gestellt werden müssen, wie die Pestcarbunkel. Da übrigens das Blutschwär und der Karfunkel chirurgische Hülfe erfordern und in den Lehrbüchern über die Chirurgie abgehandelt werden, so will ich hier die Beschreibung derselben und die Angabe ihrer Behandlung übergehen.

Die Schwämmchen.

(Mehlhund, Mehlkruste, Voss, Fasch, Soor, Mundsöhr, Kurvos, Aphthae.)

Ketelaer (lat. Leiden 1672). — *Stark* (nebst einer Uebersetzung v. Ketelaer's und Slevogt's Abhandl. Jena 1784). — *Arnemann* (lat. Gött. 1787). — *Lentin* (Beiträge z. ausüb. Arzneiwissensch. B. I.). — *Lélut* (Répert. gén. d'anat. et de physiol., pathologie et de chirurgie. Paris 1827, ausgezogen in den klin. Kupfertafeln, Weimar 1828). — Ausserdem die Schriftsteller über die Kinderkrankheiten.

§. 1267.

Die Schwämmchen sind kleine, weissliche, etwas zugespitzte, bläschenartige Erhabenheiten, welche auf der innern Fläche der Lippen, am Zahnfleisch, an der Zunge, in der ganzen Mundhöhle, und zuweilen auch im Darmkanal ausbrechen, auf einem dunkelrothen, entzündeten Grunde sitzen, schnell in schwammige, weisse Borken übergehen und sodann sich gewöhnlich nach einigen Tagen abschuppen.

§. 1268.

Oft brechen die Schwämmchen ohne vorhergegangenes Unwohlsein aus, zuweilen gehen ihnen gastrische Affectionen und auch Fieber voran. Im Anfange sind es nur wenige Bläschen und weissliche Borken, bei weiterm Fortschreiten des Uebels aber werden die Zunge, die innere Seite der Lippen etc. dicht mit weisslichen Borken bedeckt. Die Kinder (bei welchen die Krankheit am meisten vorkommt) saugen nun nicht mehr gehörig, indem sie wohl die Brustwarze ergreifen, aber schnell wieder los lassen, auch ist das Schlingen erschwert und die Kranken empfinden einen brennenden Schmerz in der Mundhöhle, welche auch heiss und trocken wird. Waren ursprünglich auch keine gastrischen Affectionen vorhanden, so gesellen

sich solche nunmehr hinzu, Erbrechen von saurem Magensaft, Empfindlichkeit der Magengegend, Koliken, Durchfälle. Zuweilen wird auch die Stimme heiser und es stellen sich selbst Schluchzen und Zuckungen ein.

Gewöhnlich schuppen sich die Schwämmchen in wenigen Tagen ab, ohne dass so bedeutende Zufälle erregt worden sind; die hautartigen, weisslichen Borken stossen sich los und es bleibt nur noch einige Zeit eine rothe, empfindliche Stelle zurück. Den Tod können die Schwämmchen herbeiführen durch Erschöpfung der Kräfte, vermittelst der durch sie bewirkten Durchfälle, des Erbrechens und der allmähligen Abmagerung, wie auch durch den Uebergang in den nervösen und putriden Zustand, wobei sie eine dunkle und selbst schwarze Farbe annehmen. Zuweilen tödten sie auch durch Erregung von Zuckungen.

§. 1269.

Anlage haben vorzüglich Kinder in dem ersten Lebensjahr. Gelegenheitsursachen sind bei Kindern vorzüglich Unreinlichkeit, insbesondere vernachlässigte Reinigung des Mundes, das beständige Liegenlassen der Schlutzer in dem Munde, das Liegenlassen des Kindes an der Brust der Mutter, wenn dasselbe auch nicht trinkt, z. B. im Schlafe, vernachlässigtes Wechseln der Wäsche, ferner zu reichliche Darreichung von Nahrungsmitteln und Darreichung schlechter Nahrungsmittel, z. B. geronnener Milch, Fehler in der Verdauung, Säure des Magensaftes, Zurückhaltung des Kindspechs, gehemmte Ausdünstung, die Atrophia neonatorum, bei Erwachsenen die Lungenschwindsucht, und zuweilen auch die Lustseuche und die Wassersucht. Auch besitzen die Schwämmchen eine Art Ansteckungsfähigkeit, doch wie es scheint nur bei einer besondern Anlage zu dieser Krankheit, so dass der übertragene Stoff vielleicht nur

wie andere unreine Stoffe, die die Krankheit hervorzubringen vermögen, wirkt.

§. 1270.

Vorhersage. Die Schwämmchen sind in der Regel keine gefährliche Krankheit und meistens leicht zu beseitigen. Nur bei fortdauernder Ursache werden sie hartnäckig und zuletzt tödtlich. Kommen sie bei Erwachsenen im Gefolge anderer Krankheiten vor, so sind sie meistens ein schlimmes Zeichen.

§. 1271.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Vorzüglich muss für Reinlichkeit und eine nicht zu reichliche, aber gute Nahrung gesorgt werden. Man kann die Schwämmchen oft schon dadurch verhüten, dass man dem Kinde jedesmal nach Darreichung der Brust oder anderer Nahrung den Mund mit einem in frisches Wasser getauchten reinen Leinwandläppchen reinigen lässt. Der Mehlbrei muss gut ausgekocht sein. Leidet die Mutter oder Amme an Flechten oder einer andern, die Milch verderbenden Krankheit, so muss eine andere Amme genommen werden. Gegen Säure des Magensaftes, Verstopfung etc. müssen die geeigneten Mittel in Anwendung gebracht werden.

§. 1272.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Ist der Grund, auf welchem die Bläschen und Borken sitzen, stark entzündet, so dienen Oelmixturen, Mundsäftchen mit arabischem Gummi oder mit Quittenschleim. Ist dieses weniger der Fall, so passen sanftes Einreiben von gepulvertem Zucker und noch mehr Bestreichen der krankhaften Stellen mit Rosenhonig, Honig, oder Maulbeersyrup, rein oder mit Zusatz von Borax (Nro. 71), und wenn dieses nicht genügen sollte, von verdünnter Schwefel- oder Salzsäure (zu 10 — 20 Tropfen zu einer Unce Saft), oder von Alaun oder Zinkvitriol

(von ersterem zu 1 Scrup. bis zu $^1/_2$ Drachm. und von letzterm 10 Grane als Zusatz zu derselben Menge von Saft). Sind die Schwämmchen missfarbig, so wählt man vorzüglich die genannten Mineralsäuren, so wie auch Chlor, und setzt auch den genannten Säftchen etwas Chamillen- oder Chinaextract zu und wendet auch Mundwasser von einem Aufguss von Salbei, Raute etc. an. Vermuthet man, dass auch Schwämmchen im Darmkanal sich befinden, so kann man von den genannten Mitteln kleine Portionen schlingen lassen, jedoch nicht wohl, oder nur mit besonderer Vorsicht, von dem Safte mit Zinkvitriol.

§. 1273.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Sind Koliken und Durchfälle vorhanden, so wendet man einhüllende und besänftigende Mittel, namentlich Mixturen mit arabischem Gummi und Opium an, seltener passen gegen die Durchfälle die tonischen Mittel.

Zweite Gruppe der symptomatischen Ausschläge.

Die festwurzelnden symptomatischen Hautausschläge.

Die Finnen.

(*Vari*, *Acne*, *Jonthus Acne.*)

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 62, 63, 64 u. 65, und *Alib.* Tab. 28, 29 und 30.

§. 1274.

Die Finnen sind harte, entzündete, mehr oder weniger zugespitzte Knoten in der Haut (entzündete

Schmierbälge) von dem Durchmesser von 1 — 3 Linien, die meistens an der Spitze sich mit etwas Eiter füllen, jedoch selten zu vollkommenen Pusteln werden und oft verhärten.

§. 1275.

Am häufigsten kommen die Finnen im Gesichte vor, besonders an der Stirne, in der Schäfengegend und an der Nase, doch öfters auch am Halse, auf der Brust etc. Es stehen die Finnen immer von einander getrennt, doch sind sie oft sehr zahlreich, so dass sie oft das Gesicht sehr entstellen; zwischen denselben befindet sich häufig eine grosse Menge von den sog. Mitessern, welche auch zuweilen in den Finnen selbst zu bemerken sind und das Gesicht ist oft fettig-glänzend. Es haben die Finnen entweder eine mehr arteriell rothe Farbe und gehen auch schneller in Eiterung über, etwa in 8 Tagen, (Acn. simplex) worauf sie allmählig verschwinden, wiewohl immer neue zum Vorschein kommen, oder sie haben eine mehr ins Violette gehende Farbe, sind sehr hart, eitern nur sehr langsam und wenig, und stellen mehr unverändert bleibende Knoten dar (Acn. indurata). An der Spitze erhalten die Finnen nach dem Aufbrechen derselben einen kleinen Schorf. Auf das Allgemeinbefinden hat der Ausbruch der Finnen in der Regel keinen sichtbaren Einfluss.

§. 1276.

Als eine besondere Modification der Finnen kann der Kupferhandel angesehen werden (Kupfergesicht, Kupfernase, Acne rosacea, Erythema ros., Gutta ros., Phoenigmus Ploucq.). Es wird im Anfange nur nach der Mahlzeit und dem Genuss geistiger Getränke die Nase oder eine andere Stelle des Gesichtes sehr roth, es wird aber diese Röthe, die oft ins Violette geht, allmählig bleibend, es zeigen sich überfüllte venöse Gefässchen und es entstehen auf derselben oft sehr zahlreiche Finnen,

wobei die Nase allmählig um ein Bedeutendes an Umfang zunimmt. Bei langer Dauer der Krankheit erhält oft der grösste Theil des Gesichtes eine ähnliche Beschaffenheit. Nur selten verschwindet dieses Uebel allmählig ganz, doch wird es oft um Vieles geringer, nimmt aber sodann, besonders nach erneuerter Einwirkung der Gelegenheitsursachen, wiederum zu.

§. 1277.

Zu den Finnen gehört auch der **Feigenausschlag** (Sycosis, Jonthus Sycosis), welches Haufen von Finnen im Barte (Sycosis menti, Mentagra) oder zwischen den Kopfhaaren sind (Sycosis capillitii).

§. 1278.

Endlich werden auch die sog. **Mitesser** (Acne punctata *W.*) zu den Finnen gerechnet, sie sind aber nicht sowohl, wie die Finnen, Entzündungen der Schmierbälge, als ein anderes Leiden derselben, welches sich in der Regel nur dadurch ausspricht, dass die Masse, welche in den Hautbälgen enthalten ist, fester wird und an dem der Luft zugekehrten Ende braun oder schwärzlich wird und sich in Form eines Würmchens herausdrücken lässt. Es kommen die Mitesser vorzüglich an den Nasenflügeln, am Kinn und an den Schläfen vor, aber auch an andern Stellen des Gesichtes und am Körper. – Zwischen den Mitessern entstehen oft kleine, zugespitzte, weisse, den Hirsekörnern ähnliche Erhabenheiten, die mit einer weissen Schmiere gefüllt sind, die in der Regel lange unverändert stehen bleiben (die Hautgrütze, Comedo Milium).

§. 1279.

Ursachen. Die Anlage zu den Finnen ist oft erblich. Die einfachen Finnen kommen besonders bei jungen Leuten zur Zeit des Mannbarwerdens vor und werden oft bei sonst ganz gesunden und kräftigen Individuen angetroffen. Vorzügliche Ursachen der Finnen sind übrigens Geschlechtsausschweifungen, zu reichlicher Genuss

geistiger Getränke, Stockungen im Pfortadersysteme, Fehler in der Gallenabsonderung, Gicht, Scropheln, die Lustseuche, Flechten etc.

Der Kupferhandel insbesondere ist am häufigsten die Folge von einem fortgesetzten starken Genuss der Spirituosa, doch auch oft von Stockungen im Pfortadersysteme etc.

Die Mitesser kommen am häufigsten bei scrophulösen Individuen und atrophischen Kindern (daher ihr Name) vor, doch auch oft bei wohlgenährten und dem Anscheine nach vollkommen gesunden Personen.

§. 1280.

Vorhersage. Die bei jugendlichen Individuen vorkommenden Finnen verschwinden oft von selbst, zuweilen nach dem Heurathen. Oft ist der Ausschlag sehr schwer zu heben und selbst unheilbar.

§. 1281.

Behandlung. Auch bei diesem Ausschlag muss vorzüglich auf Entfernung der Gelegenheitsursachen hingewirkt werden, insbesondere muss sich der Kranke des Genusses der geistigen Getränke möglichst enthalten. Ist bei den Finnen und dem Kupferhandel die Haut stark entzündet, so leisten das Bestreichen derselben mit frischem Schweinefett und auch Bähungen mit milden Flüssigkeiten oft sehr gute Dienste. Bei dem Kupferhandel kann man selbst Blutegel in die Umgegend der kranken Hautstelle setzen lassen. Ausserdem sind empfohlen worden: Waschungen mit Schwefelwasser, verdünnter Benzoetinctur, Auflösungen von Borax, Kali carbonicum, Hydrargyrum muriaticum corrosivum, Blei, Essig etc., so wie das Bestreichen mit dem Unguentum Hydragyri praecipitati albi, oder Salben mit Schwefel, Graphit, Blei, Zink etc. Auch sind ableitende Mittel gerühmt worden, namentlich Fontanelle und das anhaltende Tragen von grünem Wachstaffent unter den Fusssohlen. In be-

deutenden Fällen kann man auch den innerlichen Gebrauch der hautreinigenden Mittel zu Hülfe ziehen.

§. 1282.

Die Mitesser entfernt man, wenn sie nur in geringer Zahl vorhanden sind, am besten durch das Ausdrücken derselben. Zur Entfernung derselben und zur Verhinderung ihrer Entstehung zeigen sich ferner nützlich: warme Bäder mit Seife, Waizen, Salz, aromatischen Kräutern, das Reiben der Haut im Bade mit wollenen Tüchern und ein solches Reiben der Haut im Bade, nach vorhergegangener Bestreichung des Körpers mit Honig oder mit einer Salbe von Honig, Mehl und Bierhefe etc.

Die Juckknötchen.

(Juckblätterchen, das Hautjucken, Pruritus, Prurigo, W.)

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 6.

§. 1283.

Die **Juckknötchen** sind der symptomatische Ausschlag, welcher in ziemlich flachen Knötchen von der Farbe der Haut und der Grösse eines kleinen Stecknadelknopfes, die mit heftigem Hautjucken verbunden sind, abgekratzt kleine, schwarze Krusten bilden und chronisch sind, besteht.

§. 1284.

Zuweilen gehen dem Ausschlag innere Störungen, namentlich gastrische Affectionen vorher. Das Uebel erscheint in verschiedenem Grade der Heftigkeit. Oft sind, besonders bei jugendlichen Individuen, die Knöthchen ziemlich klein, weich und in geringerm Grade

juckend (Pr. mitis W.), oft sind die Knötchen breiter und versteckter und sehr heftig juckend, und erregen zugleich das Gefühl, wie wenn kleine Inseckten auf der Haut hinkröchen und die Haut mit Nadeln gestochen würde (Pr. formicans W.), besonders heftig und hartnäckig ist das Uebel bei alten Leuten, bei welchen die Haut oft sehr uneben und wie granulirt erscheint (Pr. senilis *W.*). Der Ausschlag und das Hautjucken sind entweder über verschiedene Theile des Körpers verbreitet oder haben nur an beschränkten Stellen ihren Sitz, wie die Prurigo podicis, Pr. scroti, Pr. praeputialis, Pr. urethralis, Pr. pudendi muliebris etc.

§. 1285.

Die Krankheit ist langwierig, besonders die Pr. senilis, welche meistens bleibend ist. Der Ausschlag verschwindet ohne Spuren zurückzulassen. Er soll zuweilen in Krätze übergehen und durch Versetzung auf innere Theile bedeutende Zufälle hervorbringen können.

§. 1286.

D i a g n o s e. Die Juckknötchen sind oft schwer von den Schwindflechten und der Krätze zu unterscheiden.*)

§. 1287.

U r s a c h e n und B e d e u t u n g. Schlechte Speisen, namentlich sehr gesalzene Speisen und Seefische, Unreinlichkeit, Gemüthsbewegungen, Störungen in den Harnwerkzeugen, Stockungen im Pfortadersysteme, Hämorrhoiden, scheinen den Ausschlag hervorbringen zu können; meistens ist übrigens das Allgemeinbefinden nicht sehr gestört. — Das Uebel ist oft sehr hartnäckig, beschwerlich, wird aber nicht wohl Gefahr bringend.

§. 1288.

B e h a n d l u n g. Gegen das Hautjucken dienen, nebst der Berücksichtigung der Gelegenheitsursachen, verdünnende, einhüllende und kühlende Getränke von einer

*) Vergl. die Kapitel über die beiden genannten Ausschlagsformen.

Eibischabkochung, Mandelmilch, Molken, Auflösung von Weinsteinrahm, schweiss- und urintreibende Mittel und vorzüglich örtliche Mittel, wie lauwarme Waschungen mit schleimigen Dingen, lauwarme Bäder, mildernde Salben, mit Vorsicht gebrauchte kalte Waschungen, das Seebad etc. — Da *Willan* in einem Falle von Prurigo senilis viele kleine Insekten auf der Haut des Kranken wahrnahm, so wandte er Waschungen von einer Sublimatsolution an, was einen günstigen Erfolg hatte.

Die Hautkleie.

(*Der Kleiengrind, Pityriasis, Furfuratio.*)

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 15, und *Alib.* Tab. 23.

§. 1289.

Die Hautkleie ist der symptomatische Ausschlag, der sich ausser einiger Veränderung in der Farbe der Haut allein unter der Form einer fortdauernden, oft sehr reichlichen und unter geringem Jucken erfolgenden, kleienartigen Abschuppung einzelner Hautstellen darstellt.

§. 1290.

Gewöhnlich bemerkt man keine sichtbare Hautentzündung, nur zuweilen ist die Haut an der leidenden Stelle etwas geröthet (Pit. rubra W.), meistens ist sie aber auch rauh und trocken, zuweilen nimmt sie eine bunte, scheckige Färbung an (Pit. versicolor. W.). Es entsteht die Abschälung der Epidermis ohne Vorhandensein von Blätterchen, Bläschen oder Geschwürchen, nur sondert der leidende Theil der Haut zuweilen eine scharfe und stinkende Feuchtigkeit ab. Die Epidermis löst sich in kleinen, kleien- und mehlartigen Schüppchen los, die meistens in grosser Menge immer von neuem erzeugt

werden. Befinden sich die Hautkleien in den behaarten Theilen (Pit. capitis W.), was sehr häufig der Fall ist, so gehen zuweilen die Haare verloren. Meistens ist der Kleiengrind mehr bleibend, zuweilen auch schneller vorübergehend; auch hat man denselben mit den Jahreszeiten wechseln und namentlich im Herbste und Frühjahr zurückkehren gesehen.

§. 1291.

Ursachen und Bedeutung. Häufig kann man keine Veranlassung der Hautkleie entdecken, öfters entsteht dieselbe von scharfen Waschmitteln, scharfem Haarpuder, der Einwirkung der Sonnenstrahlen, dem Missbrauch geistiger Getränke, oft auch aus einem veralteten, flechtenartigen Uebel, Scropheln, Gicht und Lustseuche. — Das Uebel wird wohl nie gefährlich, ist aber oft schwer zu beseitigen.

§. 1292.

Behandlung. Die Schuppen müssen fleissig durch Bürsten des Kopfes und mildes Reiben der Haut entfernt werden. Ist die Haut empfindlich oder selbst geröthet, so muss man sie mit milden Dingen, wie frischem Schweinefett, Oleum Hyoscyami, süssem Rahme etc. bestreichen, mit milden Waschwassern waschen, auch kalte Waschungen und Bäder anwenden, und auch mit Vorsicht Bleisalben, Bleiwasser etc. zu Hülfe ziehen. Ist die Haut mehr in einem torpiden Zustande, so kann man Waschungen mit Seifenwasser, Sublimatwasser etc., Salben mit weissem Präcipitat und sämmtliche bei den Flechten gebräuchlichen Mittel in Anwendung bringen, so wie auch in hartnäckigen Fällen die innerlichen, gegen flechtenartige Uebel nützlichen Mittel in Gebrauch gezogen werden können.

Der Leibgrind.
(*Grindflechte, Impetigo Willan.*)

Abbildungen von *Will.* u. *Bat.* Tab. 34, 35 u. 36. Ueber die Milchkruste und den räudigen Ansprung. die Abbildungen v. *Will.* u. *Bat.*, Tab. 37, 38 u. 42.

§. 1293.

Der **Leibgrind** ist der chronische, symptomatische Ausschlag, der in dem Ausbruch von Eiterbläschen besteht, die auf einer entzündeten Grundfläche sich bilden und in dicke, gelbliche, festaufsitzende Grinde übergehen.

§. 1294.

Es entstehen unter heftigem Jucken ein oder mehrere getrennt stehenbleibende oder zusammenfliessende, rothe Flecken, die oft auch zu einer stärkern, rothlaufartigen Entzündung werden, und auf welchen dicht beisammenstehende Eiterbläschen ausbrechen. In zwei bis drei Tagen öffnen sich diese Bläschen und ergiessen den Eiter, der nun trocknet und zu einem dicken, gelblichen, leicht zerreiblichen Grinde wird. Indem der eiterartige Ausfluss immer fortdauert, werden die Grinde dicker, gelbgrünlich und erhalten eine unregelmässig runde Gestalt (Impetigo figurata W.). Zuweilen werden die Krusten so dick, dass sie den Baumrinden gleichen (Imp. scabida W.). Indem im Umkreise des Grindes neue Pusteln entstehen, wächst der Grind oft zu einem bedeutenden Umfang. Zuweilen sind die Eiterbläschen nicht auf die angegebene Weise zusammengruppirt, sondern sind mehr einzeln über den Körper zerstreut, gehen aber ebenfalls in dicke, kleienartige Grinde über (Imp. sparsa W.). Zuweilen gesellen sich zu dem Grinde eine bedeutende Hautentzündung und

Fieber hinzu (Imp. erysipelatodes W.). Manchmal entstehen auch ausgebreitete Eiterungen, die Nägel werden zerstört und es entwickelt sich zuletzt Wassersucht.

Die Krankheit kommt zur Heilung, indem keine neue Eiterbläschen sich bilden und auch unter den Krusten die Eiterung aufhört, worauf auch die Kruste abfällt und nur noch einen röthlichen Flecken zurück lässt. In den günstigern Fällen kann die Krankheit in 3 bis 4 Wochen ein Ende erreichen, in der Regel wird sie aber langwierig und kann eine ganz unbestimmte Zeit dauern.

§. 1295.

Zur Impetigo muss die **Milchborke** (Milchgrind, Ansprung, Sägesprünge, Crusta lactea, Lactumen infantum, Tinea faciei, Porrigo larvalis Willan) gerechnet werden.

C. Strack (lat. Frankf. a. M. 1779, aus dem Lat. von Weitz, Weimar 1788). — *Wichmann* (Ideen z. Diagnost. B. 2).

Es besteht dieser Ausschlag in Bläschen, die unter geringem oder auch stärkerm Jucken auf einem etwas entzündeten Grunde im Gesichte hervorbrechen, eine zähe, mehr oder weniger eiterartige Flüssigkeit ergiessen, und in Krusten übergehen, die der am Feuer eingetrockneten Milch ähnlich sind. Es erscheint der Ausschlag vorzüglich am Kinn, den Wangen und der Stirne, überzieht aber allmählig, indem immer neue Bläschen hervorbrechen und in Krusten übergehen, oft den grössten Theil des Gesichtes und dehnt sich selbst über den Hals und die Brust aus. Diese Krusten bleiben oft mehrere Monate und selbst ein Jahr lang stehen, wobei oft einzelne abfallen und neue sich bilden, endlich stossen sich die Krusten los und es schält sich die Epidermis wiederholt ab, worauf aber keine Narben zurückbleiben. Der Uebergang in Gesundheit soll oft

unter dem Abgang eines trüben, milchigten Urins erfolgen, der den Geruch des Katzenharnes hat.

§. 1296.

Von der Milchborke unterscheidet man den räudigen Ansprung (Crusta serpiginosa nach Wichmann), welcher übrigens mehr den Flechten, als dem Grinde angehört. Es brechen hier statt Eiterbläschen mehr Lymphbläschen aus, die ein heftiges Jucken veranlassen und eine scharfe Feuchtigkeit ergiessen, die die Theile, auf welche sie fliesst, in Entzündung versetzen und zur Erzeugung neuer Bläschen Veranlassung geben. Es bildet die ausgeschwitzte Lymphe keine so dicken Grinde, wie die Milchkruste, sondern dünnere Schuppen, die sich auch leicht lostrennen, so dass an vielen krankhaften Stellen die Haut nicht davon bedeckt ist, sondern roth, wund und nässend erscheint. Es breitet sich der räudige Ansprung oft über den grössten Theil des Gesichtes, namentlich auch über die Augenlieder aus, die die Milchborke nicht ergreift. Zuweilen dehnt sich der Ausschlag über den grössten Theil des Körpers aus. — Die Krankheit kann Jahre lang dauern und zuletzt allgemeine Schwäche, Abmagerung und ein Zehrfieber veranlassen.

§. 1297.

Die Ursachen des Leibgrindes sind nicht alle hinreichend bekannt. Oft wird das Uebel nur durch äussere Schädlichkeiten, wie Kalk, Metallstaub etc., veranlasst. Kinder beim Zahnen und Frauen in den klimakterischen Jahren leiden öfters an diesem Ausschlag. Häufig ist er bei scrophulösen und andern dyscrasischen Leiden, auch scheint er durch Ausschweifungen und Gemüthsaffecte hervorgebracht werden zu können und entwickelt sich auch zuweilen im Gefolge von andern Ausschlägen.

Die Milchborke befällt besonders Kinder in dem

ersten Lebensjahr. Als Ursache derselben werden vorzüglich die Scropheln, eine zu alte und dicke Ammenmilch, Ueberfütterung, Säure, Verschleimung der ersten Wege, grosse Vollsaftigkeit des Kindes und auch ein eigener Ansteckungsstoff beschuldigt.

Der räudige Ansprung kommt vorzüglich bei Kindern vor, die schon an der Krätze oder an einem syphilitischen Uebel gelitten haben oder deren Eltern oder Amme mit Krätze, Flechten, Syphilis oder einem andern unreinen Leiden behaftet sind oder es wenigstens waren.

§. 1298.

Vorhersage. Die Impetigo wird nicht leicht gefährlich, ist aber langwierig und oft sehr hartnäckig. — Die Milchborke wird niemals tödtlich und verschwindet mit der Zeit von selbst. — Der räudige Ansprung ist sehr hartnäckig und kann selbst Gefahr bringend werden.

§. 1299.

Behandlung. Es sind sowohl diejenigen Mittel in Anwendung zu bringen, die zur Beseitigung der der Impetigo zum Grunde liegenden Krankheit erforderlich sind, namentlich oft die gegen Scropheln dienlichen Mittel, als auch solche, welche die hier schon etwas bedeutendere Hautaffection erfordert. Ist der Hautfleck, auf welchem der Grind sich gebildet hat, in einem gereitzten und entzündeten Zustand, so ist es zuweilen selbst nothwendig, Blutegel in den Umkreis der kranken Stelle zu setzen, in der Regel genügt es aber, ihn mit einem mit frischem Fett bestrichenen oder in ausgelassenes Fett getauchten Leinwandläppchen bedecken zu lassen oder mit Fett, Oel, süssem Rahm etc. bestreichen zu lassen, oder besänftigende Bähungen, Bäder, den Wasserdampf etc. in Anwendung zu bringen. Vorzüglich empfohlen werden auch Waschungen mit Blausäure, mit Wasser verdünnt und dem Zusatze von essigsaurem

Blei und etwas Alkohol. Auch können bei Hartnäckigkeit des Uebels Blei- und Zinksalben angewandt werden. Ist die Haut weniger entzündet, so wendet man Schwefelbäder, Quecksilbersalben u. s. w. an. Genügen diese Mittel nicht, so muss man die Stelle mit einer Mineralsäure, besonders Salzsäure, oder einer Auflösung von salpetersaurem Silber cauterisiren, oder ein Blasenpflaster auf dieselbe legen. In den schlimmsten Fällen hat man den Arsenik äusserlich angewandt. — Als innerliche Mittel hat man zum Theil Abführungsmittel, zum Theil die gewöhnlichen hautreinigenden Mittel empfohlen, namentlich die Antimonialien, die Quecksilbermittel und das Zittmännische Decoct.

§. 1300.

Bei der Behandlung der Milchborke ist es von der grössten Wichtigkeit, die Diät des Kindes und die der Amme auf eine angemessene Weise zu ordnen, so wie auch der krankhaften Säure des Magensaftes, den Scropheln etc. entgegenzuwirken. Im allgemeinen finden übrigens bei der Milchborke die gegen die Impetigo gebräuchlichen Mittel nach den nämlichen Anzeigen ihre Anwendung, nur möchten die stärkern äusserlichen und innerlichen Mittel, wie das Cauterisiren und die äussere Anwendung des Arseniks, so wie der innerliche Gebrauch der Antimonialien, der Quecksilbermittel und des Zittmännischen Decoctes nicht nothwendig sein, dagegen sind vorzüglich im Gebrauch die Herba Jaceae (von *Stark* empfohlen, zu einer halben bis ganzen Drachme des frischen oder des getrockneten Krautes mit 3 — 4 Uncen Milch oder Wasser gekocht, morgens und Abends genommen, oder jüngern Kindern esslöffelvollweise den Tag über gegeben, so wie auch das Pulver zu 10 — 15 Grane mehrmal des Tages unter den Brei gemischt oder mit Syrup gegeben) und die Schwefel-

mittel innerlich und in Bädern in Anwendung gebracht. — Bei dem räudigen Ansprung müssen zuweilen Quecksilber- und Antimonialmittel zu Hülfe gezogen werden.

Die Flechten.

(*Herpes, Serpigo.*)

De Roussel (lat. Cadom. 1779. — *Poupart* (a. d. Franz. 1784, übers. v. Conrad, Strassb. 1785). — *Tilesius* (Lpz. 1802, mit 1 K.). — *Alibert* (Dict. des sciences méd. Par. 1814. Tom. 8.).

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 9 bis 14, und 49 bis 52, und *Alib.* Tab. 23 bis 27, und Tab. 34.

§. 1301.

Die **Flechten** sind der fieberlose und meistens chronische Hautausschlag, welcher in beissenden und juckenden, entzündeten Hautflecken besteht, die vermittelst Bläschen und auch ohne dieselben eine scharfe, seröse Feuchtigkeit ausschwitzen und sich mit Schuppen bedecken.

§. 1302.

Unter dem Namen Flechten sind von vielen Aerzten beinahe alle chronische, sich vorzüglich durch Schuppenbildung characterisirende Hautausschläge begriffen worden, von *Willan* aber nur eine bestimmte, mit Bläschen bezeichnete Form von Ausschlag. Zu den Flechten der ältern Aerzte gehören die Pityriasis, zum Theil der Lichen (namentlich Lichen agrius), zum Theil das Eczema, Ecthyma, Rhypia, Impetigo, der Herpes und die Psoriasis nach *Willan*. Es hat diese ältere Darstellungsweise den Vortheil, dass nicht wegen einer, oft wie es scheint zufälligen Verschiedenheit in der Beschaffenheit des Exanthems, diejenigen Veränderungen in der Haut von

einander getrennt werden, die in ein und derselben Art von Störung im Körper wurzeln, doch hat man allerdings zu verschiedenartige Krankheitsformen, die doch auch nicht ganz dieselbe Bedeutung haben, unter *einem* Namen begriffen. *Willan* auf der andern Seite begieng den Fehler, dass er ganz allein die Form der Hautveränderung berücksichtigend, Hautkrankheiten von den Flechten trennte, die vorzugsweise diese Krankheitsart darstellen, und Ausschläge unter denselben begriff, die nicht zu ihnen gehören, da sie das vorzügliche, von Alters her angenommene und durch das Wort Herpes (von ῥεπω kriechen) schon bezeichnete Merkmal der Flechten, das langsame Umsichfressen, gänzlich entbehren und vielmehr schnell vorübergehende, meistens in Begleitung von Fiebern auftretende Exantheme sind, wie z. B. der Herpes Zoster nach *Willan*.

§. 1303.

Als die beiden Hauptmerkmale der Flechten glaube ich die meistens in kleinen Bläschen, aber auch ohne dieselbe geschehende Bildung von einer scharfen, serösen Flüssigkeit, die leicht die Theile, wo sie hinkommt, in Entzündung versetzt und sich zu Schuppen umwandelt, und die Neigung, ein festwurzelndes Hautübel zu bilden, annehmen zu dürfen. Diesemnach trenne ich die durch einfache Abschuppung der Epidermis und die durch Eiterblasen entstandenen Schuppen und Grinde von den Flechten, mithin die Pityriasis, Ecthyma, Rhypia und Impetigo, so wie auch diejenigen schuppigen Hautausschläge, die zwar durch Bläschen entstanden sind, aber nur ein flüchtiges, symptomatisches Exanthem sind, wie z. B. der Gürtel, die um den Mund herum im Wechselfieber und bei gastrischen Reitzen sich bildenden consensuellen Bläschen (Herp. Zoster und Herp. labialis, nach *Will.* und *Bat.*), das Eczema etc.

Nach diesen gegebenen Bestimmungen gehören von

den von *Willan* und *Bateman* aufgestellten Ausschlagsarten folgende beide zu den Flechten: Der Herpes, in so fern die hier entstehenden Bläschen nicht blos ein flüchtigesSymptom, namentlich einer fieberhaften Krankheit, sind, und die Psoriasis.

Die *Flechte* (Herpes) ist nach *Willan* und *Bateman* eine meistens acute Krankheit, welche in dem mit Jucken und Brennen verbundenen Ausbruch von Bläschen besteht, die auf entzündeten Hautplätzen angehäuft sich befinden und in Schüppchen und Krusten übergehen. Zum Theil als Arten, zum Theil als Varietäten werden angenommen: Die Kleienflechte (H. furfuraceus). Sie besteht in kaum sichtbaren, auf schwach entzündeten Stellen, stehenden Bläschen, welche kleienartig sich abschuppen. — Die Frieselflechte (H. miliaris). Sie sind Flechten, bei welchen die Bläschen die Grösse der Frieselbläschen haben. — Die Blasenflechte (H. phlyctaenoides) ist eine solche Flechte, bei welcher die Bläschen 1 bis 2 Linien im Durchmesser haben. — Die Ringflechte (H. circinatus) ist in Beziehung auf die Grösse der Bläschen entweder Kleien- oder Friesel- oder Blasenflechte, und unterscheidet sich nur von diesen Flechtenarten dadurch, dass die einzelnen Plätze nur an ihrem Rand von Bläschen besetzt sind. Indem dieser Rand sich allmählig mehr ausdehnt, wird hierdurch zu neuen Ausbrüchen von Bläschen Veranlassung gegeben. — Die Regenbogenflechte (H Iris). Sie besteht in kleinen runden Flecken, welche aus concentrischen Ringen von verschiedener Farbe zusammengesetzt sind und auf welchen Bläschen in der Art stehen, dass in der Mitte ein grösseres und im übrigen Theile des Fleckes kleinere Bläschen sich befinden. — Die Gürtelflechte (H. Zoster), sie ist von mir als eine eigene Ausschlagsart abgehandelt worden. — Die Lippenflechte (H. labialis). Sie ist der vorzüglich beim Wechselfieber vorkommende Bläschenausbruch an den Lippen und wurde von mir in dem Kapitel von dem Hidroa beschrieben. — Die Vorhautflechte (H. praeputialis). Es sind dieses auf der innern und der äussern Seite der Vorhaut vorkommende, auf entzündeten Flecken stehende Bläschen, welche leicht in oberflächliche Geschwürchen übergehen, die aber sich mit Krusten bedecken und in wenigen Tagen von selbst heilen. — Aehnliche Blasengruppen kommen auch an den Augenliedern (H. palpebralis), an dem Ohre (H. auricularis) etc. vor, (H. localis).

Die Ursachen dieser Veränderungen auf der Haut sind: örtlich angebrachte Reitze, wie scharfe Waschwasser, unreine Stoffe, die

sich an einzelnen Stellen, z. B. zwischen der Vorhaut ansammeln etc., gastrische Reitze verschiedener Art, rheumatische und catarrhalische Fieber, Wechselfieber, Gemüthsbewegungen, auch Scropheln, Gicht etc.

Die *Schuppenflechte* (Psoriasis). Dieselbe besteht in Flecken von trockenen, unregelmässig gestalteten Schuppen, fortlaufend oder von unterbrochenem Umfange, oft mit Rissigkeit der Haut. Es entstehen entzündete, kaum oder gar nicht über die Haut hervorragende Plätze, mit einer sehr zarten Oberhaut, die ohne wahrhafte Excoriationen Serum ausschwitzen, welches in dünne, halbdurchsichtige Schuppen und oft auch in einen ausgedehnten, von Spalten durchrissenen Grind übergeht. *Willan* nimmt folgende Arten an: Die tropfenartige Schuppenflechte (Ps. guttata), dieselbe besteht in Plätzen von der Schuppenflechte von dem Durchmesser von 2 — 4 Linien, welche vorzüglich an den Extremitäten wie Tropfen aufgespritzt sind. Häufig steht ein derartiger Schuppengrind mit einem syphilitischen Uebel in Verbindung, in welchem Falle die Flecken oft eine braune und dunkelrothe Farbe annehmen (Ps. guttata syphilitica). — Die ausgebreitete Schuppenflechte (Ps. diffusa). Sie besteht in grossen, irregulär begrenzten, röthlichen, rauhen und schrundigen Flecken, auf denen hin und wieder Schuppen sitzen. — Die gewundene Schuppenflechte (Ps. gyrata). Dieselbe stellt schmale, verschiedentlich gestaltete, oft geschlängelte Flecken und Streifen dar. — Als Modificationen der ausgebreiteten Schuppenflechten können angesehen werden die Psoriasis infantilis, bei welcher zugleich entzündete Pusteln, die in Eiterung übergehen, entstehen, die Nasenlöcher verstopft werden, die Haare der Augenlieder und die Wimpern ausfallen und bei welchen zwischen den schuppigen Flecken glatte, glänzende Erhabenheiten der Epidermis zum Vorschein kommen, die an der Spitze etwas flach sind und eine zirkelförmige oder ovale Grundfläche haben, und die Psoriasis inveterata, welche sich durch einen fast allgemein schuppigen Zustand auszeichnet, wobei die Haut rauh, trocken und widernatürlich dick ist. — Nach Verschiedenheit des Sitzes nimmt *Willan* auch noch als besondere Arten der Schuppenflechten die Psoriasis palmaria, Ps. labialis und Ps. scrotalis an.

Die Schuppenflechte ist erblich und wird erzeugt durch den Genuss stark gesalzener Speisen, Seefische, Stockungen im Pfortadersystem, niederdrückende Gemüthsaffecte, einen dyscrasischen Zustand des Körpers, Unreinlichkeit, unmittelbar auf die Haut wirkende Reitze etc.

§. 1304.

Es können drei Hauptarten der Flechten angenommen werden:

1) Die *mehlichten Flechten* (Herpes farinosus). Es erscheinen dieselben unter etwas Jucken und Brennen der Haut, welche einen rauhen und röthlichen Fleck oder mehrere derartige Flecke enthält, auf welchen man bei genauer Betrachtung, besonders mit bewaffnetem Auge, ganz kleine Bläschen wahrnimmt. Von selbst oder indem sie aufgekratzt werden, ergiessen diese Bläschen eine scharfe Feuchtigkeit, welche zu mehlartigem Staub oder kleienartigen Schüppchen vertrocknet. Oft kann man auch jene Bläschen nicht mit Bestimmtheit erkennen, und es entstehen die mehlartigen Schuppen durch blosse Aushauchung jener Feuchtigkeit aus dem mehr oder weniger entzündeten Hautfleck. Es gehen dem Ausbruche dieses Exanthems oft verschiedene Affectionen vorher, z. B. mangelnde Esslust, Mattigkeit und Nervenzufälle, die zuweilen durch denselben gehoben werden, oft ist er aber mit keinen solchen Beschwerden verbunden.

§. 1305.

2) Die *schuppigen Flechten* (Herpes squamosus). Auf entzündeten Flecken der Haut entstehen zusammengehäufte Bläschen von der Grösse der Hirsekörner (H. miliaris) oder grösser (H. phlyctaenoides), welche eine scharfe, klebrichte und übelriechende Feuchtigkeit ergiessen, oder es wird diese Feuchtigkeit aus der entzündeten und wunden Hautstelle, ohne jene Bläschen ausgeschwitzt. Es bilden sich nunmehr Schuppen (H. squamosus) und Borken (H. crustaceus), unter welchen oft fortdauernd etwas Feuchtigkeit sich ergiesst (H. squamosus madidus) und welche eine lange Zeit festsitzen oder durch neue Schuppen ersetzt werden. Im Umfang dieser Schuppen entzündet sich die Haut mehr oder weniger und es entstehen oft neue Bläschen oder nässende

Stellen und Schuppen, wodurch die Flechte allmählig an Umfang zunimmt, während sie oft in der Mitte trockener wird. Diese Art der Flechten erregt stärkere Beschwerden, als die mehligten Flechten, insbesondere stärkeres Jucken und Brennen, das oft Schlaflosigkeit verursacht, auch wird oft der Harn trübe, bei Weibern stellt sich ein weisser Fluss ein und die Ernährung leidet.

§. 1306.

3) Die *fressenden Flechten* (Herpes exedens, Herpes ἐσθιομενος, rodens, depascens, phagedänicus, Lupus). Diese Flechte, die vorzüglich im Gesichte, namentlich an der Nase und dem Kinne (Mentagra)*) vorkommt, zeichnet sich durch heftige Schmerzen und vorzüglich dadurch aus, dass eine sehr scharfe Feuchtigkeit abgesondert wird und unter den Borken Verschwärungen entstehen, wodurch die Haut immer mehr angefressen und selbst die darunter liegenden Theile zerstört werden.

§. 1307.

Diese verschiedenen Arten von Flechten erscheinen unter verschiedenen Modificationen, wohin der Herp. circinatus, Herp. Iris, die Psoriasis guttata, und die Ps. gyrata, nach *Willan*, gehören.

§. 1308.

Es haben die Flechten immer einen mehr chronischen Verlauf und dauern oft selbst Jahre und sind selbst habituell. Zuweilen verschwinden sie und kehren an derselben oder an einer andern Stelle wieder zurück, und oft erscheinen sie nur zu gewissen Zeiten, z. B. zu gewissen Jahreszeiten. — In Gesundheit gehen dieselben durch allmählige Abschälung der Haut, oft unter dem Eintritt von Ausscheidungen, z. B. dem der Hämorrhoiden,

*) Unter diesem Ausdruck versteht man übrigens verschiedenartige Ausschläge am Kinn.

über. In Nachkrankheiten und den Tod durch Metastasen und allmählige Entwicklung einer allgemeinen Cachexie und Abzehrung.

§. 1309.

Die Anlage zu Flechten ist oft ererbt. Auch bedingen gewisse Lebensperioden, namentlich bei Weibern die Zeit des Aufhörens der Geschlechtsfunction und gewisse Constitutionen, namentlich die lymphatische Constitution, eine besondere Anlage zu dieser Krankheit. Als Gelegenheitsursachen werden beschuldigt: gastrische Reitze, wie Säure, Galle, Schleim in den ersten Wegen, der reichliche Genuss stark gesalzener und schwer verdaulicher Speisen, namentlich des eingesalzenen Fleisches und mancher Fische, häufige Gemüthsaffecte, insbesondere Zorn, Unterdrückung gewohnter Ausleerungen, z. B. eines weissen Flusses, der Hämorrhoiden, zu sparsamer Harnabgang, Stockungen im Pfortadersystem, vorzüglich auch unvollkommen geheilte Krätze, Syphilis, die Scropheln, die Bleichsucht und die Gicht. Von einigen Aerzten (*Poupart* und *Roussel*) wurde auch bei den höhern Graden der Flechten Ansteckungsfähigkeit beobachtet, doch wird (von *Richter* und *Haase*) das Vorhandensein eines eigenen Flechtencontagiums geleugnet und behauptet, dass bei einer etwa erfolgten Ansteckung nicht die Flechten an sich, sondern die Krankheit angesteckt habe, in deren Verbindung sie vorkommen, wie die Syphilis. Endlich werden auch flechtenartige Veränderungen in der Haut durch unmittelbar auf die Haut wirkende scharfe Stoffe, wie reitzende Pflaster, Salben, Staub, z. B. bei Webern, und das Tragen rauher, wollener Kleider hervorgebracht.

§. 1310.

Ueber das Wesen der Flechten wurden verschiedene Meinungen ausgesprochen. *Hippokrates* leitete die Krank-

heit von einem zähen Schleime ab, *Galen* von überflüssiger und heisser Galle, mehrere Aerzte (*Sanctorius, Ballonius, Piso, Gorter*) von einem scharfen Serum, andere hielten sie für eine abnorme Secretion des im Blute zurückgebliebenen Harnstoffes,[1]) einige neuere Aerzte endlich (*Haase, Rayer*), wie überhaupt die Hautausschläge, für Hautentzündungen. — Ich erkläre die Entstehung der Flechten, wie überhaupt die der Exantheme[2]) und halte dieselbe für eine oberflächliche seröse Entzündung und krankhafte Absonderung in der Haut. Hiebei ist es mir wahrscheinlich, dass häufig in der Säftemasse oder im Gewebe der Haut selbst schadhafte (scharfe) Stoffe, z. B. entarteter Krätzstoff, sich befinden, die der Entzündung und krankhaften Absonderung den eigenthümlichen Character geben und die Ursache des Festwurzelns des Exanthemes sind.

§. 1311.

Vorhersage. Die Flechten sind, mit Ausnahme der fressenden Flechten, eine zwar selten gefährlich werdende, aber eine oft sehr hartnäckige Krankheit, besonders da man die kräftiger wirkenden Mittel, nämlich viele äussere Mittel, nur mit grosser Vorsicht, um keine Metastase zu veranlassen, anwenden darf. Am schwersten sind die angeerbten und die in höherm Alter und von innern Ursachen entstandenen Flechten zu heilen, leicht dagegen die neu und von äussern Ursachen entstandenen flechtenartigen Veränderungen in der Haut.

§. 1312.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Vorzüglich ist die Diät zu ordnen, insbesondere sind stark gesalzene und gewürzte Speisen und eine reichliche Fleischnahrung zu vermeiden, und dagegen

1) *Raimann* Handb. d. spec. Path. u. Therap. B. II. S. 188. — 2) Vergl. die §§. 1190—93.

mehr Vegetabilien, insbesondere säuerliche Früchte, z. B. Aepfel, zur Nahrung zu wählen. Gegen Verstopfung und Stockungen im Pfortadersysteme, so wie gegen eine vorhandene Dyscrasie, namentlich die Lustseuche und die Scropheln sind die geeigneten Mittel in Anwendung zu bringen. Die in den Flechten abgesonderte scharfe Feuchtigkeit, die selbst wieder Ursache der grössern Ausbreitung der Krankheit wird, muss durch fleissiges Reinigen der Theile vermittelst milder Waschwasser und Bäder entfernt werden, so wie es auch zuträglich ist, die Theile durch Bestreichen mit einem Fette vor der Einwirkung der scharfen Feuchtigkeit zu schützen etc.

§. 1313.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um den Krankheitsprozess in der Haut aufzuheben, sind zum Theil Mittel dienlich, die den Lebensprozess in der Haut überhaupt herabstimmen, zum Theil solche, die qualitativ umstimmend wirken (die mischungsändernden und hautreinigenden Mittel), die nach den im allgemeinen Theil von den Hautausschlägen angegebenen Anzeigen in Anwendung gebracht werden müssen. Erstern Zwecke entsprechen die von Manchen empfohlenen, aber meistens entbehrlichen Blutentziehungen und die wohl viel nützlicheren, von Zeit zu Zeit in Anwendung zu bringenden Abführungsmittel, so wie auch, wenn es das Allgemeinbefinden des Kranken gestattet, eine magere Diät. Die letztere Wirkung haben vorzüglich die Mercurialien, die Antimonialien, der Schwefel, besonders mehrere dieser Mittel in Verbindung mit einander, wie in dem Aethiops antimonialis, Aeth. mercurialis, den Plummerschen Pulvern (Nro. 68) etc., der von *Weinhold*[1]) empfohlene Graphit (innerlich Erwachsenen zu einer

1) Der Graphit oder neu entdecktes Heilmittel wider die Flechten. Meissen 1812.

Unze innerhalb 8 Tagen verbraucht, in Lattwergen, Bissen oder Pillen für sich oder in Verbindung von Quecksilber, Spiessglanz, Schwefel etc.). Das Jod (nach *Biett*), der Arsenik (doch nur in den schlimmsten Fällen), die Herba Jaceae, Stipites Dulcamarae, Quajack, Sarsaparill, Cortex Ulmi, die Tinctura Cantharidum (nach *Biett*) etc.

§. 1314.

Mit diesen innerlichen Mitteln müssen zugleich entsprechende äussere Mittel in Anwendung gebracht werden, von denen jedoch die schnell heilenden, nur mit Vorsicht und bei grösserer Gefahr einer Metastase nach vorher geschehener Setzung einer Fontanelle oder Auflegen von Seidelbast auf eine benachbarte, gesunde Hautstelle in Gebrauch gezogen werden dürfen. Um den erhöhten Lebensprozess in der Haut herabzustimmen, also vorzüglich bei grosser Empfindlichkeit und einem entzündlichen Zustand der Haut, wendet man an: frisches Fett, Oel, milde Salben, Waschungen mit milden Waschwassern, warme Bäder, einfachen Wasserdampf, Blei- und Zinksalben, und bei starker Entzündung auch Blutegel im Umfang derselben gesetzt. Um qualitativ umändernd zu wirken, wendet man an: Salben mit weissem oder rothem Quecksilberpraecipitat (Nro. 72), das Unguentum oxygenatum, Waschungen mit Sublimatwasser (*Wedekind*), Graphitsalben und Pflaster (Nro. 73), Schwefelsalben, Schwefelbäder, Schwefelräucherungen (nach *Gale's* Methode), nach *Biett* eine Salbe mit einfachem oder doppeltem Jodquecksilber (von ersterm 12 Grane bis zu 1 Scrup., von letzterm 12 — 15 Grane auf eine Unze Schweinefett), salinische Bäder, Waschungen mit einer Abkochung von Stipites Dulcamarae, Ulmenrinde, Wallnussschaalen etc. Um die krankhafte Hautstelle zu zerstören, hat man Blasenpflaster auf dieselbe gelegt, die Brechweinsteinsalbe eingerieben und Aetzmittel ange-

wandt. Bei der fressenden Flechte muss die kranke Hautstelle vollkommen zerstört werden, was am besten durch das Hellmund'sche Mittel [1]) geschieht.

§. 1315.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen*. Sind die Flechten zurückgetrieben, so dienen Hautreitze und die schweisstreibende Methode. Entwickelt sich ein allgemein cachectischer Zustand, so müssen oft stärkende Mittel in Anwendung gebracht werden.

Der Kopfgrind.

(*Tinea, Porrigo nach Willan.*)

Murray (lat. Gött. 1782). — *Hillairet* (Par. 1814). — *Mahon* (Par. 1829).

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 38 bis 41 und *Alib.* Tab. 13 bis 17.

§. 1316.

Der **Kopfgrind** ist der chronische, bisweilen ansteckende, vorzüglich bei Kindern vorkommende Ausschlag an dem behaarten Theile des Kopfes, welcher in Eiterbläschen und zuweilen auch in kleinen Abscessen in der Kopfschwarte besteht, wodurch eine klebrige, übelriechende, in Grinde übergehende Feuchtigkeit erzeugt wird und oft die Haarzwiebeln zerstört werden.

§. 1317.

Es gehen dem Ausbruch des Grindes Jucken und das Gefühl von Spannung und Hitze in der Kopfhaut, und oft Anschwellung der Drüsen am Halse, so wie auch Kopfweh vorher. Sodann brechen kleinere und

1) *Rust's* Magazin Bd. XIX. Heft 1.

grössere, mit einer halb eiter-, halb lymphartigen, zähen, übelriechenden Flüssigkeit gefüllte Bläschen an dem behaarten Theile des Kopfes, vorzüglich am Hinterhaupte aus, welche zum Theil ganz oberflächlich sind, zum Theil auch tiefer sitzen und mit welchen zuweilen Ansammlungen einer grössern Menge einer ähnlichen Flüssigkeit im Zellgewebe verbunden sind, welche kleine Abscesse darstellen. Diese Bläschen und kleinen Abscesse brechen gewöhnlich auf und ergiessen durch enge Oeffnungen (Augen) die erwähnte Flüssigkeit, welche nunmehr zu Schuppen und Borken von sehr verschiedenartiger Gestalt erhärten. Zuweilen finden diese Eiteransammlungen um die Haarzwiebeln herum statt, wobei sodann aus der Mitte des Eiterbläschens ein Haar hervorgeht, und die Haare leicht ausgezogen werden können und von selbst ausfallen. Oft erkranken auch die Haarzwiebeln, ohne dass sie der Mittelpunkt des Abscesschens sind, wobei die Haare entweder nur ihre Farbe verlieren und kraus werden, oder auch ganz ausgehen. In andern Fällen endlich gehen die Bläschen und Abscesschen in um sich greifende Geschwüre über, wodurch nicht allein die Haarzwiebeln zerstört, sondern auch die Haut selbst zerfressen wird, ja zuletzt die Schädelknochen selbst angegriffen werden. Bei dem Kopfgrind werden viele Läuse erzeugt und es entwickelt sich bei langer Dauer und in den höhern Graden der Krankheit zuletzt ein cachectischer Zustand und selbst Zehrfieber.

§. 1318.

Man hat sehr verschiedene Arten des Kopfgrindes angenommen. Indem man die Achores und die Favi der Alten für zwei verschiedene Veränderungen in der Kopfhaut hielt, hat man hiernach zweierlei Arten des Grindes, je nachdem sie mehr in Achores oder Favi bestehen, oder von denselben herstammen, angenommen; man ist aber über die Bedeutung beider angegebenen Worte nicht

einig, indem die Einen unter Achores nur enge Oeffnungen verstehen, durch welche die klebrige Lymphe aus den Bläschen und Abscesschen fliesse, und unter Favi grössere, den Bienenzellen ähnliche Oeffnungen, Andere eine Verschiedenheit der Bläschen darunter begreifen, indem sie die Achores für kleinere Eiterbläschen (Wachsbläschen) von dem Durchmesser einer Linie erklären, die aufplatzen und kleine Löcher oder Augen bilden, aus welchen viele Feuchtigkeit dringt, die zu Krusten erhärten, und die Favi für grössere Bläschen von dem Durchmesser von 2 Linien und mehr, welche nicht leicht aufplatzen, sondern zu einer käseartigen Masse eintrocknen, wobei der Mittelpunkt einsinkt und einen becherförmigen Nabel bildet, oder indem sie die Achores für etwas ausgedehntere Eiterbläschen als die Favi halten, die sehr oberflächlich seien, oft zusammenfliessen und in breite gelbliche oder braune Grinde übergehen und die Favi für kleine, vollkommen runde und in die Epidermis gleichsam eingekeilte, im Mittelpunkt eingedrückte Pusteln, die einen dicken cellulösen Grind bilden, der längere Zeit hindurch wächst und bald einen Eindruck und die Form eines Näpfchens bekommt, bald aber diese Eigenschaft verliert und blos als ein dicker gelbgrauer Grind erscheint, und indem wieder Andere unter den genannten Ausdrücken mehr die Beschaffenheit der Krusten verstehen und unter Achores flache, leichte Krusten begreifen, unter welchen mehr eine allgemeine Eiterabsonderung als die Erzeugung einzelner Geschwürchen stattfindet, unter Favi dagegen dickere zellenartige Grinde, die mehr isolirte Geschwürchen bedecken. Nach diesen Unterschieden hat man den Kopfgrind eingetheilt in die Tinea acherosa (Wachsgrind) und die Tinea favosa (Wabengrind), zu welcher man als dritte Art entweder noch die Tinea pilaris (Haargrind), bei welcher aus den Eiterbläschen Haare hervorgehen oder den bösartigen,

oder Erbgrind (Tinea maligna), welcher vorzüglich durch bedeutende Schmerzen und um sich fressende Geschwüre characterisirt ist, hinzugefügt hat.

Willan und *Bateman* theilen die Porrigo, zu welcher von denselben aber nicht allein der Kopfgrind, sondern auch die crusta lactea gezählt werden, ein: in die Porrigo larvalis, welches die Crusta lactea der Schriftsteller ist. — Die P. furfurans, bei welcher die Achores in dünne blätterige Schuppen übergehen. — Die P. lupinosa, welche sich durch trockene, kreisförmige Schorfe von gelblicher Farbe mit erhabenen Rändern und einem becherförmigen Eindruck, welche oft einen schuppigen Staub enthalten und im allgemeinen den Saamen der Lupinen gleichen, characterisirt. — Die P. scutulata, welche durch Haufen kleiner, hellgelber Pusteln gebildet wird und in dünnen Schorfen besteht, welche auf abgesonderten und von einander entfernt stehenden Flecken von unregelmässiger Kreisform angehäuft sind. — Die P. decalvans, welche durchaus keine andere Erscheinung als einfache, kahle Flecken, von mehr oder weniger kreisförmiger Gestalt zeigt, auf welchen nicht ein einziges Haar bleibt, während das, welches die Flecken umgiebt, so dick wie gewöhnlich ist. Die Oberfläche der Kopfhaut ist innerhalb dieser Flecken glatt, glänzend und auffallend weiss. — Die P. favosa, welche in grossen abgeplatteten Eiterblasen von unregelmässigem Umfang (Favi) besteht, die grünliche oder gelbliche, halb durchsichtige Grinde bilden.

Alibert theilt die Dermatoses teigneuses in folgende Gattungen und Arten ein: 1) Achore (Milchschorf und räudiger Ansprung), a. A. muqueux, b. A. lactumineux; 2) Porrigine (Haarschuppen), a. P. furfuracée, b. P. amiantacée, c. P. granulée, d. P. tonsurante; 3) Favus (Grind) a. F. vulgaire, b. F. scutiforme; 4) Trichoma (Weichselzopf), a. Tr. vulgaire, b. faux.

§. 1519.

Da die Form der Eiterbläschen und der Grinde von mancherlei unwesentlichen Verhältnissen abhängt, so ist es zweckmässiger, den Grind nach den mehr wesentlichen Verschiedenheiten des Krankheitsprozesses, durch welche auch die geringern und grössern Folgen des Uebels und der Erfolg der Kur bedingt sind, einzutheilen. Hiernach haben die grössten Aerzte, wie z. B. *Hufeland* und *Richter*, den Kopfgrind in den gutartigen und den bösartigen Grind eingetheilt. Man kann wohl auch nach demselben Eintheilungsgrunde folgende Arten des Grindes annehmen:

1) Den gutartigen, einfachen Grind (Tinea benigna simplex). Es besteht derselbe in Eiterbläschen, welche in Grinde von verschiedener Form übergehen, bei welchen aber die Haarzwiebeln nicht erkrankt sind und aus welchen daher auch kein bleibender Nachtheil hervorgeht.

2) Den kahlmachenden Kopfgrind (Tinea benigna decalvans). Es sind hier die Haarzwiebeln erkrankt, was man zum Theil daran erkennt, dass die Eiterbläschen gerade an den Wurzeln der Haare sich befinden und die Haare dieselben durchbohren, und auch daran, dass die Haare bleich und wollig werden und ausgehen, wobei aber keine um sich fressende Geschwüre in der Kopfhaut entdeckt werden können. Derselbe kann aus dem einfachen, gutartigen Grinde entstehen, wenn die Haarzwiebeln mit in den Krankheitsprozess gezogen werden.

3) Den bösartigen Kopfgrind (Tinea maligna, exedens). Es ist diese Art des Grindes von starken Schmerzen begleitet, grosse Schorfen bedecken die Kopfhaut und unter denselben entdeckt man um sich fressende Geschwüre, die zuweilen selbst den Knochen angreifen und eine äusserst stinkende Jauche von sich geben.

Als Spielarten der hier angegebenen drei Hauptarten können mehrere von *Willan* und von *Alibert* angeführte Arten des Kopfgrindes angesehen werden.

§. 1320.

Anlage haben vorzüglich Individuen vom kindlichen Alter. Gelegenheitsursachen sind: eine zu warme Kopfbedeckung, insbesondere durch Pelzmützen, nicht gehöriges Reinhalten der Haare, insbesondere viel Ungeziefer bei starkem Haarwuchse, eine zu nahrhafte Kost und daher Ueberfluss in der Säftebereitung, Unordnungen in der Verdauung, Unterdrückung von Absonderungen, und vorzüglich auch Scropheln und Lustseuche, von welchen beiden Cachexien man insbesondere die Entstehung des bösartigen Kopfgrindes herleitet. Zuweilen bemerkte man die Entstehung durch Ansteckung, welches besonders bei dem bösartigen Kopfgrind der Fall ist.

§. 1321.

Es scheint, wenigstens der gutartige Kopfgrind, dem Wesen nach im allgemeinen die nämliche Krankheit wie die Impetigo zu sein, nur dass das Leiden oft durch die Theilnahme der Haarzwiebeln modificirt wird und die Form der Grinde durch die Haare manchmal verändert wird. Der bösartige Grind ist sehr nahe mit der fressenden Flechte verwandt.

§. 1322.

Vorhersage. Der Kopfgrind wird nicht wohl lebensgefährlich, wenn er nicht mit den Scropheln oder der Lustseuche in Verbindung steht, in welchem Falle aber die Ursache der Gefahr mehr in diesen Krankheiten, als in dem Grinde, liegt. Meistens verliert sich die Krankheit mit der Zeit, dem Ende des Knabenalters, von selbst, doch widersteht sie oft sehr hartnäckig den gegen dieselbe in Gebrauch gezogenen Mitteln. Durch plötzlichen Zurücktritt der Hautkrankheit können Blind-

heit, Taubheit, Engbrüstigkeit, Abzehrung und andere Krankheiten herbeigeführt werden.

§. 1323.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man muss darauf dringen, dass der Kopf des Kranken rein gehalten werde, die zu langen Haare abgeschnitten werden, der Kranke nicht zu reichliche Nahrung nehme etc., ist eine scrophulöse oder syphilitische Dyscrasie vorhanden, so muss vor Allem dieser entgegengewirkt werden.

§. 1324.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Es können die nämlichen innerlichen und äusserlichen Mittel und nach den nämlichen Anzeigen angewandt werden, welche gegen den Leibgrind und die Flechten gebraucht werden; auch sind hier dieselben Vorsichtsmassregeln nothwendig, wie dort. In den leichtern Fällen genügt, unter den äusserlichen Mitteln, oft das Bestreichen der kranken Hautstelle mit frischem Fette, Oele und die Anwendung anderer milder Mittel, zuweilen sind dagegen aber auch die Anwendung der weissen Präcipitat- und anderer Mercurialsalben, Sublimatwaschungen, Schwefelsalben, Bietts Jodschwefelsalbe (ein Scrup. bis ½ Drachm. auf 1 Unce Fett) und Waschungen mit einer Auflösung von Schwefelleber oder mit verdünnter Schwefel-, Salpeter- oder Salzsäure, oder selbst einer Auflösung von Höllenstein etc. nothwendig. In hartnäckigen Fällen hat sich auch, nach Abschneidung der Haare und Entfernung der Krusten, ein Pflaster von Gummi Ammoniacum, mit Essig gekocht, das man auf Leder gestrichen und durch eine Mütze unterstützt 6 — 8 Wochen liegen liess, sehr nützlich erwiesen. Oft ist es auch nothwendig, die Haarzwiebeln auszureissen, was man vermittelst einer Pincette und auch vermittelst Streifen von Pechpflaster, die man auf die kurz ge-

schorenen Haare auflegt und nach einiger Zeit abzieht, bewirken kann; zu verwerfen dagegen ist das plötzliche Ausreissen aller Haare, vermittelst der Pechkappe.

§. 1325.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Bei starkem Geruch muss der Kopf durch Waschen häufig gereinigt werden; auch hat man das Aufstreichen von einer Salbe mit Kohlenpulver empfohlen. Die Läuse müssen entfernt werden, wozu man sich der in dem Kapitel von den parasitischen Thieren angegebenen Mittel bedienen kann. Ist die Hautkrankheit unter bedenklichen Zufällen zurückgetreten, so sucht man sie auf die Weise wieder zu erzeugen, welche in dem Kapitel von der Behandlung der Hautausschläge im allgemeinen angegeben worden ist.

DRITTE ORDNUNG DER HAUTAUSSCHLÄGE.

Die specifischen, fieberlosen Ausschläge.

Die Krätze.

(*Scabies, Psora.*)

Wichmann (Hannov. 1791). — *Guldener von Lobes* (Prag 1795). — *Hildebrand* (Hannov. 1797). — *Ackermann* (Bemerk. über die Kenntniss und Kur einiger Krankheiten. Hft. 5. Nürnberg 1798). — *Galés* (Paris 1812). — *Wenzel* (Bamb. 1825).

Abbild. v. *Will.* u. *Bat.* Tab. 45 u. 46, und *Alib.* Tab. 55 u. 56

§. 1326.

Die Krätze ist der chronische Hautausschlag, welcher in einzeln stehenden Blätterchen und Bläschen

und zum Theil in Pusteln besteht, heftig juckt und ansteckend ist.

§. 1327.

Verlauf. Gewöhnlich brechen zuerst unter starkem, bei der Bettwärme zunehmendem Jucken und Beissen und oft unter dem vorübergehenden Gefühl von Nadelstichen, einige wenige kleine, zugespitzte und an der Spitze mit einer wasserhellen und oft etwas gelblichen Lymphe gefüllte Blätterchen am untern Theile und der innern Fläche der Arme, zwischen den Fingern, an der innern Fläche der Schenkel, am Bauche etc. hervor (Scabies papuliformis); meistens entstehen auch kleine, nicht zugespitzte, mit einer wasserhellen oder nur durchscheinenden, gelblichen Flüssigkeit gefüllte Bläschen an dem innern Rande der Finger, an der Handwurzel etc., welche, wenn sie aufgestochen werden, die erwähnte Lymphe und zuletzt etwas wässeriges Blut ergiessen und sich schnell wieder füllen (Sc. vesicularis). Besonders die Blätterchen werden allmählig zahlreicher, jedoch so, dass sie sich nicht von einer Stelle zur andern kriechend vermehren, sondern, mit Ausnahme des Gesichts, am ganzen Körper, vorzüglich aber an den Beugeseiten desselben ausbrechen; sie werden gewöhnlich durch Kratzen zerstört und hinterlassen meistens keine nässende, sondern trockene, aufgekratzte und mit kleinen, röthlich-schwärzlichen Blutkrusten besäete Stellen (Sc. sicca). In einzelnen Fällen, besonders bei sehr vollsaftigen Individuen und wenn die Krankheit schon lange gedauert hat, entstehen oft von Eiter strotzende Pusteln (Sc. pustulosa, humida), besonders zwischen den Fingern, welche aufplatzen und oft längere Zeit eine schwärende, mit Krusten sich bedeckende und mit harten Rändern umgebene Stelle zurücklassen (das Krätzgeschwür, Ulcus scabiosum). Diese nässenden Stellen ergiessen eine scharfe Lymphe, welche den zunächst liegen-

den Theil der Haut in Entzündung versetzt und excoriirt; allmählig bilden sich auch Risse und Schrunden und häufig entstehen auch kleine Furunkeln.

§. 1328.

Wird die Krätze zur Heilung gebracht, so schuppt sich die Haut etwas ab und es verschwindet allmählig das Hautjucken; an den am meisten ergriffenen Stellen bleiben noch einige Zeit röthliche und bläuliche Flecken zurück, wodurch die Haut ein marmorirtes Ansehen gewinnt. — Wird die Krätze nicht geheilt, so kann zwar, auch bei einem bedeutenden Leiden der Haut, die Gesundheit im allgemeinen lange Zeit unverletzt erscheinen, endlich aber entwickelt sich ein cachectischer Zustand, es schwellen lymphatische Drüsen an, der Körper magert ab und es soll sich selbst Wassersucht einstellen. Gelingt die Heilung der Krätze nicht vollkommen, so brechen von Zeit zu Zeit noch einzelne Bläschen aus, es stellen sich zuweilen Jucken und Beissen in der Haut ein und es bilden sich flechtenartige Ausschläge. Sehr viele, ja die meisten innerlichen Krankheiten, besonders die chronischen, sollen häufig von schlecht geheilter und unterdrückter Krätze veranlasst werden, namentlich beschuldigt *Autenrieth* diesen Ausschlag als Hauptursache der Lungenschwindsucht, doch scheint die Krätze nicht so häufig Krankheitsursache zu sein, als man in der neuern Zeit von mehrern Seiten behauptet hat.

§. 1329.

Diagnose. Die Krätze kann mit dem Lichen simplex, Prurigo, Eczema (falschen Krätze, Psydracia) und, wenn sie mit Pusteln erscheint, mit Impetigo und Ecthyma verwechselt werden; doch unterscheidet sie sich von diesen Ausschlägen durch ihre Entstehung durch Ansteckung, zum Theil durch das heftige Jucken, was bei dem Eczema, Impetigo, Ecthyma und selbst bei

dem Lichen, nicht oder in geringerem Grade vorkommt, durch das meistens gleichzeitige Vorkommen verschiedener Formen des Exanthems, (so unterscheidet sich die Krätze von den Blätterchen des Lichen simplex und des Prurigo leicht, wenn zugleich Eiterpusteln da sind, und von dem Impetigo und dem Ecthyma, wenn neben den Pusteln die Haut mit einer Menge von Blattern und Bläschen besäet ist), zum Theil durch die Form des Exanthems selbst, indem zwischen den Blätterchen, Bläschen und Pusteln der Krätze und denen der genannten Ausschläge doch einiger Unterschied besteht, (so z. B. ist das Krätzblätterchen zugespitzter, als das des Lichen und des Prurigo und ist an der Spitze mehr Bläschen, wogegen diese, insbesondere Prurigo, mehr Knötchen bleiben) durch die Dauer der Krankheit, da die Krätze immer chronisch ist und nie von selbst verschwindet, wo hingegen jene Ausschläge oft nur eine flüchtig vorübergehende Erscheinung sind, endlich durch den Sitz des Ausschlages, da die Krätze vorzüglich stark zwischen den Fingern und wohl nie im Gesichte vorkommt, jene Ausschläge aber nicht vorzugsweise zwischen den Fingern, aber oft auch im Gesicht erscheinen.

§. 1330.

Anlage haben alle Individuen, besonders aber solche mit einer weichen Haut, daher mehr die jugendlichen als die ältern Personen. Die Anlage wird nicht, wie bei den fieberhaften Exanthemen, durch die Krankheit selbst aufgehoben.

Gelegenheitsursachen. Die Krätze wird, wie es scheint, immer durch einen Ansteckungsstoff hervorgebracht, der fix ist und sich durch unmittelbare längere Berührung und durch Träger, insbesondere die Kleider und das Bette, mittheilt. Die Milbe, die man in den frisch entstandenen Bläschen der Krätze fand (Krätzmilbe, Acarus exulcerans, s. scabiei) und welche *Wich-*

mann, *Peter Frank*, *Galés* u. A., als die Ursache der Krätze ansehen, scheint doch wohl nicht diese Bedeutung zu haben, da sie nicht immer gefunden wurde, namentlich nicht von *Heberden*, *Lugol* und *Mouronval*. Dass die Krätze unter zusammenwirkenden, begünstigenden Umständen, namentlich durch Unreinlichkeit, schlechte Nahrungsmittel und eingeschlossene Luft, wie dieses oft in Zuchthäusern der Fall ist, ohne Ansteckung entstehen könne, ist nicht mit Bestimmtheit erwiesen.

§. 1331.

Vorhersage. Die Krätze heilt, wie es scheint, nie von selbst, sie wird aber beinahe nie gefährlich, und ist in der Regel leicht durch die Kunst zu heben; doch soll oft die Heilung nur scheinbar sein und der Krätzstoff im Innern des Körpers fortwirken und mancherlei Krankheiten veranlassen. Zuweilen, besonders wenn ganze Familien von der Krätze ergriffen sind, ist die Heilung schwierig, was von einer immer neu erfolgenden Ansteckung herzurühren scheint.

§. 1332.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen*. Es ist von Wichtigkeit, von dem Körper des Kranken die von ihm selbst erzeugten Ansteckungsstoffe, so viel wie möglich, zu entfernen, daher ist es im Allgemeinen gut, den Kranken öfters baden und waschen zu lassen, besonders mit Seifenwasser, das Hemd und das Bettweisszeug öfters zu wechseln und auch die Kleider mit Schwefel oder mit Chlor zu durchräuchern; wenigstens ist es nothwendig, nach vollendeter Kur die sorgfältigste Reinigung aller Gegenstände, mit welchen der Kranke in Berührung kam, vorzunehmen, um eine neue Ansteckung zu verhüten. Nützlich ist es auch, wenn der Kranke während der Kur alle Einflüsse vermeidet, die überhaupt schädlich auf die Haut wirken, wie z. B. stark gesalzene Speisen, geräuchertes Fleisch etc.

§. 1333.

b) *Nach dem Wesen der Krankheit.* Es glückt mit sehr verschiedenen Mitteln, die Krätze zu heilen. Der alleinige Gebrauch der innerlichen Mittel möchte wohl selten zum Ziele führen; ist die Krätze neu entstanden, so hält man ihn für überflüssig, ist dieselbe schon älter, so hält man ihn für nothwendig, um innern Krankheiten vorzubeugen; es ist übrigens zweifelhaft, ob derselbe überhaupt nothwendig ist und einen wesentlichen Nutzen gewährt, doch ist es eine löbliche Vorsicht, nicht nachtheilige innerliche Mittel anzuwenden. Am besten passen die Schwefelblumen, entbehrt können aber die Antimonial- und Quecksilberpräparate werden.

§. 1334.

Den grösten Nutzen gewähren die äusserlichen Mittel und es sind dieselben in der Regel unentbehrlich.

Am meisten im Gebrauch sind die Schwefelmittel, und unter ihnen ist wohl die einfache Schwefelsalbe, mit Schweinefett oder Oel bereitet (Nro. 74), die zweckmässigste Anwendungsart. Es wird dieselbe entweder nur in kleinen Portionen, zweimal täglich, in die Handwurzel, zwischen die Finger, in die Biegungen der Gelenke, oder in grösserer Menge bis 1 Unce täglich am ganzen Körper und vorzüglich an den leidenden Stellen eingerieben. Ebenfalls sehr zweckmässig ist eine Salbe von 1 Theil Schwefel, 2 Theile schwarzer Seife und der nöthigen Quantität Wasser (*Autenrieth*). Zum Theil sehr angerühmt, aber in der Regel unnöthig, sind verschiedene Zusätze zu den Schwefelsalben, wie der des weissen Vitriols (ung. sulphur. compos. Pharm. boruss.), des weissen Vitriols und der Baccae Lauri (*Jasser*), des Salmiaks (*Hufeland* u. *Alibert*), der kohlensauren Pottasche (*Helmerich* u. *Biett*), der Calx viva (*Valentin*), des Bleizuckers und weissen Vitriols (*Chaussier*) etc. Einen sehr schnellen Erfolg soll die in der englischen Armee eingeführte

Methode haben. Der Kranke erhält ein Seifenbad, wird in einem warmen Zimmer entkleidet, zwischen zwei wollene Decken gelegt und am ganzen Körper dreimal täglich mit einer Unce des Ung. sulphur. comp. Pharm. Lond. (Nro. 75) eingerieben.

Weniger gebräuchlich, als die Schwefelblumen, ist schon wegen ihres üblen Geruches die Schwefelleber. Man wendet sie ebenfalls in Salben an (nach *Jadelot* 4 Unc. Hepar. sulphur. calc., 2 Pf. weisse Seife, 4 Pf. Mohnöl und 2 Drach. Ol. Thymi.); ferner in Waschwassern, eine einfache Auflösung von Kalischwefelleber, oder nach *Dupuytren* eine Auflösung von 4 Unzen Kalischwefelleber in $1\frac{1}{2}$ Pf. Wasser mit einem Zusatz von $\frac{1}{2}$ Unc. Schwefelsäure, zweimal täglich zu gebrauchen, so wie auch in Bädern, vorzüglich den natürlichen Schwefelbädern zu Aachen, Töplitz, Baden in der Schweiz und bei Wien, Wiesbaden, Langenbrücken etc. Endlich hat man auch Schwefelräucherungen (schweflichte Säure) nach *Galés* Methode angewandt, welche mit Hülfe der Räucherungskästen vorgenommen werden.

§. 1335.

Unter den Quecksilberbereitungen wird vorzüglich der weisse Präcipitat in Salbenform gerühmt und wird zuweilen den Schwefelmitteln vorgezogen, weil er keinen üblen Geruch veranlasst, doch verdient er, wie alle Quecksilberpräparate dem Schwefel nachgesetzt zu werden, weil er nicht auf eine ausgebreitete Fläche eingerieben werden kann, ohne die Quecksilberdyscrasie zu erzeugen. Ausser der weissen Präcipitatsalbe werden angewandt das Unguent. hydrarg. citrinum, das Unguent. hydrarg. cinereum., Waschungen mit einer Sublimatauflösung, Sublimatbäder etc.

§. 1336.

Schnell, sicher und wohlfeil ist die Heilung der Krätze durch die Schmier- oder grüne Seife (aus Oel

und Pottasche bereitet), welche nach der, von der Grossh. Bad. Sanitätscommission für die Hospitäler vorgeschriebenen Methode auf folgende Weise angewandt wird: Der Kranke wird sieben Tage lang Morgens und Abends am ganzen Körper, mit Ausnahme des Kopfes, des Gesichtes und der Geschlechtstheile, mit der grünen Seife überschmiert. Man nimmt nach dem Alter und der Grösse des Kranken zu den ersten zwei Einreibungen 3 bis 6, zur zweiten, dritten und vierten 1½ bis 3 Unzen, zu den letzten ½ bis 1 Unce. Am achten Tag, womit die Kur gewöhnlich beendigt ist, erhält er ein lauwarmes Bad.

§. 1337.

Ausser den angegebenen Mitteln sind noch empfohlen worden: einfache, fette Oele, frisches Fett, Theer, Salben mit weissem Vitriol, Salmiak, Braunstein, Graphit, Schwefelsäure, Salpetersäure (Unguentum oxygenatum), Waschungen mit einer Abkochung von rad. Helenii, Hellebori albi, Nicotianae, Lapathi acuti, cort. Betulae etc.

§. 1338.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Ist die Krätze unterdrückt worden, so giebt man die innerlichen antiscabiösen Mittel und erregt eine vermehrte Hautthätigkeit durch innerlich gegebene schweisstreibende Mittel und Bäder; auch kann man die Brechweinsteinsalbe einreiben lassen und in dringenden Fällen die Krätze einimpfen.

Der Aussatz.

(*Lepra.*)

Schilling (lat. Lugd. Batav. 1778). — *Hensler* (vom abendl. Aussatz im Mittelalter, nebst e. Beitr. zur Kenntniss und Geschichte des Aussatzes, Hamb. 1790). — *Bonorden* (Kurt. Sprengel, Halle 1794). — *Kurt. Sprengel* (in sr. Pathologie, sr. Geschichte der Med. u. sn. Beiträgen zur Geschichte der Med. . — — Ueber die Elephantiasis insbesondere: *Lawrence* und *Southey* (Med. chir. Transact. Lond. 1815). — *Warburg* (lat. Halle 1829). — Ueber partielle Elephantiasis: *Hendy* und *Rollo* (über die Drüsenkrankheit in Barbadoes und über Hillarys Elephantiasis, aus d. Engl. Frankf. a. M. 1788, mit 2 K.). — *Hillary* (Lond. 1759). — *Alard* (Paris 1807—1824) — *Chelius* (Heidelberg. klin Annal. 2. Bd.). — *Faber* (in Berends und Moldenhavers Journ. 1830).

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 7, 8 und 9, und *Alib.* Tab. 40—42.

§. 1339.

Der Aussatz ist die chronische, erbliche und ansteckende Krankheit, welche durch mehr oder weniger weisse oder dunkle, unempfindliche Flecke (die Morpheen), durch Finnen, durch meistens umschriebene Plätze, die sich mit Schuppen und Borken bedecken, und oft auch in Geschwüre übergehen oder auch durch harte unempfindliche Knollen und durch Zeichen allgemeiner Cachexie sich auszeichnet.

§. 1340.

Verlauf. Die Krankheit beginnt mit verschiedenen Veränderungen in der Haut, die auch ohne in den Aussatz überzugehen vorkommen und oft geraume Zeit, selbst Jahre lang dem Aussatz vorhergehen, wobei sie oft zu gewissen Zeiten, besonders im Frühjahre, zunehmen. Diese Hautaffectionen, Vormäler, sind zum Theil Flecken von verschiedener Farbe und Grösse, von der Grösse des Stiches einer Nadel oder der Grösse einer Linse

(Linsenmäler, Lentigo, Lenticula), oder ausgebreitetere Flecke (Maalplätze, Panni), Flechten und Grinde, welche eine dämmerige Farbe haben, sich oft ringförmig ausbreiten und mit fressenden Schmerzen verbunden sind, so wie auch Finnen und Kupferhandel, Spaltung und Ausgehen der Haare etc. Besonders characteristische Vormäler sind aber das weisse und das dunkle Maal. Das erstere (die weisse Morphea, Vitiligo alba) besteht in einem milchweissen Fleck der Haut, welcher etwas uneben und rauh ist, und auf welchem auch die Haare weiss werden, der wenig und zuletzt gar kein Jucken mehr erregt, sich bei vollkommener Entwicklung auf das Reiben, wobei sich Schüppchen wie Kleienstaub loslösen, nicht mehr röthet, und bei einem Einstich mit der Nadel (Nadelprobe) weder Empfindlichkeit zeigt noch blutet, sondern eine milchigte Feuchtigkeit von sich giebt. Das dunkle Maal (die dunkle Morphea, Vitiligo μέλας) hat ein dunkles, bläuliges und schwärzliches Ansehen, ist ebenfalls rauh und schilfert sich ab, erregt aber mehr Stechen und Brennen und zeigt bei der Nadelprobe länger als das weisse Maal Empfindlichkeit und Blut.

§. 1341.

Entwickelt sich nunmehr die Krankheit vollständiger, so kommt oft ein Fieber hinzu, das gerne den Typus eines Wechselfiebers annimmt. Der Kranke hat das Gefühl von Taubheit in den Gliedern, er ist sehr niedergeschlagen, hat schreckhafte Träume, dabei aber oft einen starken Trieb zum Beischlafe. Die Schweisse erhalten einen Bocksgeruch, der Harn wird jumentös und das aus der Ader gelassene Blut ist sehr schwarz und soll auch zuweilen mit weisslichen Körnern vermischt sein. Es entwickeln sich unter der einen oder andern Form immer mehr die Veränderungen in der Haut und entstellen oft das Aussehen des Kranken auf eine furchtbare Weise, dabei wird auch das Athmen beengt, die Stimme

heisser, zuweilen werden die Knochen angefressen und der Körper zehrt ab.

§. 1342.

Es ist der Verlauf dieser Krankheit ganz chronisch, zuweilen von vielen Jahren. In den leichteren Graden erfolgt zuweilen Genesung unter Abschuppung der Epidermis und Ausscheidungen; der Tod wird vorzüglich durch Auszehrung herbeigeführt.

§. 1343.

Es können vier Hauptformen des Aussatzes angenommen werden:

1) *Der weisse* oder *mosaische Aussatz* (Lepra alba, L. Judaeorum, Baras alba Arab.). Derselbe beginnt mit dem weissen Maal. Es entstehen hierauf Pusteln und Geschwüre, die in weissliche Krusten übergehen und oft kritisch sind. Ist dieses nicht der Fall, so breiten sich die weissen Flecken immer mehr aus und die Haut wird, wohin diese weisse Entfärbung kommt, unempfindlich. Dabei entstehen Geschwülste des Zellgewebes, die fester als gewöhnliche Wassergeschwülste sind und von Stockung einer gallertartigen Lymphe herrühren, und oft schält sich die Haut mehrmals des Jahres in grossen Stücken ab, wie es die Schlangen thun (Tyrus, daher die Benennung Lepra Tyria). Es entstehen Risse und Geschwüre in der Haut. Das Antlitz wird wassersüchtig, das Zahnfleisch ist schwammig und faulig, die Haare gehen aus, die Sinne werden stumpf, das aus der Ader gelassene Blut ist weisslich und trübe und der Blutkuchen weisslich oder aschgrau. Der Tod wird durch Abzehrung und Wassersucht herbeigeführt.

§. 1344.

2) *Der schuppige* oder *raudige Aussatz* (Lepra squamosa, L. Graecorum, L. Ichthyosis, Baras nigra). Es kommt hier die dunkle Morphea vor, die Grindmäler

breiten sich in Ringen aus. Es bildet sich eine grosse Masse von Schuppen und Borken, so dass man Hände voll aus dem Bette nehmen kann. Die Haut ist zwischen den Schuppen entzündet und brennt besonders zur Nachtzeit sehr heftig, sie wird rissig, erhält Geschwüre, auf welchen weisse, speckähnliche Stellen sich zeigen, die Nägel werden kolbig, die Haare spalten sich und fallen aus, oft schwellen die Leistendrüsen an und es entstehen in verschiedenen Theilen harte Knoten. Reichliche, besonders stark bockicht riechende Schweisse stellen sich ein, Heiserkeit, Engbrüstigkeit, Abzehrung. Endlich kommen Ohnmachten und Zuckungen hinzu, unter welchen der Tod eintritt.

Eine blos an den Beinen oder den Armen erscheinende Abart des schuppigen Aussatzes, wobei missfarbige und oft schwärzliche Schorfen losgetrennt werden und der ergriffene Theil unempfindlich wird, hat man den Todtenbruch (Malmorto, Malum mortuum) genannt.

§. 1345.

3) *Der knollige Aussatz* (Lepra tuberculosa, nodosa universalis, Elephantiasis der Griechen, Lepra oder Lepra Elephantia Arab.). Es geht demselben das dunkle Maal vorher und häufig entwickelt er sich auch aus dem raudigen Aussatz. Meistens schwellen die Leisten- und Achseldrüsen zuerst an, das Antlitz wird roth oder bleifarbig und angeschwollen, es bilden sich an den Augenbraunen und sodann im ganzen Gesichte harte, unempfindliche Knollen, von der Grösse einer Erbse bis zu der eines Eies, in welche man selbst Einstiche machen kann, ohne dass es der Kranke spürt, und die das Antlitz furchtbar verunstalten, eben solche Knollen erscheinen an den Füssen und den Armen, und in geringerm Grade an dem Leibe. Zwischen diesen Knollen ist die Haut rissig und legt sich in Falten, insbesondere befinden sich solche Risse in den Lippen, welche auch mit über-

füllten Gefässchen durchzogen sind und leicht bluten, so wie auch das Zahnfleisch schwammig und zerfressen ist. Die Augen ragen kugelrund hervor und der Blick ist entweder stier und wild oder ganz erloschen. Die Kranken verfallen in tiefe Melancholie und selbst Wahnsinn, die Sinne werden stumpf, die Stimme heiser, und es gesellt sich Engbrüstigkeit und Auszehrung hinzu. — Zuweilen gehen auch die Knollen in krebsartige Geschwüre über, welche auf der Oberfläche ein schwammiges Aussehen haben, mit himbeerähnlichen Auswüchsen besäet sind und verdickte und knollige Ränden haben. Es kommen gewöhnlich zu diesen Geschwüren bald Knochenschäden hinzu und ganze Gliedmassen sterben ab (der knollige, geschwürige Aussatz, den man auch wegen des damit verbundenen furchtbaren Aussehens des Antlitzes, das dem des Löwen gleichen soll, Lepra leonina genannt hat).

Oft ist der knollige Aussatz nur auf eine einzelne Stelle, insbesondere eine Gliedmasse beschränkt (der locale Aussatz, das Knollbein, Elephantenfuss). Es schwellen die Achsel oder die Leistendrüsen an, von welchen sich ein rother Streif nach dem Verlaufe der Saugadern herabzieht, der Fuss oder der Arm schwillt an, wird hart, glänzend und man kann keine Grube in dieselben drücken. Die Geschwulst wird unförmlich dick, völlig unempfindlich und oft mit Schuppen bedeckt. Die Nägel werden schäbig und kolbig. Das Allgemeinbefinden ist oft wenig gestört, nur dass hier leicht, wie in dem Aussatz überhaupt, ein Wechselfieber (F. quartana) vorhanden ist. So kann die Krankheit viele Jahre, ja Zeitlebens bestehen, wenn nicht das Knollbein in Verschwärung geräth.

§. 1346.

Bei den Leichenöffnungen fand man die Haut sehr verdickt, das Zellgewebe und die Muskeln oft in eine

gleichförmige, speckartige Masse verwandelt, welche oft fest an dem Knochen anliegt. Die Blut- und Lymphgefässe sehr ausgedehnt und letztere zuweilen zerrissen. Die Drüsen zuweilen weich und mit einer gallertartigen Flüssigkeit bedeckt, meistens aber hart und scirrhös, die Knochen ausgedehnt, oft erweicht, ohne Höhle und Mark. In verschiedenen innern Eingeweiden Verhärtungen und auch Verschwärungen, namentlich auch Geschwüre im Darmkanal, besonders an der Bauhinischen Klappe.

§. 1347.

Der rothe Aussatz (Lepra rubra). Derselbe fängt mit einer fremdartigen Röthe, besonders im Gesichte, an (Kupferhandel), welche auch oft ins Bleifarbige und ins Erdfarbige spielt, dabei sind die Theile geschwollen, es erscheinen viele feine, finnenartige Knötchen und auch Blasen auf der ganzen Haut, welche in Geschwüre übergehen, die Jauche und Blut von sich geben, und oft auch die Haut und selbst die Knochen zerstören. Die Haare gehen aus, der Urin wird dick, öligt, das Zahnfleisch wird aufgelockert, Blutungen aus verschiedenen Theilen stellen sich ein und es entwickelt sich ein allgemeiner scorbutischer Zustand.

§. 1348.

Willan und *Bateman* haben den Aussatz nach der Verschiedenheit der Veränderung in der Haut in zwei Krankheitsgattungen geschieden, die in verschiedene Klassen von Exantheme eingereiht wurden. 1) Die Lepra (schuppigen Aussatz), mit den Arten Lepra vulgaris, L. alphoides und L. nigricans, und 2) Elephantiasis; es geht jedoch die Verwandtschaft beider Krankheiten daraus hervor, dass der knollige Aussatz häufig aus dem schuppigen entsteht, und der schuppige oft mit Knoten in verschiedenen Theilen des Körpers verbunden ist.

§. 1349.

Es kommt der Aussatz, ausser den angegebenen,

noch unter andern Formen vor, die übrigens als Modificationen der schon beschriebenen Arten angesehen werden können; dahin gehören:

Die *Flechte von Aleppo*[1]) (das aleppische Zeichen, aleppische Geschwür), welche übrigens kaum zu dem Aussatz gerechnet werden kann und in einer, fast alle Einwohner von Aleppo befallenden und insbesondere im Gesichte vorkommenden rothen, juckenden Blatter besteht, welche nach mehrern Monaten oder erst nach einem Jahre in eine Borke übergeht und eine hässliche Narbe zurücklässt.

Das *Pellagra*[2]) (die mailändische Rose, Pellagra, Lepra lombardica). Dasselbe äussert sich durch Röthungen an den den Sonnenstrahlen blosgestellten Theilen, insbesondere dem Gesichte und dem Rücken der Hände, welche in kleienartige Abblätterung übergehen und womit ein bedeutendes Allgemeinleiden, insbesondere das Gefühl von Taubheit der Glieder, Schwindel, Melancholie, die in den höhern Graden der Krankheit bis zum Selbstmord führt, und eine sehr übelriechende Hautausdünstung verbunden ist. Das Uebel kommt alle Frühjahre zurück und verschwindet gegen den Herbst beinahe ganz. Allmählig wird aber die Haut hart, rauh und gefurcht, die Haare borstenartig, die Nägel klauenartig, es entstehen juckende, brennende Bläschen, über den ganzen Körper verbreitete

1) *Ferriere's Sauveboeuf's* Reisen in die Türkei. — *Alex. Russel's* Naturgeschichte von Aleppo. — *Haselquist* (in den schwedischen Abhandlungen. 12ter Bd.)

2) *Frapolli* (lat. Mediolan. 1771). — *Gherardini* (Milan. 1780). — *Jansen* (lat. Lug. Bat. 1787). — *Strambio* (Mediolan. 1786—89). — *Franzago* (Pad. 1789—1816). — *Perinetti* und *Cerri* (übersetzt v. Schlegel, Jena 1807). — *J. Frank* (Prax. med. univ. praecept.). — *Marzari* (Venedig 1810—19). — *Chiaruggi* (Firenz. 1814). — *Zecchinelli* (Pad. 1818). — *Filippi* (Neapel 1819).

flechtenartige Ausschläge, Kopfgrind, scorbutische Sugillationen und an dem Zahnfleisch bösartige aphthöse Geschwüre. Auch kommen Krämpfe, Lähmungen, der schwarze Staar, Durchfälle, Abzehrung und Wassersucht hinzu.

Die *asturische Rose*[1]) (Lepra asturica, Rosa asturica). Dieselbe kann als eine Abart des Pellagras betrachtet werden. Es entsteht hier an verschiedenen Theilen eine Hautröthe, welche in die Bildung schwärzlicher, stinkender und rissiger Krusten übergeht. Zuweilen bricht der Ausschlag am Halse aus und zieht sich vom untern und vordern Theil des Halses zu beiden Seiten des Brustbeines bis zur Mitte der Brust herab (das asturische Ordensband). Es kommen verschiedene Nervenzufälle, Melancholie, ein scorbutischer Zustand, Abzehrung und Wassersucht hinzu.

Das *Mal rouge von Cayenne*[2]). Es ist durch rothe und gelbliche Flecke, die sich immer mehr ausbreiten und Schuppen bilden, durch Verdickung der Haut, die Entstehung von Knollen an den Lippen und Ohren und Flechten und Pusteln am ganzen Körper, die in stinkende, schmutzigrothe, mit schwammigen Auswüchsen versehene Geschwüre übergehen und durch Beinfrass und andere Knochenkrankheiten ausgezeichnet.

Die *krimmische Krankheit*[3]) (Morbus s. Lepra crimensis). Sie besteht vorzüglich in rothen Flecken, die

1) *Thiery* (phys. med. Beob. an verschiedenen Orten in Spanien gesammelt, aus d. Franz. v. Fischer, 1794, und in der Sammlung auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte. B. 2.). — *Townsend* (Voyage en Europe 1786 u. 87).

2) *Forster* (Reise um die Welt). — *Bajon* (mem. pour servir à l'histoire de Cayenne. Par. 1777). — *Bergeron* (Par. 1824).

3) *Pallas* (Reisen. B. I. S. 302.). — *Gmelin* (Reisen. B. II. S. 169.). — *Martius* (Leipz. 1816 u. Freiberg 1819).

besonders im Gesichte ausbrechen und sich mit Schuppen bedecken, auf welchen nach Monaten oder Jahren sich harte Beulen und Knollen erheben, die endlich aufbrechen und in um sich fressende Geschwüre ausarten. Solche Geschwüre bilden sich nach 5 bis 6 Jahren auch im Innern der Nase, des Mundes, der Luftröhre, des Schlundes etc., wodurch Abzehrung herbeigeführt wird.

§. 1350.

Ursachen. Der Aussatz ist erblich und ansteckend, und wird vorzüglich durch den Beischlaf fortgepflanzt. Er entwickelt sich meistens erst zur Zeit der Mannbarkeit, kommt mehr in heissen, als in kalten Klimaten vor, und wird vorzüglich der grossen Hitze, einer feuchten und mit Sumpfausdünstungen angefüllten Luft, dem Genusse des Schweinefleisches im Morgenlande, eingesalzener und faulichter Fische uud anderer schlechter Nahrung, Unreinlichkeit, Stockungen im Pfortadersysteme, Verhärtungen von Unterleibseingeweiden, und vorzüglich auch der Lustseuche und entartetem Krätzstoffe zugeschrieben; man kennt übrigens die genügenden Ursachen des Aussatzes, der noch jetzt ohne Ansteckung entsteht, nicht. Die Ursachen, warum in verschiedenen Gegenden bestimmte Arten von Aussatz einheimisch sind, sind, wie es scheint, die Ansteckung und auch Eigenthümlichkeiten in der Lebensweise der Einwohner, so wie in der Beschaffenheit des Klimas und des Bodens. Der weisse Aussatz, welcher jetzt sehr selten ist, kam zu Moses Zeiten in Aegypten, Arabien und Palästina häufig vor. Der raudige Aussatz war vorzüglich in Griechenland einheimisch und verbreitete sich auch über Europa, wo er unter dem Namen der argen Raude bekannt war. Der knollige Aussatz soll in Aegypten entsprungen sein und sich von da bis zum Euphrat verbreitet haben, doch kommt er auch in Europa, Africa und Amerika vor, besonders das Knollbein. Der rothe Aussatz, welcher

für eine Verbindung des Aussatzes mit dem Scorbut gehalten wird, herrschte besonders im Mittelalter im Abendlande und kommt noch jetzt unter Modificationen, wie in dem Pellagra, der asturischen Rose etc., daselbst vor. Das Pellagra ist in der gebirgigen Gegend von Mailand endemisch, während an den Ufern des Po's das Wechselfieber herrscht und kommt vorzüglich bei Landleuten vor. Die asturische Rose ist in den tiefen, mit Nebeln bedeckten Thälern des Oviedo, in welchen auch die Nahrungsmittel eine wässerige, kraftlose Beschaffenheit haben sollen, vor. Die krimmische Krankheit ist in der Gegend um Cherson, in Astrakan und am Jaik zu Hause. Von der Flechte von Aleppo wird vorzüglich das dortige Wasser als Ursache beschuldigt.

§. 1351.

Vorhersage. Der ausgebildete Aussatz wird höchst selten gehoben, am meisten ist die Heilung noch bei dem raudigen Aussatz möglich, doch sind die angeführten Modificationen des Aussatzes nicht alle in demselben Grade gefährlich, insbesondere ist die Flechte von Aleppo nur ein leichtes Uebel.

§. 1352.

Behandlung. Es ist noch am meisten Rettung möglich, wenn der Kranke bei den ersten Spuren der Krankheit seine ganze Lebensweise verändert und insbesondere, wenn er den Ort und die Gegend verlässt, in welcher der Aussatz endemisch ist. Auch soll derselbe den Beischlaf vermeiden und man hat selbst die Castration von Nutzen gefunden.

Eine einigermassen sichere Behandlung ist noch nicht bekannt. Im allgemeinen sind dieselben Mittel, wie gegen Herpes, in Anwendung gekommen, welchen man noch, besonders bei den Modificationen, die zu dem rothen Aussatz gehören, antiscorbutische Mittel hinzugefügt hat. Antimonialien, Quecksilbermittel (besonders

bei dem schuppigen Aussatz und syphilitischem Ursprung), Schwefel, Quajak, Stipites - Dulcamarae etc., auch die Kanthariden und selbst der Arsenik, so wie Brunnkresse, Sauerampfer, Meerrettig, Senf, ein gutes, bitteres Bier, Limonade und sehr verdünnte Mineralsäuren, Buttermilch, Molken, Cocusmilch, Milchdiät, Vipernfleisch und Vipernbrühe etc.; sind die Kräften gesunken, auch erregende Mittel und die China, und bei sich entwickelndem Wechselfieber die gewöhnlichen Fiebermittel. Aeusserlich: einfache Wasserbäder, Dampfbäder, Schwefelbäder, Waschwasser und Salben mit Quecksilbermitteln, das Auflegen der frischen Blätter von Chenopodium bonus Henricus, ein starker Aufguss von Ledum palustre, und auch ätzende Dinge, spanische Fliegen mit Senf und scharfem Essig (bei den Morpheen angewandt) und selbst Arsenik. Gegen das Knollbein hat man insbesondere Compression, vermittelst eines angemessenen Verbandes, auch die Dampfdouche und Einreibungen von Jodsalben in Anwendung gebracht und auch das leidende Glied amputirt, worauf sich aber das Uebel bald an einem andern Theile entwickelte.

Der Weichselzopf.

(*Wichtelzopf*, *Plica polonica*, *Trichoma*, *Godziec*.)

Hercules Saxonia (lat. Patav. 1600). — *Minadous* (lat. Patav. 1600). — *Bonfiglius* (Bresl. 1712 und Krakau 1720). — *Erndtel* (Varsovia physice illustrata. Dresd. 1730). — *De la Fontaine* (chir. med. Abhandl. verschiedenen Inhalts, Polen betreffend. Bresl. 1792). — *Brera* (Samml. auserles. Abhandl. B. 20.). — *Dufour* (ebendas. B. 24). — *Schlegel* (mit 4 ill. Kupf. Jena 1806). — *Hecker* (Erf. 1810). — *Chromy Edl. v. Rumfeld* (Freiburg 1813). — *Jos. Frank* (act. clin. ann. 3—6, auch Mémoire sur l'origine et la nature de plique polonoise. Viln. 1814, und in dessen prax. med. praecept.). — *Gadowski* (Diss. Par. 1814). — *F. Bondi* (Berl. 1828).

Abbildungen von *Schlegel* und *de la Fontaine* in d. angegebenen Werken, *Alib.* Tab. 18 bis 22 und *Struve*. Tab. I.

§. 1353.

Der **Weichselzopf** ist die chronische, ansteckende Krankheit der behaarten, so wie der mit Nägel versehenen Theile, welche vorzüglich durch Verklebung der Haare unter einander durch eine klebriche Lymphe, wodurch meistens dieselben zu unförmlichen Zöpfen sich gestalten, so wie auch durch eine eigenthümliche Entartung der Nägel sich auszeichnet.

§. 1354.

Verlauf. Entweder beginnt die Krankheit mit einem Leiden in andern, als den behaarten Theilen des Körpers (Vorläufer), welches viele Monate und selbst Jahre lang dauern kann, bevor der Weichselzopf sich entwickelt, oder die Krankheit fängt sogleich mit dem Leiden der behaarten Hautstellen an, was besonders der Fall ist, wenn dieselbe durch Ansteckung veranlasst worden ist (der selbstständige Weichselzopf). Die Vorläufer sind: catarrhalische, rheumatische und gichtische Beschwerden und den syphilitischen gleichende Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Sausen in den Ohren, Triefen der Augen und Abnahme des Gehöres und der Sehkräfte,

Hypochondrie, Wahnsinn und Krämpfe, auch Engbrüstigkeit, Druck in der Magengegend, Erbrechen, Hämorrhoidalzufälle, mannigfaltige chronische Hautausschläge, namentlich der Kleiengrind des Kopfes, Anschwellungen der Drüsen und der Gelenke, besonders an den letzten Phalangen der Finger, äussere Geschwüre, weisser Fluss, ein dicker Niederschlag im Urin, Bluthusten und eiteriger Auswurf aus der Lunge, selbst auch Beinfrass etc. und zuletzt selbst acute Krankheiten, z. B. Lungenentzündung, Fieber etc.

§. 1355.

Nach diesen und ähnlichen Vorboten und in seltenern Fällen auch ohne dieselben, entsteht ein Gefühl von Prikeln in der Kopfhaut und auch zuweilen an andern behaarten Stellen, so wie unter den Nägeln, das Ohrenschmalz wird reichlich abgesondert und es brechen reichliche, übelriechende Schweisse am Kopfe aus, wobei oft Frostschauer und Hitze vorhanden sind. Die Haarzwiebeln schwellen an und es lässt sich eine klebrichte, öligte, oft blutige und übelriechende Materie aus denselben herausdrücken, und die Haare selbst werden mit einer ähnlichen, klebrichen Materie bedeckt. Die innern Krankheitszufälle lassen gewöhnlich nach dem Ausbruch dieser Hautkrankheit nach. Indem nun die Haare durch die ausgeschwitzte klebrichte Feuchtigkeit zusammengeklebt werden und immer dabei fortwachsen, bilden sie oft einen oder mehrere Zöpfe, die oft eine Länge von mehrern Ellen erhalten, oder stellen ein ausserordentlich dickes, oft nestartiges Gewirre von Haaren dar (Plica longicauda, Pl. langicaud. lateralis, Pl. l. fusiformis, Pl. l. falciformis, Pl. l. clavaeformis, Pl. caput Medusae, Pl. cap. Med. laciniata, Pl. cap. Med. cirrhata, Plica cespitosa Alib.). Nach mehrern Schriftstellern (*Gehema*, *Brera*, *Dufour*) bluten in den höhern Graden der Krankheit die trichomatösen Massen und die Haare, wenn man

sie, auch ganz entfernt von ihrer Wurzel, durchschneidet und werden zuweilen (nach *Alibert*) sehr empfindlich, ja es sollen sich öfters diese Massen entzünden und sich wahre Abscesse bilden, aus welchen, wenn sie geöffnet werden, eine grosse Menge Eiter sich ergiesst; doch wird von Andern (*de la Fontaine* und *Jos. Frank*) das Bluten und Sensibelwerden der Haare geläugnet. Zugleich werden oft die Wurzeln der Nägel mit einer weissen, talgartigen Materie bedeckt, die Spitze der Finger und Zehen wird entzündet und die Nägel werden schmerzhaft, roth, bleifarbig oder braun, dick, höckerig und oft zu unförmlichen Krallen umgebildet.

§. 1356.

Es hat die Krankheit häufig eine Dauer von mehreren Jahren. Zur Gesundheit geht dieselbe über, indem allmählig die Absonderung jener klebrichen Lymphe aufhört und gesunde Haare auf der krankhaften Stelle hervorwachsen, an welchen zuletzt der Zopf hängt und abgeschnitten werden kann oder von selbst abfällt. — Wird die Entwicklung des Weichselzopfes durch voreiliges Abschneiden der Haare, Verkältung oder äussere zurücktreibende Arzneimittel gehemmt oder kommt die Krise durch die Haut aus irgend einer andern Ursache nicht zu Stande, so entstehen leicht innere Entzündungen, Eiterungen, Abzehrung, Wassersucht, Fallsucht, Schlagfluss etc.

§. 1357.

Die Anlage soll erblich sein; die Krankheit kommt bei jedem Alter und Geschlechte vor (auch bei Thieren), wird aber am wenigsten bei Individuen vom Kindes- und solchen vom Greisenalter wahrgenommen. Die Gelegenheitsursachen sind ausser der Ansteckung wenig bekannt, indem sämmtliche beschuldigte Einflüsse sonst sehr häufig auf den Menschen einwirken, ohne diese Krankheit hervorzubringen. Hieher gehören: Unreinlich-

keit, wesshalb die Krankheit vorzüglich bei Individuen aus der ärmern Volksklasse und bei Juden vorkommt, das Tragen von Pelzmützen und das zu grosse Warmhalten des Kopfes, das Abscheeren der Haare, wodurch die durch die Haare geschehende Ausdünstung unterdrückt werde, der übermässige Genuss des Branntweins, so wie öligter Speisen, schlechter Häringe etc., die stinkenden Ausdünstungen der Weichsel und anderer Flüsse, so wie der Sümpfe in Polen, Verkältung in neblichter Luft, schlechtes Trinkwasser etc., Gemüthsbewegungen, syphilitische Ansteckung etc. Der Ansteckungsstoff des Weichselzopfes ist ein Contagium von specifischer Art, derselbe ist fix und haftet daher an festen Trägern, insbesondere den Kopfbedeckungen.

Es soll diese Krankheit im dreizehnten Jahrhundert durch die Tartaren nach Polen gebracht worden sein. Es ist die Krankheit in Polen, in der Tartarei und den angrenzenden Ländern endemisch, kommt aber auch in seltenen einzelnen Fällen in andern Ländern vor. [1])

§. 1358.

Ueber die Natur des Weichselzopfes ist man verschiedener Ansicht. Einige ältere und auch neuere Schriftsteller, *Hercules de Saxonia* und *Wolfram*, hielten den Weichselzopf für eine Modifikation der Syphilis, *Schlegel* für eine Gichtmetastase und *Jos. Frank* für eine eigene Art des Aussatzes, welche letztere Meinung die gegründetere zu sein scheint.

§. 1359.

Vorhersage. Der Weichselzopf ist in vielen Fällen heilbar, oft aber auch nicht. Da immer ein bedeutendes Allgemeinleiden dem örtlichen zum Grunde liegt (die trichomatische Dyscrasie) und das örtliche selbst ein

1) Der Weichselzopf in Deutschland. Inaugural-Abhandl. von v. Steinkühl, mit 1 Abbildung. Würzburg 1817.

sehr bedeutendes ist, so ist die Krankheit auch lebensgefährlich. Oft bleiben auch Nachkrankheiten, Taubheit, Lähmungen, Drüsenkrankheiten, Beinfrass etc. zurück.

§. 1360.

Behandlung. Es ist noch kein Mittel bekannt, durch welches man den Krankheitsprozess unmittelbar zum Erlöschen bringen könnte, wie z. B. durch das Quecksilber die Lustseuche. Die beim Weichselzopf üblichen Heilverfahren sind vorzüglich solche, durch welche man bei den vorhandenen Vorboten oder bei sehr langsamer Entwicklung der Hautkrankheit, die Lebensthätigkeit gegen die Haut hin zu leiten und dadurch die Krise zu beschleunigen sucht, doch mag auch hierdurch zuweilen die Krankheit in der Haut unterhalten und vermehrt werden, wie z. B. auch der Friesel durch die diaphoretische Methode. Man empfiehlt zu dem angegebenen Zwecke die Antimonialien, allein oder in Verbindung mit Merkurialien, den Schwefel (nach *J. Frank* in Verbindung mit Extr. Hellebor oder Cicut.), das Guajack, den Kampher, das doversche Pulver und die als Volksmittel bekannte Vinca Pervinca, auch empfiehlt man Warmhalten des Kopfes und wendet reitzende Fomentationen auf die behaarten Theile an, z. B. von einer Abkochung von Lycopodium Selago, Vinca minor etc., so wie auch Senfteige, Blasenpflaster und andere die Haut reitzende Mittel. Bei gefährlichen Zufällen, die man von einem nicht zu Stande kommenden Weichselzopfe herleitet, wendet man selbst die Einimpfung durch das Auflegen eines vor kurzem abgeschnittenen Weichselzopfes an, doch lauft man bei einem solchen Unternehmen leicht Gefahr, den Weichselzopf ohne Noth zu erzeugen und trägt hierdurch auch zur weitern Verbreitung der Krankheit bei. — Sind mit dem Weichselzopf eine beträchtliche Entzündung der Kopfschwarte und andere bedeutende örtliche Zufälle ver-

bunden, so setzt man Blutegel an den Kopf, Blasenpflaster in den Nacken und wendet auch Abführungsmittel an. – Es ist Regel, den Zopf nicht eher abzuschneiden, bis er an gesunden Haaren hängt. In dem Volke soll es üblich sein, um das Wachsen des Zopfes abzukürzen, denselben zwischen zwei glatten Steinen oder Hämmern zu klopfen. Ist der Zopf entfernt, so muss man den Kopf des Kranken vor Verkältung schützen.

§. 1361.

Einen grössern Erfolg, als die Behandlung der Krankheit, versprechen Maassregeln zur *Prophylaxis* derselben, die vorzüglich in solchen zur Verhinderung der Ansteckung bestehen müssten. So wie es geglückt ist, mehrere andere ansteckende Krankheiten, namentlich den Aussatz und die Pest aus Europa zu verdrängen, so scheint es auch möglich zu sein, den Weichselzopf auszurotten oder wenigstens sehr selten zu machen.

Die Beerschwämme.

(*Thymiosis.*)

§. 1362.

Es giebt erdbeer-, himbeer- und maulbeerartige Auswüchse der Haut, die man zu den Hautausschlägen zählt. Aehnliche Excrescenzen kommen schon in der gewöhnlichen Syphilis vor, vorzüglich stellen diese Gestalt aber jene Hautveränderungen dar, die ein Theil der Syphiloiden sind, zu welchen gewöhnlich der Scherlievo, die Sibbens, die Radesyge, die Marschkrankheit und das Mal de Chicot gerechnet werden, zu welchen übrigens auch noch die Yaws und Pians, die in ihrer

Form und Entstehungsweise viele Aehnlichkeit mit den genannten Krankheiten haben, gehören. Ich werde diese Krankheiten, da der Ausschlag nicht allein oder vorzugsweise die Krankheitsform bildet, sondern innere Leiden, z. B. Knochenkrankheiten, wesentlich zu derselben gehören, unter den Cachexien abhandeln, wo sie am schicklichsten den Platz neben der Lustseuche einnehmen, von der sie gröstentheils eine Modification zu sein scheinen.

VIERTE ORDNUNG DER HAUTAUSSCHLÄGE.

Die unverändert bleibenden ausschlagsartigen Hautfehler.

Die von mir als vierte Ordnung der Hautausschläge angeführten Hautfehler bilden eigentlich keine eigene Familie von Hautausschlägen, denn insofern einige derselben als Symptom einer frühern oder noch bestehenden Krankheit betrachtet werden können, müssen sie zu den symptomatischen Ausschlägen gezählt werden, und insofern sie die unmittelbare Folge von äussern, zunächst auf die Haut wirkenden Einflüssen sind, können sie eigentlich nicht zu den Ausschlägen gerechnet werden; um jedoch dem gewöhnlichen Gebrauche, diese Hautfehler unter den Ausschlägen anzuführen, folgen zu können, und da von allen hier erwähnten Formen in den meisten Fällen der symptomatische Ursprung eben so wenig als etwas Specifisches nachgewiesen werden kann, so stellte ich diese Hautfehler als eine vierte Reihe auf, die jedoch weniger als eine eigene Ordnung von Ausschlägen, als vielmehr als Anhang zu der Lehre von den Hautausschlägen betrachtet zu werden verdienen. Da diese Hautfehler, wenn sie ein-

mal vorhanden sind, in der Regel lange Zeit oder immer unverändert stehen bleiben und daher auch nicht anzunehmen ist, dass ein fortdauerndes inneres Leiden auf dieselben wirke, so glaube ich diese Eigenschaft als das vorzügliche characteristische Merkmal dieser Reihe von Hautkrankheiten anführen zu müssen.

Die Sommersprossen.

(*Sommerflecken*, *Sonnenflecken*, *Ephelis*, *Lentigo*, *Chloasma Ephelis.*)

Abbildungen von *Alib.* Tab 59.

§. 1363.

Die Sommersprossen sind bräunliche, nicht juckende und nicht über die Haut erhabene, glatte Flecken von der Grösse bis zu einer Linse, welche vorzüglich im Gesichte, aber auch an andern, von den Kleidern nicht bedeckten Theilen der Haut entstehen, am häufigsten bei Individuen von zarter Haut und blonden oder rothen Haaren vorkommen und vorzüglich durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen hervorgebracht werden. Dieselben nehmen jeden Sommer zu, indem sie deutlicher hervortreten oder auch neue sich bilden, und im Winter ab, verschwinden jedoch selten vollständig. Sie stehen mit keinen innern Störungen in Verbindung.

§. 1364.

Behandlung. Schutz gegen die Einwirkung der Sonne durch das Tragen von Schleiern. Man empfiehlt Waschwasser von Wasser mit Zusatz von Essig oder Citronensaft, einer geringen Menge Mineralsäure, Meerzwiebelessig, Alaun, Bleipräparate, Borax, Benzoetinktur, so wie mit einer Emulsion von bittern Mandeln, eine Masse von bittern Mandeln, Honig und Weinessig, statt der Seife gebraucht, das Bestreichen mit Campheröl, mit reiner

Ochsengalle oder einer Art Salbe von Ochsengalle und Oleum Tartari per deliquium bereitet, was Abends geschehen kann, worauf am andern Morgen das Gesicht mit Seifenwasser abgewaschen wird, und auch beinahe sämmtliche, gegen flechtenartige Ausschläge gebräuchliche Mittel.

Der Leberfleck.

(*Laubfleck*, *Macula hepatica*, *Chloasma hepaticum*, *Vitiligo hepatica*.)

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 96, und *Alib.* Tab. 60.

§. 1365.

Die Leberflecken sind Fecken von gelbbräunlicher und zuweilen ins gräulich-bräunliche und schwärzliche gehender Farbe, von der Grösse einer Linse bis zu der einer Hand und darüber, welche vereinzelt stehen und meistens weder jucken noch sich verändern, sondern oft das ganze Leben unverändert stehen bleiben, doch zuweilen auch gelind juckend sind und ganz feine Schuppen bilden und in seltenen Fällen auch wiederum vergehen, namentlich die in der Schwangerschaft entstandenen. Sie kommen in den Weichen, auf der Brust, im Gesichte und an andern Theilen vor. — Haufig ist das Uebel angeboren; auch werden die Schwangerschaft, Hämorrhoiden, Unordnungen in der monatlichen Reinigung und gestörte Gallenabsonderung beschuldigt.

§. 1366.

Behandlung. Ist ein inneres Leiden vorhanden, das mit den Leberflecken in Verbindung stehen könnte,

so muss man auf dieses wirken. Die äusserlichen Mittel, die man empfohlen hat, sind dieselben Mittel, die auch gegen die Sommerflecken gebräuchlich sind.

Die Warzen.
(*Verrucae.*)

§. 1367.

Die Warzen sind meistens lange Zeit unverändert stehen bleibende und aus keiner bekannten Ursache entstandene oder durch eine äussere Einwirkung hervorgebrachte Veränderungen in der Haut, doch entstehen sie zuweilen, ähnlich den symptomatischen Ausschlägen, aus einem innern Leiden, vorzüglich der Lustseuche. — Da zu ihrer Behandlung meistens chirurgische Hülfe nothwendig ist, so wird ihre Darstellung auch gewöhnlich in den Lehrbüchern der Chirurgie gegeben.

Die Mollusken.
(*Mollusca.*)

§. 1368.

Die Mollusken sind weiche, bewegliche, mit einer breiartigen Materie gefüllte, in der Haut sitzende Bälge, welche von der Farbe der Haut oder etwas bräunlich sind, bald flach sind und eine breite Basis haben, bald gestielt sind, allmählig sich vermehren, so dass sie zuletzt in grosser Menge vorhanden sind und

das Aussehen verunstalten, und in der Regel stehen bleiben. — *Bateman* nimmt ein Molluscum contagiosum an, welches sich dadurch auszeichne, dass die Geschwülste an der Spitze eine kleine Oeffnung erhalten, aus welcher auf einen Druck eine milchigte Feuchtigkeit ausfliesst, die eine ansteckende Beschaffenheit besitzt und dass die grössern Geschwülste in eine langsame Verschwärung übergehen. — Einen Fall beobachtete ich, in welchem der ganze Körper, vorzüglich das Gesicht, mit Mollusken, die sich nicht öffneten, bedeckt war, und sich zuletzt Brustkrebs entwickelte. Die Mollusken kamen bei drei weiblichen Personen der nämlichen Familie vor. — Es ist kein Mittel bekannt, um dieser Krankheit, die übrigens für sich nicht tödtlich wird, Einhalt zu thun.

Die Keloide.

Abbildungen von *Alib.* Tab. 36 u. 37.

§. 1369.

Die Keloide ist eine von *Alibert* beschriebene, von Einigen aber in Zweifel gezogene Krankheit der Haut, welche in einer kleinen, flachen, meist ovalen oder unregelmässig geformten, harten, dunkel- oder blassrothen, glänzenden Geschwulst, mit einem kleinen Eindruck in der Mitte, besteht. Die Epidermis, die sie bedeckt, ist dünn, gerunzelt, wie Brandnarben. Es ragen diese Geschwülste 1 — 2 Linien in die Höhe, sie haben die Grösse von 1 – 2 Zollen im grössern Durchmesser, oft aber bleiben sie auf der Grösse von 1 — 2 Linien stehen. Bei manchen Kranken sind durchaus keine Schmerzen vorhanden und die Geschwulst bleibt unverändert, bei andern stellen sich Schmerzen ein und zu-

weilen geht die Geschwulst in Eiterung über und hinterlässt eine harte und weisse Narbe. — Die Ursachen der Keloide sind unbekannt und ebensowenig kennt man eine erfolgreiche Behandlungsweise. Die Cauterisation und die Exstirpation haben sich nicht vortheilhaft erwiesen.

Das Hauthorn.

(Dermoceras, cornua cutanea, ceratiasis.)

Abbildungen in *Froriep's* Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. Bd. VII. Nro. 3. und in *Struves* Synopsis. Tab. IV.

§. 1370.

Das **Hauthorn** besteht in einer hornartigen Masse, welche an irgend einer Stelle, am häufigsten aber an einem behaarten Theile, aus der Haut hervorwächst und oft einen Durchmesser und eine Länge von mehreren Zollen erhält, es sitzt nicht tiefer, als die Haut ist, und ist wie diese selbst beweglich, worin es sich von den Hörnern der Thiere unterscheidet. Oft kommt nur eine, zuweilen mehrere solcher Excrescenzen vor. — Am häufigsten entstehen die Hauthörner aus vereiterten Balggeschwülsten, aber auch zuweilen aus Warzen und exulcerirten Hautstellen, zuweilen aber wachsen sie auch aus der unverletzten Haut hervor. Die Basis derselben ist entweder von dem Balge, aus dem sie hervorwuchsen, oder von einer Verlängerung der Oberhaut umgeben. — Man kennt den hinreichenden Grund der Entstehung dieser Hauthorne nicht, doch bemerkt man sie vorzüglich bei ältern Frauen, und glaubt, dass sie

durch eine Verirrung des Bildungstriebes bedingt seien. — Das sicherste Mittel ist die Exstirpation vermittelst des Messers.

Der Fischschuppenausschlag.

(*Ichthyosis.*)

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 16 bis 18 und *Alib.* 62 u. 63.

§. 1371.

Die **Ichthyosis** ist ein verhärteter, warzen- oder hornartiger Zustand der Haut, in grösserer oder geringerer Ausdehnung, welcher mit keinen innern Beschwerden in Verbindung steht.

§. 1372.

Willan und *Bateman* beschrieben zwei Arten von diesem Hautübel: 1) Die *Ichthyosis simplex*. Bei ihrem Beginne besteht die Krankheit blos in einem verdickten, rauhen und missfarbigen Zustand der Oberhaut; beim Fortschreiten nimmt die krankhafte Haut die Beschaffenheit kleiner Warzen an, und ist fest und schwarz und der darüber hinfahrende Finger erhält das Gefühl, als ob er über die Oberfläche einer Feile oder des rauhesten Chagrins gleite. Diese harten Hervorragungen sind oft in rautenförmige Abtheilungen getheilt, einige haben eine gleichförmige Dicke von ihrer Wurzel nach oben, andere einen kurzen, schmalen Hals und unregelmässige Köpfe. An einigen Stellen der Extremitäten und manchmal auch am Rumpfe, sind diese Excrescenzen schuppig, flach und breit und zuweilen übereinander liegend, wie die Schuppen der Karpfen, was jedoch wahrscheinlich von dem Druck der Kleidungsstücke abhängig ist; in

andern Fällen sind sie getrennt stehend und von weisslichen Furchen durchzogen. — Es kommt diese Entartung in grossen, fortlaufenden Flecken vor, welche bisweilen den grössern Theil des Körpers, mit Ausnahme der Beugeseite der Gelenke, des innern und obern Theiles des Schenkels und der Vertiefung längs dem Rückgrat bedecken. Das Gesicht wird in der Regel nicht ergriffen, doch ist ein Fall bekannt, in welchem nur im Gesichte die Entartung sich zeigte. Es ist meistens nicht die geringste Ausdünstung der Haut zu bemerken, dagegen bilden sich oft in einzelnen Theilen entzündete Beulen. Wenn ein Stück der schuppigen Decke hinweggenommen wird, so erzeugt sie sich nicht leicht wieder, die Haut bleibt aber hart und trocken. — 2) Die *Ichthyosis cornea.* Diese ist eine steife, hornartige, zuweilen partielle, zuweilen sich über den ganzen Körper erstreckende Beschaffenheit der Integumente. Hieher rechnen auch *Willan* und *Bateman* die einzelnen hornartigen Excrescenzen, die man jedoch gewöhnlich nicht zu dem Fischschuppenausschlag zählt. — Als eine Modification der Ichthyosis kann die Hyctriciasis (Stachelschweinmenschen) angesehen werden, bei welcher, bei einer ähnlichen Beschaffenheit der Haut, wie bei dem Fischschuppenausschlag, Borsten und Stacheln auf der Haut vorkommen.

§. 1373.

Es ist der Fischschuppenausschlag meistens angeboren und zuweilen erblich; im übrigen sind die Ursachen desselben unbekannt.

§. 1374.

Die **Behandlung** ist meistens ohne grossen Erfolg. Man empfiehlt, die Schuppen durch Bäder zu erweichen und vermittelst der Finger allmählig loszuschälen. *Plumbe* wendet die Compression vermittels Klebpflasterstreifen und Binden an. *Bateman* glaubt von dem inner-

lichen Gebrauch des Pechs und des Arseniks Nutzen gesehen zu haben.

Das Muttermaal
(*Naevus maternus.*)

Abbildungen von *Will.* und *Bat.* Tab. 70 — 72, und *Struve* Tab. 1.

§. 1375.

Die Muttermäler sind im weitern Wortsinne Fehler in der Farbe und Structur einzelner Hautstellen, welche Flecken von verschiedener Form darstellen und ihren Ursprung in der ersten Bildung haben.

§. 1376.

Indem man die Muttermäler dem Versehen zugeschrieben und ihre Formen mit den Gegenständen des angenommenen Versehens verglichen hat, hat man nach ihrer Gestalt verschiedene Arten angenommen, wie Naevus cerasus, ribes, morus, fragarius, araneus, foliaceus etc. Diese Verschiedenheiten in den äussern Umrissen sind unwesentlich und man theilt daher besser die Muttermäler nach Verschiedenheit des krankhaften Gewebes ein, wornach zwei Hauptarten des Muttermaales angenommen werden können:

1) *Das Muttermaal* (Naevus) im engern Sinne des Wortes. Es ist dieses ein Fleck der Haut von verschiedener Gestalt, meistens bräunlich gefärbt und etwas erhaben, in welchem sich keine abnorm entwickelte Gefässe zeigen. Entweder hat dieser Fleck eine glatte Oberfläche (glattes Muttermaal, Naevus glaber), oder er ist mit einem dichten Haarfilze bedeckt (filziges Muttermaal, Naevus tomentosus) oder mit längern starken Haaren (haariges Muttermaal, Naevus pilosus). Diese Art des

Muttermaales verändert sich in der Regel im ganzen Leben nicht mehr.

§. 1377.

2) *Das Blutmaal* (Spilus). Es besteht dasselbe in einem Gewebe von äusserst reichlichen, ausgedehnten und andauernd mit Blut überfüllten feinen Gefässchen (Telangiectasia). Zuweilen sind diese Gefässchen hellroth, wie mit arteriellem Blut überfüllt (das arterielle Blutmaal, Spilus arteriosus). Zuweilen sind sie dunkel- und bläulichroth, wie mit venösem Blute überfüllt (das venöse Blutmaal, Spil. venosus). Meistens sind diese Blutmäler nicht über die Haut erhaben; oft aber auch Geschwülste von einem Convolut von Blutgefässen darstellend (das anevrysmatische Blutmaal, das mehr blutroth ist und das man von einer anevrysmatischen Ausdehnung der arteriellen Blutgefässe herleitet, und das varicöse Blutmaal, das mehr eine bläuliche und schwärzliche Geschwulst darstellt und für eine Ausdehnung venöser Hautgefässe gehalten wird). Zuweilen befinden sich zwischen den Gefässchen Zellchen oder Zwischenräume, welche oft mit einer gallertartigen Materie angefüllt sind (das zellige Blutmaal, Spil. cavernosus). — Es bleibt das Blutmaal oft das ganze Leben hindurch unverändert stehen, zuweilen trocknet es von selbst ein und verschwindet allmählig, was noch geschehen kann, wenn es einen bedeutenden Umfang und Dicke erreicht hatte. Zuweilen geht es von selbst, oder wenn Arzneimittel angewandt worden sind, in ein bösartiges krebshaftes Geschwür über oder es platzen Gefässe und geben zu Blutflüssen Veranlassung.

§. 1378.

Ursachen. Die Muttermäler sind zuweilen erblich. Dass sie durch das sog. Versehen entstehen, ist unwahrscheinlich; eben so wenig genügt es, sie von einem anhaltenden Druck auf einen Theil des Kindes herzuleiten, wiewohl die Telangiectasie in einzelnen Fällen hier-

durch hervorgebracht werden kann. In der Regel ist durchaus keine Ursache von diesen Fehlern aufzufinden.

§. 1379.

Behandlung. Gegen den Naevus sind die Mittel empfohlen worden, die auch gegen die Sommerflecken gerühmt werden; sie sind aber wirkungslos. Die ebenfalls empfohlenen Aetzmittel hinterlassen oft entstellende Narben; am sichersten ist die Exstirpation. — Gegen den Spilus dienen kalte Umschläge und eine angemessene Compression. Das Aetzmittel kann bösartige Geschwüre veranlassen. Den sichersten Erfolg gewährt die Hinwegnahme durch das Messer, doch ist es besser, wenn die Operation für sich wegen der grossen Ausdehnung der Geschwulst gefahrvoll wäre, dieselbe zu unterlassen, da wenigstens das varicöse Blutmaal oft mit den Jahren von selbst verschwindet.

Das Ausgehen der Haare.

(Defluvium capillorum, Madesis.)

§. 1380.

Die Haare fallen oft in grosser Menge aus, so dass der Kopf beinahe kahl wird, sie wachsen aber wieder, was besonders nach hitzigen Krankheiten, z. B. dem Nervenfieber und der Gesichtsrose der Fall ist, oft aber werden sie nicht mehr ersetzt. Meistens gehen die Haare zuerst an dem Vorderhaupt, vorzüglich auf beiden Seiten desselben allmählig aus, so dass die Stirne sehr hoch wird, oft aber auch auf dem Scheitel des Kopfes. Zuletzt gehen oft alle Haare von der Stirne bis zum Hinterhaupte verloren (der Kahlkopf, Calvities); ja manchmal sämmtliche Kopfhaare. In manchen Fällen sind es bestimmt

begränzte Plätze (Areae), auf welchen die Haare ausgehen, was man Glatzmaal und wegen der Aehnlickeit mit den abgehaarten Plätzen bei Füchsen Alopecia genannt hat. Zuweilen kriecht ein solcher kahler Feck in schlangenförmigen Windungen zwischen den Haaren fort, was man das Streifmaal (Ophiasis) nennt. Die Haare werden oft vor dem Ausgehen blasser, dünn und zuweilen auch an ihrer Spitze gespalten. Die Kopfhaut ist oft mit Schuppen bedeckt oder zeigt noch einen bedeutenderen krankhaften Zustand, oft aber ist nichts Regelwidriges an ihr zu erkennen.

§. 1381.

Ursachen. Von dem gewöhnlichen allmähligen Ausgehen der Haare sind die Hauptursachen: eine angeerbte Anlage, das höhere Alter, Schwäche des Körpers, wie z. B. bei zehrenden Krankheiten, niederbeugende Gemüthsaffecte, übermässiger Beischlaf, lange Zeit gestörte Nachtruhe, anstrengende Geistesarbeiten, Kopfschmerzen, die Gesichtsrose, der Grindkopf, der Kleiengrind, die bei der Lustseuche vorkommenden Hautausschläge, der Gebrauch scharfer Haarpuder, das Brennen der Haare beim Frisiren etc.

§. 1382.

Behandlung. Der Kranke darf sich den Schlaf nicht zu sehr entziehen, den Coitus wenig ausüben, man muss genau untersuchen, ob nicht die Kopfhaut an einer ausschlagsartigen Affection leide, und muss diese mittelst geeigneter Salben, Waschwasser und den etwa nöthigen innerlichen Mitteln behandeln etc. Kann man blos eine verminderte Ernährung der Haare als Ursache des Ausfallens derselben betrachten, so sucht man die Lebensthätigkeit zu erhöhen durch gelindes Reiben der Kopfhaut mit grober Leinwand, Zwiebeln etc., Waschungen des Kopfes mit einer Abkochung von rad. Bardanae, rad. Graminis etc mit Wasser, Bier, oder Wasser und etwas

Branntwein, Einreibungen von aromatischen Geistern, fetten Oelen mit Zusatz von ätherischen Oelen, mit der Chininsalbe, mit der aus dem Wiesbadener Wasser bereiteten Sinterseife etc., so wie auch durch öfteres Abschneiden und Abrasiren der Haare.

SIEBENTE KRANKHEITS-FAMILIE.

Die Cachexien und die örtlichen fehlerhaften Bildungsprozesse.

ERSTES HAUPTSTÜCK.

Von den krankhaften Bildungsprozessen im allgemeinen.

§. 1383.

Die Bildungsprozesse sind in vielen Krankheiten fehlerhaft, z. B. in den Fiebern und den Entzündungen, doch können wir dieselben, in so fern sie nur Theile einer andern Krankheit sind, hier nur gelegentlich bei der allgemeinen Untersuchung über die krankhaften Bildungsvorgänge berücksichtigen, eine besondere Betrachtung aber nur denjenigen krankhaften Zuständen der Reproduction schenken, welche eigene Krankheitsarten darstellen. Die meisten hieher gehörenden Krankheiten hat man unter dem Namen Cachexien begriffen, doch ist diese Benennung nicht für alle hier zu betrachtenden Krankheitsformen passend, da das Wort Cachexie eine Krankheit bezeichnet, die mit einem schlechten Aussehen verbunden ist, und es auch krankhafte Bildungsprozesse

in dem Gewebe einzelner Theile giebt, die in den übrigen Geweben keine Veränderung hervorbringen und daher nicht der Krankheit den Ausdruck der Cachexie geben.

§. 1384.

Wir erkennen dreierlei verschiedene Abweichungen vom normalen Zustand des Körpers, die wir einer fehlerhaften Bildungsthätigkeit zuschreiben müssen, 1) die übermässige Ernährung, 2) die verminderte Ernährung und 3) die Umwandlung der flüssigen und festen Theile in fehlerhaft beschaffene Stoffe.

§. 1385.

1) Die übermässige Ernährung. Eine noch so kräftige Ernährung, bei welcher alle Theile des Körpers gleichmässig zunehmen und in ihren normalen Grösse- und Formverhältnissen bleiben, kann niemals Krankheit sein, dagegen müssen wir die übermässige Ernährung als krankhaft anerkennen, in welcher einzelne Theile des Körpers, unverhältnissmässig zu den übrigen Theilen, sich vermehren. Diese unverhältnissmässige starke Ausbildung einzelner Theile ist von verschiedenen krankhaften Zufällen begleitet. Durch die übermässige Ausbildung eines Organs geschehen seine Verrichtungen mit zu vieler Kraftentwicklung, wie z. B. bei der Hypertrophie des Herzens, und eine zu schnelle Verzehrung der Kräfte und mancherlei Störungen in Theilen, auf welche das leidende Organ hinsichtlich seiner Verrichtungen einen Einfluss ausübt, sind die Folgen davon, ebenso werden andere Theile in ihren Verrichtungen durch die Volumszunahme des leidenden Organs gestört etc. Der Tod kann demnach wegen der ungleichmässigen Ernährung durch Erschöpfung der Kräfte, oder was der häufigere Fall ist, durch Hemmung der Verrichtungen eines edlen Organs herbeigeführt werden.

§. 1386.

2) **Die verminderte Ernährung.** Dieselbe spricht sich durch Abmagerung des ganzen Körpers oder einzelner Theile desselben (Schwinden eines Gliedes, Aridura, Tabes partialis) aus. Sehr häufig tritt diese Abmagerung im Gefolge anderer, die Kräfte und Stoffe verzehrender Krankheiten auf, so z. B. in Fiebern, in welchem Falle sie aber nur vorübergehend ist und vorzüglich in langwierigen Krankheiten mit Ausscheidungen von Säften, insbesondere von Eiter (die Schwindsucht, Phthisis im engern Sinne des Wortes), oft aber sind keine solche verzehrende Krankheiten vorhanden, sondern es findet nur der gewöhnliche Wiederersatz der Stoffe nicht statt (die mangelhafte Ernährung, Atrophia, im engern Sinne des Wortes auch, jedoch nicht genügend bezeichnend, Abzehrung, Tabes, genannt), in vielen Fällen sind wohl auch zu schnelle Verzehrung (Phthisis), und mangelhafte Ernährung zugleich vorhanden. Hat die Abmagerung des Körpers einen gewissen Grad erreicht, so gesellt sich, jedoch bei der Phthisis mehr als bei der Atrophie, ein Zehrfieber (Febris hectica) hinzu, durch welches die Erschöpfung der Kräfte des Kranken sehr beschleunigt wird.

§. 1387.

3) **Die Umwandlung der Bestandtheile des Körpers in fehlerhafte Stoffe.** Diese Umwandlungen stellen sehr mannigfaltige Krankheitsformen dar. Oft bemerken wir im ganzen Körper in festen und flüssigen Theilen Veränderungen in der Farbe, in der Dichtheit der Theile, in den chemischen Bestandtheilen u. s. w., und zwar ist oft die Art der Veränderung beinahe überall die gleiche, z. B. Auflockerung und Verflüssigung in den verschiedensten Theilen des Körpers, oft ist sie in ein und derselben Krankheit sehr verschieden, so dass an der einen Stelle Verflüssigung, Ver-

schwärung und an einer andern Verhärtungen und Wucherungen sich bilden, wie z. B. in der Lustseuche. Man kann wohl diese über den ganzen Körper verbreiteten Entartungen, bei welchen immer mehr oder weniger eine Veränderung der Mischung der Säfte und der meisten festen Theile stattfindet, die allgemeine Mischungsausartungen (Dyscrasie) nennen. — In andern Fällen entstehen nur an einzelnen Stellen Veränderungen der Gewebe, es erweicht oder verschwärt das eine oder das andere Organ, oder geht in Verhärtung über, oder es werden an der einen oder der andern Stelle Aftergebilde erzeugt; es können jedoch solche Veränderungen auch im Gefolge von allgemeinen Mischungsausartungen auftreten und auch zuweilen ein allgemeines Leiden der Ernährung herbeiführen. — Diese Stoffumwandlungen sind von mancherlei Krankheitszufällen begleitet. Es sind die Organe, in welchen die krankhaften Bildungen vorzüglich stattfinden, mehr oder weniger in ihren Verrichtungen gehemmt, wodurch sehr viele Krankheitserscheinungen, z. B. Athmungsbeschwerden, unordentliche Herzbewegungen und Gehirnaffection hervorgebracht werden, meistens leiden die Absonderungen, insbesondere ist oft der Harnabgang vermindert oder der Harn trübe, der Magensaft oft sauer und die Verdauung leidet, zuweilen begleiten heftige Schmerzen die örtlichen Entartungen, bei langer Dauer leidet auch wegen starkem Stoffverlust die Ernährung und die Kräften werden erschöpft, häufig kommt auch in den höhern Graden der Krankheit ein Zehrfieber hinzu.

§. 1388.

Der Verlauf der krankhaften Bildungsprozesse ist, in so fern schon materielle Veränderungen eingetreten sind und die Krankheit nicht durch Zerrüttung eines edeln Organs schnell zum Tode führt, immer langwierig. — In Gesundheit gehen diese Krankheiten über entweder durch Wiederherstellung der normalen Verhältnisse in Hinsicht

der Stärke der Ernährung, so dass die Stoffsanlagerung der Verzehrung wiederum das Gleichgewicht hält, oder durch allmählige Umbildung der fehlerhaften Stoffe in gesunde Substanz vermittelst einer kräftigen Ernährung, oder durch Ausführung der kranken Stoffe auf dem Wege der rückschreitenden Metamorphose und durch Wiederersatz durch gesunde Stoffe, oder Aufsaugung fehlerhafter Stoffe, Aufnahme in die Wege der Circulation und Ausscheidung durch verschiedene Absonderungen, oder endlich, indem das fehlerhafte Gewebe sich von dem gesunden lostrennt und durch gesunde Fleischwarzenbildung ersetzt wird. — Nachkrankheiten sind Zerstörungen einzelner Theile und daher Hemmung ihrer Verrichtung und Schwäche im Systeme der Reproduction, wodurch ein cachectischer Zustand bedingt sein kann, der von dem zuerst bestandenen verschieden ist, aber oft leicht wieder in denselben übergeht. — Zum Tode führen die krankhaften Bildungsvorgänge durch Erschöpfung der Kräfte oder durch Zerstörung zum Leben nothwendiger Organe.

§. 1389.

Die Anlage zu gewissen Krankheiten der Ernährung ist oft angeerbt und es entwickelt sich zu einer bestimmten Zeit das Leiden ohne alle erkennbare Gelegenheitsursache und unaufhaltsam. Zu manchen derartigen Krankheiten macht vorzüglich ein gewisses Alter geneigt, wie z. B. zur englischen Krankheit das Kindesalter und zur Lungenschwindsucht das Jünglingsalter, einzelne Krankheitsarten kommen vorzüglich beim männlichen, andere beim weiblichen Geschlechte vor, wie bei ersterm die Rückendarre, bei letzterm die Bleichsucht, endlich bedingt auch öfters das Temperament und die Körperconstitution eine besondere Anlage zu bestimmten Cachexien, wie z. B. das cholerische Temperament zur Gelbsucht und ein sehr fetter Körperbau zu Wassersucht.

§. 1590.

Gelegenheitsursachen sind Fehler in dem Gebrauche der Nahrungsmittel, der Genuss einer zu grossen Menge derselben, Mangel an Nahrungsmitteln, verdorbene oder zu reitzende oder in irgend einer andern Beziehung fehlerhafte Speisen und Getränke, Krankheiten des Magens, der Lymphgefässe und Drüsen, wodurch die Bereitung und die Fortleitung der aus den Nahrungsmitteln gezogenen Stoffe gehindert werden, die Aufnahme von Giften, Miasmen oder von einem Contagium, z. B. dem der Lustseuche in den Körper, fehlerhafte Umwandlung des Blutes in den Lungen, durch den Aufenthalt in einer ungesunden Luft oder durch Krankheiten der Lungen, Zurückhaltungen der Auswurfsstoffe durch Krankheiten der Leber, der Nieren etc., oder auch vermehrte Entleerungen von Säften durch fehlerhafte Milchabsonderungen, Saamenentleerungen, Blutflüsse etc., zu starke Körperanstrengungen, andauernde Geistesanstrengungen, Gemüthsaffecte, Mangel an Schlaf oder zu viel Schlaf, Entbehrung des Lichtreitzes etc.

§. 1591.

Wesen der Krankheit. Die Ernährung geschieht durch eine von den Organen aus stattfindende Anziehung auf gewisse Bestandtheile des Blutes und Umwandlung derselben in bestimmte Organensubstanz durch die eigenthümliche Lebenskraft des Organs. Diese Anziehung könnte nun zwar eine rein chemische sein, so dass die Organe ernährt würden, wie ein Salzkrystall wachst, an den sich die im Wasser aufgelösten gleichartigen Salztheile anlagern, es beweist aber die zu dem ganzen Bau des Körpers passende Form der einzelnen Organe, dass diese Anziehung unter dem Einfluss des Lebens stehe und viele krankhaften Erscheinungen thun dar, dass hierbei das Nervensystem eine grosse Einwirkung zeige, ja die Bildungsgeschichte macht es so viel wie gewiss, dass der

letzte Grund der verschiedenen Gewebebildung in der Verschiedenheit der biochemischen Wirkung liege, die das Nervensystem an verschiedenen Stellen (Polen) äussert, denn im Anfang ist kein Organ vorhanden als der Form nach das Gehirn und Rückenmark, denen sich die übrige Körperform anschliesst und die ganze Substanz besteht aus secundären Bildungskugeln. Diese letztern wandeln sich nun um, je nachdem sie eine Stelle im Körper einnehmen, in Hirn- und Nervensubstanz, in Knochen, in die Muskeln, in die äussere Haut, in den Darmkanal, in die Leber etc. Wenigstens wird die erste Anlage dieser Theile nach der eben angegebenen Weise bewirkt, wenn auch die vollständige Ausbildung erst stattfindet, nachdem der Blutlauf zu Stande gekommen ist.

Demnach ist auch bei den Bildungsprozessen das Nervensystem immer der eine Hauptfactor, ihm gegenüber stehen im Anfange die secundären Bildungskugeln, späterhin verschiedene Similartheile, vorzüglich aber das Blut.

§. 1392.

Untersuchen wir nun, welcher der beiden bezeichneten Factoren des Ernährungsprozesses bei den krankhaften Bildungsvorgänge primär leide, so finden wir, dass es bald der eine, bald der andere sein kann.

Von dem Nervensysteme geht die Krankheit aus: wenn Reitzungen des Nervensystems die Bildung verändern, wie z. B. bei der Hypertrophie des Herzens, welche aus Gemüthsaffecten entsteht, bei der grossen Entwicklung der Muskeln der willkührlichen Bewegung durch starken Gebrauch derselben, bei consensuell erregten Verändungen in den Geweben, wie z. B. bei der Entstehung von Phlyctänen am Munde, welche von gastrischen Reitzen erzeugt sind, bei der Entstehung von Desorganisationen in den Brüsten bei veränderter Lebensthätigkeit in der Gebärmutter u. s. w., und 2) wenn der veränderten Bildung ein Gesunkensein des Nerven-

lebens vorausgeht. Dieses findet z. B. bei der Abmagerung des Körpers, die aus niederbeugendem Gemüthsleiden entsteht, bei der Abmagerung der gelähmten Glieder, bei der Synchysis und Cirsophtalmie, die sich in Folge des schwarzen Staares bilden etc., statt.

§. 1393.

Das Blut ist der zuerst veränderte Krankheitsfactor, wenn der krankhaften Ernährung ein Fehler des Blutes in Hinsicht seiner Menge oder seiner Beschaffenheit vorausgeht, insbesondere wenn es zu wenig ist, wie z. B. nach Blutflüssen, wenn es dünnflüssig ist, sich in der scorbutischen Auflösung befindet, wenn das arterielle Blut mit dem venösen gemischt ist, wie in der Blausucht, oder aus einer andern Ursache eine überwiegend venöse Beschaffenheit des Blutes sich gebildet hat, wenn wegen Unthätigkeit der Nieren, der Leber etc. Harnstoffe, gallichte Stoffe u. s. w. sich in ihm befinden, fremdartige Stoffe durch Aufsaugung in dasselbe aufgenommen worden sind, wie vielleicht in der Lustseuche das venerische Gift etc.

§. 1394.

Ist nun auf die angegebene Weise der eine oder der andere der Factoren der Bildungsprozesse verändert, so treten die angegebenen Veränderungen in den Bildungsvorgängen, wie es scheint, auf folgende Weise ein: 1) Die *Vermehrung der Stoffbildung* geschieht von Seite des Nervensystemes aus, vorzüglich bei den Hypertrophien einzelner Organe, in welchem Falle durch erhöhte Lebensthätigkeit eine vermehrte Anziehung der ernährenden Stoffe nach einem einzelnen Theile bewirkt wird, und von Seite des Blutes aus, wenn im Verhältniss zum Verbrauche zu viele Nahrungsmittel dem Körper dargeboten werden; es vermag übrigens in dem letztern Falle die von den Nerven ausgehende Lebensthätigkeit der Organe nicht immer eine verhältnissmässig eben so grosse Masse

von normaler Organensubstanz zu bilden, sondern es bleibt zum Theil eine grössere Menge Bluts in den Gefässen, zum Theil wird ein weniger vollkommenes Gewebe, nämlich Fett, erzeugt.

§. 1395.

2) Die *Verminderung der organischen Stoffe* tritt ein, wenn die Nerventhätigkeit darnieder liegt, und daher die ernährenden Stoffe weniger durch das Nervensystem angezogen werden und also die Ernährung des leidenden Theiles, im Verhältniss zu der des übrigen Körpers zurückbleibt, wie z. B. bei Lähmung eines Gliedes, so wie auch, wenn die Stoffe nicht in gehöriger Menge vorhanden sind, aus welchen durch die Lebenskraft der Organe die für die Gewebe nothwendigen feinsten Theilchen gebildet werden können. In diesen beiden Fehlern, der verminderten Anziehung und Umwandlung der Stoffe durch verminderte Nerventhätigkeit und in Mangel des Blutes, liegt übrigens noch nicht die zureichende Ursache der Abzehrungen, denn es würde hierdurch nur der Mangel weiterer Körperzunahme, nicht aber das Schwinden der schon gebildeten Gewebe erklärt werden. Ich halte diese Verzehrung in einem doppelten Verhältnisse begründet, erstens und vorzüglich in den in den Organengeweben vor sich gehenden Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Stoffen, wodurch das Organische allmählig zu Unorganischem umgewandelt und ausgeschieden wird, welche Wechselwirkung entweder durch einen eigenen Krankheitszustand vermehrt ist, wie z. B. im Fieber, insbesondere dem Zehrfieber, oder auch in normaler Stärke vor sich geht oder selbst vermindert ist, aber wegen Verminderung oder Zuführung von ernährenden Stoffen, wegen mangelnder Blutbereitung oder bei Lähmung eines Gliedes im Verhältniss zur Ernährung zu gross wird; und 2) in Aufsaugung von Stoffen, welche z. B. einzutreten scheint,

wenn ein Theil des Körpers über einen andern überwiegend wird, wie bei der Lähmung eines Gliedes, wo vielleicht zum Theil das öfters eintretende Schwinden des Gliedes auf eine ähnliche Weise bewirkt wird, wie das Verschwinden des Schwanzes der Kaulquappen zu geschehen scheint, durch Anziehung der Stoffe nach den lebenskräftigeren Centraltheilen.

§. 1396.

3) Die *krankhafte Umwandlung der Flüssigkeiten und organischen Gewebe* geschieht entweder dadurch, dass fehlerhafte Substanzen in das Blut aufgenommen und krankhafte Stoffe in das Gewebe der Organe abgelagert werden, wie z. B. letzteres bei der Wassersucht der Fall ist, wo Wasser, und in der Gelbsucht, in welcher gelbfarbige Stoffe aus dem Blute in das Gewebe abgesetzt werden, oder indem nicht die gehörigen Substanzen in das Blut oder die Organengewebe gelangen, z. B. nicht die gehörige Menge von Faserstoff bereitet wird, oder dadurch, dass nicht die gewöhnlichen Ausscheidungsstoffe aus dem Blute oder aus dem Organengewebe ausgeschieden werden, z. B. Stoffe, aus denen die Galle bereitet wird, im Blute zurückbleiben, die aufgelösten oder ausgehauchten Stoffe wegen Unthätigkeit der lymphatischen Gefässe im Organengewebe liegen bleiben, wie bei der Wassersucht, oder dass zu viele Stoffe aus dem Blute und den festen Theilen auf dem Wege der Absonderungen ausgeschieden werden, wie z. B. bei der Harnruhr, oder endlich dadurch, dass durch die biochemischen Prozesse Blut und Organengewebe selbst unmittelbar umgewandelt werden. Eine durch die Lebensprozesse geschehende unmittelbare Umwandlung des Blutes scheint z. B. in hohen Graden des Nervenfiebers, der Pest etc. statt zu finden, eine derartige Umwandlung der Gewebe aber kommt sehr häufig vor und verdient noch eine besondere Betrachtung.

§. 1397.

Es findet die erwähnte Umwandlung der Gewebe statt: 1) in der *Erweichung der Gewebe.* Oft scheinen sich nur einzelne Stoffe zu verflüssigen, wie z. B. das Fett, was in der Wassersucht der Fall zu sein scheint, oft gehen sämmtliche im Gewebe sich befindliche Stoffe, Nervensubstanz, Blut und alle andern Stoffe in den Krankheitsprozess ein und vereinigen sich zu einer gleichförmigen Masse, wie dieses der Fall ist bei der Erweichung des Magens, des Gehirnes, bei den verschiedenartigen Verschwärungen, bei den sphacelösen Auflösungen, bei der weissen und dunklen Morphea und bei der Erweichung mehrerer Verhärtungen, der Erweichung der Hepatisation, der Tuberkelweichung, der Erweichung des Scirrhus, der Encephaloiden etc. Dass das Produkt der Erweichung ein sehr verschiedenes ist, mag zum Theil in der verschiedenartig umgeänderten Nerventhätigkeit und zum Theil in der schon vorher eingetretenen Umänderung der Stoffe, wobei oft ganz fremdartige Substanzen, z. B. ein contagiöses Gift, mitwirken, begründet sein. Zuweilen vereinigen sich auch in verschiedenen Krankheiten ganz verschiedene Stoffe zu ein und demselben Produkt, wie z. B. die hepatisirte Substanz und die Tuberkeln, welche beide in eiterige Erweichung übergehen.

§. 1398.

2) In den *Erhärtungen der Gewebe.* Hier mag oft eine plastische Ausschwitzung in das Gewebe statt finden, das ursprünglich vorhandene Gewebe verändert aber in der Regel zugleich seine Beschaffenheit und es vereinigen sich die verschiedenen, dasselbe bildenden Stoffe, so wie auch zum Theil, und zwar vorzüglich bei der Entzündung, das Blut zu einer gleichförmigen harten Masse. Diese Massen gehen sodann gerne durch weiteres Fortschreiten des biochemischen Vereinigungsprozesses in Eiterung über.

§. 1399.

3) Endlich in den *Afterbildungen.* Hier ist in der Regel der Lebensprozess an der ergriffenen Stelle sehr gesteigert, so dass ernährende Säfte zu derselben hingezogen werden und die Substanz wuchert, zugleich ist aber die Bildungsthätigkeit auf eine eigenthümliche, noch nicht erklärte Weise umgeändert, wodurch, statt dem gewöhnlichen Gewebe des Organs, ganz neue Bildungen hervorgebracht werden.

§. 1400.

Vorhersage. Die fehlerhaften Bildungsprozesse gehören im allgemeinen zu den schwer heilbaren Krankheiten. So lange die Veränderungen nur in leichtern Umänderungen in der Farbe, in der Consistenz etc. bestehen, ist eher ein Erfolg der Behandlung zu erwarten, als wenn das Gewebe vollständig umgewandelt ist, doch wird auch durch solche Veränderungen nicht immer das Leben bedroht, und sie sind auch öfters noch heilbar. Am meisten hängt der Ausgang der Krankheit von der Krankheitsart ab, indem z. B. die Gelbsucht, Bleichsucht und Lustseuche in der Regel leicht zu heilende Krankheiten sind, die Lungenschwindsucht und der Krebs aber in der Regel tödtlich werden. Eine grosse Berücksichtigung verdienen auch die Wichtigkeit der ergriffenen Organe, der Kräftezustand des Kranken, die äussern Verhältnisse desselben etc. Ein Zehrfieber beschleunigt den tödtlichen Ausgang sehr.

§. 1401.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Wohl in keiner Kur einer andern Krankheit ist es nothwendiger, auf die Lebensweise des Kranken genau Achtung zu geben, als bei Behandlung der fehlerhaften Bildungsprozesse, denn in den Gewohnheiten und der Beschäftigung des Kranken liegt sehr häufig der Grund eines langwierigen Siechthums, und durch die

Befolgung einer gehörigen Diät, werden oft allein Cachexien geheilt. Die Nahrung muss in der Regel kräftig und auf eine lange Dauer der Krankheit berechnet sein, doch giebt es auch Fälle, in welchen eine möglichst strenge Entbehrung von Nahrung viel zur Umstimmung der Reproduction beiträgt, zuweilen ist auch eine gänzliche Umänderung der Nahrungsweise nützlich. Dem Kranken ist in der Regel der Genuss freier Luft, wenn sie nicht rauh ist, und der Aufenthalt an einem sonnigen Orte zuträglich. Manche Kranken erholen sich von langwierige Leiden in einem milden Klima, wie in dem südlichen Frankreich und Italien. Das Gemüth des Kranken muss möglichst erheitert werden, weil eine frohe Stimmung viel zu einer bessern Reproduction beiträgt. Krankheiten in den Verdauungswerkzeugen müssen wo möglich gehoben, unterdrückte Absonderungen wieder hergestellt, zu starke Ausleerungen gehemmt werden etc.

§. 1402.

b) *Nach dem Wesen der Krankheit.* Auch bei der Behandlung der Krankheiten der Ernährung ist es von Wichtigkeit, stets im Auge zu behalten, dass wir sowohl durch Einwirkung auf das Nervensystems, als durch Veränderung des Blutes und überhaupt der den Nerven entgegenwirkenden Stoffe die Lebensprozesse umzustimmen vermögen.

1) *Behandlung der krankhaft vermehrten Ernährung.* Wir vermögen die zu starke Ernährung, wenn sie mehr den ganzen Körper betrifft, dadurch zu beschränken, dass wir die Verzehrung der organischen Stoffe im Gewebe der Organe durch Beschleunigung der Lebensprozesse vermehren, indem wir den Kranken wo möglich in eine Lebensweise zu versetzen suchen, wodurch seine Körperkräften andauernd angestrengt und sein Geist und Gemüth mehr in Anspruch genommen werden; ist aber

die übermässige Ernährung nur örtlich zu stark, so suchen wir die Thätigkeit des leidenden Theiles zu beschränken, damit die Anziehung der ernährenden Säfte nicht in ihm überwiegend stark werde. Ebenso wirken wir auch auf den zweiten Factor der Lebensprozesse, indem wir die Blutmasse durch Verminderung der Nahrungsmittel oder Vertauschung der zu kräftigen Fleischnahrung mit mehr Pflanzenkost zu verringern suchen. Eine unmittelbare Entziehung des Blutes ist in dringenden Fällen bei übermässiger Blutbildung und bei Hypertrophie des Herzens oft nothwendig, doch ist es im allgemeinen zweckmässiger, die Blutmenge auf die andere angegebene Weise zu vermindern, indem oft wiederholte Blutentleerungen eine Anlage zu Entmischungskrankheiten zu gründen vermögen.

§. 1403.

2) *Behandlung der verminderten Ernährung.* Wir vermehren die Ernährung, indem wir die rückwärtschreitende Metamorphose durch Verhinderung der starken Kräfteanstrengung, durch Mässigung des Fiebers, Hemmung von krankhaften Entleerungen etc. beschränken, und indem wir die gesunkene Lebensthätigkeit durch gelind erregende Mittel, Wein, Gewürze und aromatisch-tonische Mittel erhöhen, so wie auch dadurch, dass wir die Stoffe, die zur Ernährung der Organe dienen, vermehren durch Darreichung einer kräftigen Nahrung aus Fleisch, Eiern, Milch etc. Die Beschaffenheit der Nahrungsmittel muss übrigens nach dem Alter des Kranken, der Natur der Krankheit und zum Theil auch nach der Gewohnheit des Kranken sich richten, was bei den einzelnen Krankheitsarten näher erörtert werden wird.

§. 1404.

3) *Behandlung der krankhaften Umwandlung der Stoffe.* Die allgemeinen Mischungsausartungen können wir auf verschiedene Weise verbessern: 1) durch Erhö-

hung der Bildungsthätigkeit durch die im §. 1403 bezeichneten Mittel. Durch dieselbe wird oft nicht allein die Ernährung vermehrt, sondern auch der Art nach verändert, indem hierdurch die Bereitung einer fehlerhaften Lymphe beschränkt und eine normalere Stoffanlagerung herbeigeführt wird, wie z. B. in den Scropheln; 2) durch Beschränkung der Bildungsthätigkeit. Hierdurch wird nicht allein die das gewöhnliche Maass überschreitende Ernährung vermindert, sondern es wird auch oft die Erzeugung krankhafter Bildungen gehemmt, wie dieses z. B. bei der Lustseuche der Fall ist, bei welcher in den schwerern Fällen die Hungerkur einen sehr wichtigen Theil der Behandlung ausmacht. 3) Durch Darreichung von Stoffen, aus welchen ein besseres Blut gewonnen wird, wie z. B. der frischen Gemüse beim Scorbut, der Fleischspeisen, der China und des Eisens, wenn es am Blutroth und Faserstoff fehlt. 4) Durch Darreichung von Stoffen, die der Bildung gewisser Stoffe entgegenstehen und vielleicht diese Stoffe zerstören, wie z. B. der Säuren bei der vermehrten Neigung zur Gallenbildung und des Quecksilbers bei der Lustseuche. 5) Durch Vermehrung der Aufsaugung auf unmittelbarem Wege durch die auf die Resorption wirkenden Mittel, wie durch gewisse Narcotica, das Quecksilber, die Antimonialien, das Jod, oder auf mittelbarem Wege durch Vermehrung der Absonderungen, Verminderung der Nahrung etc. 6) Durch Vermehrung der einen oder der andern Absonderung, wodurch bestimmte Stoffe, die in dem Blute und den festen Theilen zurückgehalten waren, ausgeschieden werden, wie z. B. das Wasser in der Wassersucht durch Erregung der Harnabsonderung, galligte Stoffe in der Gelbsucht durch Vermehrung der Gallenabsonderung u. s. w. 7) Durch allgemeine Veränderung der Mischung und der Bildungsthätigkeit, durch eine gänzlich veränderte Lebensweise, durch die sog-

blutreinigenden Mittel, welche meistens Mittel sind, die mehr oder weniger auf sämmtliche Absonderungen wirken, durch den Gebrauch der Quecksilber- der Antimonialmittel etc.

§. 1405.

Bei der Behandlung der Erweichung und der Verschwärung der Gewebe ist besonders zu untersuchen, ob dieselbe in einem entzündlichen Zustande begründet ist oder nicht, und im erstern Falle die in dem Kapitel von der Entzündung, §. 504, angegebene Verfahrungsweise einzuschlagen. Stehen diese Veränderungen der Gewebe mit einem Allgemeinleiden in Verbindung, so muss dieses gehoben werden; man muss suchen, die Scropheln, die Lustseuche, den Scharbock etc. zu heilen. In solchen Fällen müssen auch örtlich die der bestimmten Dyscrasie entsprechenden specifischen Mittel angewandt werden, wie z. B. bei syphilitischen Geschwüren, Salben und Auflösungen von Quecksilbermitteln.

Kommt eine Erweichung der Gewebe ohne entzündlichen Zustand vor, so möchte die örtliche Anwendung der tonischen und zusammenziehenden Mittel, so wie auch zuweilen der flüchtig erregenden Mittel passend sein. Bei schlaffen, reitzlosen Geschwüren sind ebenfalls die tonischen und zusammenziehenden Mittel, wie Columbo, Alaun, Eisen etc. anzuwenden, bei solchen mit fauligtem und brandigem Character, fäulnisswidrige und erregende Mittel, wie die Mineralsäuren, die China, der Campher. Bei innern Verschwärungen sind auch diejenigen Mittel anzuwenden, welche in der Haut einen ableitenden Krankheitsprozess erregen, wie die Blasenpflaster, die Brechweinsteinsalbe, Fontanelle, Haarseile und selbst die Moxen. Bei den äusserlichen Geschwüren können die Mittel leichter als bei den innern unmittelbar auf die leidende Stelle gebracht werden, und werden in Form von Salben, Waschwassern, Umschlägen von befeuchteten Tüchern,

Breiumschlägen, Pulvern, Pflastern angewandt, auch kann ein Druck-Verband angelegt und bei callösen Geschwüren können die Aetzmittel und das Messer zu Hülfe gezogen werden.

§. 1406.

Die Verhärtung vermögen wir auf dreierlei Weise zu entfernen: 1) durch allmählige Auflösung, 2) durch Versetzung derselben in Eiterung und 3) durch ihre Hinwegnahme vermittelst des Messers. — Die Auflösung kann auf zweierlei Wegen bewirkt werden, durch Vermehrung der Absonderung in dem leidenden Theile und dadurch bewirkte unmittelbare Ausführung stockender Stoffe und durch Erhöhung der Aufsaugung in dem verhärteten Organ. Viele der bekannten auflösenden Mittel wirken auf die erste Weise, wie z. B. die gegen die Leberverhärtung empfohlenen Mittel, welche beinahe sämmtlich die Gallenabsonderung vermehren. Um die Aufsaugung zu befördern, dienen sowohl Mittel, welche in andern als dem leidenden Theile die Absonderungen befördern, als auch solche, welche unmittelbar die Resorption erregen. Viele Mittel zeigen beide Wirkungen zugleich. Die erstere Wirkung zeigen die auflösenden Extracte, das Extractum Graminis, Taraxaci, Fumariae, Saponariae, Marrubii albi etc., die auflösenden Salze, das Calomel in eröffnender Gabe, die Gummiharze in absonderungsbefördernden Gaben, die Mittel, welche absondernde Stellen auf der Haut hervorbringen und unterhalten etc.; die letztere äussern vorzugsweise die Antimonial- und Mercurialpräparate in kleinen Gaben, Schierling, Belladonna, die Blausäure haltigen Mittel und andere Narcotica, die Gummiharze, die Seife, die Alkalien, der salzsaure Baryt, das Jod etc., endlich die örtlichen Mittel, fette Einreibungen, Einreibungen der grauen Quecksilbersalbe, Bähungen mit einer Abkochung von Schierling oder Belladonna, einfache warme Bäder und Dampfbäder,

Mercurial- und Schierlingspflaster, so wie auch nach Umständen Umschläge von Abkochungen aromatischer Kräuter, ein Pflaster von Gummi Ammoniacum, Einreibungen der Jodsalbe, des flüchtigen Linimentes, Seifenbäder, Schwefelbäder, Tropfbäder, trockenes Reiben, Electricität und Galvanismus. Nicht alle Verhärtungen ertragen jedoch die erregende Behandlung und man muss sich bei den scirrhösen Verhärtungen wohl hüten, durch die Anwendung solcher Mittel den Uebergang derselben in offenen Krebs zu veranlassen.

Die Versetzung der Verhärtung in Eiterung wird man bei der Verhärtung ganz im Innern liegender Theile wohl niemals und auch bei den auf der Oberfläche liegenden Verhärtungen nur selten beabsichtigen. Dieselbe wird durch die Mittel bewirkt, die auch zur Beförderung einer schon begonnenen Eiterung dienen.

Die Ausschneidung der verhärteten Stelle findet bei der Verhärtung innerer Theile nur selten Anwendung.

§. 1407.

Gegen die Aftergebilde wendet man, insbesondere wenn ihnen ein allgemeines Leiden zum Grunde liegt, die im §. 1404 angegebene Verfahrungsweise, vorzüglich auflösende und specifisch mischungsändernde und umstimmende Mittel an, auch kann man den krankhaften Prozess durch Zerstörung der kranken Stelle durch Aetzmittel oder durch Ausschneidung derselben auszutilgen suchen. Bei manchen Afterbildungen ist es übrigens rathsamer, nicht viel zu unternehmen, indem bei denselben die krankhafte Bildungsthätigkeit doch nicht gehemmt wird und ein starkes Eingreifen der Kunst eine schnellere Zerrüttung der Lebenskräfte herbeiführt.

§. 1408.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die die Bildungskrankheiten begleitenden Nebenzufälle müssen so bald als möglich gehoben werden, indem durch dieselben

die Ernährungsprozesse noch mehr gestört werden. Die Schmerzen sucht man durch Opium, Umschläge u. s. w. zu stillen, den Schlaf sucht man durch die bekannten Mittel zu Stande zu bringen, eine beginnende Entzündung durch einige Blutegel und besänftigende Umschläge zurückzuhalten, die edlen Organe sucht man auf jede Weise zu schützen.

§. 1409.

Eintheilung der Bildungskrankheiten. Nach den angegebenen Verschiedenheiten der krankhaften Bildungsvorgänge glaube ich, diese Krankheitsfamilie in folgende Ordnungen eintheilen zu können. 1) Krankhaft vermehrte Bildungsvorgänge (die Hypertrophien). 2) Verminderte Bildungsprozesse, (die Atrophien im engern Sinne, indem die eigentlichen Schwindsuchten in andern Kapiteln abgehandelt sind, da die Abmagerung nur Folge von andern Krankheitsprozessen, z. B. der Tuberkelbildung und Erweichung ist). 3) Die krankhaften Umwandlungen (Metamorphoses), die letztern zerfallen wieder in fünf Unterabtheilungen, 1. die allgemeine Mischungsausartung, 2. die Erweichung einzelner Gewebe, 3. die Verhärtung einzelner Gewebe, 4. die Afterbildungen und 5. die Erzeugung parasitischer Thiere.

ERSTE ORDNUNG DER BILDUNGSKRANKHEITEN.

Die krankhaft vermehrten Bildungsprozesse.

(*Hypertrophiae.*)

Die Substanzvermehrung des Herzens.

(*Hypertrophia cordis.*)

§. 1410.

Es ist die Hypertrophie des Herzens eine solche Vermehrung der Substanz des Herzens, dass hierdurch der Herzschlag seine normale Beschaffenheit verliert und Fehler in der Blutbewegung und verschiedene Folgekrankheiten hervorgebracht werden.

§. 1411.

Die Hypertrophie besteht zuweilen in allen Theilen des Herzens, zuweilen nur in einzelnen. In den seltenern Fällen ist mit der Hypertrophie keine Vergrösserung der Höhlen des Herzens verbunden, meistens wird zugleich eine geringere oder stärkere Erweiterung der Höhlen angetroffen, und oft auch zeigen sich selbst die Höhlen zur Stärke der Wandungen zu gross, so dass diese verdünnt erscheinen, doch ist hiebei meistens die Substanz des ganzen, oft sehr vergrösserten Herzens beträchtlicher, als im gesunden Zustand, wenn gleich die Wandungen der Höhlen, im Vergleich zu dem Raume derselben, dünner als im normalen Zustand desselben sind.

§. 1412.

Die Krankheit entwickelt sich sehr langsam. Der Kranke fühlt allmählig immer mehr die eigene Herzbewegung und erhält besonders bei starker Körperbewegung ein aussergewöhnlich starkes Herzklopfen, mit welchem mehr oder weniger auch das Gefühl der Beengung verbunden ist.

Leidet die linke Herzkammer an Hypertrophie, so geben die Zusammenziehungen derselben, wenn man sie zwischen den Knorpeln der fünften und sechsten Rippe untersucht, einen starken Stoss und ein weniger deutliches Geräusch als gewöhnlich, sie sind um so mehr verlängert, als die Hypertrophie beträchtlich ist. Die Zusammenziehungen der Vorkammern sind sehr kurz, wenig sonor und eben desshalb in den bedeutendsten Fällen kaum bemerklich. Die Herzschläge werden nur in einem kleinen Umfange gehört. — Die Hypertrophie des rechten Ventrikels hat die nämlichen Zeichen, nur ist das Geräusch der Zusammenziehungen des kranken Ventrikels deutlicher. Von der Hypertrophie der linken Herzkammer unterscheidet sie sich dadurch, dass das Herz unter dem untern Theil des Brustbeines einen stärkern Stoss giebt, als zwischen den Knorpeln der fünften und siebenten Rippe. — Die Percussion giebt bei einer starken Hypertrophie des Herzens einen matten Ton.

§. 1413.

Die Erweiterung des Herzens (Anevrysma cordis) wird, wenn der linke Ventrikel davon befallen ist, durch einen hellen und geräuschvollen Ton der Zusammenziehungen des Herzens zwischen den Knorpeln der fünften und siebenten Rippe angezeigt, wobei dieser Ton in einem grossen Umfang wahrgenommen wird. Die Helle des Tones und sein Umfang sind das Maas der Erweiterung. Bei der Erweiterung des rechten Ventrikels hört

man besonders unter dem untern Theil des Brustbeines einen geräuschvollen Ton. Es bestehet bei der Erweiterung des Herzens das Herzklopfen vorzüglich in Vermehrung der Frequenz und des Geräusches, aber der Stoss ist meistens nicht verstärkt und selbst oft schwächer als gewöhnlich.

§. 1414.

Wenn Erweiterung der Kammern mit Hypertrophie derselben verbunden ist, so sind die Erscheinungen beider Krankheitszustände zugleich vorhanden. Die Zusammenziehungen der Ventrikel geben einen starken Stoss und ein ziemlich deutliches Geräusch, die der Vorkammern sind stark tönend, die Herzschläge werden in einem grossen Umfange gehört. Die Percussion giebt einen matten Ton.

Die Zeichen der Erweiterung der Vorkammern vermischen sich in der Regel mit den Zeichen der Verletzung der Ventrikel oder der Klappen, aus der sie meistens entstanden sind.

§. 1415.

Die Krankheit geht zuweilen, wenn sie keinen hohen Grad erreicht hat, unter allmähliger Verminderung des starken Herzschlagens in Gesundheit über. In den höhern Graden des Uebels wird der Herzschlag so stark, dass die Rippen auseinander getrieben werden, so dass man in den Zwischenräumen zwischen der fünften und sechsten oder dieser und der siebenten Rippe tief hineingreifen und die Spitze des Herzens fühlen kann; diesem starken Herzschlage entspricht aber die Stärke des Pulses nicht, der zuweilen dabei sehr klein ist. Meistens ist eine mehr andauernde oder anfallsweise wiederkehrende Beengung vorhanden, und es bilden sich wassersüchtige Anschwellungen der Füsse und zuletzt allgemeine Wassersucht aus. In einem Falle sah ich von Zeit zu Zeit Ecchymosen entstehen, besonders an den Füssen. Die

Verdauungskräfte bleiben meistens lange unverletzt und in mehrern Fällen beobachtete ich selbst einen krankhaft-vermehrten Appetit (Heisshunger). Der Tod stellt sich oft plötzlich ein, indem die Kranken bei ihrer gewöhnlichen Beschäftigung oder bei einer stärkern Körperbewegung entseelt niedersinken oder langsam, indem sich allmählig Wassersucht des ganzen Körpers ausbildet.

§. 1416.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man findet das Herz bedeutend vergrössert und seine Substanz vermehrt, so dass das Gewicht desselben häufig mehr als zwei Pfunde, ja zuweilen selbst fünf Pfunde beträgt.[1]) Oft sind die Höhlen des Herzens nicht erweitert, ja zuweilen selbst enger als im normalen Zustand. In diesen Fällen, das heisst in der einfachen Hypertrophie des Herzens ist die Substanz des Herzens auch fester, als im normalen Zustand. In andern Fällen sind, neben der Verdickung der Wände, die Höhlen oft beträchtlich erweitert (Anevrysma cordis activum), oft aber sind bei Erweiterung der Höhlen die Wände desselben verdünnt (Anevrysma cordis passivum), in welchem Falle die Substanz des Herzens immer weicher als im gesunden Zustand ist. Zuweilen findet man auch eine partielle sackartige Erweiterung des Herzens.

§. 1417.

Anlage haben Individuen von erethischer Constitution und schwindsüchtiger Anlage. Zuweilen ist ein geringer Grad von Hypertrophie des Herzens angeboren. Gelegenheitsursachen sind vorzüglich wiederholte heftige Gemüthsaffecte, insbesondere Schrecken, Aus-

1) Beispiele sind in *Kreyssig's* Werk über die Krankheiten des Herzens. B. II. S. 319 angeführt.

schweifungen im Genusse geistiger Getränke, zu heftige körperliche Anstrengungen, alle Ursachen, die einen entzündlichen Zustand des Herzens herbeiführen können, z. B. eine rheumatische Metastase und solche, welche den Ausfluss des Blutes aus dem Herzen mehr oder weniger hemmen, wie z. B. Fehler der Klappen.

§. 1418.

Vorhersage. Geringere Grade der Krankheit sind heilbar, höhere Grade in der Regel unheilbar und lebensgefährlich.

§. 1419.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Der Kranke muss einer magern Kost sich bedienen, von den geistigen Getränken sich gänzlich enthalten, alle Veranlassungen zu Gemüthsbewegungen möglichst meiden, dagegen mässige Körperbewegungen vornehmen, wodurch ohne Erhitzung der nöthige Verbrauch der Stoffe von statten geht etc.

§. 1420.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* In der Hypertrophie werden als das Hauptmittel von Zeit zu Zeit wiederholte allgemeine und örtliche Blutentziehungen angesehen. Zugleich werden in Anwendung gebracht: Nitrum und kühlende, gelind abführende Salze, wie auch die die Herzbewegung beschränkenden narkotischen Mittel, insbesondere Digitalis und Blausäure. Von Nutzen sind auch längere Zeit fortgesetzte kalte Umschläge auf die Brust, insofern der Kranke dieselben erträgt, so wie auch ableitende Mittel, wie Blasenpflaster, Fontanelle etc. — Die nämlichen Mittel werden auch gegen das Anevrysma cordis gebraucht, wo sie aber, da die Reaction oft weniger kräftig als bei der Hypertrophie des Herzens ist, oft nur in geringerm Maasse in Anwendung gebracht werden dürfen.

§. 1421.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Bei beginnender Wassersucht müssen sogleich die diuretischen Mittel, unter welchen vorzüglich die Digitalis passt, in Anwendung gebracht werden. Wird die Entkräftung bedenklich, so muss von dem oben angegebenen Verfahren abgegangen und zuweilen selbst die stärkende Methode zu Hülfe gezogen werden.

Die Substanzvermehrung der Leber.

(*Hypertrophia hepatis, Physconia hepatis.*)

Die Literatur der Leberentzündung und die der Leberkrankheiten überhaupt.

§. 1422.

Die Kranken, welche an Substanzvermehrung der Leber leiden, haben gewöhnlich eine erdfahle, ins Gelbliche spielende Gesichtsfarbe, und sind meistens etwas eingefallen im Gesichte. Die Lebergegend und der ganze Unterleib sind aufgetrieben und man fühlt oft sehr deutlich, zuweilen tief unten im Leibe und bis zur Milzgegend herübergehend den untern Rand der Leber. Der Kranke hat das Gefühl von Druck und Schwere und zuweilen auch von Schmerz in der Lebergegend, besonders beim Umwenden des Körpers von der rechten auf die linke Seite, auch empfindet er zuweilen einen drückenden Schmerz unter dem rechten Schulterblatt oder in der rechten Wade. Das Zwerchfell wird hinaufgedrückt und dadurch die Respiration erschwert. Die Verdauung ist mehr oder weniger gestört, es sind die Zeichen des gallichten Zustandes und oft der krankhaften Magensäure

und oft Magenweh vorhanden (was zum Theil von den fehlerhaften Absonderungen, zum Theil vom Druck der Leber auf den Magen bedingt sein kann). Die Stuhlentleerungen sind oft vermindert, zuweilen vermehrt. Der Kranke leidet oft an Hämorrhoiden und zuweilen auch an der schwarzen Krankheit des Hippokrates. Es entwickelt sich ein allgemeiner gelbsüchtiger Zustand, Abzehrung, zuweilen aber auch Fettsucht und meistens zuletzt Wassersucht. — Es kann übrigens das Uebel im mässigen Grade auch viele Jahre bestehen, ohne bedeutende Störungen der Gesundheit zu veranlassen. — Bei den Leichenöffnungen findet man gröstentheils die in dem Kapitel von der Leberentzündung, §. 692, angegebenen Veränderungen.

§. 1423.

Anlage zur Vergrösserung der Leber haben Leute von zornmüthigem Character. Gelegenheitsursachen sind öfters wiederkehrende Gemüthsaffecte, der fortgesetzte Missbrauch geistiger Getränke, der Aufenthalt in einer sumpfigten Gegend, langwierige Wechselfieber und die meisten Ursachen, die auch Entzündung der Leber oder eine Plethora abdominalis hervorzubringen vermögen. [1])

§. 1424.

Vorhersage. Eine wirkliche Hypertrophie der Leber, das heisst eine Vergrösserung der Leber, die nicht blos von einer Ueberfüllung des Parenchyms derselben mit Säften abhängt, sondern in einer Vermehrung der Organensubstanz beruht, bildet sich nicht leicht wieder zurück, die Gefahr für das Leben hängt übrigens von der Grösse der Hypertrophie, von der etwa vorhandenen Verbindung mit Erhärtung oder Erweichung des Gewebes

1) Vergl. § 693 und §. 915.

oder mit Afterbildungen, und vorzüglich von den Folgekrankheiten des Leberleidens ab.

§. 1425.

Behandlung. Vorzüglich hat man hier auf die Entfernung der Ursachen zu wirken, insbesondere Alles, was die Leber reitzt und Stockungen im Pfortadersystem veranlassen kann, zu entfernen. Ist die Vergrösserung der Leber die Folge eines Wechselfiebers, so ist das Chininum sulphuricum das Hauptmittel. Sind Stockungen im Pfortadersystem vorhanden, so passen die in den §§. 920 und 921 angegebenen Mittel. Ist die Leber zugleich verhärtet, so sind die auflösenden Mittel (§. 696) anzuwenden, welche auch bei der Physconie, wenn sie ohne deutliche Verhärtung besteht, einigen Nutzen gewähren mögen.

Die Substanzvermehrung der Milz.

(*Hypertrophia lienis, Physconia lienis.*)

§. 1426.

Die Substanzvermehrung der Milz entwickelt sich meistens allmählig und ist mit einem cachectischen Zustand verbunden, oft entsteht aber eine Vergrösserung der Milz, welche übrigens oft mehr in einer andauernden Blutüberfüllung, als in einem vermehrten Wachsthum des Gewebes begründet ist, auch ziemlich schnell in Folge von Entzündung und Congestion, oder ist selbst nur, wie manche Aerzte annehmen, ein Symptom eines schleichenden Entzündungsprozesses. — Die Symptome

und die Folgen dieses krankhaften Zustandes, so wie die Ursachen und die Regeln der Behandlung desselben sind aus dem Kapitel von der Milzentzündung zu entnehmen.

ZWEITE ORDNUNG DER BILDUNGSKRANKHEITEN.

Krankhaft verminderte Bildungsprozesse.

Die Darrsucht der Kinder.

(Atrophia neonatorum, Paedatrophia, Scrophula mesenterica, Atrophia glandularis, Febris hectica meseraica.)

Fr. Hoffmann (lat. Halle 1702). — *Chüden* (lat. Soltquel. 1726 u. Göttingen 1746). — *Russel* (lat. Oxon. 1751). — *Gattenhof* (lat. Heidelberg 1775). — *Keiser* (Lemgo. 1775 — 84). — *Gruner* (lat. Jena 1792). — *Baumes* (Par. 1805). — *Barth* (lat. Halle 1821). — Ausserdem die Schriftsteller über Kinderkrankheiten.

§. 1427.

Die Darrsucht der Kinder ist die Abzehrung des Körpers, welche von einem krankhaften Zustand des Lymphsystems, insbesondere der Gekrösdrüsen, ausgeht.

§. 1428.

Die Kinder sind sehr gefrässig und lieben besonders den Genuss von Mehlspeisen und Kartoffeln, und haben dagegen Abneigung vor Fleischspeisen; meistens leiden

sie an Säure, haben zuweilen Durchfälle, oft aber auch mehr feste, gräuliche und tonartige Stuhlentleerungen. Hierbei magern die Kinder auffallend ab, ihr Gesicht wird eingefallen, runzlich, eingeschrumpft und stellt im verkleinerten Maassstabe das eines alten Mütterchens dar, wobei auch der Blick etwas Ernstes hat. Die Arme und Füsse werden ebenfalls mager und zuletzt so abgezehrt, wie wenn sie nur aus Haut und Knochen bestünden, ebenso ist die Brust mager, so dass die Rippen beinahe so deutlich wie beim Scelette zu sehen sind, dagegen ist der Bauch sehr gross, er treibt die falschen Rippen weit hervor, meistens ist er etwas gespannt und oft kann man in demselben verhärtete Gekrösdrüsen fühlen. Die kleinen Kinder weinen sehr viel, werden auch häufig von Kolikschmerzen geplagt, sie leiden viel an leichten Gichtern. Viele Kinder haben die sogenannten Mitesser in grosser Zahl. In dem höhern Grade der Krankheit gesellt sich ein hektisches Fieber hinzu.

§. 1429.

Diese Krankheit hat einen chronischen Verlauf. In Gesundheit geht sie bei besserer Pflege des Kindes unter allmähliger Zunahme des Körperumfanges über, in den Tod durch Schwäche unter der höchsten Abmagerung des Körpers. Oefters beschliessen auch Anfälle tödtlicher Zuckungen den Verlauf der Krankheit.

§. 1430.

Bei den Leichenöffnungen findet man die Gekrösdrüsen oft bis zu der Grösse eines Tauben- oder Hühnereies angeschwollen, violettroth oder auch im Innern in eine speck- oder käseartige Masse verwandelt, zuweilen jedoch findet man die Gekrösdrüsen, auch bei sehr grossem Unterleibe und der vollkommensten Abmagerung, nur wenig angeschwollen, doch sind sie meistens hiebei etwas violett gefärbt. Zuweilen ist auch die Leber vergrössert, die Gallenblase ist mit einer

blassen und dünnen Galle angefüllt. Manchmal kommen Geschwüre im Darmkanale vor.

§. 1431.

Anlage. Diese Art der Darrsucht kommt beinahe nur bei Kindern und zwar in den ersten Lebensmonaten vor, doch giebt es auch zuweilen Fälle, in welchen Erwachsene an Gekrösdrüsenverhärtung und dadurch bedingter Abmagerung leiden. Scrophulöse Kinder sind vorzüglich zu dieser Krankheit geneigt.

Gelegenheitsursachen sind vorzüglich Ueberfütterung, besonders mit schlecht bereitetem Mehlbrei, Kartoffeln etc., Mangel an Reinlichkeit, eine feuchte und dunkle Wohnung etc., wesshalb auch diese Krankheit vorzüglich in der ärmern Volksklasse angetroffen wird. Ausserdem vermögen aber auch bei Kindern und bei Erwachsenen alle Ursachen, die Entzündung des Gekröses zur Folge haben können, die Krankheit zu erzeugen, insbesondere bemerkte man Entzündung, Anschwellung und Verhärtung von Gekrösdrüsen in Folge der Syphilis, der Bleivergiftungen, der Blattern, des Scharlaches, des Typhus, des Nervenfiebers etc., worin auch theilweise der Grund der langsamen Reconvalescenz nach diesen Krankheiten liegen mag.

§. 1432.

Das **Wesen** der Pädatrophie wird gewöhnlich in der Anschwellung und Verhärtung der Gekrösdrüsen gesucht, wodurch die Fortbewegung und allmählige Umwandlung des Chylus gehemmt werde, und es ist nicht zu läugnen, dass durch den bezeichneten Zustand der Gekrösdrüsen, Abmagerung herbeigeführt werden kann; doch ist der nächste Grund der Krankheit in der schlechten Bereitung des Chylus selbst anzunehmen, da die Krankheit vorkommt, ohne dass die Gekrösdrüsen, oft nur einzelne wenige ausgenommen, vergrössert oder erhärtet sind.

§. 1433.

Vorhersage. Der Ausgang der Krankheit richtet sich vorzüglich nach den äussern Verhältnissen, in welchen der kleine Patient sich befindet. Ist eine sorgfältige Pflege zu erwarten, so darf die Hoffnung zur Genesung auch bei sehr weit gekommenem Uebel nicht aufgegeben werden, findet das Gegentheil statt, so ist der Kranke verloren.

§. 1434.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Wurde das Kind künstlich ernährt, so ist es meistens sehr zuträglich, ihm eine gesunde Amme, die nicht viel früher, als die Mutter des Kindes, geboren hat, zu halten. Der Mehlbrei muss gut bereitet oder an die Stelle desselben Zwiebackbrei gesetzt werden, es kann frühzeitig etwas Eigelb und Fleischbrühe gegeben werden; niemals darf aber dem Kinde zu reichlich Nahrung gereicht werden. Eine eigentliche Wasserkost, das heisst eine Bereitung der Speisen, z. B. des Zwiebackbreies mit Wasser und Darreichung von alleinigem Zuckerwasser zum Getränk ist nachtheilig und die Darreichung von gekochter Milch und eines Breies mit Milch gekocht viel zweckmässiger. Das Kind muss fleissig gewaschen, gebadet, in die frische Luft und an das Sonnenlicht gebracht werden etc. *)

§. 1435.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Insofern Anschwellungen der Gekrösdrüsen vorhanden sind, passen die bei der Behandlung der Scropheln angegebenen auflösenden Mittel, die auflösenden Extracte, der Aethiops antimonialis (Nro. 77), die Plummerschen Pulver, die Terra ponderosa salita etc. (Nro. 78), die

1) Vergl. d. Behandl. der Scropheln.

Hauptanzeige bleibt aber immer die Erregung einer kräftigen Verdauung, zu welchem Zwecke, ausser den gehörigen Nahrungsmitteln, erregende und tonische Mittel angewandt werden können, aromatische und gewürzhafte Mittel, wie z. B. das schon von *Kämpf* und neuerlich wieder von *Golis* empfohlene Pulver von gleichen Theilen Baccae Lauri (vorher in Brodteig gebacken), Nux moschata und C. C. ust. und zwei Theilen Süssholzpulver, zweimal täglich zu einem Theelöffel voll, der Eichelkaffe, die wässerigte und geistige Rhabarbertinktur, leicht bittere Extracte und mit gewisser Vorsicht China und Eisen (Nro. 87 und 88). Hiermit werden aromatische Bäder, Salz-, Stahlbäder etc., so wie geistige und aromatische Einreibungen und Reibungen mit Tüchern, die mit aromatischen Stoffen durchräuchert sind, verbunden.

§. 1436.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Hier, wie bei den Scropheln, muss man suchen, die Säure der ersten Wege zu tilgen, Würmer zu entfernen, Durchfälle zu stillen, eine etwa vorhandene entzündliche Reitzung der Eingeweide durch besänftigende Mittel zu mässigen etc.

Die Nervenschwindsucht.

(*Tabes nervosa*, *Atrophia nervosa*.)

G. G. Richter (lat. Gött. 1744). — *Trnka de Krzowitz* (hist. febr. hect. Wien 1783). — *Sachtleben* (Versuch einer med. clin. oder pract. Path. und Therap. der auszehr. Krankh. 2 Bde. Danzig 1792.)

§. 1437.

Unter *Nervenschwindsucht* versteht man die Abzehrung des Körpers, welche von einem Allgemeinleiden des Nervensystems ausgeht.

§. 1438.

Sind die Individuen, welche von dieser Krankheit befallen werden, Frauenzimmer, so leiden sie meistens an hysterischen Zufällen, sind es Männer, an Hypochondrie. Die Kranken fühlen sich über ihre Lage unglücklich, eine unbefriedigte Sehnsucht, Kummer, Aerger, irgend eine Leidenschaft zehrt in ihrem Innern, ihr Schlaf ist unruhig und kurz, leicht tritt Herzklopfen ein, meistens fehlt der Appetit, die Verdauungskräfte liegen darnieder und hiebei zehrt der Körper immer mehr ab und schwinden die Kräfte. Ist diese Abmagerung bis zu einem gewissen Grade gediehen, so zeigen sich nun Spuren des hektischen Fiebers. Es stellen sich zuweilen Hitze der Wangen und der Handflächen und Morgenschweisse ein. In einem spätern Zeitraum der Krankheit macht das Fieber oft zwei Exacerbationen, die eine und stärkste gegen Abend, die andere am Mittag oder in den Nachmittagsstunden (*Haase*). Sodann erreicht die Körperschwäche den Grad, dass der Kranke das Bett nicht mehr verlassen kann, die Schweisse werden schmelzend, es stellen sich auch Durchfälle ein und Schwämmchen im Munde, der Kranke wird heiser, zuweilen gehen die Haare aus, es bilden sich Oedeme,

dabei fällt der Kranke in ein Irrereden und zuletzt bilden sich auch noch Lähmungen aus.

§. 1439.

Die Krankheit hat einen ganz langwierigen, oft mehrere Jahre sich hinziehenden Verlauf. Noch nicht zuweit entwickelt, geht sie, besonders bei veränderten Verhältnissen des Kranken, oft ziemlich schnell in Gesundheit über. Der Tod wird durch Erschöpfung der Kräfte herbeigeführt.

§. 1440.

Anlage haben mehr Individuen weiblichen Geschlechts, als Männer, besonders solche mit sehr reitzbarem Nervensysteme. **Gelegenheitsursachen** sind vorzüglich unbefriedigte Sehnsucht, häufiger Verdruss, gekränktes Ehrgefühl, Nahrungssorgen, übermässige Geistesanstrengung, Nachtwachen, der Missbrauch geistiger Getränke und des Kaffes, vorhergegangene Nervenfieber, andauernde schmerzhafte Krankheiten, Krampfkrankheiten etc.

§. 1441.

Das **Wesen** der Krankheit ist allmählige Verzehrung der Nervenkraft, mit zugleich statt findender Reitzung des Nervensystems und das hiedurch bedingte Darniederliegen der Prozesse der Reproduction.

§. 1442.

Vorhersage. Der Erfolg der Behandlung hängt vorzüglich von der Gestaltung der äussern Verhältnisse des Kranken ab, immer aber gehört dieses Leiden zu den gefährlichern Zuständen und führt oft unerwartet schnell eine tödtliche Erschöpfung herbei.

§. 1443.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Der Arzt suche die unglückliche Lage des Kranken nach Kräften zu verbessern, er suche bei den Umgebungen desselben eine möglichst freundliche Be-

handlung des Kranken zu bewirken, bezeige sich selbst, je verlassener der Kranke in der Welt steht, desto theilnehmender und aufmerksamer gegen ihn, er suche ihn in angemessene Gesellschaft zu bringen, er rathe ihm eine erheiternde Lectüre, den Aufenthalt an einem freundlichen Badeorte oder eine Reise an. Zuweilen ist die Verehelichung das einzige Rettungsmittel. Auch bekämpfe man aufs kräftigste die etwa schon bestehenden, das Nervensystem zerrüttenden Krankheiten, wie z. B. heftige Schmerzen etc.

§. 1444.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Der krankhafte Zustand im Nervensystem, der dem Leiden zum Grunde liegt, ist zugleich Erregung und Schwäche, und es ist daher die besänftigende und die stärkende Methode angezeigt. Zur Beruhigung des Nervensystems werden hier vorzüglich die Mittel, die gegen Hysterie im Gebrauch sind, empfohlen, die Chamillen, Valeriana, Asa foetida, das Castoreum, der Moschus etc., einen entschiedenen Nutzen bringen bei grosser Reitzung des Nervensystems das Opium und das Morphium aceticum hervor, welche Mittel jedoch nicht anhaltend fortgesetzt werden dürfen. Ist das Herz und das Gefässsystem sehr beweglich, so dienen die Digitalis, das Hallersche Sauer etc. Um zu stärken, ist eine gut nährende Kost, mit etwas gutem, altem Weine, so wie der Aufenthalt in einer gesunden Wohnung und gesunden Gegend nothwendig. Dabei verordnet man dem Kranken Milch- und Molkenkuren, den Gebrauch des isländischen Mooses und anderer bitterer Mittel, der China, des Chininum sulphuricum, Eisenpräparate und insbesondere den Grbrauch der eisenhaltigeu Mineralwasser, z. B. dessen von *Pyrmont* an der Quelle getrunken.

§. 1445.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Den Schlaf

sucht man durch angemessene Körperbewegung, insbesondere durch Fahren, durch Vermeidung alles dessen am Abend, was den Geist oder das Gemüth erregt, und im Nothfalle durch Opium zu Stande zu bringen. Durchfälle, Blutflüsse und andere schwächende Zufälle müssen ohne Verzug gehoben werden.

Die Rückendarre.

(*Rückenmarkschwindsucht, Tabes dorsalis.*)

Die in dem Kapitel über den Saamenfluss angegebenen Schriftsteller. Ausserdem *Brendel* (lat. Gött. 1749). — *W. Horn* (mit einer Vorrede von E. Horn, Berl. 1827).

§. 1446.

Die Rückendarre ist die Art von Abzehrung, die mehr oder weniger deutlich mit einem Rückenmarksleiden in Verbindung steht und durch übermässige Geschlechtsreitzungen und Saamenentleerungen erzeugt wird.

§. 1447.

Die Kranken, bei welchen sich die Rückendarre auszubilden beginnt, fühlen die gewöhnlichen Folgen zu häufiger Saamenausleerungen in höherem Grade; insbesondere fühlen sie eine ungewöhnliche Schwäche in den Füssen und ihr Gang wird so zu sagen kreuzlahm, der Körper magert immer mehr ab und es stehen insbesondere die Dornfortsätze der Rückenwirbel stark hervor. Die Kranken haben nun häufig das Gefühl, wie wenn Ameisen den Rücken herunterkröchen, oder laues oder kaltes Wasser an demselben herunterriesle, ihr Kopf ist eingenommen, sie leiden oft an Schwindel, das Gedächtniss und überhaupt die Geisteskräften werden, so wie die Sinne, insbesondere der des Gesichtes, schwach. Oft

leiden dabei die Kranken an mancherlei Krämpfen, die Hoden werden krampfhaft gegen den Bauchring gezogen, sie leiden an asthmatischen Zufällen, zuweilen kommen selbst bei männlichen Individuen Krämpfe vor, die ganz den hysterischen gleichen, manchmal die Fallsucht. Die Kranken sind sehr niedergeschlagen und oft der Verzweiflung nahe. Die Verdauungskräften liegen darnieder, der Appetit fehlt, die Stuhlentleerungen sind fest. Allmählig stellt sich auch ein trockenes Hüsteln und sodann Schleim- und Eiterauswurf ein. Ein hektisches Fieber mit colliquativen Schweissen und Durchfällen gesellt sich hinzu, oft auch Lähmungen, besonders der untern Gliedmassen.

§. 1448.

Diese Krankheit entwickelt sich gewöhnlich erst im Verlaufe von mehreren Jahren bis zu ihren höchsten Graden, doch kann sie auch in wenigen Monaten zu einer bedenklichen Höhe sich steigern. In Gesundheit geht sie über nach dem Aufhören der Saamenentleerungen durch allmählige Zunahme der Kräfte, in den Tod durch Auszehrung und zuweilen auch, nachdem noch ein wassersüchtiger Zustand sich ausgebildet hat.

§. 1449.

Ergebniss der L e i c h e n ö f f n u n g e n. Man findet nicht immer Veränderungen im Rückenmark, doch oft auch das Rückenmark theilweise, besonders an der cauda equina, geschwunden und mehr oder weniger erweicht, die Gefässe in den Häuten des Rückenmarkes oft überfüllt. Meistens sind zugleich die Veränderungen, die die Lungenschwindsucht characterisiren, vorhanden.

§. 1450.

Die alleinige U r s a c h e dieser Krankheit sind übermässige Geschlechtsreitzungen, besonders bei männlichen Individuen und die damit verbundenen Saamenentleerungen, vorzüglich wenn dieselben in früher Jugend statt-

finden. Die gewöhnlichste Veranlassung zu diesem Leiden giebt die Onanie, oft auch zu häufig gepflogener Beischlaf. — Andere auf das Rückenmark und das Nervensystem einwirkende Krankheitseinflüsse, z. B. Metastasen auf das Rückenmark können wohl ein ähnliches Leiden, doch nicht leicht ganz dieselbe Krankheitsform hervorbringen.

§. 1451.

Wesen. Es scheint die erwähnte Gelegenheitsursache der Rückendarre auf zweifache Weise diese Krankheit hervorbringen zu können, 1) durch Schwächung des Nervensystems und des Rückenmarkes insbesondere, und 2) durch andauernde Reitzung desselben. Die Schwächung wird herbeigeführt sowohl durch den häufigen Verlust des Saamens, durch dessen Bereitung ein grosser Aufwand von Nervenkraft erfordert zu werden scheint, als auch durch die Geschlechtsreitzung und besonders in dem Moment der Saamenentleerung selbst, in welchem viel Nervenkraft verloren geht. Hierdurch scheint zuerst das feinere in den Nerven wirkende Agens vermindert zu werden und sodann auch die Substanz selbst zu leiden, wenigstens schwindet oft der untere Theil des Rückenmarkes, zu welchem die Geschlechtstheile in besonderer Beziehung stehen. Neben dieser wahren Nervenschwäche besteht zugleich Reitzung, die vorzüglich auch auf das Rückenmark zu wirken scheint und vielleicht manchmal einen schleichenden Entzündungszustand in demselben veranlasst. Durch diese Nervenschwäche ist die Schwäche aller Verrichtungen des Körpers und namentlich auch der Ernährung bedingt, da aber zugleich Reitzung vorhanden ist, so entstehen Krämpfe, Husten, schleichende Entzündungen, Vereiterungen etc.

§. 1452.

Vorhersage. Die Rückendarre ist eine sehr gefährliche Krankheit; der Ausgang derselben hängt von

dem Grade, den sie erreicht hat und vorzugsweise von der Möglichkeit und Unmöglichkeit, die Saamenentleerungen zu hemmen, ab.

§. 1453.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Da Alles davon abhängt, die Geschlechtsreitzung nicht mehr eintreten zu lassen und den Saamenfluss zu heilen, so müssen vor Allem mit Nachdruck und Beharrlichkeit die Mittel in Anwendung gebracht werden, die gegen die bezeichnete Ursache der Krankheit gerichtet und in den §§. 1111—12 angegeben sind.

§. 1454.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Befindet sich das Nervensystem in einem sehr gereitzten Zustande, so dienen besänftigende Mittel, der vorsichtige Gebrauch des Opiums und des Morphium aceticum, auf den Rücken angewandte Mittel, selten möchten Blutegel oder Schröpfköpfe wegen der allgemeinen Schwäche passen, eher Einreibungen, Reibungen des Rückens mit durchräucherten Tüchern, das Setzen von Fontanellen etc. In einem sehr weit gediehenen Falle bewirkte ich Heilung durch die zweimalige Anwendung von 6 Larreiischen Moxen längs dem Rücken hinuntergesetzt, nebst dem innerlichen Gebrauch von Morphium aceticum und stärkenden Mitteln. Um die Reproduktion zu unterstützen, dienen gut nährende Nahrungsmittel und stärkende Arzneimittel, insbesondere China und Eisen, doch muss die Anwendung derselben stets in der Art stattfinden, dass durch dieselbe keine zu kräftige Erregung hervorgebracht und dadurch die Saamenentleerungen vermehrt werden.

§. 1455.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die Durchfälle müssen möglichst gehemmt werden, die Schweisse

durch Hallersches Sauer etc. gemässigt werden, damit durch diese Zufälle die Erschöpfung nicht allzuschnell überhandnehme.

Die Darrsucht der Greise.

(Das Austrocknen der Greise, Auszehrung aus Altersschwäche, Marasmus senilis.)

Farr (lat. Bristol 1773). — *Nagel* (Altona 1829).

§. 1456.

Die Darrsucht der Greise ist die Abzehrung des Körpers mit Erschöpfung der Kräfte, welche die natürliche Folge des hohen Alters ist.

§. 1457.

Etwas früher oder später nimmt im hohen Alter der Umfang des Körpers allmählig ab und zuletzt wird der Kranke sehr mager, so dass die Knochen im Gesichte hervorstehen und die Flechsen an den Händen deutlich zu sehen sind. Die Haut wird runzlig, verliert das Weiche, wird pergamentartig, die Epidermis spröde, häufig trifft man dunkelrothe Flecken von ergossenem Blute, besonders an dem vordern Theil der Arme an (Purpura senilis W.). Die Arterien zeigen sich stellenweise verknöchert. Die Glieder sind schwer beweglich, die Gelenke wie steif, die Knochen aber leicht zerbrechlich. Der Kranke wird durch geringe Körperbewegung erschöpft oder ist selbst beständig genöthigt im Lehnstuhle oder im Bette zu verweilen, sein Gehör und sein Gesicht sind schwach, seine Geisteskräften gesunken, insbesondere leidet das Gedächtniss oft sehr und es entwickelt sich selbst ein ganz stupider Zustand. — Dabei

leidet der Kranke oft noch an verschiedenen besondern Beschwerden, an dem Hautjucken, Harnzwang und unwillkührlichem Abgange des Harnes, Verschleimung der ersten Wege und der Lunge, Engbrüstigkeit, zuweilen schwellen die Füsse wassersüchtig an oder es stellt sich von selbst der Brand an denselben ein (Gangraena senilis), Zuweilen verfällt der Kranke zuletzt in ein Fieber mit Irrereden und einem soporösen Zustand, mit trockener brauner Beschaffenheit der Zunge etc., das im Ganzen den Ausdruck eines nervösen Fiebers mit vorherrschender Kopfaffection hat und gewöhnlich in 7 bis 14 Tagen tödtet. (Febris soporosa senum Burser.)

§. 1458.

Es kann der beschriebene Zustand sich wieder bis auf einen gewissen Grad vermindern, so dass die Alten wieder etwas kräftiger und auch im Geiste freier werden und das Leben noch eine geraume Zeit gefristet wird, meistens aber führt derselbe, ohne dass noch ein besserer Zustand mit ihm wechselt, zum Tode.

§. 1459.

Die Ursache der erwähnten Beschaffenheit des Körpers und der Kräfte ist das Greisenalter, doch tritt dieser Zustand bald früher, bald später ein, zuweilen schon mit dem 70sten Jahre, häufiger mit dem 80sten, oft erst mit dem 90sten und selbst erst mit dem 100sten und noch später. Eine schwächliche Constitution des Individuums, eine frühere nachtheilige Lebensweise, namentlich Geschlechtsausschweifungen noch im vorgerückten Alter und noch fortgesetzte schädliche Einflüsse, z. B. eine niedergebeugte Gemüthsstimmung und schlechte Nahrung befördern den frühern Eintritt dieser Art von Darrsucht.

§. 1460.

Die nächste Ursache der Darrsucht der Greise scheint mir vorzüglich in dem Uebergewicht, welches

im höheren Alter nach und nach die dem Nervensysteme entgegenwirkenden Similartheile im ganzen Organismus über das Nervenagens erhalten, und in der hiedurch bedingten Veränderung und geringeren Verwandtschaft dieser Theilchen zum Nervenagens zu liegen. Es wechselt nämlich das Verhältniss des Nervensystems zu den demselben entgegenstehenden Stoffen andauernd in der Art, dass sogleich nach der Entstehung des Thieres die Masse des Nervensystems zu der der übrigen Theile des Körpers am grössten ist und sodann bis zur Vollendung des Wachsthums nach bestimmten Gesetzen abnimmt. Nach meinen Messungen ist bei einem menschlichen Foetus von 9 Wochen die Masse des Gehirns und Rückenmarkes der $4^{14}/_{15}$ Theil des ganzen Körpers, bei dem neugebornen Kinde der $7^{97}/_{153}$ Theil und bei einem erwachsenen schlankgebauten jungen Manne nur der $44^{5}/_{18}$ Theil. Auf eine ähnliche Weise nimmt auch, so weit meine Messungen gehen, die Masse der Zentraltheile des Nervensystems im Verhältniss zur Masse der übrigen Stoffe in der ganzen Thierreihe mit dem Alter ab. Ist das Wachsthum in der Längenachse vollendet, so nimmt noch in der Regel das in der Breite und Dicke einige Zeit zu, so dass auch hierdurch das Verhältniss der Nerven zu den übrigen Stoffen ungünstiger wird. Zugleich nehmen aber auch die Stoffe allmählig eine andere Beschaffenheit an, es nimmt das Flüssige und Weiche ab, das Feste, Harte, Erdige wird vorherrschend, selbst in der Nervensubstanz, wodurch die Nerventhätigkeit geschwächt und hierdurch, wie bei Lähmung, die Stoffanlagerung gehemmt wird, während die rückschreitende Metamorphose nicht stillstehet. Die dem Nervenagens entgegenwirkenden Stoffe werden diesem immer mehr fremdartig, die Wechselwirkung zwischen beiden Factoren der Lebensprozesse immer mehr beschränkt, bis zuletzt diese erlöschen.

§. 1461.

Behandlung. Wir suchen die Nerven zu beleben durch Erheiterung des Gemüthes, passende Erregung der Geistesthätigkeit, die mässige Darreichung eines guten Weines und nach Umständen durch innerlich gegebene erregende, besonders auf das reproductive System wirkende Arzneimittel, so wie auch durch Waschungen und Bäder, und den Wiederersatz der Stoffe zu befördern durch eine sehr nahrhafte und mehr flüssige als feste Kost, z. B. durch Brühen mit Bouillontafeln und Eigelb bereitet, frischgemolkene Milch, aber auch gutes Fleisch etc.

DRITTE ORDNUNG DER BILDUNGSKRANKHEITEN.

Krankhafte Umwandlungen der flüssigen und festen Theile.

(Metamorphoses.)

Erste Gruppe:

Die allgemeinen Mischungs-Ausartungen.

(Dyscrasiae.)

Die Scropheln.

(Die Scrophelkrankheit, die Drüsen, Scrophulae, Morbus scrophulosus.)

Kortum (lat. Lemgo 1789—90, deutsch ebend. 1793, 4 Bde.) — *Hamilton* (Lond. 1791, a. d. Engl. Lpz. 1793). — *Hufeland* (Jena 1795—97, 3te Aufl. Berl. 1819). — *Carmichael*, *Henning* und *Goodland* (a. d. Engl. v. Choulant, Lpz. 1818). — *Fare* (Lond. 1818, a. d. Engl. von Becker, Lpz. 1820). — *v. Vering* (Wien 1829). — *Lugol* (Mémoire sur l'emploi de l'iode dans les maladies scrophuleuses, Par. 1829 mit Fortsetzungen 1830 und 31).

§. 1462.

Die Scropheln sind die Cachexie, welche sich durch den weiter unten beschriebenen eigenthümlichen Habitus und bei völliger Ausbildung der Krankheit, vorzüglich durch Anschwellung von lymphatischen Drüsen zu erkennen giebt.

§. 1463.

Die noch nicht vollständig entwickelte Krankheit nennt man auch die scrophulöse Anlage oder den ersten

Grad der Scropheln. Haben die Kinder eine erethische (arterielle) Constitution, so ist die scrophulöse Anlage oft schwer zu erkennen. Die schönen blonden und blauäugigen Kinder haben eine krankhaft zarte Haut, das Fleisch ist zu schlaff, die Röthe der Wange ist einigermassen umschrieben, die Kinder sind lebhaft und leicht angegriffen; bei etwas deutlicher Anlage zeigt sich auch die Oberlippe und die Nase etwas dick. Haben Kinder mit torpider (venöser) Constitution die scrophulöse Anlage, so sind die Kinder meistens hässlich, von bleicher und erdfahler Gesichtsfarbe, dickem Kopf, dicker Oberlippe nnd Nase, breiten Kinnladen, kurzem Halse, schwammigem Fleische, dickem Bauche, träge und zuweilen simpelhaft. Oft zeigen sich schon sehr frühe leichte Krankheitszufälle, welche auf die Scropheln hindeuten, die Hitzblätterchen, die Milchborke oder die Crusta serpiginosa; ihr Urin ist häufig trübe, sie haben leicht Würmer, Säure des Magensaftes, Gefrässigkeit, einen dicken Leib, sie zahnen spät und die Zähne werden gerne schwarz, sie lernen spät gehen und zeigen eine Hinneigung zur englischen Krankheit.

§. 1464.

Bei der ausgebildeten Form der Krankheit zeigen sich Anschwellungen der lymphatischen Drüsen, besonders am Halse, aber auch unter den Achseln, in den Weichen, wodurch ein ungegründeter Verdacht des Bestehens venerischer Bubonen erregt werden kann, so wie im Gekröse, wodurch die Darrsucht der Kinder erzeugt wird. Diese Drüsen haben oft nur die Grösse von Erbsen, es können aber auch dieselben bis zu der einer Nuss oder eines Hühnereies wachsen und bei deren Vereinigung mehrere grosse Geschwülste am Halse sich bilden. Mit denselben dürfen die nur zufälligerweise durch Verkältung, das Auflegen von Blasenpflastern etc. entstandenen, gewöhnlich nur einzeln vorkommenden und bald auch wieder verschwinden-

den Anschwellungen lymphatischer Drüsen (Hagedrüse, Scrophula fugax) nicht verwechselt werden. Die scrophulösen Drüsengeschwülste werden oft sehr hart, sind aber unschmerzhaft, sie nehmen zuweilen nach gewissen Perioden zu und ab, oft entzünden sie sich, vereitern theilweise, brechen auf und bilden die scrophulösen Geschwüre. Nebst dem bilden sich oft auch an andern Stellen der Haut, z. B. über dem Brustbein, Entzündungen, die den Furunkeln nicht unähnlich, aber weicher als dieselben sind, aufbrechen, einen dünnen Eiter von sich geben und ebenfalls Geschwüre zurücklassen. Die scrophulösen Geschwüre haben harte, ungleiche Ränder, welche unterhöhlt sind; sie sind schmerzlos, ihre Umgegend zeigt eine blasse oder violette, glänzende Röthe, ihr Grund ist mit etwas Lymphe oder dünnem Eiter bedeckt; wenn sie heilen, hinterlassen sie hässliche, vertiefte und harte Narben. Manchmal erkranken auf ähnliche Weise, wie die lymphatischen Drüsen, auch die Speicheldrüsen, die Mandeln und die Brustdrüsen. Häufig bilden sich hierbei Augenentzündungen aus und zwar vorzüglich eine schleichende Entzündung der Meibom'schen Drüsen und die eigentliche scrophulöse Augenentzündung, bei welcher so leicht sich auf der Hornhaut Bläschen und Geschwüre bilden, zu welchen sich strickförmige Gefässbündel hinziehen, die dieselben umkränzen, und wobei heftige Lichtscheue und Augenliederkrampf stattfindet. Seltener kommen Entzündungen der Nase vor. Die Kranken leiden an Ausschlägen, besonders im Gesichte, die mehr oder weniger den herpetischen Character haben. Die Schleimhäute sind oft ergriffen, der Kranke hat viel den Schnupfen, einen Ohrenfluss (Otorrhoea scrophulosa), einen Schleimfluss aus den Geschlechtstheilen (scrophulöser Tripper); sehr häufig werden in den höhern Graden der Krankheit die Knochen angegriffen, es entstehen der Knochenfrass, der Winddorn, Gelenksleiden, insbe-

sondere Gliedschwamm. Oft entwickelt sich aus den Scropheln die englische Krankheit und langwierige Gehirnwassersucht, und gerne bilden sich Lungenknoten aus und es entsteht daher, besonders in dem Jünglingsalter Lungenschwindsucht.

§. 1465.

Der Verlauf der Scropheln ist sehr langwierig. Es kann sich die Krankheit, besonders wenn das erkrankte Individuum noch im Kindesalter oder im Alter der Entwicklung der Mannbarkeit begriffen ist, allmählig verlieren, doch bleibt meistens eine scrophulöse Anlage zurück. Den Tod führt die Krankheit langsam herbei durch Mangel der Ernährung, besonders bei Anschwellung der Gekrösdrüsen und durch Verzehrung der Kräfte durch die bei dem Knochenfrass vor sich gehende Vereiterung und Schmerzen, wo immer noch ein Zehrfieber sich hinzugesellt, durch die sich zuweilen ausbildende Lungenschwindsucht, durch Gehirnwassersucht, durch Geschwülste, die sich im Gehirn bilden, und Epilepsie und Lähmungen hervorbringen, und durch schleichende innere Entzündungen in verschiedenen Theilen.

§. 1466.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man findet die erhärteten Drüsen in eine weisslich gräuliche, mehr oder weniger speckartige und oft beinahe knorpelartige Masse verwandelt, in manchen Fällen sind sie in die käseartige Masse übergegangen, die auch in den Lungentuberkeln vorkommt und oft ist diese käseartige Masse in der Mitte erweicht und zu Eiter umgewandelt. Ausserdem trifft man die in der Darstellung des Verlaufes der Krankheit angegebenen Knochenaffectionen und die andern erwähnten Entartungen an.

§. 1467.

Anlage. Die Scrophelkrankheit ist oft angeerbt und angeboren, oder es hat, wenn auch die Eltern nicht

an der nämlichen Krankheit litten, dieselbe doch in der Zeugung ihren letzten Grund, indem eines oder beide Eltern schwächlich, zu alt oder zu jung waren, oder an Schwindsucht, Lustseuche, Gicht, Nervenübeln etc. litten. Die Krankheit entwickelt sich meistens schon in dem Kindes- und Knabenalter, sehr selten erst in dem Mannesalter; bei Individuen weiblichen Geschlechts soll dieselbe häufiger vorkommen als bei dem männlichen Geschlechte.

Gelegenheitsursachen sind vorzüglich der Genuss fehlerhafter und besonders zur Säureerzeugung Veranlassung gebender Nahrungsmittel, z. B. schlecht bereiteter Mehlspeisen, der zu reichliche Genuss von Kartoffeln, ferner der Aufenthalt in einer feuchten Wohnung, wo weder das Sonnenlicht, noch die frische Luft gehörigen Zutritt haben, grosse Unreinlichkeit des Körpers, Mangel an Bewegung, zu frühe Geistesanstrengung, der Missbrauch von Abführungsmitteln etc. Auch scheinen zuweilen die Lustseuche, der Keuchhusten, die Blattern und auch wohl manchmal die Kuhpocken die letzte Veranlassung der Entwicklung der Scropheln zu werden.

§. 1468.

Ueber das Wesen der Krankheit besitzen wir keine zuverlässige Kenntniss, als die, dass das lymphatische System und besonders die lymphatischen Drüsen der vorzugsweise und wie es scheint, primäre Sitz der Krankheit sind. Man glaubt, dass eine Stockung und Entartung der Lymphe statt finde und hierdurch die Reproductionsprozesse im Gewebe der Organe ebenfalls leiden. Die ältern Aerzte haben eine eigenthümliche scrophulöse Schärfe (Miasma scrophulosum) angenommen. *Schäfer*[1]) ist der Meinung, dass eine Anhäufung der

1) Kinderkrankheiten, S. 414.

nicht gehörig ausgeleert werdenden Phosphorsäure stattfinde. Neuere glauben, dass der Chylus unvollkommen bereitet sei, namentlich ist *Sundelin* [1]) der Ansicht, dass der Eiweissstoff in demselben im Uebermass vorherrsche. *Willis* leitet die Krankheit von verdorbenem Magensaft, *van Helmont* von Säure in den ersten Wegen ab, und *Hausmann* und *Hecker* glaubten, dass sie aus der Lustseuche entsprungen sei. [2])

§. 1469.

Vorhersage. Die Scropheln werden in der Mehrzahl der Fälle nicht unmittelbar lebensgefährlich, sie sind aber schwer zu heilen, wenn der Kranke schon in dem Jünglings- oder Mannesalter sich befindet. Am gefährlichsten ist die Krankheit, wenn sich Knochenleiden entwickeln, wiewohl auch ein solches zuweilen geheilt wird, und wenn in den Lungen und andern edlen Theilen sich Entartungen bilden.

§. 1470.

Behandlung der Scropheln. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Vor Allem muss darauf gesehen werden, dass in dem Verhalten des Kranken nichts störend auf die Ernährung wirke. Werden Kinder von einer Amme gesäugt, so muss dafür gesorgt werden, dass man sich keiner Amme bediene, die viel früher geboren hat, als das Kind zur Welt kam, indem in diesem Falle die Milch zu nährend und zu fett ist. Die Amme oder die Mutter darf, wenn sie das Kind stillen soll, auch nicht selbst an Scropheln, Schwindsucht, weissem Flusse, Flechten etc. leiden. Wird das Kind künstlich ernährt, so sorge man, dass die Milch stets gut, der Mehlbrei gut gekocht und von feinem und gutem

1) *Berends* Vorlesungen, B. V. S. 220. — 2) S. *Richter*, B. V. S. 459.

Mehl bereitet sei, oder lasse an die Stelle desselben den Zwiebackbrei setzen, oder einen Brei von Arrowmehl geben. Auch suche man zu verhüten, dass das Kind nicht überfüttert werde. Bei etwas ältern Kindern dienen Eigelb und Fleischspeisen, Gallerten von Kalbsfüssen, Sago, in Fleischbrühe gekocht, gebratenes Kalbfleisch, und sodann leichte Gemüse, auch kann den ältern Kindern etwas weniges Wein und gutes Bier gegeben werden; zu vermeiden sind dagegen der viele Genuss von Kartoffeln, schwerem Brode etc. Nebst einer geeigneten Nahrung ist für den scrophulösen Kranken seine Wohnung das Wichtigste. Dieselbe sei wo möglich gegen Süden gerichtet, so dass Licht und Wärme sie gehörig durchdringen können, die Schlafstätte sei geräumig, werde fleissig gelüftet und sei nicht feucht. Der Kranke halte sich viel im Freien auf, besonders an sonnigen Orten, er mache sich viele körperliche Bewegung, oder werde viel im Freien herumgetragen und gefahren. Die scrophulösen Kinder müssen fleissig gewaschen und öfters in ein lauwarmes Bad gesetzt werden, wobei es zuträglich ist, den Körper mit Flanell zu reiben.

§. 1471.

Nebst der Anordnung der zuträglichsten Lebensweise ist es von Wichtigkeit, diejenigen Schädlichkeiten, die etwa im Körper selbst liegen und auf die Ernährung nachtheilig wirken, zu entfernen. Dieses sind insbesondere durch die Krankheit selbst hervorgebrachte Stoffe, Säure im Magen, Verschleimung der ersten Wege und Würmer. Es ist daher oft zuträglich, den Anfang der Kur mit einem Brech- oder Abführungsmittel zu machen, zu welchem letzterem man nicht leicht die schwächenden, sondern die mehr erregenden Abführungsmittel wählt, vorzüglich die Rhabarber, etwa mit Zusatz von Tartarus tartarisatus, Tartarus natronatus etc., bei sehr zähem Schleime Calomel mit Jalappe, jedoch das Calomel mit

besonderer Vorsicht. Diese Mittel müssen nach Umständen von Zeit zu Zeit wiederholt werden, so wie es auch meistens sehr zuträglich ist, öfters säuretilgende und zuweilen auch Wurmmittel gebrauchen zu lassen.

§. 1472.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Es ist die doppelte Aufgabe: 1) die vorhandenen Anschwellungen der Drüsen aufzulösen und im allgemeinen mischungsändernd auf die schon gebildete Lymphe und die festen Theile zu wirken, und 2) eine bessere Bereitung des Chylus zu bewirken. Dem erstern Zwecke entspricht bald mehr die auflösende, bald mehr die mischungsändernde Methode. Häufig geschieht beides durch die nämlichen Mittel zugleich. Insbesondere werden angewandt: die Antimonialmittel, wie der rohe Spiessglanz (Nro. 76), der Goldschwefel, der Mineralkermes, mehr vorübergehend auch der Brechweinstein, ferner die Merkurialmittel und insbesondere dieselben in Verbindung mit Antimonialen und Schwefel, wie in dem Plummerschen Pulver (Nro. 68), in dem Aethiops antimonialis (Nro. 77), in dem Aethiops mineralis etc., die salzsaure Schwererde (Terra ponderosa salita) (Nro. 78), der salzsaure Kalk, die flüchtigen und die festern Alkalien, der gebrannte Schwamm, das vorzüglich von *Lugol* mit grossem Erfolg angewandte Jod (Nro. 79—86), das salzsaure Gold, ferner frisch ausgepresste Kräutersäfte von Lactuca sativa, Taraxacum, Marrubium album, Fumaria, Chaerefolium, Beccabunga etc., zu 1 — 4 Uncen jeden Morgen in Melissenthee oder schwacher Fleischbrühe, ein Aufguss von Herba Tussilaginis, so wie die auflösenden Extracte, die auflösenden narkotischen Mittel, wie die Dulcamara, die Digitalis, die Cicuta, die Blausäure haltenden Mittel, Aconit, die Belladonna etc., die Gummiharze, insbesondere das Gummi Guajacum und die Asa foetida, letztere vorzüglich bei Knochenleiden.

Endlich sind auch bei eingewurzeltem Uebel und bedeutenden Entartungen noch durchgreifendere, den ganzen Körper umstimmende Heilmethoden in Anwendung gebracht worden, wie die Hunger- und Schmierkur, das Zittmännische Decoct etc.

§. 1473.

Dem zweiten Zwecke, der Verbesserung der Bereitung der Lymphe und des Blutes entsprechen Mittel, die die Verdauungskräfte und überhaupt auch die vegetative Thätigkeit erregen und vielleicht auch zur Bereitung eines guten Chylus und Blutes, insbesondere zur Bereitung des Blutrothes und des Faserstoffes Bestandtheile hergeben, was vorzüglich die erregenden und tonischen Mittel sind. Hieher gehören gute Weine und geistige Tinkturen, Fenchelsaamen, Sternanis, Melisse, Mentha piperita, der Eichelkaffe, Calamus aromaticus, Absinthium, Cortices Aurantiorum, rad. Caryophyllatae, die bittern Extracte, die Rhabarber, die China, das Chininum sulphuricum, und die Eisenpraeparate (Nro. 87 und 88).

§. 1474.

Bald mehr auflösend, bald mehr stärkend und erregend wirken auf das lymphatische System und den ganzen Körper die Bäder, einfache warme Bäder, Seifenbäder, Schierlingsbäder, Weinbäder, Bäder mit Krausemünze, Bäder von Abkochungen von Wermuth, von Calamus aromaticus, China, Lohbäder, See- und Soolebäder, Stahlbäder, Jodbäder etc. Auch sind Reibungen des ganzen Körpers mit Flanell und geistigen Dingen zweckmässig.

§. 1475.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Gegen die örtlichen, mit der scrophulösen Cachexie in Verbindung stehenden Leiden wendet man die erwähnten antiscrophulösen Mittel an, und behandelt sie ausserdem

noch auf verschiedene Weise, nach Verschiedenheit ihrer Beschaffenheit.

Zur Zertheilung der Anschwellung und Verhärtung einzelner Drüsen legt man das Emplastrum mercuriale, Cicutae, Gummi Ammoniaci auf, lässt graue Quecksilbersalbe, Linimente mit Ochsengalle (Nro. 89), das flüchtige Liniment, das Linimentum saponato camphoratum, den Liquor ammonii causticus, das Petroleum, in schicklichen Verbindungen, oder Jodsalbe einreiben, und lässt auch die Dämpfe von heissem Wasser oder Essig an dieselben gehen. Ist die Geschwulst schmerzhaft und entzündet, so macht man Bähungen von Cicuta, lässt die graue Quecksilbersalbe einreiben und einige Blutegel setzen. Bildet sich ein Abscess, so befördert man dessen Reifung durch erweichende Breiumschläge und überlässt in der Regel die Oeffnung der Natur, wenn derselbe nicht in der Nähe eines Knochens liegt, so dass hierdurch Beinfrass entstehen könnte, oder wenn nicht eine andere Anzeige zur Oeffnung desselben vorhanden ist.

Die Geschwüre, die gewöhnlich eine schlaffe Beschaffenheit haben, verbindet man mit Abkochungen von Eichenrinde, China, grünen Nussschalen etc., welchen man Cicuta- oder Belladonnaextract zusetzt, oder mit Auflösungen von Sublimat und Höllenstein mit denselben Zusätzen, mit rother Präcipitatsalbe, betupft sie mit Höllenstein und nimmt die unterhöhlten Hautränder hinweg. Sind die Geschwüre entzündet, so macht man besänftigende Umschläge.

Scrophulöse Hautausschläge sind oft wohlthätig und ihre Heilung vermehrt zuweilen das innere Scrophelleiden; es ist daher besonders in der Anwendung äusserer Mittel grosse Vorsicht nothwendig.

1) Vergl. Chelius Chirurgie.

Was die Behandlung der scrophulösen Augenentzündung, der Knochenleiden, der Schleimflüsse, der Säurebildung im Magen etc. betrifft, so verweise ich auf die Augenheilkunde, die Chirurgie und auf die betreffenden Kapitel dieses Handbuches der Pathologie.

Die englische Krankheit.

(*Die doppelten Glieder, der Zweiwuchs, Rhachitis.*)

Glisson (lat. London 1650). — *Trnka de Krzowitz* (lat. Wien 1787, deutsch 1789). — *Veirac* (aus d. Holländ. v. Keup, Stendal 1794). — *Portal* (Par. 1797, aus d. Franz. Weissenfels 1798). — *Ficker* (lat. Berl. 1821). — *Seibold* (Würzb. 1827).

§. 1476.

Die englische Krankheit ist eine beinahe nur bei Kindern vorkommende Cachexie, die sich mehr oder weniger durch den scrophulösen Habitus und durch Verbiegungen der Knochen äussert.

§. 1477.

Das Aussehen der Kinder, bei welchen sich die Rhachitis auszubilden droht, ist entweder das der an Darrsucht leidenden Kinder, das Gesichtchen ist runzlicht, die magere Brust auf beiden Seiten eingedrückt, mit Ausnahme der falschen Rippen, welche durch den grossen Bauch hervorgetrieben sind, die Füsse und Arme sind mager, zuweilen ist hierbei der Kopf sehr gross und selbst ein wahrer Wasserkopf vorhanden; oder die Kinder sind im Gesichte, am Körper und selbst an den Gliedmassen ziemlich dick, das Fleisch ist aber schlaff und die Glieder doch im Verhältniss zu dem starken Kopf

und Rumpfe zu schmächtig. Oft leiden die Kinder an Säure im Magen, saurem Aufstossen und Durchfällen und sind dabei sehr gefrässig, die Schweisse riechen säuerlich, der Urin ist oft trübe, milchigt und es sollen oft Pflanzensäuren, wie Benzoe- und Sauerkleesäure in ihm hervorstechen, und nach *Bolba* und *Malfatti* viele phosphorsaure Kalkerde durch ihn ausgeführt werden. Die Kinder zahnen spät und die Zähne werden leicht cariös, schwarz und fallen aus. Manche an der Rhachitis leidenden Kinder, besonders diejenigen, die einen Wasserkopf haben, sind simpelhaft, bei vielen dagegen zeigen sich hervorstehende Geisteskräfte, sie lernen viel schneller sprechen, als die Versuche zum Stehen oder Gehen einigen Erfolg haben, und sind frühzeitig altklug.

Bei vielen, besonders den mit einem darrsüchtigen Zustand behafteten Kindern, kommt es nicht einmal zu Versuchen zu gehen, sondern dieselben liegen beständig auf dem Rücken, mit hinaufgezogenen Füsschen, an denen sich nun, so wie an dem übrigen Körper, immer mehr die eigenthümliche Knochenkrankheit offenbart, andere beginnen zu gehen, aber spät, so dass sie z. B. mit zwei Jahren noch nicht laufen können, sie führen einen wackelnden Gang, einer Ente ähnlich, und werden sehr schnell müde. Zuweilen entwickelt sich die Krankheit erst, nachdem die Kinder schon einige Zeit gehörig gehen konnten, dieselben wollen nun von neuem wieder getragen sein und weinen, wenn man sie auf die Füsse stellt. Man findet nunmehr, dass die Enden der Röhrenknochen an dem untern Fussgelenke etwas angeschwollen sind und die Füsschen oberhalb dieser Anschwellung eine leichte Biegung zeigen und nimmt auch in geringerm Grade eine ähnliche Beschaffenheit der Knochen an dem Handwurzelgelenke wahr. Durch diese Auftreibung der Knochenenden gewinnen zuweilen die bezeichneten Gelenke einigermassen das Aussehen, wie wenn zwei

Gelenke über einander vorhanden wären, woher die Krankheit auch den Namen doppelte Glieder erhalten hat.

§. 1478.

Entwickelt sich das Uebel zu einem höhern Grade, so werden allmählig die Knochen oft auf eine furchtbare Weise verbogen, die Unterschenkel werden sichelförmig, die Vorder- und selbst die Oberarme gebogen und verdreht, und zeigen zuweilen bei ganz jungen Kindern eine Ecke, wie wenn der Knochen gebrochen wäre, der Kopf senkt sich gegen das Brustbein, die Wirbelsäule wird nach vorn, nach hinten oder zur Seite gekrümmt (Lordosis, Kyphosis und Scoliosis), die eine Achsel steht höher, als die andere, die Schlüsselbeine sind gekrümmt, die Rippen auf der einen Seite einwärts gebogen, so dass diese Seite enger als die andere wird, die eine Hüfte steht höher, wie die der entgegengesetzten Seite. Diese Verbiegungen entwickeln sich meistens sehr langsam, so dass die Kranken, wiewohl nur mit Anstrengung und baldiger Ermüdung und zuweilen mit längern Unterbrechungen, ihre Gliedmassen gebrauchen können; oft aber verlieren sie das Vermögen zu gehen ganz und können nicht einmal stehen und sitzen. Häufig bildet sich auch an den Händen, den Füssen, an dem Rückgrathe etc. Beinfrass aus, es entstehen hierdurch Abscesse, Nerven werden zusammengedrückt, Lähmungen erzeugt und auch, so wie durch die Anschwellung der Gekrösdrüsen, die höchste Abmagerung und hectisches Fieber herbeigeführt.

§. 1479.

Die Krankheit hat einen Jahre lang dauernden Verlauf. In den günstigern Fällen werden die Knochen allmählig wieder hart und es können auch die Verbiegungen der Knochen durch eine geeignete Behandlung um vieles vermindert werden, doch bleiben oft grosse Verunstaltungen des Körpers zurück, das Gehen ist oft

nur mit Krücken möglich, durch die Verengerung der Brusthöhle sind Athmungsbeschwerden bedingt, und es stellt sich oft späterhin noch Lungenschwindsucht oder Brustwassersucht ein, die Verbiegungen des Beckens erschweren die Geburten und machen sie oft unmöglich. Den Tod führt die Krankheit durch das hektische Fieber in Folge des Beinfrasses und der Anschwellung der Gekrösdrüsen und zuweilen auch durch Kopfwassersucht oder eine sich hinzugesellende Lungenschwindsucht oder Brustwassersucht herbei.

§. 1480.

Ergebniss der **Leichenöffnungen.** Die Knochen sind sehr weich und zuweilen theilweise mehr knorpelartig, so dass man sie manchmal selbst mit dem Messer durchschneiden kann, das Mark in denselben ist flüssiger. In einem Falle fand ich bei einem etwa dreivierteljährigen Kinde sechs Knochenbrüche an verschiedenen Knochen, ohne dass die Eltern von diesem Zustande des Kindes oder von einer Gewalt, die auf dasselbe gewirkt hätte, etwas wussten. Der eine dieser Brüche war frisch entstanden, die Knochenenden noch blutig und das eine neben das andere hingezogen, ein anderer, bei welchem die Knochenenden ebenfalls neben einander standen, bildete eine Art falsches Gelenk, die übrigen waren wiederum ziemlich fest vernarbt. Das Fleisch solcher Leichen ist sehr weich, das Blut soll mehr dünnflüssig sein, meistens sind die Gekrösdrüsen angeschwollen und zuweilen mit einer kreidenartigen Masse ausgefüllt, die Lunge ist oft mit Tuberkeln angefüllt, die Leber ist oft vergrössert, die Gallenblase enthält eine eiweissartige Flüssigkeit, im Gehirne trifft man häufig Wasser an, wenn auch kein eigentlicher Wasserkopf vorhanden ist, die Leichen sollen erst spät erstarren.

§. 1481.

So weit die **Ursachen** der Rhachitis bekannt sind, sind sie ganz dieselben, die die Scropheln zu erzeugen vermögen. Die Krankheit kommt ebenfalls bei Kindern, die von rhachitischen, scrophulösen, syphilitischen, zu alten oder zu jungen Eltern erzeugt sind, vor, und ihr Entstehen wird durch Ueberfütterung und den Genuss unpassender Nahrung, namentlich schlechten Mehlbrei und schlechtes Brod, viele Kartoffeln etc., so wie durch eine dunkle, feuchte Wohnung, Unreinlichkeit und Mangel an Bewegung begünstigt.

§. 1482.

Das Wesen dieser Krankheit, die schon *Hippokrates* und *Celsus* gekannt zu haben scheinen, aber erst *Reusner* in Holland (1582), *de Boat* in Irland (1648) und vorzüglich *Glisson* deutlicher beschrieben haben, suchte man vorzüglich in einer Verderbniss der Säfte, und zwar nahm man eine eigenthümliche Schärfe an und hielt dieselbe zum Theil für ein umgeändertes, venerisches Gift, zum Theil leitete man sie von der Säure der ersten Wege ab. Andere (*Cullen*) suchten ihren Grund im Nervensystem, in einer fehlerhaften Beschaffenheit des Nervensaftes u. s. w. *Heine*[1]) und *Sömmering*[2]) in krankhaft verstärkter Thätigkeit der Lymphgefässe, wodurch dieselben die kalkartige Materie in den Knochen in sich aufnehmen, *Walther*[3]) in Entzündung der Knochen, *Jörg* in schwacher Oxydirung des Blutes durch die Lungen und durch die Haut, *Fourcroy*[4]) in zu lange im Körper zurückgehaltener Phos-

1) Diss. de vasor. absorbent. ad rhachitid procreand. potentia. Goett. 1792. — 2) De morb. vasor. absorbent. Frankf. 1795. — 3) Anatom. Museum. Berl. 1796. — 4) Memoires de la soc. roy. de Med. 1782.

phorsäure, *Renard*[1]) in einer Umwandlung des Blutes in den Gefässen der Beinhaut, wodurch das Eisen von der Phosphorsäure sich scheide, diese frei werde und die phosphorsaure Kalkerde der Knochen zu einem flüssigen Kalkphosphat umwandle. Die Neuern haben gröstentheils eine fehlerhafte Ernährung des Körpers und insbesondere der Knochen, durch Krankheit des lymphatischen Systems angenommen, wobei die Knochenmasse verändert und die phosphorsaure Kalkerde in die aufsaugende Gefässe aufgenommen werde.

Am genügendsten scheint mir *Haases*,[2]) im Wesentlichen mit *Renards* Ansichten übereinstimmende Erklärung zu sein. Derselbe sucht die nächste Ursache der Rhachitis in dem doppelten Grund: 1) in dem scrophulösen, unthätigen Zustand des Lymphsystems, wodurch eine mangelhafte Zuführung der ernährenden Stoffe, zu den Knochen, bedingt werde, und 2) in dem bei scrophulösen und rhachitischen Kindern vorkommenden Vorherrschen von freier Säure, wodurch auch die gewöhnlich in der Beinhaut abgesondert werdende Phosphorsäure im Uebermaass gebildet und die Kalkerde in den Knochen in zu grosser Menge gelöst werde.

§. 1483.

Vorhersage. Die englische Krankheit wird zuweilen lebensgefährlich und stört durch zurückgelassene Verunstaltung des Körpers, Unfähigkeit des Gebrauches einzelner Gliedmassen, Unvermögen zu Gebären, zurückgebliebene Athmungsbeschwerden etc., das Lebensglück der Individuen, die an dieser Krankheit gelitten haben.

§. 1484.

Behandlung. Diese Krankheit kann beinahe ganz

1) Versuch. die Entstehung und Ernährung etc. der Knochen zu erklären. Leipzig 1803. — 2) Chron. Krankh. B. III. S. 429.

nach denselben Grundsätzen und mit denselben Mitteln behandelt werden, wie die Scropheln.

Es sind dieselben Ursachen zu vermeiden und es ist daher dasselbe Verhalten zu befolgen, welches zur Heilung der Scropheln nothwendig ist, es sind daher dieselben Nahrungsmittel, wie dort, zu wählen; es sind der Aufenthalt in einer sonnigen Wohnung mit gesunder Luft, häufiger Aufenthalt im Freien, grosse Reinlichkeit etc. nothwendig. Unter den innern schädlichen Einflüssen ist besonders auf die Säure im Magen Rücksicht zu nehmen und dieselbe durch die bekannten Mittel zu bekämpfen.

§. 1485.

Was die Anzeige aus dem Wesen der Krankheit betrifft, so sind hier ebenfalls, wie bei den Scropheln, häufig die auflösenden Mittel angezeigt, wenn nämlich Drüsenanschwellungen vorhanden sind; die vorzüglich entsprechenden und in der That sehr heilsamen Mittel sind aber die erregenden und tonischen Mittel. Unter denselben stehen in vorzüglichem Rufe die Wurzel von Calamus aromaticus, Caryophyllata, die Rubia tinctorum (Nro. 90), die China, das Chininum sulphuricum und besonders das Eisen, welchem man, ausser seiner tonischen Kraft, auch die Wirkung zuschreibt, die überflüssige Säure zu binden. Hiemit verbindet man dieselben Bäder, Reibungen des Körpers mit durchräuchertem Flanell und die andern äussern Mittel, die bei den Scropheln gebräuchlich sind.

§. 1486.

Ausser den Zufällen, welche auch bei den Scropheln vorkommen und deren Behandlung in der Darstellung dieser Krankheit angegeben wurde, verdient hier besonders die Verbiegung der Knochen Berücksichtigung. Um diese Verunstaltung zu vermeiden, darf man die zur Rhachitis geneigten Kinder nicht früher zum Stehen

und Gehen anhalten, als bis sie sich hierzu kräftig genug zeigen, den Kindsmädchen muss empfohlen werden, die Kinder abwechselnd auf beiden Armen zu tragen, die Lage der Kranken im Bett muss öfters gewechselt werden, und es ist gut, dieselben mehr in ausgestreckter Richtung auf Rosshaarmatrazen auf den Rücken liegen zu lassen; anhaltendes Sitzen mit schiefer Richtung des Körpers, wie z. B. beim Sticken, muss vermieden werden, das frühe Anlegen der Schnürbrüste ist höchst nachtheilig, dagegen ungezwungene Bewegung und angemessene körperliche Uebung sehr vortheilhaft. Um gebogene Knochen wieder grad zu strecken, bedient man sich auch verschiedener Maschinen, deren Darstellung der Chirurgie überlassen werden muss.

Die Gelbsucht.

(*Icterus*, *Aurigo*, *Morb. regius*, *arquatus*, *s. arcuatus*, *bilis suffusio.*)

Brünnig (Lips. 1773). — *Marcerd* (med. Versuche. Thl. 1. Lpz. 1778). — *Vogler* (Wetzl. 1791).

§. 1487.

Die Gelbsucht ist die Krankheit, in welcher die Haut sich gelb färbt.

§. 1488.

Diese Färbung der Haut kommt in Fiebern, namentlich in Gallenfiebern und dem gelben Fieber vor, und es bildet sodann der gelbsüchtige Zustand ein Symptom dieser Krankheiten, sie ist aber auch häufig die Haupterscheinung einer fieberlosen, mehr oder weniger chroni-

schen Krankheit. Dieser Zustand ist es vorzüglich, den man mit dem Namen Gelbsucht belegt.

§. 1489.

Die Gelbsucht entsteht oft sehr schnell und beinahe plötzlich, z. B. auf einen heftigen Verdruss, oft bildet sie sich aber auch langsamer aus und es gehen ihr Erscheinungen vorher, die auf ein Leberleiden und Störungen in den Verdauungswegen hinweisen, wie das Gefühl von Spannung, Druck und selbst lebhaftem Schmerz in der Lebergegend und dem Magen, Aufgetriebenheit dieser Stellen, Neigung zum Erbrechen, übles Aufstossen, Aufblähung des Leibes, Verstopfung, Eingenommenheit des Kopfes, Mattigkeit, mürrische Gemüthsstimmung, zuweilen auch Brustbeklemmung, Trockenheit der Haut und ein schwaches Gefühl von Jucken und Fressen in derselben.

Die ersten Spuren der gelben Färbung zeigen sich im Weissen des Auges, sodann werden die zarten Stellen der Haut um die Augen herum, zur Seite der Nase, am Halse etc. gelb, endlich erscheint der ganze Körper gelb. Die Farbe spielt vom blass Citrongelben bis ins Orange und Safrangelbe, besonders an den sonst rothen Stellen der Wangen, und wird auch zuweilen selbst grünlich (Icterus viridis) und ins Schwärzliche gehend (Melas icterus, Icterus niger). Der Harn erhält eine dunkle, safrangelbe und selbst ins Schwärzliche gehende Farbe, er hat einen gelblich-grünlichen Schaum und färbt hineingetauchte Leinwand gelb, zuweilen zeigt auch der Schweiss und der Auswurf eine gelbliche Farbe und man hat selbst Fälle beobachtet, in welchen die wässerigte Flüssigkeit des Auges gelb gefärbt war und dem Kranken daher alle weissen und hellen Gegenstände in gelber Farbe erschienen. Meistens fehlt dabei in dem Darmkanal die Galle, die Stuhlentleerungen sind mehr oder weniger unterdrückt, der Koth fest und grau.

Die Kranken leiden dabei an schlechter Verdauung, Magenweh, bitterm Geschmacke, Aufstossen, gallichtem Erbrechen, und haben in der Regel grosse Abneigung vor Fleischspeisen, sie haben Kopfschmerz, werden sehr matt und der Puls ist in der Regel träge und klein.

§. 1490.

Diese Krankheit ist oft sehr langwierig, doch kann sich auch die gelbe Hautfarbe unter günstigen Umständen sehr schnell verlieren. In Gesundheit geht die Gelbsucht über, nachdem die Stuhlentleerungen wieder ihre gehörige Farbe erhalten haben oder auch gallichte Durchfälle oder gallichtes Erbrechen eingetreten sind. Auch kommen dabei oft wohlthätige Schweisse zu Stande, ein röthlicher Bodensatz im Urin, zuweilen Nasenbluten, ein frieselartiger Ausschlag, ein Rothlauf, Hämorrhoiden etc.

Den Tod führt die Krankheit durch Schwäche oder auch Zerstörung edler Organe herbei, nachdem vorher Fieber, Abzehrung, ein scorbutischer Zustand, Blutflüsse oder auch Wassersucht hinzugetreten sind.

§. 1491.

Bei Leichenöffnungen hat man alle Theile, selbst Knochen, Knorpel, das Gehirn etc. gelb gefärbt angetroffen und mancherlei Veränderungen in der Leber und den dazu gehörigen Theilen gefunden, insbesondere Verhärtungen in derselben und Gallensteine in der Gallenblase und dem Ductus choledochus.

§. 1492.

Die *Gelbsucht der Neugebornen* (Icterus neonatorum) tritt gewöhnlich zwischen dem dritten und siebenten Tage, selten erst in der zweiten oder dritten Woche nach der Geburt ein. Es wird zuerst die Haut dunkelroth und sodann gelb, und oft beinahe kupferfarbig, wobei man aber keine Störungen im Allgemeinbefinden

der Kinder wahrnimmt. Die Krankheit verschwindet in 4 — 7 Tagen in der Regel von selbst.

§. 1493.

Anlage zur Gelbsucht giebt das cholerische Temperament. — **Gelegenheitsursachen** sind alle diejenigen Ursachen, welche Reitzung, Krampf, Entzündung oder Verhärtung der Leber, Verschliessung der Gallengänge und Ueberfüllung des Blutes mit gewissen Stoffen veranlassen können, daher Zorn, Verkältung, besonders durch schnell eingetretene Kälte nach sehr heisser Witterung, der Missbrauch geistiger Getränke, der häufige Genuss von Stoffen, die, wie es scheint, zur übermässigen Bereitung gallichter Stoffe geneigt machen, des Fettes, ranziger Speisen etc., der Aufenthalt in einer sehr heissen Athmosphäre, Unterdrückung der Hämorrhoiden, der Missbrauch drastischer Mittel, bösartige Wechselfieber, der Biss der Scorpionen, gewisser Schlangen etc.

§. 1494.

Als Ursachen der Gelbsucht der Neugebornen werden beschuldigt: die Verschliessung der Gallengänge durch Kindspech und Schleim, der ungewohnte Reitz der ersten Nahrung auf den Darmkanal und auf die Leber, die Gewalt, die das Gehirn bei der Geburt erleidet und die consensuelle Einwirkung desselben auf die Leber, die mit der Geburt eintretenden Veränderungen im Blutlaufe, der Consens und die Wechselwirkung des Darmkanals nebst der Leber mit der Haut, der ungewohnte Eindruck der Luft auf die Haut und die veränderte Funktion der Haut, welche mit der Geburt von einem rein einsaugenden, zu einem zugleich ausscheidenden Organ wird.

§. 1495.

Das **Wesen** der Gelbsucht besteht in Ablagerung von gallichten Stoffen in die Haut und oft in alle Ge-

webe und in alle abgesonderten Stoffe des Körpers. Dass die gelbe Farbe wirklich von gallichten Stoffen herrühre, dafür sprechen der Ursprung der Krankheit aus Störungen in der Gallenabsonderung und die Untersuchungen von *Fourcroy* und *Clarion*, welche die wesentlichen Bestandtheile der Galle im Blute und von *Fourcroy*, *Vauquelin*, *Orfila* und *Cruikschank*, welche sie im Harne fanden.

Diese Bildung gallichter Stoffe in der Haut und anderen Theilen kann wie in dem Gallenfieber erregt werden, sowohl auf dem Wege des Nervensystems durch antagonistische Thätigkeit der Haut, als auch durch das Blut, indem gallichte Stoffe resorbirt, oder die Bestandtheile der Galle nicht durch die Leber ausgeschieden werden, oder das Blut durch Einwirkung einer schlechten Athmosphäre auf dasselbe oder durch fehlerhafte Nahrungsstoffe mit gewissen zur Gallenerzeugung geneigten Stoffen überladen wird. Der Unterschied zwischen Gelbsucht und Gallenfieber ist aber der, dass bei der Gelbsucht mehr die Absonderungen verändert sind, bei jener aber eine allgemeine Gefässreitzung erzeugt wird, was wohl in der Verschiedenheit der Krankheitsanlage und der erregenden Ursachen, insbesondere der Verschiedenheit des diesen Krankheiten zum Grunde liegenden krankhaften Zustandes der Leber zu suchen ist, indem z. B. eine entzündliche Reitzung der Leber leichter Gallenfieber, eine einfache Hemmung der Gallenabsonderung eher die gewöhnliche Gelbsucht zur Folge hat.

§. 1496.

Die Vorhersage ist aus der Beschaffenheit der Leber zu entnehmen, ist dieselbe von der Art, dass die Absonderung von Galle durch dieses Organ nicht wieder hergestellt werden kann, wie z. B. meistens bei Leberverhärtungen, so ist ein schlimmer Ausgang zu erwarten, bei mehr dynamischen Leiden dagegen in der Regel ein

guter. Ein leichter Zufall ist in der Regel die Gelbsucht der Neugebornen.

§. 1497.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Die Kranken müssen die zur Gallenbereitung geneigt machenden Speisen möglichst vermeiden, daher wenig Fleischnahrung, Butter etc. geniessen und sich mehr an Pflanzennahrung, besonders säuerliches Obst, halten, zum Getränke aber kühlende säuerliche Mittel wählen; Gemüthsbewegungen müssen möglichst vermieden werden. Bei grosser Hitze der Athmosphäre muss für eine kühle Temperatur der Wohnung gesorgt werden, nach einem Biss eines giftigen Thiers muss die Wunde ausgeschnitten, gebrannt oder durch stark reitzende oder ätzende Mittel in Eiterung versetzt werden, und die Hautausdünstung und Harnabsonderung durch starke Gaben von Spiritus Mindereri, Hirschhorngeist, Campher, das Dowersche Pulver etc. erregt werden.

Der zu den entfernteren Ursachen der Gelbsucht gehörende, ihr zum Grunde liegende krankhafte Zustand der Leber und der dazu gehörigen Theile verdient stets die grösste Berücksichtigung. Nach Verschiedenheit desselben dienen bald Blutentleerungen nebst Umschlägen von Cicuta, bald allein krampfstillende Mittel, wie Oelemulsionen, Opium, Hyoscyamus, Ipecacuanha in kleinen Gaben und nach Umständen auch die Valeriana, Asa foetida, Castoreum etc., bald Mittel um die Verhärtungen der Leber aufzulösen, Gallensteine zu beseitigen, Würmer hinwegzuschaffen, bei veränderter Lebensthätigkeit der Leber, wenn dieselbe durch den dem Wechselfieber zum Grunde liegenden krankhaften Zustand der Leber bedingt ist, vermag das Chininum sulphuricum in kurzem die Gelbsucht zu beseitigen. Ist eine grosse Menge Galle in der Gallenblase und zugleich im Magen angehäuft, so dass man erkennen kann, dass der Ausfluss

der Galle in die Gedärme nicht gehemmt ist, so ist es vortheilhaft, dieselbe durch Brechmittel oder auch durch Abführungsmittel auszuleeren, um ihre Resorption zu verhindern. Bei Kindern leert man das Kindspech durch Rhabarbersaft aus.

§. 1498.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Es ist hier die Aufgabe, die Ablagerung von galligten Stoffen auf die Haut zu verhindern und die Resorption der schon abgelagerten Stoffe zu befördern. Beides geschieht durch Erregung der Gallenabsonderung in der Leber, wenn etwa nicht schon eine erhöhte Thätigkeit in diesem Organe vorhanden ist und durch Ausführung der Stoffe nach aussen. Zu den leichtern Mitteln gehören die mildern Salze, wie Tartarus tartarisatus natronatus etc., die auflösenden Extracte, insbesondere von Graswurzel, Taraxacum, Herb. Fumariae, Marrubii albi, Chelidoni, die Ochsengalle, Eidotter, auch die Seife, das Gummi Ammoniacum in nicht zu grossen Gaben; die wirksamsten Chalagoga sind aber das Calomel, die Rhabarber und die Aloe, von welchen man sich vorzüglich der beiden letztern bedient. Auch bewirken Brechmittel, besonders aus dem Tartarus emeticus, nicht allein die Ausleerung der schon angesammelten Galle, sondern vermögen auch, besonders wenn sie wiederholt gegeben werden, die Absonderung selbst zu erhöhen. Die Kämpfschen Visceralklystiere sind ebenfalls anwendbar.

§. 1499.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Das diese Krankheit zuweilen begleitende Erbrechen ist oft heilsam; wird es zu heftig, so sucht man es durch die gewöhnlichen Mittel zu stillen. Bei Entkräftung und Abmagerung dient vorzüglich das Eigelb als Nahrungsmittel. Im Uebrigen wendet man gegen besondere Zufälle die Mittel an, die nach ihrem Character angezeigt sind.

Die Bleichsucht.

(*Das weisse Fieber, die weisse Gelbsucht, Chlorosis. Febris alba, Icterus albus, und in so fern sie bei Mädchen zur Zeit der Mannbarkeit vorkommt, Pallor virginum, Cachexia virginea, Febris amatoria.*

Fr. Hoffmann (Diss. Hall. 1731). — *Brandis* (Erfahrungen über die Wirkung der Eisenmittel im allgemeinen und des Driburger Wassers insbesondere, Hannov. 1803). — Ausserdem die Schriftsteller über Frauenzimmerkrankheiten.

§. 1500.

Die Bleichsucht bestimmt man gewöhnlich als eine bei Mädchen zur Zeit der Mannbarkeit und zuweilen auch bei jungen Wittwen vorkommende Dyscrasie, wobei die Gesichtsfarbe sehr blass, das Fleisch schlaff und die Muskelkräften schwach sind, und welche mit Störungen in den Geschlechtsverrichtungen, insbesondere Fehlern in der Menstruation in Verbindung steht; da jedoch derselbe Fehler in der Reproduction, welcher dem beschriebenen Aussehen zum Grunde liegt, auch bei Männern vorkommt, so muss das Wort Bleichsucht in einem ausgedehnteren Begriffe genommen und die erwähnte Beschaffenheit des Körpers verstanden werden, mag sie bei dem einen oder dem andern Geschlecht vorkommen und von dieser oder von jener Ursache hervorgebracht sein.

§. 1501.

Zuweilen im Gefolge eines andern langwierigen Leidens, oft aber ohne ein solches und vorzüglich bei Mädchen zur Zeit, in welcher die Mannbarkeit gewöhnlich eintritt, bildet sich zuweilen eine eigene Beschaffenheit des Körpers aus. Die Gesichtsfarbe wird andauernd blass, entweder mehr kreideweiss oder mehr wachsgelb,

insbesondere werden auch die Lippen und das Zahnfleisch blass, es zeigen sich dunkle Ringe um die Augen, die gewöhnlich etwas tief liegen, die Augenlieder haben meistens eine bräunliche Farbe, und sind nach dem Schlafe etwas aufgedunsen, der ganze Körper zeigt eine schlaffe Structur und es bilden sich selbst öfters wässerigte Geschwülste um die Knöchel aus. Dabei sind die Muskelkräften sehr schwach, so dass auf Körperbewegung sehr bald Ermüdung folgt, wobei auch leicht Herzklopfen eintritt, das Athmen ist erschwert, die Temperatur des Körpers vermindert, die Verdauung ist schlecht, oft haben aber die Kranken besondere Gelüste, zuweilen stellt sich saures und schleimiges Erbrechen ein, der Urin ist blass und schleimig, oft ist weisser Fluss vorhanden, die monatliche Reinigung fehlt meistens, oder sie ist sparsam und mit Beschwerden verbunden. Der Geschlechtstrieb kann sowohl erhöht als auch sehr gering sein und ganz mangeln. Meistens haben die Kranken eine traurige und oft eine schwärmerische Gemüthsstimmung, häufig sind sie hysterisch.

§. 1502.

Die Dauer der Krankheit kann sowohl nur einige Monate als auch mehrere Jahre betragen. In Gesundheit geht die Krankheit allmählig über, wobei die Menstruation gehörig zu Stande kommt, oft auch nach geschehener Verehlichung und nach einer stattgefundenen Schwangerschaft. Bei sehr weit gekommenem Uebel kann sich Wassersucht und Lungenschwindsucht aus demselben entwickeln und auch heftige Krampfzufälle, wie die Fallsucht oder der Veitstanz, so wie auch eine Seelenstörung sich hinzugesellen, doch liegen der Ausbildung dieser Uebel meistens noch andere Ursachen zugleich mit zum Grunde.

§. 1503.

Bei den Leichenöffnungen hat man Mangel an Blut, nicht gehörig ausgebildete Gebärmutter und Eier-

stöcke, Desorganisationen in denselben, so wie auch in der Milz und Leber, Erweiterung des Herzens und seröse Ergiessungen in der Brust- und Unterleibshöhle gefunden.

§. 1504.

Anlage zur Bleichsucht haben vorzüglich Mädchen zur Zeit der Mannbarkeit, besonders erethische, mit lebhaftem Geiste und Gefühle, so wie auch an scrophulöser Dyscrasie leidende.

Gelegenheitsursachen sind eine sitzende Lebensart, Kummer, besonders unglückliche Liebe, Aufreitzung und besonders zu frühe Erregung des Geschlechtstriebes durch die Phantasie oder durch Onanie, Nichtbefriedigung des gewohnten Geschlechtsgenusses, schlechte Nahrungsmittel, der Missbrauch erschlaffender Getränke, eine feuchte Wohnung, zu vieles Schlafen, öfterer Blutverlust, chronische Durchfälle, Schleimflüsse, andauernde Störungen in der Verdauung, Unterdrückung des Monatflusses, und verschiedene Entartungen von Organen, besonders Krebs.

§. 1505.

Als nächste Ursache der Bleichsucht wird gewöhnlich verminderte Menge des Faserstoffes und Blutrothes im Blute und der ihnen entsprechenden Stoffen in den festen Theilen beschuldigt, wodurch die Energie in der Blutbewegung vermindert, die Wärmebildung verringert, die Muskelbewegung kraftlos wird etc. Dass dieser Fehler in der Reproduction, vorzüglich bei Mädchen zur Zeit der Pubertätsentwicklung hervortritt, kann durch verschiedene Verhältnisse bedingt sein. Oft ist der Körper vorher schon schwach, scrophulös, und seine Kräften und die bessern Bestandtheile der Säfte werden durch das, um die bezeichnete Periode eintretende schnellere Wachsthum des Körpers, die Anstrengung der Natur zur Ausbildung der Brüste und der Zeugungsorgane und durch Verlust des in der, wenn auch nur sparsam ein-

tretenden Menstruation abgehenden Blutes zu sehr verbraucht, häufig wird zugleich das Nervensystem durch zu frühzeitige Aufregung des Geschlechtstriebes, durch die Phantasie oder Onanie geschwächt. Das Ausbleiben der Menstruation ist wohl in der Regel nur Folge, nicht leicht alleinige Ursache der Bleichsucht, doch mag es dieses auch mittelbar werden, indem durch Unterdrückung des Monatsflusses die Verrichtung der Organe auf verschiedene Weise gestört und dadurch Siechthum veranlasst werden kann. Gewöhnlich leitet man die Bleichsucht, die man der Hemmung der Menstruation zuschreibt, von Beeinträchtigung der Bewegung des Blutes und dadurch verminderten Lebensprozessen her, und *Puchelt* theilt die Bleichsucht, je nachdem sie durch Verminderung des Blutes und insbesondere seines Cruors oder durch Hemmung in der Blutbewegung entstehe, ein, in die anämische und in die venöse Chlorose.

Auf die bezeichnete Weise kann auch bei Männern und bei Weibern in einem andern als dem angegebenen Alter die bleichsüchtige Dyscrasie sich entwickeln, wenn durch Kummer, Onanie, wiederholten Blutverlust, andere Säfteentleerungen etc. die Nerventhätigkeit geschwächt und die Blutmasse vermindert ist, wo sodann der chlorotische Zustand häufig der Anfang der Wassersucht wird. Ein höchst blasses aber meistens kein aufgedunsenes Aussehen kommt bei dem Krebse vor. Zuweilen nähert sich das scorbutische Aussehen dem der Bleichsucht (Chlorosis atrophica et scorbutica nach *Harless*) und zuweilen steht auch die Krankheit zwischen Bleichsucht und Blausucht in der Mitte (die von organischen Herzfehlern entstehende Bleichsucht, Chlorosis cardiaca nach *Harless*).

§. 1506.

Vorhersage. Die Bleichsucht ist in der Regel keine lebensgefährliche Krankheit und wir sind im Besitze

wirksamer Mittel gegen dieselbe. Nur wenn sie schon einen sehr hohen Grad erreicht hat oder eine unheilbare Krankheit ihr zum Grunde liegt, hat sie zuweilen einen unglücklichen Ausgang.

§. 1507.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Von grösster Wichtigkeit ist die Anordnung einer geeigneten Lebensweise, wo diese fehlerhaft war. Die Kranke halte sich viel in der freien Luft auf, besonders an sonnigen Tagen, mache sich Körperbewegung, so viel die Kräften es gestatten, geniesse eine kräftige Kost, besonders Fleischnahrung und etwas Wein, gestatte der Phantasie keine zu grosse Gewalt über sich, sondern beschäftige sich mit Arbeiten. Ist bei unbefriedigtem Geschlechtstriebe dieser durch die Phantasie andauernd erregt, so ist oft das beste, schon von *Hippokrates* vorgeschlagene, Mittel die Verehlichung. Auch suche man den krankhaften Zustand einzelner Organe oder Systeme, welcher die entfernte Ursache der Bleichsucht sein oder sie vermehren könnte, zu heben, verbessere bei Säure im Magen die Absonderung des Magensaftes, suche die Scropheln zu mässigen, beschränke Schleimflüsse, suche Stockungen im Pfortadersysteme zu heben, die Menstruation, in so fern in ihrer Unterdrückung ein ursächliches Moment der Krankheit liegt, wieder herzustellen oder dieselbe im Nothfalle durch eine künstliche Blutentleerung zu ersetzen, unterlasse es aber, treibende Mittel anzuwenden oder Blut zu entleeren, wenn die ausbleibende Reinigung nur Folge der Schwächung der Körperkräfte ist.

§. 1508.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Sind die Hindernisse, welche der Erregung einer kräftigern Reproduction im Wege stehen, wie etwa eine venöse Plethora es sein könnte, hinweggeräumt, so

ist es unsere Aufgabe, so wohl die Prozesse der Blutbereitung als auch die productiven Prozesse im Organengewebe des ganzen Körpers zu erhöhen. Hiezu dienen ausser einer angemessenen Diät die geistigen und aromatischen und die tonischen Mittel, besonders beide in Verbindung, von welchen die ersteren die Lebensthätigkeit mehr zu erregen, die letzteren mehr Stoffe zur Bereitung eines kräftigen, an Faserstoff und Blutroth reichen Blutes herzugeben scheinen. Hieher gehören Wein, Melissen, Pfeffermünze, Zimmt, Flavedo corticum Aurantiorum, das Extractum corticum Aurantiorum, der Calamus aromaticus, Absinthium, das Extractum Trifolii Fibrini, Gentianae, Quassiae etc. und vorzüglich die China, nebst dem Chininum sulphuricum, und die Eisenpräparate. Unter diesen giebt man gerne zuerst die Tinctur Ferr. acet. aether, die Tr. Ferr. pom., die Tr. Ferr. muriatici, und geht zu den Flor. Sal. ammoniac. martiales und zu der Limatura martis über. Auch können die eisenhaltigen Mineralwasser, vorzüglich das zu Pyrmont und Driburg gebraucht werden.

§. 1509.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Bei grosser Beweglichkeit des Gefässsystems werden die Mineralsäuren, besonders in dem Elixir acidum Halleri, empfohlen, doch dürfen diese Mittel nicht zu lange fortgebraucht werden, da sie die Verdauung schwächen. — Bei grosser Beweglichkeit des Nervensystems wendet man mehr oder weniger die gegen Hysterie empfohlenen Mittel an. — Den in Folge der Bleichsucht zuweilen sich einstellenden weissen Fluss sucht man durch die bekannten Mittel zu beseitigen, ebenso die andern angegebenen Folgeübel, und zwar ist dieses um so nothwendiger, als sie ihrer Seits wiederum zur Vermehrung des bleichsüchtigen Zustandes beitragen können.

Die Blausucht.

(Die blaue Krankheit, Morbus coeruleus, Cyanosis, Cyanopathia, Coerulosis.)

Lentin (Beiträge zur ausüb. Arzneiwiss. B. II). — *Meckel* (über die Bildungsfehler des Herzens, in Reils Archiv für Physiol. B. VI. und in s. deutsch. Archiv f. d. Physiol. B. I). — *Nasse* (üb. d. Einfl. d. rothen Blutes auf die Entwickl. u. Verricht. d. menschl. Körpers in Reils Archiv f. d. Phys. B. X). — *Farre* (on Malformations of the human heart, Lond 1814). — *Kreysig* (üb. d. Krankh. d. Herzens). — *Hein* (Diss. Gött. 1816). — *Gintrac* (Par. 1824). — Ausserdem die Schriftsteller über pathologische Anatomie.

§. 1510.

Unter **Blausucht** versteht man die Cachexie, deren Hauptausdruck in einer bläulichen Färbung der Lippen, Wangen und anderer Körpertheile liegt.

§. 1511.

Wenn ein solches bläuliches Aussehen mit einem Herzfehler in Verbindung steht, wodurch das arterielle Blut mit venösem gemischt wird, so nennt man dieses vollkommene oder wahre Blausucht (auch Cyanosis cardiaca), wenn dagegen eine ähnliche Färbung von venösen Stockungen wegen Hemmungen in dem Athemholen entsteht, unvollkommene Blausucht. Letztere wird als Symptom in den Kapiteln von der Brustwassersucht und andern Krankheiten der Athmungsorgane beschrieben, sie ist übrigens oft sehr bedeutend, so dass die Wangen und vorzüglich die Lippen und die Zunge oft ein ganz schwärzlich-violettes Aussehen erhalten, wobei man gewöhnlich viele überfüllte venöse Gefässchen, besonders an den Wangen erkennen kann, und wobei die Theile kalt anzufühlen sind.

§. 1512.

Bei der wahren Blausucht zeigt sich eine mehr oder weniger blaue Färbung im Gesichte, besonders an den Lippen, den Wangen und auch an den Augenliedern, so wie an den Fingerspitzen, den Zehen etc., der Körper zeigt selbst für das Thermometer eine geringe Temperatur, die Kranken frieren leicht, sie fühlen sich sehr matt, sind schlecht genährt (der Körper schlank und die Finger an ihrem vordern Gliede kolbig und mit gebogenen Nägeln), und leiden zuweilen an Blutflüssen, wobei das Blut sehr dunkel gefärbt ist. Auf rasche Körperbewegung, und selbst auch ohne diese, treten leicht Herzklopfen und Unordnungen in der Herzbewegung ein, so wie Angst und das Gefühl von Beklemmung, wobei aber das Athmen in der Regel nicht wirklich gehemmt ist. In solchen Anfällen nimmt die blaue Färbung noch mehr überhand, der Körper wird kalt und es entstehen selbst Ohnmachten und zuweilen auch Zuckungen.

Ist die Blausucht durch angeborne und sehr bedeutende Herzfehler erzeugt, so sterben meistens die Kinder in der ersten oder zweiten Woche nach der Geburt unter Zuckungen und Ohnmachten. Zuweilen entwickelt sich aber die Krankheit erst im zweiten und dritten Lebensjahre deutlicher, wo sie sodann bis zur Zeit der Mannbarkeit andauern kann, um diese Zeit aber in der Regel tödtet, doch hat man sie auch bis zum 40sten Jahre dauern gesehen. In den Tod geht das Leiden über unter einem Anfall von Erstickung oder Ohnmacht, zuweilen durch einen Blutsturz aus der Lunge, einen Schlagfluss, oder auch durch Abzehrung oder Wassersucht.

§. 1513.

Die Fehler des Herzens und der Gefässe, die dieser Krankheit zum Grunde liegen, sind: Offenbleiben des foramen ovale, eine schiefe Durchbohrung der Scheidewand zwischen den Vorkammern, was jedoch oft ohne die Blausucht

vorkommt; Offenbleiben des Ductus arteriosus Botalli; theilweiser Mangel der Scheidewand zwischen den beiden Herzkammern; Mangel der Scheidewand sowohl in den Vor- als in den Herzkammern. Bei diesen Fehlern bestehen oft zugleich: Ursprung der Aorta aus beiden Herzkammern, Verengung der Lungenarterie, welche aber auch ohne Herzfehler vorkommen und erst in spätern Jahren durch Entzündung entstehen kann, Ursprung der Lungenarterie aus der Aorta, Oeffnung der untern Hohlvene in den linken Vorhof und Ursprung der Aorta aus der rechten Kammer und der Lungenarterie aus der linken.

§. 1514.

Die nächste Ursache der Blausucht besteht darin, dass das arterielle Blut durch die Beimischung von venösem einen Theil seiner Kraft verloren hat, mit der Organensubstanz und vorzüglich mit dem Nervensystem in Wechselwirkung zu treten; es sind daher alle Lebensprozesse, insbesondere die Wärmebildung und die Ernährung gesunken.

§. 1515.

Die Behandlung dieser unheilbaren Krankheit kann sich nur auf die Linderung der Zufälle beschränken. Gemüths- und zu starke Körperbewegungen müssen aufs sorgfältigste vermieden werden, um nicht die beschriebenen, von dem Herzen ausgehenden Anfälle zu veranlassen. Zur Minderung dieser Anfälle hat man auch kleine Blutentleerungen, kühlende Abführungsmittel, die Digitalis, das Hallersche Sauer und eine nicht reitzende Kost empfohlen. Sehr wohlthuend ist für die Kranken die künstliche Erwärmung der Glieder.

Der Scorbut.
(*Scharbock, Scorbutus.*)

Lind (Edinb. 1752, a. d. Engl. v. Petzold, Riga u. Lpz. 1773). — *Ch. L. Hoffmann* (Münster 1782). — *Milman* (Lond. 1782, aus d. Engl. v. Lindemann, Berl. 1795). — *Trotter* (Edinb. 1786, aus dem Engl. v. Michaelis, Lpz. 1787). — *Bacheracht* (St. Petersburg 1786). — *Blane* (Beobacht. über d. Krankh. der Seeleute, aus dem Engl. Marb. 1788). — *Balme* (Montpell. 1803 und Par. 1819). — *v. Schraud* (Pesth 1804). — *Kéraudren* (Paris 1804). — *Köchlin* (med. chirurg. Zeitung 1822).

§. 1516.

Der Scorbut ist die Cachexie, welche besonders durch ein schwammiges, leicht blutendes Zahnfleisch, Petechien, Blutflüsse und in den höhern Graden der Krankheit auch durch Schmerz und Steifigkeit der Gelenke und durch Athmungsbeschwerden sich ausspricht.

§. 1517.

Es scheint der Scorbut in der ausgebildeten Form, in welcher er auf Schiffen öfters herrscht, den Alten nicht bekannt gewesen zu sein, dagegen findet man in Hippokrates Werken Schilderungen von Krankheiten mit dem faulicht-scorbutischen Character. Nachdem im 13ten Jahrhundert der Compass auf den Schiffen eingeführt war, zeigte sich der Scorbut immer deutlicher, und als im 16ten Jahrhundert immer grössere Seefahrten unternommen wurden, so wurde der Scorbut so häufig beobachtet, dass er die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog; man schrieb jedoch (besonders *Eugalenus*) dem Scorbut sehr viele Krankheiten zu, die nicht aus ihm entspringen. Zu den bessern, frühern Schriftstellern über den Scorbut gehören *Ronsseus*, *Wyer*, *Dodonaeus* und *Brucaeus*. Ein klassisches Werk lieferte später *Lind*.

§. 1518.

Man theilt den **Verlauf** des Scorbutes gewöhnlich in drei Zeiträume, doch ist diese Eintheilung mehr eine künstliche als natürliche, da die Krankheit keine deutliche Abschnitte zeigt, sondern ein ganz allmähliger Uebergang von den leichtesten zu den schwersten Graden der Krankheit statt findet.

Erster Zeitraum. Die Kranken fühlen ihre Kräfte geringer werden und haben desshalb eine Abneigung zu Muskelanstrengung, zuweilen fühlen sie dabei eine Art Steifigkeit in den Knieen, sie sind niedergeschlagen, ihre Gesichtsfarbe wird bleich und erdfahl, sie haben dunkle Ringe um die Augen, oft zeigt sich an den Wangen und den Lippen eine dunkelbläuliche Röthe, welche, genau betrachtet, aus einem feinen, varikösen Gefässnetze besteht, das Zahnfleisch ist aufgelockert, schwammig, blutet leicht und ist oft selbst geschwürig (die Mundfäule, Stomacace), der Kranke riecht aus dem Munde, die ganze Haut des Körpers hat eine schmutzige Farbe, das Oberhäutchen ist wie abgestorben und schuppt sich oft auch ab; mehr oder weniger zahlreiche Petechien und grössere Ecchymosen, dunkle Flecken und Striemen darstellend, entstehen nach und nach, vorhandene Geschwüre und Wunden erhalten ein schwammiges Ansehen, die Kranken bluten leicht aus der Nase und leiden auch an andern Blutflüssen, der Urin ist braun und trübe, der Puls ist klein und schwach. Oft schwellen die Haut um die Knöchel etwas ödematös an. Die Kranken haben Abneigung vor Fleischspeisen und dagegen Verlangen nach säuerlichen Dingen und frischen Gemüsen.

Zweiter Zeitraum. Alle die erwähnten Zufälle nehmen zu, insbesondere aber wird die Steifigkeit der Gelenke grösser; diese Theile, vorzüglich die Kniee werden schmerzhaft und schwellen an, oft wie bei dem

Gliedschwamm; auch stellen sich oft Schmerzen in den Knochen selbst ein, und es bilden sich auch Geschwülste in den muskulösen Theilen. Die Kranken empfinden Stiche in der Brust, leiden an Schwerathmigkeit und husten oft Blut aus; auch werden dieselben oft von Kolikschmerzen befallen, es wird zuweilen Blut durch Erbrechen und die Stuhlentleerungen ausgeleert und die andern, gewöhnlich schon früher vorgekommenen Blutergiessungen aus dem Zahnfleische, der Nase, der Gebärmutter etc. wiederholen sich gerne von neuem. Häufig bilden sich, besonders an den mit Blut unterlaufenen Stellen der Haut, so wie an alten Narben, Geschwüre. Es werden nämlich solche Stellen bläulich-roth, schmerzhaft, schwellen an, brechen auf und ergiessen eine mit Blut gemischte Jauche. Der Grund des hierdurch gebildeten Geschwüres ist schlaff und es wachsen schwammige Auswüchse hervor, die Ränder desselben sind ebenfalls schwammig, aufgetrieben, dunkelblau und oft ödematös. Bei längerer Dauer solcher Geschwüre werden zuweilen die unter ihnen liegenden Knochen angegriffen und von Beinfrass befallen, das Zahnfleisch wird oft brandig und die Zahnfächer von Beinfrass ergriffen, ebenso werden die aufgelegenen Stellen brandig.

Dritter Zeitraum. Der Kranke sinkt nun, indem die erwähnten Zufälle, besonders die Blutflüsse, immer heftiger werden, in die höchste Erschöpfung, so dass er leicht in Ohnmacht verfällt. Gewöhnlich gesellt sich ein fieberhafter Zustand hinzu, wodurch die Krankheit einem hohen Grade vom Faulfieber gleicht, kalte, klebrige und zuweilen selbst blutige Schweisse brechen aus. Häufig wird der Kranke nunmehr auch gelbsüchtig und wassersüchtig, die untern Gliedmassen werden oft lahm und es sterben selbst ganze Glieder durch den Brand ab. Das entleerte Blut soll oft schwarz wie Tinte, aufgelöst und oft auch etwas gelblich sein.

§. 1519.

Es ist der Verlauf dieser Krankheit im Ganzen langwierig. Schneller und oft schon in wenigen Wochen wird der s. g. Seescorbut tödtlich, viel schleichender ist der Verlauf bei dem Landscorbute. In Gesundheit geht die Krankheit allmählig ohne besondere Krisen über, in den Tod durch Erschöpfung der Kräfte.

§. 1520.

Als verschiedene Arten des Scorbutes hat man den See- und den Landscorbut angenommen. Der Unterschied zwischen beiden besteht jedoch nur in verschiedenen Graden der Krankheit, indem der letztere gewöhnlich einen mildern Verlauf als der erstere hat, insbesondere kommen bei ihm nur selten die Schmerzen und Geschwülste der Gelenke und die Brustbeschwerden vor.

§. 1521.

Ausser den genannten Verschiedenheiten kommen noch folgende Modifikationen des Scorbutes vor:

1) *Die Werlhofsche Blutfleckenkrankheit* (Morbus maculosus haemorrhagicus Werlhofii, Haemorrhoea petechialis).*)

Werlhof (opp. Tom. III. pag. 540 u. 748) — *Behrens* (Diss. Brunsvig. 1735 u. rec. in Werlh. opp. p. 587 und 615). — *Wichmann* (Ideen z. Diagnost) — *Acrel* (Diss. Upsal. 1797). — *Havinga* (lat. Groening 1799). — *Harless* (in Hufelands Journ. B. 10). — *Hergt* (Hannover 1829).

Es zeigen sich linsengrosse, und auch grössere, rothe und bläulich rothe Flecken auf der Haut (Petechien),

*) Es ist die *Werlhofische* Blutfleckenkrankheit wohl nicht immer scorbutischen Ursprungs; wenigstens beobachtete ich einen Fall, in welchem die erwähnte Krankheit bei einer sehr kräftigen Person in Folge der unterdrückten Reinigung plötzlich entstand und durch eine Aderlässe schnell geheilt wurde. Ich hielt die Krankheit für eine Blutcongestion nach der Haut.

wobei zuweilen, wie auch ich in einem Falle beobachtet habe, sich so viel Blut unter die Epidermis ergiesst, dass diese von dem unter ihr liegenden Schleimnetze getrennt wird und ein kleines Blutbläschen darstellt. Das Zahnfleisch wird missfarbig, schwammig; im ganzen Umfange der Mundhöhle bilden sich rothe, braune und selbst schwärzliche Flecken, welche bei leichter Berührung stark bluten, so dass oft ein wahrer Blutfluss daraus entsteht, sie bedecken sich mit einer Art Schorfe, aus welcher ebenfalls viel Blut aussickert. Zuweilen ergiesst sich auch Blut aus andern Theilen, ja man hat selbst die Thränen blutig gesehen. Bei längerer Dauer der Krankheit, welche bei richtiger Behandlung sehr abgekürzt werden, aber auch Monate und Jahre betragen kann, werden die Kranken sehr schwach, blass und schwellen zuletzt wassersüchtig an.

§. 1522.

2) Die Mundfäule und der sogenannte Wasserkrebs.

Amman (lat. Lpz. 1681). — *van Lil* (Samml. auserles. Abhandl. B. 2.). — *Berthe* (ebend. B. 2.) — *Ploucquet* (lat. Tübing. 1794). — *Michaelis* (in Hufel. u. Himly's Journ. 1809). — *Mende* (ebend.). — *Siebert* (Hufel. Journ. 1818). — *Klaatsch* (Hufel. Journ. 1823). — *Angelot* (Revue méd. 1827). — *A. L. Richter* (Berlin 1828). — *V. J. Wiegand* (Erlangen 1830). — Ausserdem die Schriftsteller über Kinderkrankheiten.

Beide Uebel, von denen des letztere blos eine bösartige Form des erstern zu sein scheint, sind mehr oder weniger den Entartungen des Zahnfleisches, die im Scorbute vorkommen, ähnlich oder gleich, doch werden sie auch ohne andere Zeichen des Scorbutes angetroffen.

Die gewöhnliche Mundfäule (Stomacace), welche oft zur Zeit des Zahnwechsels, zuweilen in Verbindung mit gastrischen Unreinigkeiten oder einem cachectischen

Zustand vorkommt, giebt sich durch ein leichtes Gefühl von Brennen des Zahnfleisches, durch Anschwellung und Schwammigwerden desselben, so wie auch zum Theil des übrigen Theiles der Schleimhaut, die die Mundhöhle überzieht, zu erkennen. Es entstehen sodann weisse Bläschen, welche bersten und in Geschwüre von der Grösse einer Linse bis zu einem Groschen, welche einen speckigen Grund und etwas erhöhte, entzündete Ränder haben, übergehen. Oft erkennt man auch an diesen Stellen nur eine weisse, schwielige Haut. Dabei fliesst der Speichel stark, der Kranke riecht übel aus dem Munde und es schwellen oft die Speichel- und auch zuweilen die lymphatischen Drüsen etwas an. Die Geschwüre heilen übrigens, besonders bei richtiger Behandlung, leicht und die Krankheit geht oft schon in einigen Tagen in Gesundheit über, seltener dauert sie bis zu zwei Wochen.

§. 1525.

Der s. g. Wasserkrebs oder, richtiger bezeichnet, die bösartige Mundfäule (Stomacace maligna, gangraenosa, Cancer aquaticus, Noma) entwickelt sich zuweilen allmählig aus der gutartigen Mundfäule oder es entsteht, nachdem acht bis vierzehn Tage grosse Unruhe, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Durchfälle etc. angedauert haben, auf dem Zahnfleische oder an einer andern Stelle im Munde ein Bläschen, das mit einer schmerzhaften Entzündungsröthe umgeben ist und schnell in ein um sich fressendes Geschwür übergeht, oder es überzieht sich das geröthete und schmerzhafte Zahnfleisch mit einem weissen Fleck, der sich bald als eine Brandschorfe darstellt, worauf entweder die Brandschorfe sich losstosst und das hierdurch entstandene Geschwür heilt oder diese Stelle in ein immer mehr um sich fressendes, brandiges Geschwür übergeht. Es fliesst eine übelriechende Jauche aus dem Munde, die Zähne werden locker und fallen

aus, selbst Stücke des Kiefers sondern sich ab und die Nasenbeine werden zerstört, wobei sich leicht Blut aus dem Munde oder der Nase ergiesst. Häufig entzündet sich auch die Lippe und die äussere Seite der Wange, es entstehen schwarze und bleifarbene Bläschen auf denselben, die aufbrechen und um sich fressen und einen aashaften Geruch verbreiten. Zuletzt werden alle Absonderungen scharf und übelriechend, Durchfälle stellen sich ein, die Füsse schwellen ödematös an und ein heftiges Fieber verzehrt vollends die Kräften des Kranken.

§. 1524.

Bei den Leichenöffnungen der am Scorbute Gestorbenen, fand man das Blut schwarz und aufgelöst, das Herz sehr welk, einzelne Eingeweide brandig, namentlich auch zuweilen die Lungen, serös-blutige Flüssigkeit in die Höhlen ergossen, die Milz weich, die Gekrösdrüsen angeschwollen, einzelne Muskeln mit schwarzem Blute angefüllt und zuweilen auch brandig, eine grünliche Flüssigkeit, statt der Synovia, in den Gelenkhöhlen, in einzelnen Knochen Beinfrass.

§. 1525.

Die Ursachen des Scorbutes sind vorzüglich eine feuchte und kalte Athmosphäre, wie sie auf den nördlichen Meeren und an den nördlichen Seeküsten beschaffen ist, oder auch (nach *Trotter*) eine sehr heisse Luft, wie unter den heissen Himmelsstrichen, und der fortgesetzte Genuss unpassender Nahrung, insbesondere, bei Entbehrung von frischem Gemüse, der Genuss von gesalzenem, geräuchertem oder eingepöckeltem Fleische, halb verdorbenem Fleische oder halb verdorbenen Fischen etc. Ausserdem der Aufenthalt in einer feuchten Wohnung, in welcher die Luft nicht gehörig erneuert wird, Mangel an Bewegung, niederbeugende Gemüthsaffecte, Mangel an Nahrung, grosse Unreinlichkeit, schwächende Krankheiten, z. B. das Nervenfieber und Blutflüsse, dyscrasi-

sche Krankheiten, wie z. B. die Lustseuche, auch vermag das Quecksilber einen dem Scorbute ähnlichen Zustand hervorzubringen.

§. 1526.

Als Ursachen der Werlhofischen Blutfleckenkrankheit hat man ähnliche Einflüsse beschuldigt, namentlich eine ungesunde Nahrung, ungesunde Wohnung, Traurigkeit etc.; ausserdem leitet man sie auch von Scharlach, Krätze, Stockungen im Pfortadersysteme etc. her.

Die gutartige Mundfäule wird öfters von dem Zahnreitz und von gastrischen Reitzen hervorgebracht, und kommt auch zuweilen bei rheumatischer oder catarrhalischer Krankheitsconstitution epidemisch vor. — Die bösartige Mundfäule kommt bei cachectischen Kindern unter Einwirkung einer feuchten Wohnung mit Mangel an frischer Luft, bei dem Gebrauche schlechter Nahrungsmittel, bei grosser Unreinlichkeit etc. vor, und wird daher in der Regel nur bei Kindern der ärmsten Volksklasse angetroffen.

§. 1527.

Die Ansichten über das Wesen der Krankheit weichen vorzüglich darin von einander ab, dass viele Aerzte dasselbe in den flüssigen, andere in den festen Theilen suchen. Wohl die meisten Aerzte nehmen eine faulichte Auflösung des Blutes an. *Boerhave* glaubte, dass verschiedenartige Verderbnisse der Säfte, eine saure, kochsalzartige, ammoniakalische und ranzige, stattfinden können. *L. Hoffmann* nahm eine alkalische Schärfe an, *Jakson* übermässige Anhäufung des Phlogistons, mehrere Aerzte Mangel an Sauerstoff, *Mackride* Mangel an Kohlenstoff, *Puchelt*, neben einer schlaffen Faser, überwiegende Venosität, *Harless* sucht den nosochemischen Karakter der Blutausartung in Zersetzung des Blutes mit Verminderung seines Cruors und vorzüglich seines Faserstoffes und der Gallerte, auch mit Zersetzung

seines Albumens und zugleich mit Verminderung seines Sauerstoffgehaltes, so wie selbst seines Stickstoffes, dagegen mit Vermehrung des Wässerigten und des Kohlenstoffes. Aus einem Leiden der festen Theile, insbesondere aus Schwäche der Lebensthätigkeit, wovon der Fehler der Säfte nur die Folge sei, erklärten *Lind*, *Sprengel*, *Dreyssig* u. A. die Krankheit.

Es scheint sowohl auf dem einen, als auf dem andern Wege die Krankheit entstehen zu können, und wohl meistens die Krankheitseinflüsse auf beide bezeichneten Krankheitsfactoren zugleich zu wirken. Das Blut leidet primär, indem ein Mangel derjenigen Stoffe vorhanden ist, die zur Bereitung eines gesunden, lebenskräftigen Blutes nothwendig sind, und indem dagegen andere Stoffe, z. B. salzige Theile, die zur Auflösung des Blutes beitragen, in die Blutmasse gelangen; die festen Theile und das Nervensystem insbesondere leiden dagegen durch Anstrengung, deprimirende Gemüthsaffecte etc. Ist nun das Blut das zuerst Krankhafte, so wird eine krankhafte Wechselwirkung zwischen den festen Theilen und dem Blute eintreten, die Kräften werden sinken, die Ernährung fehlerhaft, und sind scharfe Bestandtheile, wie z. B. salzige Theile im Blute vorhanden, so werden sie in den Capillarrinnen als Reitz auf die Nervenmasse wirken und werden daher Entzündungen veranlassen. Ist dagegen das Nervensystem geschwächt, so sinkt auch die Lebenskraft im Blute und den übrigen Stoffen des Körpers, und diese gerathen in einen aufgelösten Zustand, wie man dieses bei hohen Graden des Nervenfiebers und bei Lähmungen deutlich wahrnimmt.

§. 1528.

Die Vorhersage richtet sich zum Theil nach dem Grade des Uebels, und vorzüglich nach der vorhandenen Möglichkeit, die schädlichen Einflüsse hinwegzuräumen. Kann dem Scorbutischen eine gesunde Nahrung darge-

boten werden, kann er einen gesunden Aufenthalt wählen, so sind selbst hohe Grade des Scorbutes heilbar; auch besitzen wir wirksame Arzneimittel gegen diese Krankheit.

In der Werlhofischen Blutfleckenkrankheit bilden sich, mit Ausnahme der Blutungen, die schwereren Zufälle des Scorbutes nicht aus und es wird daher diese Krankheit selten tödtlich.

Die gutartige Mundfäule ist für sich nicht gefährlich, dagegen wird der sogenannte Wasserkrebs meistens tödtlich.

§. 1529.

B e h a n d l u n g. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Es muss möglichst dafür gesorgt werden, dass die Wohnung der scorbutischen Kranken, insbesondere die Schiffsräume, gut ausgelüftet und trocken erhalten werden, die Kranken müssen sich warm und trocken kleiden, ihre Zeit mehr auf den Verdecken, als in den untern Räumen des Schiffes zubringen; leben sie auf dem Lande, so müssen sie, wo möglich, eine hoch gelegene, trockene und warme Gegend zu ihrem Aufenthalte wählen. Es muss für gutes Trinkwasser Sorge getragen werden und es werden mit Vortheil die unten anzugebenden antiscorbutischen Getränke gereicht. Zur Nahrung bediene man sich, unter möglichster Vermeidung des geräucherten, des eingesalzenen Fleisches etc., vorzüglich frischer Gemüse, besonders von den unten anzugebenden Pflanzen, des Sauerkrautes, des Salates und Speisen mit Meerrettig, Senf etc., frischen Fleisches etc. Von Wichtigkeit ist es auch, so viel als möglich, eine muthige und frohe Gemüthsstimmung bei dem Kranken zu erhalten und ihn zu einer mehr thätigen Lebensweise anzuhalten.

§. 1530.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Wir besitzen eine Reihe von Mitteln, die beinahe

specifisch dieser Dyscrasie entgegenwirken. Sie scheinen grösstentheils dadurch zu wirken, dass Theile derselben in die Blutmasse aufgenommen werden und dadurch die Mischung des Blutes verbessert wird, zum Theil auch dadurch, dass sie die Lebensthätigkeit erhöhen und dadurch eine kräftigere Blutbereitung bewirken, und den Organismus zur Ueberwältigung der nachtheiligen Einflüsse fähiger machen. Hieher gehören säuerliche Stoffe, die Limonade, Wasser mit Pomeranzensaft, Berberitzen, Johannisbeeren, saure Kirschen, Sauerampfer, Sauerklee, der Essig, ein säuerlicher Wein, z. B. Rheinwein, und in den hohen Graden des Scorbutes die Mineralsäuren, ferner die Buttermilch, die Kohlensäure haltenden Getränke, wie die kohlensauren Mineralwasser, ein musierendes Bier, der Malztrank, der Champagner, sodann die eigentlichen antiscorbutischen, ein scharfes Princip enthaltenden Pflanzen, wie Nasturtium aquaticum, Cochlearia, Beccabunga, Rettig, Meerrettig, Senf, z. B. als Senfmolken, endlich erregende und tonische Mittel, wie Wein, etwas Arack unter das Getränke, gewürzhafte und bittere Tinkturen, das Extractum Absinthii, Trifolii fibrin., Cortic. Aurant., die Wurzel von Calamus aromaticus, die Chinarinde und zuletzt das Eisen.

Hiermit werden mit Nutzen äusserliche Mittel verbunden, Waschungen des Körpers mit frischem Wasser, kühle Bäder, Waschungen mit Wasser und Essig, oder mit einem Zusatz von aromatischem Essig oder mit etwas Mineralsäure, so wie mit Wein, Branntwein, Spiritus camphoratus etc.

§. 1551.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die Behandlung des schwammigen, leicht blutenden Zahnfleisches wird weiter unten, bei der Darstellung der Kur der Mundfäule angegeben werden. — Die Blutflüsse sucht man stets zu stillen und behandelt sie wie passive

Blutflüsse. — Die geschwollenen und schmerzhaften Gelenke bäht man mit Abkochungen von antiscorbutischen Kräutern. — Die Geschwüre verbindet man mit Abkochungen von Eichen-, Weiden- und Chinarinde, mit Zusatz von Mineralsäure, mit verdünnter brenzlicher Holzsäure, mit Thedens Schusswasser, mit rothem Wein, mit Gummikino, mit Alaunauflösung, mit Chinapulver, Kohlenpulver, Campher, Myrrhen, Storax etc. Auch wird empfohlen, das Glied, an welchem das Geschwür sich befindet, mit Binden, die mit stärkenden Mitteln befeuchtet sind, einzuwickeln.

§. 1532.

Bei der Behandlung der Werlhofischen Blutfleckenkrankheit soll man, nach *Kreysig*, [1]) besonders suchen, die etwa vorhandenen Blutanhäufungen in dem Pfortadersysteme zu heben und daher kühlende Abführungsmittel anwenden. Im Uebrigen sind die gegen den scorbutischen Zustand und die Blutflüsse wirksamen Mittel anzuwenden, wie verdünnte Mineralsäuren und das Elixir acidum Halleri, die China etc., so wie Waschungen des Körpers mit frischem Wasser, Wasser mit Essig, Mineralsäuren etc. — Ist die Krankheit durch Unterdrückung eines Blutflusses entstanden, so möchte wohl die Aderlässe das Hauptmittel sein.

§. 1533.

Um die Mundfäule und den s. g. Wasserkrebs zu heilen, muss der Krankheitszustand, in deren Verbindung sie vorkommen, gehoben werden, die wichtigsten Mittel sind übrigens in beiden Krankheitsformen die örtlichen. Gegen die gewöhnliche Mundfäule dienen: Mundwasser von Abkochungen von Eichen-, Weiden-, Chinarinde, von Salbei, mit Zusätzen von Essig, Mineral-

1) Die Krankh. d. Herz. Thl. I. S. 178.

säuren, Alaun, Spiritus Cochleariae, Myrrhentinctur und Honig, oder Rosenhonig mit denselben Zusätzen. — Gegen den Wasserkrebs können dieselben Mittel gebraucht werden, vor Allem ist aber von *van Swieten* und Andern die Salzsäure, mit Wasser vermischt oder in Verbindung mit Rosenhonig (20 bis 30 Tropfen auf eine halbe Unze) und selbst unvermischt auf die kranke Stelle gebracht, empfohlen worden.

Die Fettsucht.

(*Hyperpiaenesis, Polypionia, Polysarcia, Obesitas nimia.*)

Jansen (lat. Leyden 1784, übersetzt v. Jonas, Halle 1786). — *Lorry* (a. d. Franz. v. Lindemann, Berlin 1797).

§. 1534.

Die **Fettsucht** ist die Krankheit, in welcher eine solche Menge Fett gebildet wird, dass hierdurch die Verrichtungen der Organe mehr oder weniger gehemmt werden.

§. 1535.

Die von der Fettsucht befallenen Individuen werden oft ausserordentlich dick und schwer, so dass man Beispiele hat, dass ihr Gewicht 400, ja 630 Pfunde betrug. Die Umrisse der Muskeln, der Sehnen etc., sind bei fetten Personen nicht mehr sichtbar, alle Theile

*) Von den Fettgeschwülsten (Lipoma) und der Umwandlung der Muskeln, Knochen etc. in eine speck- oder fettwachsähnliche Substanz, wird in dem Abschnitte von den örtlichen Desorganisationen die Rede sein, so weit diese Veränderungen nicht Gegenstand der Chirurgie sind.

sind rund and weich, die Bewegung der Muskeln geschieht gewöhnlich sehr langsam und auch gewöhnlich nicht mit der Kraft, als der oft colossale Bau des Körpers erwarten liesse, jede stärkere Körperbewegung geschieht unter keuchendem Athem und dem Ausbruch von reichlichem Schweisse, wobei einzelne Theile leicht wund werden (das Frattsein). Meistens ist auch der Geist träge, die Kranken haben eine grosse Neigung zum Schlafe, besonders nach dem Essen, ihre Zeugungskraft ist gering, dagegen vermögen dieselben oft länger der Kälte zu widerstehen und Nahrung zu entbehren. Zuweilen haben die Kranken, wenn in den Körperhöhlen die Fettansammlung sehr bedeutend ist, sehr bedeutende Zufälle, namentlich einen unordentlichen und schwachen Herzschlag mit Angst und Erstickungsanfällen, anhaltend erschwertes Athmen, häufige Schwindel etc. Der Urin ist oft sehr trübe und soll zuweilen wie Seifenauflösung sein, und auch einen rothen Bodensatz, und Fettaugen und ein schillerndes Häutchen auf der Oberfläche zeigen. — Oft ist der Körperumfang nicht so sehr bedeutend, die Zufälle der innern Fettanlagerung aber so stark, dass selbst der Tod hiedurch erfolgen kann.

§. 1536.

Die Fettsucht ist ein langwieriges und oft habituelles Leiden, doch verliert sie sich zuweilen auch allmählig, besonders im höhern Alter. Sie geht oft in Wassersucht über, und kann sowohl durch diese, als auch ohne dieselbe, durch Erstickung, Hemmung der Herzbewegung und auch durch Schlagfluss tödten.

§. 1537.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Das Fettlager in der Bauchwandung und an andern Theilen des Körpers ist oft mehrere Zolle dick, wo dagegen die Muskeln als ganz dünne, oft kaum bemerkbare Schichten erscheinen. Im Innern des Körpers ist das Fett am meisten am

Netze und dem Gekröse, und nebst diesem am Herzbeutel angelagert. Die Leber ist zu gross. Meistens ist etwas seröse Flüssigkeit in den Höhlen des Körpers enthalten. — In einem Falle, in welchem der nicht besonders dicke Kranke, unter Zufällen, welche der Brustwassersucht glichen, gestorben war, fand ich die Brusthöhle so sehr mit Fett ausgepolstert, dass die Lunge sich kaum bewegen konnte, das Herz, welches wenig Muskelsubstanz, aber viel Fett besass, lag in einer Kapsel von Fett, das sich um den Herzbeutel angelagert hatte. Ebenso war die Unterleibshöhle von Fett gleichsam ausgepfropft und die Gedärme lagen zu dünnen Stricken eingeschrumpft in einer Masse von Fett, das sich am Gekröse angelagert hatte und die ganze Bauchhöhle ausfüllte.

§. 1538.

Anlage zur übermässigen Fettbildung giebt vorzüglich das phlegmatische und im geringern Grade auch das sanguinische Temperament, so wie das Alter zwischen 30 und 50 Jahren; auch ist dieselbe oft erblich.

Gelegenheitsursachen sind der Genuss reichlicher und stark nährender Speisen, vielen Fleisches, Bieres etc., wiewohl Individuen, die wenig essen, bei vorhandener Anlage fett werden können, ferner zu geringer Verbrauch der Kräfte und Stoffe, daher eine sitzende Lebensart, langes Schlafen, grosse Geistes- und Gemüthsruhe, Hemmung naturgemässer Absonderungen, z. B. der Milch bei unterlassenem Stillen, Enthaltung vom Beischlafe etc., ferner der reichliche Genuss gewisser Stoffe von besonderer Wirkung auf den Körper, z. B. der zu starke Genuss von geistigen Getränken, endlich auch zuweilen überstandene Blutungen und andere nicht mehr fortdauernde schwächende Einflüsse, wie z. B. frühere Ausschweifungen in der Liebe, Merkurialkuren etc.

§. 1539.

Wesen. Man glaubt, dass bei der zu starken Fettbildung Kohlenstoff und Wasserstoff in dem Blute überwiege, und dagegen Sauerstoff in zu geringer Menge vorhanden sei, woher es denn auch komme, dass die zur Ausscheidung unbrauchbarer Stoffe bestimmte Leber so gross werde. Mit der Wasserbildung scheint die krankhafte Fettbildung einige Verwandtschaft zu haben, da sie oft auf dieselbe Gelegenheitsursachen eintritt, z. B. auf den Missbrauch geistiger Getränke, auf Blutflüsse etc., da sie ferner, wie jene, oft mit einem Leberleiden in Verbindung steht, da auf sie die Wassersucht oft folgt, und in den in beiden Krankheiten gebildeten Stoffen der bei andern Erzeugnissen der productiven Prozesse vorkommende Stickstoff fehlt. Die Fettbildung, welche also zu den unvollkommenern Vegetationsprozessen gehört, scheint sowohl dadurch eintreten zu können, dass mehr Nahrungsstoffe, als die Natur zu den vollkommenern Gebilden umzuschaffen vermag, dem Körper dargeboten werden, was theils in der absolut zu grossen Menge von Nahrungsmitteln, theils in einer zu langsamen Verzehrung der organischen Stoffe und theils in Schwäche des reproductiven Systems begründet sein kann, als auch dadurch, dass solche Stoffe in das Blut hineinkommen oder nicht gehörig durch die Ausscheidungen aus demselben entfernt werden, welche vielleicht nicht zur Erzeugung höherer Gebilde, aber zur Fettbildung tauglich sind.

§. 1540.

Vorhersage. Die Fettsucht wird, so lange nicht eine andere Krankheit hinzukommt, nur sehr selten lebensgefährlich, doch erreichen sehr fette Leute, besonders wenn die zu grosse Fettbildung schon in früher Jugend eintrat, selten ein hohes Alter. Die Kunst vermag gegen diese Krankheit nicht viel.

§. 1541.

Behandlung. a) Die Erfüllung der *Anzeigen aus den Ursachen* ist in der Regel der einzige Weg, wodurch das Uebel gemildert werden kann, der Kranke schlafe wenig, unterziehe sich andauernd anstrengenden Arbeiten und sei sehr mässig im Genusse der Speisen und der geistigen Getränke.

§. 1542.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Man hat folgende Mittel empfohlen: den reichlichen Genuss von Salz und gesalzenen Speisen, den reichlichen Genuss von Meerzwiebelessig, die Seife (von *P. Frank* empfohlen), wiederholt angewandte Abführungsmittel, die Jodtinctur (*Gräfe*) etc., welche Mittel jedoch selten ihrem Zwecke entsprechen und die Gesundheit oft noch mehr zerrütten möchten. Eher sind die ebenfalls empfohlenen Sauerbrunnen, kalte Bäder, Stahlbäder und trockene Frictionen anzuwenden.

§. 1543.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Gegen den häufig eintretenden Schwindel und gegen die Beengungsanfälle können die gewöhnlichen Mittel, z. B. Ableitungsmittel und Blutentleerungen angewandt werden, doch letztere nur bei dringender Nothwendigkeit, indem sie bei der Fettsucht selten gut vertragen werden.

Die Wassersucht.

Don. Monro (Lond. 1755, a. d. Engl. v. Krause, Altenb. 1777). — *Milman* (Lond. 1779, a. d. Lat. v. Seger, Braunschw. 1782). — *Backers* (a. d. Franz. Berl. u. Stettin 1781). — *Sachtleben* (Danzig 1795). — *Camper* (Samml. auserles. Abhandl. B. 16). — *Lentin* (Beiträge zur ausüb. Arzneiw.). — *Blackall* (Lond. 1814, a. d. Engl. v. Radius, Lpz. 1821). — *Eggert* (Lpz. 1817). — *Chrestien* (Par. 1817). — *Portal* (2 Tom. Par. 1824).

§. 1544.

Wassersucht im weitesten Sinne des Wortes ist jede krankhafte Ansammlung einer wässerigen Flüssigkeit im Zellgewebe oder den Höhlen des Körpers.

§. 1545.

Die allgemeinen Zeichen der Wassersucht sind: Zunahme des Umfangs in den ergriffenen Theilen, wenn sie nämlich einer Ausdehnung fähig sind; teigicht anzufühlende Substanz des ergriffenen Organs, welche durch einen Druck mit dem Finger einen nicht sogleich verschwindenden Eindruck erhält; verminderte Wärme und blasses Aussehen der ergriffenen Theile; unter gewissen Umständen das Gefühl und das Geräusch vom Schwappen des Wassers; Störungen in den Verrichtungen des leidenden Organs, nicht mit dem Character der Reitzung, sondern mit dem der Hemmung der Function; sparsame Absonderung des Harnes und Verminderung der Absonderungen überhaupt; Zeichen der Wassersucht in andern Theilen, als den zuerst ergriffenen, namentlich ödematöse Anschwellung der Füsse und der Augenlieder; Abnahme der Kräfte.

§. 1546.

Der Verlauf der Wassersucht ist selten acut, meistens chronisch. Ist er acut, so beginnt die Krankheit gewöhnlich mit dem Zeichen einer Entzündung

besonders einer solchen der serösen Häute, oft auch als Rheumatismus, Rose etc., der Puls ist oft sehr voll und fieberhaft gereitzt, und es entwickeln sich sodann die Zeichen der örtlichen oder der allgemeinen Wassersucht mit reissender Schnelligkeit, oder es bilden sich auch ohne die genannten Krankheitszustände mit oder ohne Zeichen eines primären Nierenleidens die Zufälle der Wassersucht in wenigen Tagen aus.

Ist der Verlauf langwierig, so entwickelt sich die Krankheit oft aus einem andern chronischen Leiden, oft auch ohne dieses und ganz allmählig, nachdem in der Regel schon längere Zeit das Aussehen des Kranken blass oder erdfahl war und die Kräften desselben geschwächt erschienen, wobei gewöhnlich kein Fieberzustand vorhanden ist. Die Krankheit kann in diesem Falle Monate und Jahre lang anhalten und verschiedene Grade der Stärke zeigen.

In Gesundheit geht die Krankheit gewöhnlich über unter reichlicherm Abflusse des Harnes, welcher dabei meistens seine braune Farbe und satzige Beschaffenheit verliert und eine gelbe Farbe und beinahe wasserhelles Aussehen erhält. Seltener und vorzüglich nur bei acutem Verlaufe entscheidet sich die Wassersucht unter Schweissen, manchmal auch unter Durchfällen. Auch hat man die Geschwulst aufbrechen und das Wasser sich mit günstigem Erfolg nach aussen entleeren gesehen und auch Entscheidung der Krankheit unter dem Eintritt eines Speichelflusses, der Hämorrhoiden, der monatlichen Reinigung, eines Rothlaufes etc. beobachtet.

In den Tod geht die Wassersucht grösstentheils durch Hemmung der Verrichtungen edler Organe, namentlich der Herzbewegung, des Athmens, der Gehirnthätigkeit über; öfters auch durch Erschöpfung der Kräfte, nachdem oft noch ein hektisches Fieber hinzugekommen ist.

§. 1547.

Es zeigt die Wassersucht mancherlei Verschiedenheiten in ihrem Bilde: manchmal ist sie, wie schon bemerkt worden ist, acut (H. acutus), in den meisten Fällen chronisch (H. chronicus), zuweilen besteht neben der Wasserergiessung ein entzündlicher Zustand, wie dieses namentlich bei der aus einer Affection einer serösen Haut entspringenden Wassersucht oft der Fall ist (H. inflammatorius); das in den Höhlen des Körpers enthaltene Wasser befindet sich bald frei in denselben (H. diffusus), bald ist es in besondere Säcke eingeschlossen (H. saccatus); die ergossene Flüssigkeit ist bald rein wässerig, bald mit weissen Flocken gemengt und bald wie mit Eiter oder wie mit Blut gemischt. Die chemische Untersuchung zeigt besonders häufig einen grossen Reichthum von Eiweiss. Endlich zeigt die Krankheit Verschiedenheiten nach der Verschiedenheit des Theiles des Körpers, in welchem das Wasser sich befindet, wornach es folgende Arten von Wassersucht giebt:

§. 1548.

Die Hautwassersucht (Hydrops anasarca, Aqua intercus, der geringere Grad desselben Leucophlegmatia, die wassersüchtige Anschwellung einzelner Theile Oedema). Dieselbe beginnt gewöhnlich mit einer Anschwellung der Weichtheile um die Knöchel herum, wobei diese Theile blass bleiben, eher eine kältere als vermehrte Temperatur haben und bei dem Druck mit dem Finger eine Delle erhalten. Die Geschwulst breitet sich sodann bis zu den Zehen hin und gegen die Kniee hinauf aus, während welcher Zeit auch das Gesicht einige Spuren von Aufgedunsenheit erhält und die Augenlieder wässerigt anschwellen, doch kann das Gesicht in diesem Zeitraum auch seine gewöhnliche Beschaffenheit behalten. Die Geschwulst der Füsse steigt im weitern Verlauf der Krankheit bis an den Bauch, es schwellen sodann auch

die Bauchbedeckungen an, der Hodensack schwillt auf und unterscheidet sich in diesem Zustande von der Hydrocele dadurch, dass nicht erst unter der Haut eine Geschwulst zu fühlen ist, sondern die Haut selbst, nebst dem zunächst unter ihr liegenden Zellgewebe angeschwollen, sehr gespannt, dünn, zart, glänzend und meistens etwas geröthet ist. Am spätesten schwellen gewöhnlich die Hände an, die sodann auf ihrer Rückseite von der ödematösen Geschwulst wie von einem Kisselchen bedeckt sind, doch kann auch die Anschwellung eines Armes, besonders wenn der Kranke darauf lag, viel früher eintreten. Im höchsten Grade der Hautwassersucht schwellen die Lippen, die Augenlieder, das ganze Gesicht unförmlich an und die Geschwulst breitet sich auch auf die Weichtheile des Halses aus, so dass der Kranke kaum die Augenlieder öffnen kann und unter einem schnarchenden Geräusche athmet. Ist die Geschwulst sehr gross, so wird die Haut ganz gespannt, glänzend und kalt, dabei aber werden einzelne Stellen, besonders über den Knöcheln, roth, heiss und schmerzhaft (das Erythaema laeve W.), es entstehen an denselben Risse und kleine zerplatzende Bläschen, aus welchen eine grosse Menge Wasser aussickert und welche in flache Verschwärungen übergehen. Zuweilen werden diese Stellen auch bläulich und gehen in wirklichen Brand über.

In Gesundheit geht die Hautwassersucht unter den gewöhnlichen Entscheidungen der Wassersucht über, manchmal auch, jedoch selten durch den Aufbruch der oben beschriebenen Stellen. In den Tod durch Erschöpfung der Kräfte und, was der häufigere Fall ist, durch Hinzukommen einer Bauch, Brust- und Herzbeutelwassersucht.

§. 1549.

Die **Kopfwassersucht** (Hydrocephalus) im weitesten Sinne des Wortes ist jede krankhafte Ansammlung

einer wässerigten Flüssigkeit unter den Bedeckungen des Schädels oder innerhalb der Schädelhöhle.

§. 1550.

Die Kopfwassersucht wird eingetheilt in die äussere und die innere Kopfwassersucht, oder den äussern und den innern Wasserkopf, welche letztere Bezeichnung aber von Manchen nur für die Arten der Kopfwassersucht gebraucht wird, bei welchem eine Vergrösserung in dem Umfang des Kopfes wahrgenommen wird. Ausserdem nehmen Einige noch als dritte Art die gemischte Kopfwassersucht an, bei welcher ein äusserer und ein innerer Wasserkopf zugleich bestehen.

Unter der Benennung innere Kopfwassersucht versteht man im weitesten Begriffe jede Ansammlung von Wasser, innerhalb der Schädelhöhle, mag sie zwischen den Gehirnhäuten oder in den Hirnhöhlen stattfinden, in einem engern Sinne versteht man aber nur die Ansammlung von Wasser zwischen den Gehirnhäuten darunter, wo man sodann nach dem verschiedenen Sitze des Wassers 3 Arten von Kopfwassersucht annimmt, 1) den äussern Wasserkopf, 2) die innere Kopfwassersucht und 3) die Gehirnhöhlenwassersucht. Auch hat man den Ausdruck innere Kopfwassersucht für die Wassersucht der Gehirnhöhlen und den Ausdruck äussere Kopfwassersucht für die Ansammlung von Wasser zwischen den Gehirnhäuten und dem Schädel gewählt, und die letztere Bezeichnung für die Ansammlung von Wasser unter den Schädelbedeckungen, welche nicht zum Hydrocephalus gehöre, verworfen.*) Die Bezeichnung innerer Wasserkopf gebraucht man zum Theil für gleichbedeutend mit innerer Kopfwassersucht und zum Theil für die chronische innere Kopfwassersucht, welche mit

*) Chelius Chirurg. II. pg. 205.

Ausdehnung des Schädels verbunden ist, mag sie ihren Sitz zwischen den Gehirnhäuten oder in den Gehirnhöhlen haben.

Von grösserem praktischem Werthe möchte die Eintheilung der Kopfwassersucht von *Gölis* u. A. sein, wornach dieselbe in 3 Arten getrennt wird: 1) die Ansammlung von Flüssigkeiten ausser dem Cranio, 2) den innern chronischen Wasserkopf und 3) die hitzige Gehirnhöhlenwassersucht, wobei jedoch die acute seröse Ausschwitzung zwischen den serösen Häuten, welche oft ohne Verbindung mit der hitzigen Gehirnhöhlenwassersucht angetroffen wird, nicht übergangen werden darf. Hiernach müssen zwei Arten der hitzigen Gehirnwassersucht angeführt werden, 1) die Ausschwitzung zwischen den Gehirnhäuten und 2) die weit wichtigere und mehr als selbstständige Krankheit vorkommende hitzige Gehirnhöhlenwassersucht.

§. 1551.

1) Die äussere Kopfwassersucht (Hydrocephalus externus).

Gölis (Abhandlung über die vorzüglicheren Krankheiten des kindlichen Alters. 2ter B. vom innern chronischen Wasserkopfe und von den verschiedenen Arten des äussern Wasserkopfes, Wien 1815—18, 2te Aufl. 1820—24).

Das Wasser befindet sich hier nach *Peter Frank*[1]) und *Gölis*[2]) entweder im Zellgewebe zwischen der Kopfhaut und der Schädelhaube, der zelluläre Wasserkopf, oder zwischen der letztern und der Beinhaut, der aponevrotische, oder zwischen der Beinhaut und den Schädelknochen, der periostische Wasserkopf. Ausserdem theilt *Gölis* den äussern Wasserkopf ein in den allgemeinen und örtlichen und führt an, dass der partielle äussere Wasserkopf mit dem allgemeinen

1) Epitom. Lib. VI. — 2) In a. W. II. pag. 157.

gleichzeitig vorkommen könne, indem sich nämlich über die allgemeine Geschwulst eine zweite, örtlich begrenzte erhebe, in welcher das Wasser in einem häutigen Sack eingeschlossen sei und somit in keiner Verbindung mit dem Wasser der allgemeinen Kopfwassersucht stehe.

Der *zelluläre äussere Wasserkopf* stellt eine kalte, bei dem Drucke unschmerzhafte Geschwulst von natürlicher Hautfarbe dar, welche sich über den ganzen behaarten Theil des Kopfes, und oft auch über die Stirne und die Augenlieder und den Nacken hinab ausbreitet, auf den Druck mit dem Finger eine Grube zurücklässt, und dem Lichte gegenüber halb durchsichtig ist. Diese sog. Kopfwassersucht ist nichts anderes als ein Oedem der Haut.

Der *aponevrotische äussere Wasserkopf* ist eine mehr begrenzte Geschwulst, welche nie bis über die Augenlieder reicht, sich härter und elastischer anfühlt, auf den Druck mit dem Finger, welcher dem Kranken empfindlich ist, keine Grube zurücklässt und dagegen das Schwappen zeigt.

Der *periostische Wasserkopf*, welcher höchst selten vorkommt, ist kaum mit Gewissheit von dem aponevrotischen zu unterscheiden. Von grosser Wichtigkeit ist zu erkennen, ob der äussere Wasserkopf für sich allein bestehe, oder die äussere Geschwulst mit einer Wasseransammlung innerhalb der Schädelhöhle in Verbindung stehe. Nach *Gölis* entdeckt man dieses vermittelst des Gesichtes, indem man in dem Zustande der Erschlaffung des Kranken bei aufmerksamer Betrachtung wahrnehmen kann, ob die Umkleidung der Geschwulst nur aus den allgemeinen Bedeckungen des Schädels oder zugleich auch aus der äussern und innern Beinhaut, welche an solchen Stellen noch mit Knochenmasse durchschossen ist, oder selbst auch aus den Häuten des Gehirnes zusammengesetzt sei. Hiebei ist genau zu un-

tersuchen, ob die allgemeinen Zeichen des innern Wasserkopfes vorhanden sind oder fehlen, doch wird meistens schon der Ausdruck in der Physiognomie des Kranken hierüber Aufschluss geben.

§. 1552.

2) Die innere chronische Kopfwassersucht (Hydrocephalus chronicus internus). Dieselbe ist eine langsam sich bildende Ansammlung von wässerigter Flüssigkeit entweder zwischen den Gehirnhäuten und auch zwischen ihnen und dem Schädel, oder in den Hirnhöhlen oder an diesen verschiedenen Orten zugleich.

Hiebei können, was den Umfang des Schädels betrifft, drei verschiedene Verhältnisse stattfinden, entweder ist derselbe grösser als gewöhnlich, oder hat die gewöhnliche Grösse oder ist selbst kleiner als im normalen Zustand.

§. 1553.

Es kann sich die innere chronische Kopfwassersucht schon im Embryo zu bilden anfangen und der Kopf schon vor der Geburt einen solchen Umfang annehmen, dass die Geburt äusserst schwierig wird und selbst die Enthirnung vorgenommen werden muss, oft nimmt die Entwicklung der Krankheit, zu welcher die Kinder meistens die Anlage mit auf die Welt bringen, sogleich nach der Geburt ihren Anfang, oft aber erfolgt sie erst nach einem und mehreren Jahren; höchst selten beginnt sie erst in höherm Alter.

§. 1554.

Bei denjenigen, die die Kopfwassersucht mit auf die Welt bringen, bemerkt man zwar in der Regel einen vermehrten Umfang des Schädels, in seltenen Fällen aber einen verminderten, bei welchem die Kranken mit geschlossenen und verknöcherten Näthen, oft schon todt zur Welt kommen, oder bald nach der Geburt unter Convulsionen sterben. Wenn sie, was selten der Fall

ist, ein Alter von mehreren Wochen oder Monaten erreichen, so zeigt sich bei ihnen noch in höherem Grade als es bei den Wasserköpfen mit grossem Umfange des Schädels gewöhnlich der Fall ist, ein Mangel der geistigen Kräfte und selbst ein solches Stumpfsein der Sinne, dass ihr Auge selbst nicht von einem flammenden Licht afficirt wird und nur Kneipen und Stechen eine automatische Bewegung der äussern Gliedmassen veranlasst.

§. 1555.

Bei Kindern, bei welchen der Wasserkopf sich erst nach der Geburt entwickelt, bemerkt man gewöhnlich, bei zugleich bestehenden andern rhachitischen Erscheinungen, ein allmähliges Hervortreten der Stirnknochen, wo besonders die Verknöcherungspunkte hervorstehen und der Kopf dadurch etwas Viereckiges erhält. Durch dieses starke Hervortreten der Stirne ragt dieselbe nebst den Augenbraunen weit über die tiefer liegenden Augen hervor und der Umfang des Schädels, welcher zuletzt die Grösse von 30 Zollen erreichen kann, steht in keinem Verhältniss zu dem kleinen sehr magern Gesichtchen. Gewöhnlich schliessen sich die Fontanellen und die Näthe nicht, werden im Gegentheil breiter und oft von dem andringenden Wasser zu Wülsten ausgedehnt, dabei sind sie fluctuirend und beim Lichte durchscheinend. Manchmal werden auch die Knochen ganz dünne und durchscheinend, ja *Gölis* führt einen Fall an,[1] in welchem die ganze Knochensubstanz, vorzüglich des Hinterhauptbeines sich verlor und das Gehirn wie unter einer gespannten Blase sich anfühlte. In selteneren Fällen verknöchern die Näthe, während die Schädelknochen dünne werden und sich ausdehnen, wo sodann an den Stellen der Fontanellen und Näthe nicht wie im vorhergehenden Falle

1) A. a. O. II. pg. 13.

Wülste, sondern Vertiefungen wahrgenommen werden. Der Kopf sinkt seiner Schwere wegen etwas auf die eine oder die andere Seite, oder kann gar nicht aufrecht getragen werden. Bei der beginnenden Entwicklung dieses Uebels zeigt sich bei den Kindern eine auffallende Veränderung des Gemüths, sie werden mürrisch und eigensinnig, dabei geben sie manchmal Kopfschmerz zu erkennen, sind viel schläfrig, das Auge ist schwach und matt, die Kranken stemmen den Kopf gerne an einen festen Gegenstand an. — Immer magert der Körper sehr stark ab. Die Kranken lernen spät gehen und ihr Gang ist auf eine eigene Art schwankend und stolpernd, und ist in der Periode der vollendeten Ausbildung der Krankheit nur noch mit Unterstützung möglich. Sind auch im Anfange die Seelenäusserungen nicht getrübt, so werden sie es doch immer mehr, die Kranken werden blödsinnig und erhalten auch einen solchen Ausdruck in der Physiognomie, wobei auch die Sprache lallend wird und der Speichel aus dem Munde läuft; doch giebt es auch Fälle, in welchen die eine oder die andere Seelenthätigkeit wach bleibt, z. B. die Fähigkeit zum Rechnen vorhanden ist. — Im letzten Zeitraum der Krankheit verschwinden die noch vorhandenen Aeusserungen der Thätigkeit einer menschlichen Seele, die Kranken liegen Monate lang in beständiger Betäubung, meistens auf der Seite mit zurückgezogenem oder vorwärtshängendem Kopfe, gradgestreckten Armen und gerungenen zwischen die an den Bauch gezogenen Beine eingekeilten und krampfhaft an die Symphisis Pubis angepressten Händen *(Gölis)*; sie sind blind, taub, sprachlos, oft theilweise gelähmt und vegetiren blos. Doch auch die vegetativen Prozesse gehen schlecht von statten, der Körper ist im höchsten Grad abgemagert, der Stuhlgang verstopft, der Urin sparsam, gewöhnlich blass und ohne Bodensatz, das Schlucken mühsam, zuletzt wird der Puls schwach und aus-

setzend, die Hände und Füsse werden kalt und der Kranke stirbt entweder an Schwäche in Folge eines noch hinzugetretenen Zehrfiebers und der äussersten Abmagerung, oder unter Zuckungen und den Folgen eines Schlagflusses, oder unter Erstickungszufällen. Häufig sollen sich im letztern Zeitraum der Krankheit zu den Zufällen des chronischen, innern Wasserkopfes die der acuten Hirnhöhlenwassersucht hinzugesellen, indem sich von Neuem Kopfschmerz einstellt, und Fieber, ein weisser Bodensatz im Urin etc. und andere Erscheinungen des Hydrocephalus acutus eintreten.

§. 1556.

Die Dauer der Krankheit ist sehr verschieden. Der angeborne Wasserkopf, besonders der mit nicht vergrössertem Schädel und verknöcherten Näthen, tödtet gewöhnlich bald nach der Geburt. Der sich nach der Geburt erst entwickelnde kann Monate, so wie auch Jahre lang dauern, und es giebt selbst Fälle, in welchen die Kranken ein Alter von 10, 20 ja selbst 50 Jahren erreichen. Die im spätern Alter entstandene chronische innere Kopfwassersucht kann auch mehrere Jahre andauern.

§. 1557.

Bei den Leichenöffnungen findet man in den oben bezeichneten Orten, innerhalb der Schädelhöhle, das Wasser oft zu mehreren, ja bis zu etlich und zwanzig Pfunden und zwar meistens frei, oft auch zum Theil in Hydatiden eingeschlossen. Das Gehirn ist dabei, wenn sich das Wasser zwischen den Gehirnhäuten befindet, zusammengepresst, so dass es oft nur die Grösse eines Apfels hat; ist aber das Wasser in den Gehirnhöhlen angesammelt, so ist es oft so ausgedehnt, dass die Hemisphären zu einem hautartigen Gebilde umgeschaffen sind. Nach *Meckel*[1]) ist hiebei das Gehirn auf einer

1) Handb. d. pathol. Anal. B. I. S. 260.

frühern Bildungsstufe stehen geblieben und der Hirnbildung der Fische ähnlich. Nach *Hartell* sind die Sehnerven im Verhältniss zum Gehirne zu dick, was ebenfalls bei den frühern Bildungsstufen des Embryos vorkommt. Die Zirbeldrüse ist angeschwollen, die einsaugenden Gefässe sind erweitert. Oft ist zugleich Wassersucht des Rückgrathes vorhanden. Die Schädelknochen sind dünn, zum Theil knorpelartig und häutig; von den Verknöcherungspunkten breiten sich die Knochenfasern strahlenförmig aus.

§. 1558.

3) **Die acute Kopfwassersucht.**

a) *Die acute Wassersucht der Gehirnhäute.* (Hydrocephalus meningeus.)

Es wird unter dieser Bezeichnung hier nur die Wasseransammlung zwischen den Gehirnhäuten, so weit dieselben die Oberfläche des Gehirns überziehen, und nicht jene begriffen, welche von einer Ausschwitzung aus den Plexus choroidei herrührt und in den Gehirnhöhlen sich befindet. Es kommt diese Art der Kopfwassersucht in der Regel nicht als ein für sich bestehendes Leiden und als eine eigene Krankheitsform vor, sondern entweder in Verbindung mit der hitzigen Gehirnhöhlenwassersucht, oder als ein Ausgang der Encephalitis manifesta oder derjenigen Gehirnaffection, welche mit dem Nervenfieber und dem Typhus verbunden ist, so wie auch beim Schlagfluss etc. Die Haupterscheinung dieser Wasserergiessung scheint der Schwindel zu sein, wiewohl derselbe auch im Nervenfieber vorkommt, in einem Zeitraum, in welchem diese Wasseransammlung noch nicht statt zu finden scheint. Die Menge des angesammelten Wassers ist in der Regel unbedeutend, so dass dieselbe nicht leicht die zureichende Todesursache wird, doch habe ich schon öfters, nach tödtlich abgelaufenem Nervenfieber, eine das gewöhnliche Quantum

stark überschreitende Menge Wasser gefunden. Ueber die Ausschwitzung, welche die Folge der Encephalitis manifesta ist, vergleiche das über die Gehirnentzündung Gesagte.

§. 1559.

b) *Die hitzige Gehirnhöhlenwassersucht.* (Hydrocephalus acutus, Hydrops ventriculorum cerebri, Febris hydrocephalica.)

Odier (aus d. Franz. Lpz. 1785). — *Quin* (Lond. 1790, aus d. Engl. v. Michaelis, Lpz. 1792). — *Bader* (Frankf. u. Lpz. 1794). — *Hopfengärtner* (Stuttg. 1802). — *Cheyne* (Lond. 1809 u. 1819, aus dem Engl. v. Müller, Bremen 1809). — *Formey* (Berlin 1810). — *v. Portenschlag-Ledermeyer* (Wien 1812). — *Gölis* (im angef. Werke, 1r Bd., v. d. hitzigen Gehirnhöhlenwassersucht). — *Yeats* (London 1815, a. d Engl. v. Kaufmann, Hannov. 1816). — *Coindet* (Paris 1817. — *Matthey* (Genf 1820, a. d. Franz. v. Wendt, mit einer Vorrede v. Cerutti, Leipzig 1821). — *Bricheteau* (Paris 1829). — *Charpentier* (Paris 1829). — Ausserdem die Schriftsteller über Kinderkrankheiten.

Der Verlauf dieser Krankheit wird verschieden eingetheilt, von Manchen, wie z. B. von *Peter Frank*, in zwei Zeiträume, den entzündlichen und den der Ausschwitzung, von Andern in drei Zeiträume, den der Entzündung, der Ausschwitzung und der Lähmung. Den wichtigsten Abschnitt in der Krankheit bildet der Uebergang von der Entzündung zur Ausschwitzung, und es ist zwischen dem Stadium der Turgescenz und der Entzündung keine bestimmte Gränze, so wie auch die Lähmung nur die Folge der Ausschwitzung ist und sich Krämpfe und Lähmung allmählig entwickeln; es ist daher die Eintheilung in zwei Hauptstadien gerechtfertiget, und es ist dieselbe auch in Hinsicht auf Prognose und Therapie die wichtigste; doch sind in der Regel die von *Gölis* angenommenen Zeiträume in der Natur wohl zu erkennen, und sie mögen daher als Unterabtheilungen der zwei Hauptperioden gebraucht werden.

§. 1560.

1) *Der entzündliche Zeitraum.* — a. Die Periode

der Turgescenz. Die Kinder verlieren ihre Munterkeit, sie werden schwerfällig, mürrisch und selbst auffallend böse, sie sind viel schläfrig, aber schlafen nicht ruhig, sondern schrecken im Schlafe zusammen, träumen viel und ächzen (grunzen nach *Gölis* Ausdruck), ältere Kinder klagen über Schwindel und oft auch über Kopfweh, und der Gang derselben ist strauchelnd, wobei sie auf ebener Erde die Füsse hoch aufheben. Die Kinder verlieren die blühende Gesichtsfarbe, die Völle der runden Wangen und die Esslust und haben eine allgemeine Abspannung der Kräfte, oft werden sie aber auch roth im Gesichte und heiss am Kopfe. Die Haut ist trocken, der Stuhlgang träge, der Harn ist sparsam, nach *Odier* und *Formey* trübe, ganz molkenartig (was aber nicht immer der Fall ist), die Kranken empfinden oft rheumatische Schmerzen im Nacken, in den Armen und Füssen, nach *Formey* erscheint in diesem Zeitraum, und gehört zu den wesentlichen Merkmalen der Krankheit, ein ganz feiner, trockener Ausschlag an den Oberarmen, den Wangen und zuweilen an den Lippen, welcher dem sogen. Zahnausschlag ähnlich ist; es ist jedoch zweifelhaft, ob er wirklich dieser Krankheit eigenthümlich ist, da er bei dieser Krankheit sehr häufig nicht vorkommt und Strophulus ähnliche Exantheme bei Kindern ohnehin öfters angetroffen werden. Am Ende dieses Zeitraumes stellen sich oft Schauder und fliegende Hitze ein, im Puls scheint kaum eine constante Veränderung vorhanden zu sein, nach *Gölis* ist er zuweilen aussetzend.

Die Dauer dieser Periode beträgt oft nur wenige Stunden, zuweilen bis 14 und mehr Tage.

§. 1561.

b) Die Periode der ausgebildeten Entzündung. Die Kranken werden nun sehr unruhig, werfen sich im Bette hin und her, nehmen aber dabei gewöhnlich gerne

wieder eine solche Lage ein, dass sie mehr oder weniger gegen den Bauch gewendet im Bette liegen, wobei sie die Stirne gegen das Kopfkissen andrücken und die Augen mit demselben bedecken, sie ächzen viel und klagen über Schmerz, meistens in der Stirne, zugleich auch manchmal in den Gliedern, bei kleinen Kindern erkennt man den Schmerz durch ihr vieles Wimmern und durch ihr Hinauffahren mit den Armen nach der Stirne. Nimmt man die Kinder empor, um ihre Augen zu untersuchen, so werden sie unwillig und suchen die gewöhnliche Lage wieder zu gewinnen, dabei ist in ihren Augen etwas wildes und scheues und die Pupille gewöhnlich klein, nur in den seltenern Fällen ist die Bindehaut des Augapfels geröthet, der behaarte Theil des Körpers und die Stirne sind heiss, aber nicht roth, so wie auch die Wangen meistens blass sind und die Augen tief in der Höhle liegen und oft mit einem dunklen Ringe umzogen sind, wobei aber meistens die Carotiden stark klopfen. Die Nase und die Lippen sind trocken und die Kinder bohren viel in der erstern; nach *Gölis* machen sie oft mit dem Munde die Bewegung des Kauens und Schnalzens, sie sind oft schläferig, können aber zu keinem Schlafe gelangen, oder schrecken in demselben auf und knirschen zuweilen mit den Zähnen. In dem Schlafe sind die Augenlieder nur halb geschlossen und die Augen stehen etwas nach oben, so dass man nur das Weisse derselben wahrnimmt. Es stellt sich ein öfters wiederholtes Erbrechen ein, wodurch Speisen, Schleim und Magensaft und zuweilen gallichte Stoffe ausgeleert werden, welche Ausleerungen einen eigenen, widrigen, fauligten Geruch haben sollen.[1]) Es kommt dieses Erbrechen in manchen Fällen so häufig und geschieht so gewaltsam, dass dadurch leicht die Erscheinungen, die

1) Henke, II 132.

unmittelbar auf das Gehirnleiden hindeuten, versteckt werden, wesshalb bei schwächerm Hervortreten der zuerst genannten Symptome, namentlich bei ganz jungen Kindern, die Diagnose zwischen einer primären Magenaffection und einer Gehirnentzündung nicht immer ohne Schwierigkeit ist. Meistens ist dabei Verstopfung vorhanden und der Bauch fällt ohne vermehrte Darmausleerungen zusammen, was nach *Gölis* [2]) ein vorzügliches pathognomonisches Zeichen ist. Gewöhnlich ist kein Fieber vorhanden, der Puls ist sehr verschieden und veränderlich, nach *Gölis* [3]) meistens langsam, ungleich und auslassend.

Es sind die hier angegebenen Erscheinungen nicht immer alle vorhanden, so wie hingegen auch andere hinzutreten und namentlich Zuckungen schon in diesem Zeitraume vorkommen können. Diese Periode kann in wenigen Stunden vorübergehen, dauert jedoch gewöhnlich 2—3 und mehrere Tage an.

§. 1562.

2) *Der Zeitraum der Ausschwitzung.* a. Die Periode der beginnenden Durchschwitzung. Das Kind wird nunmehr viel ruhiger, so dass dieses den Eltern und dem weniger erfahrnen Arzte oft neue Hoffnung giebt; es wählt von nun an die Rückenlage, und zwar so, dass es gerne den Kopf etwas zurückbeugt. Hebt man das Kind in die Höhe, was immer langsam geschehen muss, so widerstrebt dasselbe sehr und sucht die Ruhe und seine bisherige Lage wieder zu erhalten. Im Anfange von diesem Zeitraume geben die Kinder auf die an sie gestellten Fragen noch Antwort, klagen in der Regel nicht über Schmerz, stöhnen aber von Zeit zu Zeit und nehmen an dem, was um sie vorgeht, wenig oder keinen Antheil. Die Augen sehen klar aus, die Pupillen sind

1) Im a. W. I. 32. — 2) Im a. W. I. 55.

aber etwas weit und man wird bald zweifelhaft, ob die Kinder Lichtempfindung haben. Hält man ihnen etwas entgegen und bringt sie dazu, darnach zu greifen, so geschieht dieses nicht mit gehöriger Bestimmtheit und sie verfehlen leicht den Ort, wo der Gegenstand sich befindet. Bald darauf bemerkt man auch, dass die Augen viel nach einer Seite hingedreht werden, und es ist nicht möglich, den Blick des Kindes auf die andere Seite hinzuleiten. Dabei sind die Augenlieder empfindlich, und wenn man dieselben anfasst, um sie zu öffnen, so wird in der Regel das Kind ungeduldig. Das Gehör ist unverletzt, die Nase sehr trocken, die Kleinen krübeln viel in der Nase, so dass sie oft blutet, oder schlagen auch mit den Händchen auf dieselbe. Die Kinder nehmen nun oft wieder eher Nahrung, nachdem das Erbrechen aufgehört hat. Der Stuhlgang ist gewöhnlich verstopft, der Urin sparsam und geht oft unwillkührlich ab, der Puls ist meistens langsam und unregelmässig. Gegen das Ende dieses Zeitraumes wird das Kind immer mehr schlafsüchtig, für die meisten Eindrücke unempfindlich und die Erscheinungen des letzten Zeitraumes treten allmählig immer deutlicher hervor. Die Dauer dieser Periode ist gewöhnlich mehrere Tage.

§. 1563.

b. Periode der Zuckungen und der Lähmung. Man bemerkt allmählig, dass das Schlingen sehr erschwert ist, und selbst, dass der Unterkiefer fest an die obere Kinnlade angepresst ist (Trismus), das Kind wird von halbseitigen Zuckungen und Verdrehungen einzelner Glieder befallen, oft auch wird der ganze Körper durch einen tonischen Krampf nach rückwärts gebogen (Opisthotonus), die Augen sind gewöhnlich nach einer Seite und nach oben gedreht, oft stehen sie auch so, dass beide Augen ungleiche Axen haben, die Pupillen sind gewöhnlich erweitert, oft die eine grösser als die andere und manchmal auch oval gezogen, die Kinder sind da-

bei gänzlich unempfindlich für das Licht, sie liegen gewöhnlich ohne alle Zeichen des Bewusstseins, doch kehrt dieses nach *Gölis* Beobachtungen oft auf kurze Zeit vollkommen zurück, so dass eine trügerische Hoffnung dadurch erregt wird, und in einem Falle bemerkte ich, dass ein Kind in diesem Stadium bis kurz vor dem Tode auf die an dasselbe gestellten Fragen leicht mit dem Kopfe nickte, ja die Aermchen, von denen eines vom Krampfe ausgestreckt war, gegen die eine Seite, wo die Mutter desselben sass, hinzuwenden sich bemühte, während die Augen auf die entgegengesetzte Seite krampfhaft verdreht waren. Während der Krämpfe wird der Puls gewöhnlich sehr häufig und schnell, die Haut heiss und die Stirne von Schweiss triefend. Oft hinterlassen die Krampfanfälle halbseitige Lähmung oder Lähmung einzelner Glieder. Allmählig wird auch der Athem erschwert, die Athemzüge werden im Anfange sehr häufig und kurz, später immer seltener und mühsamer, bis die jammervolle Scene zu Ende geht.

Die Dauer dieses Zeitraumes kann sehr kurz sein und auch mehrere Tage betragen.

§. 1564.

Der Verlauf der Krankheit weicht oft von dem eben gegebenen Krankheitsbilde bedeutend ab. Oft sind die Zeichen der Entzündung nicht so deutlich ausgesprochen, es bleibt zweifelhaft, ob das Kind Kopfschmerz habe, das Erbrechen fehlt oft ganz etc., oft wird der Zeitraum der Vorboten übersprungen oder er ist so kurz und unmerklich, dass er übersehen wird, und die Krankheit beginnt sogleich mit den Zeichen der zweiten Periode oder selbst mit Zuckungen und heftigem Fieberanfalle, wobei die Zeichen der Gehirnentzündung noch mehrere Tage fortdauern oder auch bälder die Zeichen der Ausschwitzung eintreten, oder endlich die Krankheit hat im Ganzen nur eine Dauer von wenigen Stunden, die erste und zweite Periode scheinen oft ganz übersprungen zu

werden und die zweite und dritte fliessen zusammen, so dass die ganze Krankheit nur in einem schnell tödtenden Anfall von heftigen Zuckungen und tetanischen Krämpfen, Bewusstlosigkeit und Lähmung besteht. Diese Form nennt man nach *Gölis* den Wasserschlag (Apoplexia hydrocephalica).

§. 1565.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Meistens findet man unzweifelhafte Zeichen der Entzündung, nämlich die zweigartige, so wie auch zum Theil die haargefässförmige, entzündliche Gefässinjection in den Gehirnhäuten, eine grünlich-gelbliche, gallert- und eiterartige Ausschwitzung zwischen denselben und viel Blutpunkte auf den Durchschnittsflächen des Gehirns; zuweilen jedoch fehlen diese Veränderungen und das Gehirn bietet, ausser einer etwas weichen Beschaffenheit seiner Substanz, Nichts vom gesunden Zustande abweichendes dar, als die Wasseransammlung. Das Wasser befindet sich nur zum geringern Theil zwischen den Gehirnhäuten oder ist auch daselbst gar nicht in abnormer Menge vorhanden, und füllt dagegen die Gehirnhöhlen, besonders die Seitenventrikel oft so sehr an, dass dieselben selbst von dem Wasser stark ausgedehnt sind. Das Wasser ist meistens hell, oft auch weisslich trüb oder geröthet, die Plexus choroidei sind meistens blass und mit Hydatiden besetzt. Die Wandungen der Gehirnhöhlen sind manchmal ganz erweicht. Zuweilen ist auch in der Wirbelhöhle viel Wasser angesammelt.

§. 1566.

Die Wassersucht des Rückgrathes (*Hydrorachia, Hydrorachis*).

Hochstetter (de spin. bifid. Altdorf 1703). — *Gild* (de spin. bifid. Vienn. 1754). — *Murray* (de spin. bifid. Goett. 1779). — *Büsser* (auct Sprengel, Halle 1795). — *Möckel* (lat. Lpz. 1822). — Auch die Schriftsteller über Kinderkrankheiten.

Die Wassersucht des Rückgrathes ist eine die

gewöhnliche Menge überschreitende Ansammlung von Wasser in der Höhle der Wirbelsäule, wobei sich das Wasser in der Regel zwischen den Häuten des Rückenmarkes befindet.

§. 1367.

Als eine eigene Krankheitsart kennt man nur die mit dem gespaltenen Rückgrath auftretende und angeborne Hydrorachis genauer, obgleich abnorme Wasserergiessungen, in Folge verschiedener Krankheitszustände des Rückenmarkes und seiner Häute, zu jeder Periode des Lebens vorkommen.

Die als ein Morbus acquisitus vorkommende Hydrorachis hat man vorzüglich im Gefolge folgender Krankheiten beobachtet und ihre Existenz bei Leichenöffnungen zum Theil nachgewiesen: 1) bei wirklicher Rückenmarksentzündung, Myelitis manifesta, 2) bei dem Hydrocephalus acutus, 3) beim Schlagfluss, 4) bei heftigen rheumatischen Affectionen, 5) bei bösartigen, ins Nervöse übergehenden Fiebern und 6) bei äussern Verletzungen.

Steht die Ausschwitzung in der Wirbelhöhle in Verbindung mit einem Gehirnleiden, so ist die Erkennung derselben sehr schwierig und oft unmöglich, ist dieses nicht der Fall, so bleibt dennoch oft ein Zweifel über das Vorhandensein der Ausschwitzung, indem ähnliche Zufälle, welche das Exsudat hervorbringt, auch ohne dasselbe durch rein dynamische Störung in dem Nervenleben hervorgebracht werden können, so z. B. habe ich bei Nervenfieberkranken, bei welchen die Zeichen einer krankhaften Ausschwitzung in der Wirbelhöhle ziemlich deutlich waren, doch nicht immer bei der Leichenöffnung eine solche gefunden. Die wesentlichen Erscheinungen der erworbenen Wassersucht des Rückgrathes sind folgende: Eine verminderte Beweglichkeit und eine Steifigkeit in den Füssen, welche von dem Kreuze ausgeht, reissende Schmerzen und das Gefühl

von Taubheit in denselben, oft wirkliche Lähmung, paralytische Harnverhaltung, Verstopfung, manchmal Athmungsbeschwerden und Beschwerden im Schlingen, wie es scheint auch der Status nervosus.

§. 1568.

Es ist bei der Leichenöffnung oft schwer zu bestimmen, ob eine Wasseransammlung in der Wirbelhöhle krankhaft sei oder nicht, da sich regelmässig etwas Wasser vorzufinden scheint, welches nach *Magendies* Behauptung, mit Einschluss des zwischen den Hirnhäuten und in den Hirnhöhlen befindlichen Wassers, die Menge von zwei Uncen beträgt.

§. 1569.

Die der mit Rückenspalte (Spina bifida) verbundene Wassersucht des Rückgrathes ist immer angeboren und giebt sich durch eine Geschwulst zu erkennen, welche meistens in der Gegend der Lendenwirbel ihren Sitz hat, von den äussern Bedeckungen oder auch nur von den Häuten des Rückenmarkes überzogen ist, von Anfang oft nur die Grösse einer Erbse hat, aber allmählig wächst, bis zur Grösse einer Faust oder selbst eines Kopfes, entweder flach aufsitzt oder gestielt ist, und apfel- oder birnförmig ist, sich elastisch anfühlt, manchmal schwappt und etwas durchscheinend ist, bei dem Drucke keinen Schmerz erregt, sich dabei verkleinert, aber leicht Zuckungen und selbst Lähmungen veranlasst, und dagegen beim Schreien des Kindes zunimmt und gespannter wird. Bei diesem Uebel ist Schwäche, Abmagerung und selbst Lähmung der untern Gliedmassen vorhanden, und es bilden sich in manchen Fällen selbst brandige Stellen an denselben. Ebenso sind die Urinblase und der Mastdarm in einem lähmungsartigen Zustande, desshalb eben sowohl Verhaltung, als unwillkürlicher Abgang des Urins und des Kothes vorhanden sind. Gewöhnlich kommt allgemeine Abmagerung

hinzu und die Kranken sterben im kindlichen Alter. Zuweilen entzündet sich auch die übermässig ausgedehnte Geschwulst, wird brandig und berstet, was schnell den Tod zur Folge hat. Selten erreichen die Kranken ein Alter von mehreren Jahren, doch sah man solche von 20 und mehr Jahren. — Zuweilen kommt diese Art der Wassersucht mit dem chronischen, innern Wasserkopfe in Verbindung vor.

§. 1570.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Nach *Fleischmann* [1]) giebt es drei Grade von gespaltenem Rückgrathe, der niederste Grad besteht darin, dass die vollkommen gebildeten Bogenhälften der Wirbelbeine sich nicht berühren, oder nur eine kleine Oeffnung im Knochen ist, wodurch die Geschwulst hervortritt, der zweite in mehr oder weniger bedeutendem Mangel der Bogenhälften, der dritte in Spaltung des ganzen Wirbels, selbst des Körpers. Es ist dieser Fehler als ein Stehenbleiben der Bildung der Wirbelbeine auf einer niedern Stufe anzusehen, indem man an jungen Foetussceletten an den Wirbelbeinen immer eine Furche findet, welche die Zusammensetzung derselben aus zwei Knochenkernen beweist. [2]) Hiermit stimmen auch meine Untersuchungen über die Entwicklung der Thiere im Ei überein, wornach das Rückenmark und seine Hüllen bei seiner Entstehung paarig erscheinen. Diese Spaltung der Wirbel wird bald nur an einem Wirbelknochen gefunden, bald dehnt sie sich über mehrere aus, ja man hat sie in allen 24 Wirbeln des Rückgrathes gefunden. [4]) Das Wasser befindet sich auch bei dieser Art der Hydrorhachis zwischen den

1) De vitiis congenitis circa thoracem et abdomen. Erlang. 1810. p. 11. — 2) Vergl. Meckels Handb. d. path. Anat. I. S. 360. — 3) Richters chir. Biblioth. B. IX. S. 187.

Häuten des Rückenmarks, und dieses ist gewöhnlich an der Stelle, an welcher das Wasser angesammelt ist, erweicht. *Brandis*[1]) fand einen Kanal von der Dicke eines Federkiels, der aus der Geschwulst hoch ins Rückenmark hinauf sich erstreckte und *Portal*[2]) eine Höhle, die durch die Mitte des ganzen Rückenmarkes gieng und mit der vierten Hirnhöhle in Verbindung stand.

§. 1571.

Die Brustwassersucht (Hydrothorax).

Camper (de morb. chron. pulm. in ej. diss. Vol. I). — *de Haen* (de hydrope pect. in rat. med. P. 5 und 6). — *Laennec* (de l'auscult. méd.).

Die Brustwassersucht ist die Ansammlung wässerigter Flüssigkeit in einem oder beiden Säcken des Brustfells, oder was der seltenere Fall ist, in den Mediastinis. Auch hat man unter dieser Benennung zugleich das Oedem der Lunge begriffen, und diese verschiedene Krankheitszustände unter ein Krankheitsbild zusammen gefasst, es unterscheidet sich aber das Oedem der Lunge sehr wohl von der gewöhnlichen Brustwassersucht und muss daher von ihr getrennt werden.

§. 1572.

Die Ergiessung von Wasser in die Brusthöhle tritt oft im Gefolge der Brustfellsentzündung auf, wo sie sich oft sehr rasch bildet und pleuritisches Extravasat genannt wird.[3])

Die gewöhnliche, als chronische Krankheit sich darstellende Brustwassersucht beginnt unter allmählig sich ausbildender Schwerathmigkeit, wobei nur in manchen Fällen den rheumatischen ähnliche schmerzhafte Empfindungen im Rücken und den Schulterblättern wahrge-

1) In *Abernethy's* physiol. u. chirurg. Vers., übers. v. *Brandis*, 1ster Thl. Lpz. 1795. S. 69. — 2) Mémoir. de l'Acad. des sciences à Paris 1771. p. 258. — 3) Vergl. das über die Pleuritis Gesagte.

nommen werden. Die Kranken bemerken die Beschwerde im Athmen im Anfange nur bei stärkeren Körperbewegungen, z. B. dem Berg- oder Treppensteigen, wo sie aussergewöhnlich stark keuchen müssen. Allmählig nehmen sie dasselbe auch wahr im Bette, wo sie eine niedere Lage nicht ertragen und manchmal in der Nacht von etwas stärkern Beengungsanfällen beunruhigt werden. Später erreichen die Athmungsbeschwerden noch einen viel höhern Grad, so dass die Kranken nur in aufrechter Lage oder selbst nur mit vorwärts gebeugtem Körper und nur in kurzen Zügen Luft schöpfen können, und bei geringer Bewegung des Körpers der Athem auszugehen droht. Oft können die Kranken leichter auf der einen als auf der andern Seite liegen und zwar in der Regel mehr auf der Seite des Körpers, auf welcher sich die Wasseransammlung befindet. Hiebei zeigt die Percussion an der Stelle, wo das Wasser angesammelt ist, einen matten Ton und das Stethoscop bei starker Wasseransammlung Abwesenheit des Respirationsgeräusches, und bei einer dünnen Schichte von Wasser die Egophonie.[1]) Nach *Hippokrates* soll man, wenn man den Kranken an beiden Schultern fasst und etwas rüttelt, das Schwappen des Wassers wahrnehmen, was aber nach *Laennec* nur dann der Fall ist, wenn mit dem Hydrothorax der Pneumothorax verbunden ist. Nur höchst selten wird der Brustkasten ausgedehnt, was auch nur dann wahrgenommen werden kann, wenn die Ausdehnung auf der einen Seite stärker als auf der andern ist. Hiebei bekommen die Kranken einen Husten mit etwas Schleimauswurf, das Gesicht derselben erhält früher, als es bei den andern Arten der Wassersucht mit Ausnahme der Hydrocardia der Fall ist, den hydropischen Ausdruck, nämlich ein

1) Vergl. das über das pleuritische Extravasat Gesagte.

aufgedunsenes Aussehen und insbesondere ödematöse Augenlieder, späterhin erhalten oft die Mitte der Wangen, die Lippen und die Zunge eine dunkel-bläulich-rothe Färbung und man erkennt an der ersteren feine, mit venösem Blute überfüllte Gefässchen, die Füsse schwellen ödematös an, zuweilen der Arm der vorzüglich leidenden Seite, welcher auch zuweilen taub und gelähmt wird, der Urin ist meistens braun und satzig, und die ganze Symptomengruppe des hydropischen Zustandes ist vorhanden. Der Puls ist sehr verschieden, im Anfange oft härtlich, später in der Regel sehr klein.

§. 1573.

Der Uebergang in Genesung geschieht gewöhnlich unter reichlichem Abgang eines blassgelben, nur wenig getrübten Urines, der Tod erfolgt nach Ablauf von mehreren Monaten oder Jahren entweder unter einem Erstickungsanfall, oder unter allmählig überhandnehmender Schwäche oder unter einem soporösen und schlagflussähnlichen Zustande, wobei die oben schon erwähnte dunkle Färbung der Wangen, der Lippen und der Zunge wahrgenommen wird.

§. 1574.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Das Wasser befindet sich meistens frei in der Brusthöhle, in seltenen Fällen findet man Hydatiden; die Menge des Wassers ist sehr verschieden, $\frac{1}{2}$ bis 12 und mehrere Pfunde; dasselbe ist meistens farblos, etwas trübe, oft mit weisslichen Flocken und gallertartigen Massen untermengt, häufig auch röthlich gefärbt und zuweilen von einem urinösen Geruch. Die Lungen sind oft sehr zusammengedrückt und fest, so dass sie im Wasser untersinken. Das Brustfell hat manchmal die Merkmale früher bestandener Entzündung.

§. 1575.

Das Oedem der Lunge. (Oedema pulmonum, Anasarca Pulmonum Darwin, Hydrops pulmonum cellulare nach *P. Frank*).

Laennec (de l'auscult. méd.).

Diese Krankheit spricht sich, ähnlich der Lungenentzündung, durch andauernde Beengung, ziemlich starken Husten und durch eine Art knisterndes Geräusch aus, welches vermittelst des Stethoscops wahrzunehmen ist, das Gesicht des Kranken hat aber den hydropischen Ausdruck, die Füsse schwellen ödematös an, und es sind die übrigen Zeichen des hydropischen Zustandes mehr oder weniger ausgebildet; auch hat der Kranke nicht den pneumonischen, sondern einen mehr serösen Auswurf. Die Krankheit wird nur durch das Stethoscop mit Sicherheit von der Brustwassersucht unterschieden und hat auch im Ganzen mit ihr den gleichen Verlauf.

§. 1576.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Die Lungen sinken nach der Oeffnung der Brusthöhle nicht zusammen und verhalten sich in Hinsicht ihrer Schwere und Festigkeit, wie die Substanz der Lunge im ersten Grade der Lungenentzündung, sie sind aber nicht, wie diese, dunkelbläulichroth, sondern blass, gräulich und geben nicht wie diese bei der Durchschneidung eine Menge Blutes von sich, sondern eine schaumige seröse Flüssigkeit, welche beim Zusammendrücken der Lunge in sehr reichlicher Menge von den Schnittflächen herunterträuft.

§. 1577.

Die Herzbeutelwassersucht (Hydrops pericardii, Hydrocardia).

Fr. Hoffmann (Diss. Halle 1697). — *Westring* (Samml. auserles. Abhandl. B. 14). — *Mazzi* (ebend. B. 15). — Ausserdem die Schriftsteller über Herzkrankheiten (vergl. B 1 S. 466).

Die Wassersucht des Herzbeutels ist eine schwer zu

zu erkennende Krankheit, selbst wenn sie nicht mit Brustwassersucht verbunden ist, indem andere Herzkrankheiten ähnliche Erscheinungen darbieten und die Zufälle der Krankheit, so bedeutend sie in der Regel sind, doch auch sehr schwach sich aussprechen können, ja es Fälle giebt, in welchen nur die Leichenöffnung eine oft beträchtliche Wasserergiessung in dem Herzbeutel als Ursache des oft plötzlich eintretenden Todes nachweiset.

Die Kranken haben ein Gefühl von Beängstigung, oft in Verbindung mit dem Gefühle von unordentlicher Herzbewegung und zuweilen von wirklichem Herzklopfen, sie haben die Empfindung von Druck und Schwere in der Präcordialgegend, nach *Lancisi* wie von einem enormen Gewicht und zuweilen auch die Empfindung, wie wenn das Herz in Wasser schwämme. Diese beängstigenden Gefühle sind bei ausgebildeter Krankheit mehr oder weniger anhaltend vorhanden, steigern sich aber, besonders bei Körperbewegungen, bei dem Sprechen und dergleichen oft zu einem hohen Grad, wobei der Kranke oft den Anblick eines an Erstickungsanfällen Leidenden darbietet. Die Kranken empfinden hiebei oft Schwindel, wobei sie zuweilen wähnen, dass ihnen von dem Herzen Etwas gegen das Gehirn aufsteige, und werden zugleich von grosser Muskelschwäche, ja von wirklicher Ohnmacht befallen. Solche Anfälle oder wenigstens eine Steigerung der Beschwerden, werden oft schon durch eine niedere Lage hervorgebracht, so dass die Kranken oft genöthigt sind, beständig aufrecht oder selbst vorwärts gebeugt zu sitzen. Man nimmt sowohl vermittelst der Hand als mit dem Stethoscop die Herzschläge, welche sehr unordentlich und hastig sind, in einem weiten Umfange wahr, und fühlt sie bald besser an diesem Punkte, bald an jenem, was oft jeden Augenblick wechselt. Nach *Corvisart* soll man

zuweilen die Fluctuation durch Berührung wahrnehmen und nach *Senac* in den Zwischenräumen zwischen der 3ten, 4ten und 5ten Rippe die Wellen der ergossenen Flüssigkeit sehen können. Die Percussion giebt einen matten Ton, der Puls ist klein, häufig und unregelmässig, zuweilen ist ein trockener Husten vorhanden, die Stimme ist zuweilen heiser und matt, ein eigenthümlicher Schmerz soll in dem Magen und dem ganzen Unterleibe vorkommen, die Glieder sind meistens kalt. Die Augenlieder und die Füsse schwellen ödematös an und es bildet sich die allgemeine Wassersucht aus.

Die Krankheit tödtet unter Erstickungsanfällen oder auch ohne diese, und oft plötzlich, wie durch einen Nervenschlag, zuweilen kommen ein Blutsturz und Zuckungen hinzu, und oft gehen ein schlummersüchtiger Zustand und die höchste Schwäche dem Tode voraus.

§. 1578.

Bei den Leichenöffnungen findet man, ausser verschiedenen andern Veränderungen am Herzen und dem Herzbeutel, z. B. weissen Flecken, lymphatischen Ausschwitzungen und Verwachsungen, eine grössere oder geringere Menge wässerigter, meistens gelblicher und oft auch röthlicher Flüssigkeit in dem Herzbeutel angesammelt. Nach *Sömmering* beträgt die im normalen Zustande in dem Herzbeutel vorhandene Flüssigkeit nur wenige Tropfen, etwas mehr Wasser kann sich wohl bei jeder Krankheit, während eines langen Todeskampfes, sammeln, bei der Herzbeutelwassersucht findet man aber $1/2$, 1 oder mehrere Pfunde, ja *Corvisart* hat in einem Falle 8 Pfund Wasser angetroffen.[1]

[1] In a. W. obs. X. pag. 53.

§. 1579.

Die Bauchwassersucht (Hydrops abdominalis, H. ascites).

R. A. Vogel (lat. Goett. 1761). — *de Haen* (rad. med. T. IV.).

Es ist bei dieser Krankheit das Wasser entweder frei in der Bauchhöhle enthalten oder in eigenen Blasen und Säcken eingeschlossen.

Die *freie Bauchwassersucht* (Hydrops ascites diffusus oder Hydrops ascites) äussert sich in ihrem Entstehen durch Störungen in den Verrichtungen der Unterleibsorgane, welche aber viel häufiger ohne Wassersucht vorkommen, gestörte Verdauung, Verstopfung, den rheumatischen ähnliche Schmerzen im Unterleibe, so wie in den Lenden und den Füssen, und zuweilen ist der Leib tympanitisch ausgedehnt; hiebei fühlt sich auch ohne Tympatitis der Leib bald etwas voll an, die Füsse schwellen an den Knöchel etwas ödematös an und der Harn wird braun und satzig. Allmählig erreicht die Wasseransammlung im Unterleibe den Grad, dass sie mit Bestimmtheit erkannt werden kann. Der Leib schwillt gleichförmig an, und zwar von unten nach oben; hält man die flache Hand auf die eine Seite desselben und schlägt auf der andern Seite gelinde an, so fühlt man ein Schwappen (die Fluctuation) des Wassers, welches auch der Kranke bei schneller Wendung des Körpers wahrnimmt; bei Veränderung der Lage des Körpers senkt sich die Geschwulst nach dem Gesetze der Schwere. Oft erreicht der Unterleib eine ausserordentliche Ausdehnung, und zwar oft eine beträchtlichere, als dieselbe im letzten Monat der Schwangerschaft ist, wobei die leiseste Berührung der Bauchdecken mit dem Finger das Anschlagen des Wassers an die Bauchwandung erzeugt und der aufgelegten Hand fühlbar macht. Hiebei ist die Verdauung oft sehr gestört und die geringste Menge von Speisen erregt das Gefühl von Völle, der

Stuhlgang ist meistens verstopft, das Athmen, auch ohne hinzugetretene Brustwassersucht, mehr oder weniger erschwert, die Körperkräften schwinden, das Gesicht, so wie überhaupt die obern Theile des Körpers werden mager, wenn sie nicht ödematös angeschwollen sind. Der Durst ist bei dieser Art der Wassersucht quälender, als bei den übrigen Arten derselben, zuletzt bildet sich in der Regel allgemeine Wassersucht aus, wobei oft zugleich ein Zehrfieber hinzutritt und sich manchmal auch Gelbsucht entwickelt.

In die Gesundheit geht die Krankheit vorzüglich durch reichlichen Urinabgang, aber auch durch andere Krisen, namentlich Durchfälle über, doch sind diese nicht immer wohlthätig. Der Tod wird durch Schwäche, durch die hinzugekommene Brust- und Herzbeutelwassersucht und zuweilen auch durch Schlagfluss herbeigeführt.

§. 1580.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Ausser häufig vorkommenden Desorganisationen in den Organen des Unterleibes, Physconie der Leber und Milz, Entzündung und Vereiterung der Nieren, Scirrhen des Pancreas etc., welche zuweilen die Ursache der Wassersucht sind, und ausser Verdickung und Verwachsungen des Bauchfells, kleinen, weisslichten, körnigten, lymphatischen Ausschwitzungen auf der Oberfläche der Gedärme etc., welche die Folge des die Wassersucht bedingenden krankhaften Prozesses in dem Peritoneum sind, findet man oft eine ausserordentliche Menge von Wasser, häufig 30 bis 40 Pfunde, frei in der Bauchhöhle enthalten. Die Flüssigkeit ist mehr oder weniger wasserhell oder gelblich, durch weissliche Flocken getrübt, zuweilen auch blutig, bald ohne, bald von einem übeln Geruch. Manchmal findet man in derselben auch grössere Gerinnsel von einer gallertartigen Masse.

§. 1581.

Die freie Bauchwassersucht könnte verwechselt werden mit der Sackwassersucht, einer starken, ödematösen Anschwellung der Bauchbedeckungen, der Wassersucht der Gebärmutter und der Eierstöcke, der Zurückhaltung des Harnes in der Blase, den Harnleitern und dem Nierenbecken, der Trommelsucht, der Vergrösserung von Eingeweiden, dem Fettbauche und der Schwangerschaft. Von letzterer unterscheidet sich die Bauchwassersucht sowohl durch die ihr eigenthümlichen Zeichen, namentlich das Schwappen des Wassers und die allgemeinen Zeichen der Wassersucht, doch kann ersteres auch bei der Bauchwassersucht undeutlich sein und letztere zum Theil auch bei der Schwangerschaft vorkommen, namentlich Oedeme der Füsse, als auch durch den Mangel gewisser, der Schwangerschaft eigenthümlichen Erscheinungen. Hieher gehören der bestimmte Zeitraum, in welchem die allmählige Ausdehnung statt findet, das Ausbleiben der monatlichen Reinigung, welche aber auch bei der Wassersucht sehr häufig fehlt, die fühlbare Vergrösserung des Uterus, die Bewegung des Kindes, die Anschwellung der Brüste, die Veränderung am Muttermunde und das deutlich fühlbare Vorliegen eines Kindestheiles. Wo die Untersuchung der Geschlechtstheile nicht zulässig ist, kann man sich auch des Stethoscopes, das nach *Kergaradec's* *) Entdeckungen, deren Richtigkeit ich nach eigenen Untersuchungen bezeugen kann, ganz sichere Unterscheidungszeichen zwischen der Schwangerschaft und der Bauchwassersucht, so wie der Wassersucht der Gebärmutter giebt. Man vernimmt

*) Mémoire sur l'auscultation, appliquée à l'étude de la Grossesse etc. par M. J A. Lejumeau de Kergaradec. Paris 1822. Auch in Frorieps Notizen Nro. 35 u. 38 und aus denselben besonders abgedruckt. Weimar 1822.

nämlich durch das Stethoscop, so wie auch durch das unmittelbare Auflegen des Ohres bei vorgerückter Schwangerschaft, zweierlei Geräuscharten. Erstens ein so häufig erfolgendes Pulsiren, dass die Zahl der Schläge ungefähr das Doppelte von den Pulsschlägen der Mutter beträgt. Hört man die Schläge sehr deutlich, so erkennt man, dass die Schläge Doppelschläge sind, und es unterliegt keinem Zweifel, dass sie die Pulsationen des Herzens vom Kinde sind. Sie werden meistens auf der linken Seite des Bauches wahrgenommen. Zweitens Schläge, welche mit einem blasenden Geräusch verbunden und ganz isochronisch mit den Pulsschlägen der Mutter sind und von der Stelle herrühren sollen, an welcher der Mutterkuchen aufsitzt. Sind beide Geräuscharten oder wenigstens jene häufigen Doppelschläge wahrzunehmen, so unterliegt das Vorhandensein der Schwangerschaft durchaus keinem Zweifel, doch erfordert es, um sie zu erkennen, eine grosse Uebung im Gebrauche des Stethoscops, und es giebt auch Momente, in welchen das kurz vorher wahrgenommene Geräusch nicht mehr zu erkennen ist, wovon wahrscheinlich eine Veränderung in der Lage des Kindes die Schuld trägt.

§. 1582.

b) *Die Sackbauchwassersucht* (Hydrops abdominalis saccatus) wird diejenige Wassersucht des Unterleibs genannt, in welcher das Wasser in eigenen, krankhaft gebildeten Behältern, am gewöhnlichsten in einer Höhle in dem Zellgewebe zwischen dem Bauchfell und den Bauchmuskeln eingeschlossen ist.

Die hauptsächlichste und oft beinahe allein bestehende Krankheitserscheinung ist die Geschwulst. Es bildet sich nämlich, nach vorhergegangenen Schmerzen oder auch ohne diese, blos unter dem Gefühl von Druck und Spannung, eine Geschwulst, die bei dem Hydrops peritonaealis dicht unter den Bauchbedeckungen liegt, nicht

verschiebbar ist, über welche auch die Bauchbedeckungen, mit Ausnahme der Haut, gewöhnlich nicht in eine Falte gelegt werden können, und welche gespannt und zuweilen härtlich sich anfühlt, schmerzlos und meistens umschrieben ist, keine Schwappung zeigt und auch nicht bei dem Umwenden des Körpers auf eine andere Seite nach dieser sich senkt. Die Geschwulst hat oft nur die Grösse eines Eies oder einer Faust, oft nimmt sie aber den grössten Theil des Unterleibes ein und treibt, wenn sie in der Nabelgegend ihren Sitz hat, den Nabel bruchartig heraus. Es bildet sich hiebei oft gar nicht oder nur sehr spät und verhältnissmässig in geringem Grade ein allgemeiner hydropischer Zustand aus, auch ist die Verdauung oft ziemlich gut, das Aussehen nicht cachectisch, so wie oft überhaupt lange Zeit keine bedeutende Störung in der Gesundheit wahrgenommen wird; öfters sind jedoch Schmerzen im Unterleibe und Störungen in den Verrichtungen der Unterleibsorgane vorhanden, wovon in einem von mir beobachteten Falle eine mit der Sackwassersucht zugleich entstandene Verwachsung und Umschlingung der Gedärme durch das Netz die Schuld trug. Die Krankheit kann viele Jahre dauern. Bei dem höchsten Grade bilden sich Verdauungsbeschwerden, mehr oder weniger allgemeinere hydropische Zufälle und oft auch Zehrfieber aus. Zuweilen bricht der Sack nach innen auf und veranlasst freie Bauchwassersucht und in seltenen Fällen sah man ihn auch nach aussen sich öffnen.

§. 1583.

Bei den Leichenöffnungen findet man einen oder mehrere krankhaft entstandene Säcke, welche entweder durch die Lamellen des Bauchfells oder durch Zerreissung der Zellen des Gewebes zwischen dem Bauchfell und den Bauchmuskeln oder des Gewebes zwischen diesen und ihren Scheiden, oder durch Ver-

wachsungen des Netzes und des Bauchfelles oder auch im Gekröse sich gebildet haben, wobei diese Theile verdickt und oft mit Hydatiden besetzt sind. Die eingeschlossene Flüssigkeit ist wasserhell, gelblich, oft eiterartig und oft eine sehr consistente Lymphe.

§. 1584.

Die Wassersucht der Gebärmutter (Hydrops uteri, Hydrometra).

Gregorini (lat. Halle 1795, mit 1 illum. K.). — *Lindner* (lat. Sulzb. 1823). — Auch die Schriftsteller über Weiberkrankheiten.

Die Gebärmutterwassersucht ist in dem einen Falle ein Oedem des Uterus, in andern frei in der Gebärmutterhöhle angesammeltes Wasser und öfters sind es auch in der Gebärmutter befindliche Hydatiden.

Das *Oedem der Gebärmutter* soll nach *v. Siebold* [1]) zum Kennzeichen eine ungewöhnliche Dicke der Wandungen des Uterus haben, an welchem bisweilen ein mit dem Finger gemachter Eindruck, wie beim gewöhnlichen Oedem, eine Zeit lang fühlbar zurückbleibe. Wo dieses Zeichen nicht vorhanden ist, möchte das Oedem des Uterus wohl niemals erkannt werden können.

§. 1585.

Die *freie Gebärmutterwassersucht* (Hydrometra im engern Sinne) wird als eine solche Wassersucht angegeben, bei welcher das Wasser, ohne in Blasen enthalten zu sein, in der Gebärmutter eingeschlossen ist, indem der Muttermund auf irgend eine Weise verstopft oder geschlossen ist. *Kerkring* [2]) und *Neumann* [3]) leugnen die Möglichkeit der Existenz dieser Wassersucht. Ich habe zwar die Hydrometra cystica, aber noch nie die freie Gebärmutterwassersucht zu beobachten Gelegenheit

1) Frauenzimmerkrankh. 2. Thl. S. 551). — 2) Vergl. Burns Handb. der Geburtshülfe. I. S. 203. — 3) Spec. Path. u. Therap. II. S. 734.

gehabt. Als Zeichen derselben werden angegeben: Eine kalte, harte, etwas schwappende Geschwulst in der Gegend der Gebärmutter, zuweilen eine, durch das angesammelte Wasser veranlasste, wellenförmige Bewegung, welche nicht mit der Kraft und Schnelligkeit und auch nicht auf einer so beschränkten Stelle wahrgenommen wird, wie die Bewegung des Kindes sich zeigt, ein dünner, gespannter und zusammengezogener Muttermund, zuweilen beständiges Abtröpfeln von Wasser oder auch ein zu wiederholten Malen stromweises Abfliessen des Wassers (was mir jedoch eher bei Hydrometra cystica, als bei der freien Gebärmutterwassersucht statt finden zu können scheint), Welkwerden der Brüste (wovon aber nach *P. Frank* Ep. Lib. VI. P. I. p. 302 das Gegentheil der Fall sein soll) lange Zeit ungestörte Verrichtung der Verdauungs- und der meisten übrigen Organe und daher keine bedeutende Störung in dem Wohlbefinden, zuletzt jedoch, wenn die Menge des Wassers sehr bedeutend wird, wovon in einem Falle *Vesal* 180 römische Pfunde in dem Uterus fand, was aber *Burns* für eine Verwechslung mit der Wassersucht in dem Ovarium hält,[1]) Störungen in der Verdauung, allmählig sich entwickelndes cachectisches Aussehen, hektisches Fieber und allgemeine Wassersucht.

§. 1586.

Die ***Hydatiden in der Gebärmutter*** oder die falsche Schwangerschaft (Hydrometra hydatica, cystica) ist in ihrem Entstehen von der wirklichen Schwangerschaft nicht wohl zu unterscheiden und es geht auch öfters die wirkliche Schwangerschaft durch Entartung des Eies in diese Art der Wassersucht über. Es stellen sich die

1) Geburtsh. B. I. S. 204.

gewöhnlichen Zeichen der Schwangerschaft, Ausbleiben der monatlichen Reinigung, Anschwellen des Leibes, Eckel und Erbrechen ein, sodann werden aber die Brüste welk, was den Zeitpunkt bezeichnen soll, wenn das Ei völlig desorganisirt ist, und die so eben bezeichneten consensuellen Beschwerden der Schwangerschaft verschwinden wieder, wiewohl sie auch fortdauern und auch Leibschmerzen und ähnliche krankhafte Zufälle vorhanden sein können. Von nun an nimmt der Uterus in der Regel nur sehr wenig und langsam an Umfang zu, die Frau empfindet keine Kindsbewegungen und es stellen sich überhaupt die Veränderungen nicht ein, die der Periode der Schwangerschaft gemäss erfolgen sollten. Statt derselben nimmt die Kranke zuweilen einen Abgang von Wasser oder, was häufiger der Fall ist, von Blut wahr, welcher in der Regel sich sehr häufig wiederholt, so dass die Kranke entkräftet und blass wird und die Füsse wassersüchtig anschwellen. Endlich stellen sich in einer unbestimmten Zeit, oft im fünften Monat, Wehen ein, wodurch die krankhafte Masse gewöhnlich unter starkem Blutflusse ausgestossen wird.

An dem Abgegangenen erkennt man oft deutlich das Ei, von dem zuweilen nur ein kleiner Theil mit Hydatiden besetzt ist. Oft ist das ganze Ei krankhaft umgewandelt und ein bedeutender Massenzuwachs bemerkbar, wobei die Zahl der Hydatiden oft ausserordentlich gross ist. Selten kommt nur eine grosse Hydatide vor, welche meistens mit einer wahren oder einer Molenschwangerschaft verbunden ist.

§. 1587.

Zuweilen kommt die Gebärmutterwassersucht in Verbindung mit der Schwangerschaft vor, was durch folgende Zeichen erkannt wird: Uebermässige Ausdehnung des Unterleibes, ohne dass die Ungleichheit an demselben wahrgenommen wird, die die Schwangerschaft mit Zwil-

lingen veranlasst, und zeitweiser erleichternder Abgang von Wasser, unter Erscheinungen des bevorstehenden Abortus, ohne dass aber dieser erfolgt. Zuweilen findet der Wasserabgang nur kurz vor der Geburt statt, so dass man denselben leicht für das Kindeswasser hält, worauf aber dasselbe erst nachfolgt. Das Kind ist meistens klein und abgezehrt. In diesem Falle ist das Wasser in einer grossen oder in mehreren kleinen Hydatiden eingeschlossen, oder es ist zwischen den Eihäuten und dem Uterus in Zellen angesammelt, oder es besteht nur in zu reichlichem Fruchtwasser.

§. 1588.

Die Wassersucht der Eierstöcke (Hydrops ovariorum).

Peyer (Diss. Basil 1718). — *Schacher* (Diss. Lips. 1725). — *Roederer* (Goettingen 1762). — *Hunter* (med Bemerk. u. Beobacht. herausg. v. Kuhn. 2 Bde.). — *Engelmann* (Diss. Berlin 1818). — *Seymour* (illustrat. of some of the principal diseases of the ovaria. Lond. 1830).

Diese Wassersucht kommt in der Regel in Verbindung und in Folge des Scirrhus der genannten Organe vor und beginnt daher gewöhnlich mit den Zeichen dieser Krankheit, nämlich mit einem Gefühl von spannendem und druckendem Schmerz in der Weiche und der Tiefe des Beckens, am häufigsten auf der linken Seite, bei welchem die Kranke von Zeit zu Zeit auch den leidenden Theil durchfahrende Stiche empfindet. Allmählig bemerkt man am Rande des Darmbeines in der Tiefe des Leibes, eine Geschwulst, die sich härtlich anfühlt, zuerst von der Grösse einer Wallnuss oder eines Eies ist, langsamer wächst, als die Gebärmutter in der Schwangerschaft sich ausdehnt, zuletzt oft den ganzen Unterleib einnimmt, und wenn sie eine bedeutende Grösse erreicht hat, mehr oder weniger schwappt. Hiebei schwellen die Brüste nicht an, sondern welken

im Gegentheil und die Vaginalportion der Gebärmutter zeigt nicht die in der Schwangerschaft gewöhnlichen Veränderungen, sondern steht oft nur etwas schief. Durch den Druck auf die Nerven stellt sich eine Taubheit in dem Fuss der leidenden Seite ein, die Kranke empfindet ein Ziehen im Kreuze, zuweilen wehenartige Schmerzen, Blähungsbeschwerden, Eckel und Erbrechen und hat häufig hysterische Zufälle; doch geht hiebei die Ernährung lange Zeit hinreichend von statten und, die Localaffection abgerechnet, scheint die Gesundheit nicht sehr gefährdet zu sein. Endlich magert der Körper dennoch immer mehr ab, das Gesicht wird mager und zeigt etwas Leidendes und die Füsse schwellen an. Oft erst nach 20 — 30 Jahren endet die Krankheit unter allgemeiner Wassersucht und Zehrfieber.

§. 1589.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Der kranke Eierstock ist meistens scirrhös, die in ihm angesammelte Flüssigkeit, die selbst die Menge von 100 und mehr Pfunden betragen kann und meistens eine etwas dicklichte, gallertartige Beschaffenheit hat, ist entweder in Zellen oder in mehreren Säcken, die für Erweiterungen der Bläschen (Eierchen) des Ovariums gehalten werden, oder auch nur in einem einzigen Sacke, zu welchem das Ovarium ausgedehnt ist, eingeschlossen. Zuweilen findet man auch in dem kranken Eierstock Haare und Knochen mit Zähnen, die meistens in einer Speckgeschwulst enthalten und von einer gelatinösen Masse umgeben sind, und welche selbst in Fällen vorgekommen sein sollen, in welchen man in der Leiche die Zeichen der unbefleckten Jungfrauschaft vorfand.*)

*) S. Meckel in dessen deutsch. Archiv f. d. Physiologie. 1815. B. I. Hft. 4. S. 580 u. d. f.

§. 1590.

Ausser den angegebenen Arten der Wassersucht giebt es noch Ansammlungen in einzelnen andern Theilen des Körpers, deren Darstellung aber dem Gebiete der chirurgischen Nosologie und der Augenheilkunde angehört; diese sind der Wasserbruch (Hydrocele), die Gelenkwassersucht (Hydarthrus), die Wassersucht der Schleimbeutel (Hydrops bursarum mucosarum), die Wasserbalggeschwulst (Cystis serosa, Hygroma), so wie auch die hydatidösen Geschwülste äusserer Theile und die Augenwassersucht (Hydrophthalmus).

§. 1591.

Anlage zur Wassersucht haben sowohl Individuen, die zu Congestionen und entzündlichen Reitzungen gewisser Theile, z. B. des Gehirnes, geneigt sind, als auch solche, die an Schwäche leiden und einen schlaffen Körperbau haben, insbesondere fettsüchtige Personen. Die Anlage ist oft auch erblich und pflanzt sich zuweilen durch mehrere Geschlechter fort.

§. 1592.

Gelegenheitsursachen sind: a) solche Einflüsse, welche wiederholte Congestionen, Entzündung oder eine für eine Secretion vicariirende Thätigkeit in dem kranken Organ veranlassen können, wie insbesondere der anhaltende und übermässige Genuss geistiger Getränke, rheumatische und gichtische Entzündung, besonders solche mit entzündlicher Anschwellung der Glieder, und Fieber mit entzündlichem Character, das Erysipelas, gewisse contagiöse Krankheiten, insbesondere das Scharlachfieber, unterdrückte Urinabsonderung durch Nierenentzündung und andere Krankheiten der Nieren veranlasst, unterdrückte Hautausdünstung, schnell geheilte Fussgeschwüre und Ausschläge, so wie unterdrückte Blutflüsse, und überhaupt beinahe jede fortgesetzte Reitzung eines Organes und besonders eines solchen, das zur serösen Absonderung

geneigt ist. b) Solche Einflüsse, welche die Lebensthätigkeit in dem ganzen Körper oder einem Organe schwächen. Alle schwächenden Krankheiten, insbesondere die Nervenfieber, Lähmungen, Schwindsuchten, Blutflüsse und lange dauernde Wechselfieber, eine feuchte Luft, schlechte Nahrung, der Missbrauch erschlaffender Getränke, andauernde Störungen in der Verdauung, Druck auf die Venen und Lymphgefässe, z. B. bei der Schwangerschaft. Endlich c) diejenigen Einflüsse, die die reproductive Thätigkeit qualitativ umstimmen und Bleichsucht, Fettsucht, Krebs, Verhärtung der Leber und anderer Organe veranlassen.

§. 1593.

Pathogenie der Wassersucht. Als nächste Ursache der Wassersucht nimmt man gewöhnlich ein Missverhältniss zwischen der Aushauchung und der Einsaugung der serösen Stoffe an, und glaubt, dass entweder die Aushauchung krankhaft vermehrt oder die Einsaugung krankhaft vermindert sei, oder beides zugleich statt finde. Die vermehrte Aushauchung beruhe in einer vermehrten Thätigkeit der aushauchenden Gefässe, die verminderte Einsaugung entweder, und zwar in der Regel, in Schwäche der resorbirenden Gefässe oder in einem Krampfe derselben (Hydrops spasticus), oder auch in Verstopfung derselben durch Geschwülste, welche die lymphatischen Gefässe drücken.

Diese Erklärungsweise ist ziemlich befriedigend und praktisch, doch möchte eine nähere physiologische Würdigung der hier statt findenden Krankheitsvorgänge wohl erlaubt sein.

Die Krankheitsprozesse, deren Product die Wasseransammlung ist, sind sehr verschiedenartig und können in folgenden Reihen aufgeführt werden.

1) Krankheitsvorgänge in den Capillargefässen, mit dem Character erhöhter Lebensthätigkeit. Hieher ge-

hören: a) solche entzündliche Reitzungen oder Entzündungen, die den Character der Verflüssigung haben. Sie erhalten gern einen solchen, wenn sie in einem Organ ihren Sitz haben, dessen Funktion Verflüssigung (Ausdünstung) ist, daher vorzugsweise die Entzündung der serösen Häute, und wenn sie durch Hemmung einer Verflüssigung entstanden sind, wie dieses meistens bei den rheumatischen Entzündungen der Fall ist. b) Ein ohne Merkmale der Entzündung bestehender, der blosen Secretion vergleichbarer Verflüssigungsprozess in den Capillargefässen der wassersüchtigen Organe. Dieser kann auf polarische Weise durch Unterdrückung von Absonderungen, insbesondere der Hautausdünstung und vorzüglich der Urinabsonderung entstehen. In beiden Fällen wird in den Capillargefässen des leidenden Organs eine Menge Serum gebildet, welches nach und nach das die Gefässwandung bildende Parenchym des Organs durchdringt und sich im Zellgewebe anhäuft oder auch sich in Höhlen ergiesst. c) Starker Andrang des Blutes nach einem Theile, wodurch seröse Stoffe aus den Gefässen herausgedrängt werden und sich in das Zellgewebe oder eine Höhle ergiessen, wie dieses manchmal bei dem Schlagflusse der Fall ist.

2) Krankheitsvorgänge in den Capillar- und Lymphgefässen, mit dem Character gesunkener Lebensthätigkeit. Diese sind: a) die aus gesunkener Nerventhätigkeit verminderten Lebensprozesse in den Capillargefässen, wodurch die Ausscheidung der serösen Stoffe in Dunst- und Gasform nicht gehörig bewirkt wird, der Blutlauf in denselben und wie es scheint vorzüglich der des serösen Theiles nicht mit der nothwendigen Kraft vollführt wird und daher das Serum die Capillargefässe anfüllt und zuletzt das Parenchym der Organe durchdringt. Dieselbe Ursache (die darniederliegende Nerventhätigkeit) hindert auch die Zurückführung der ausgetretenen

Stoffe in den lymphatischen Gefässen, das ist die Resorption. Das deutlichste Beispiel dieser Entstehungsart der Wassersucht giebt das Oedem der gelähmten Glieder. b) Durch einen Fehler des Blutes bedingte verminderte Lebensthätigkeit in den Capillargefässen. Hieher gehört die Dünnflüssigkeit des Blutes, die auf einem Blutverlurst, wahrscheinlich durch Auflösung von Blutkügelchen, entsteht. Ein solches, an Blutkügelchen armes Blut, ist weniger geneigt mit der, ohnehin auch geschwächten Nervenkraft in kräftige Wechselwirkung zu treten, auch wirkt, da die Blutsäule oft sehr dünn ist, die Stosskraft des Herzens weniger auf dieselbe und es wird daher, besonders in den Theilen, in welchen der leichte Rückfluss der Säfte auch noch die Schwerkraft vermindert, sich leicht eine Anfüllung der Capillargefässe und zuletzt Durchdringung des Parenchyms der Organe mit serösen Theilen bilden. Vielleicht wirkt auch auf diese Weise die Unterdrückung der Harnabsonderung, indem hier das Blut mit wässerigten Theilen überfüllt wird; doch kann auch hier, wie oben schon angedeutet wurde, eine antagonistisch-erhöhte Thätigkeit mit dem Character der Verflüssigung statt finden. Ebenso kann eine andauernde passive Anfüllung der Capillargefässe mit Blut, durch Druck auf die Venen und andere Ursachen erzeugt, zum Austritt wässerigter Theile in das Parenchym der Organe Veranlassung geben, so wie auch diese Stoffe nicht resorbirt werden können, wenn ein Druck auf die Lymphgefässe statt findet. Alle Arten der Wassersucht, die aus Schwäche entstehen, scheinen sich auf die hier angegebene Weise, entweder durch verminderte Nerventhätigkeit oder durch eine, die Wechselwirkung zwischen der belebten Organenwandung und dem Blut in den Capillargefässen nicht gehörig unterhaltende Beschaffenheit des Blutes zu bilden. Auf diese Weise kann auch die von Manchen als Ursache der

Wassersucht angenommene, überwiegend venöse Beschaffenheit des Blutes wirken, doch möchte eine Hinneigung zur Venosität in dem arteriellen Blute nur höchst selten nachgewiesen werden können.

3) Gesunkene und qualitativ veränderte Reproductionsthätigkeit im Parenchym der Organe. Bei der Ernährung lagern sich niemals ganze Blutkügelchen an die Substanz der Organe an, sondern es wird ohne Zweifel aus der ganzen Masse der die Capillargefässe durchlaufenden Blutkügelchen ein flüssiger Theil ausgeschieden, der das Parenchym des Organs durchdringt und von diesen in seine eigene Substanz umgewandelt und zum Theil auch ausgeschieden wird. Liegt nun die Reproductionsthätigkeit des Organs darnieder und geht die Resorption nicht gehörig vor sich, so wird hieraus eine Ansammlung flüssiger Theile im Parenchym entstehen. Ausserdem scheint es, wie wenn durch eine eigenthümliche Umstimmung in den biochemischen Prozessen der Reproduction nicht allein eine vermehrte Menge von Wasser aus dem Blute gebildet, sondern auch solches in der Substanz der Organe durch Umwandlung festerer Stoffe, namentlich des Fettes, erzeugt werden könne. Diese eigenthümliche Umstimmung in der Reproductionsthätigkeit scheint am meisten mit der übermässigen Fettbildung selbst verwandt zu sein, indem die Fettbildung leicht in Wasserbildung übergeht, das Fett, so wie das Wasser Substanzen sind, die keinen Stickstoff enthalten,*) und Fettsucht, so wie Wassersucht, sehr häufig mit dem Leiden eines Organs, nämlich der Leber, in Verbindung stehen, das auf die Blutbereitung und überhaupt die biochemischen Prozesse

*) Hierauf weist auch Sprengel hin. Institut. medic. Tom. I. §. 43. 77. 81.

im Körper einen Einfluss ausübt und eine, ebenfalls den Stickstoff entbehrende Substanz absondert. Die Wassersucht entspringt oft aus Physconie der Leber, und bei Fettsüchtigen (im höchsten Grade bei gestoppten Gänsen) ist die Leber oft sehr gross.

§. 1594.

Was die Ursachen der einzelnen Arten der Wassersucht betrifft, so verdienen bei denselben folgende besonders hervorgehoben zu werden.

Hautwassersucht. Anlage: schwammiger Körperbau, das weibliche Geschlecht. Gelegenheitsursachen: der Rothlauf, das Scharlachexanthem, Rheumatismus, Schwächekrankheiten, besonders bei zu frühem Aufenthalt ausser Bett, Schwangerschaft, innere Wassersuchten.

Aeusserer Wasserkopf: Ist meistens angeboren und in diesem Falle entweder ein Bildungsfehler oder durch erlittene Gewalt während der Geburt entstanden; auch kann er durch zurückgetretene Kopfausschläge, Verkältung etc. erzeugt werden.

Der *chronische innere Wasserkopf*: Ist in der Regel angeboren und ursprünglicher Bildungsfehler, wozu Cachexien und Körperschwäche oder Blödsinn der Eltern, ein berauschter Zustand des Vaters oder der Mutter während des Coitus, oder häufige Trunkenheit der letztern während der Schwangerschaft öfters Gelegenheit geben sollen. Der nach der Geburt erworbene chronische innere Wasserkopf wird durch ähnliche Ursachen, wie die hitzige Gehirnhöhlenwassersucht, erzeugt.

Die *hitzige Gehirnhöhlenwassersucht.* Anlage haben Kinder bis zum 6. und 8. Jahre, (wegen der Entwicklung des Gehirns und des, während des Zahnens nach den obern Theilen gehenden Triebes der Säfte) und scrophulöse, so wie auch sehr blühende und mit sehr guten Geistesanlagen begabte Kinder. Manchen Familien

ist die Krankheit eigenthümlich, so dass oft mehrere Kinder, wenn sie in ein gewisses Alter kommen, von derselben befallen werden. Gelegenheitsursachen sind: a) idiopatisch wirkende: Kopfverletzungen, heftige Einwirkung der Sonnenhitze, z. B. bei abgeschorenem Kopfe, zu frühe und starke Anstrengung der Geisteskräfte. b) Consensuell wirkende: der Zahnreitz, gastrische Reitze, namentlich Würmer, Säure, Galle im Magen, andauernde Flatulenz, der Missbrauch der narkotischen Mittel, namentlich des Opiums und der Belladonna, so wie auch der erregenden Mittel, des Weines etc. c) Antagonistisch wirkende: Verkältung, besonders des Kopfes, daher das zu starke Abscheren der Haare, die Hinwegnahme des Gneises am Kopfe (nach *Gölis*), zurückgetretene Hautausschläge, namentlich des Kopfgrindes, des Scharlachexanthems (welches übrigens zuweilen auch ohne Zurücktritt des Ausschlages durch die Heftigkeit des Fiebers, so wie auch, uud besonders im Stadium der Abschuppung, durch Unterdrückung der Hautausdünstung, den Hydrocephalus veranlassen kann), unterdrückte Harnabsonderung, schnell gestillte Durchfälle etc.

Wassersucht des Rückgrathes. Die mit Spina bifida verbundene Hydrorhachis ist angeboren und ein Bildungsfehler, zu welchem Scropheln oder früher bestandene Rhachitis bei den Eltern Veranlassung geben sollen. Die erworbene Hydrorhachis ist der Ausgang verschiedener Krankheiten, die oben schon bezeichnet worden sind.

Die *Brustwassersucht.* Anlage: das Mannes- und höhere Alter. Gelegenheitsursachen: die Brustfellsentzündung, der Missbrauch geistiger Getränke, welcher die Lunge zum Theil durch die andauernde Erregung des Gefässsystems, wie es scheint aber auch dadurch krank macht, dass die Lunge ein Hauptausscheidungs-

organ ist, wodurch die spirituösen Stoffe wieder entfernt werden, verschiedene Leiden der Lunge, wie Verhärtungen, Asthma etc

Das *Oedem der Lunge* kann durch dieselben Ursachen hervorgebracht werden, und ist häufig ein Ausgang der Lungenentzündung.

Die *Herzbeutelwassersucht.* Gelegenheitsursachen: Herzbeutelentzündung, welche zuweilen bei dem Rheumatismus mit entzündlichem Fieber, bei contagiösen Fiebern etc. im Verborgenen sich ausbildet, andauerndes Gemüthsleiden etc.

Freie Bauchwassersucht. Anlage: das Mannes- und hohe Alter. Gelegenheitsursachen: Entzündung des Bauchfells, Anschwellungen und Verhärtungen der Leber, der Milz, des Pankreas, langwierige Wechselfieber, Unterdrückung der Hämorrhoiden.

Sackbauchwassersucht: zu starke Ausdehnung des Bauchfells während der Schwangerschaft, heftige Anstrengung der Bauchmuskeln während der Geburt, ein Stoss auf den Unterleib etc.

Wassersucht der Gebärmutter: Verschliessung des Muttermundes, als ursprünglicher Bildungsfehler oder in Folge von Entzündung, unterdrückte monatliche Reinigung, langwieriger weisser Fluss, Verhärtungen und Geschwülste der Gebärmutter, schwere Geburten und Missfälle, vorzüglich aber eine, in einem frühen Zeitraum der Schwangerschaft durch äussere Gewalt erfolgende Verletzung des Eies.

Wassersucht der Eierstöcke. Anlage: das höhere Alter, besonders die Zeit des Ausbleibens der monatlichen Reinigung. Gelegenheitsursachen: Entzündung der Eierstöcke, Fehler in den Geschlechtsverrichtungen und zwar sowohl Ausschweifungen in denselben, als auch niemals eingetretene Erfüllung der Bestimmung der Geschlechtsorgane, Missfälle, äussere Verletzungen;

§. 1595.

Vorhersage. Die Wassersucht gehört im ganzen zu den schwer heilbaren und einzelne Arten derselben zu den unheilbaren Krankheiten; auch kehrt sie leicht wieder zurück. Die Prognose ist ausser von den Krankheitszufällen selbst vorzüglich abhängig: von den Ursachen der Krankheit, so ist z. B. eine nur in Folge einer schwächenden acuten Krankheit entstandene Wasseranhäufung in der Regel weniger gefährlich als eine durch Verhärtung von Eingeweiden bedingte Wassersucht; von der Dauer der Krankheit, eine frisch entstandene und bei einem Individuum zum erstenmal sich zeigende Wassersucht ist eher zu heilen als eine lang bestehende oder zum zweiten- und drittenmal sich zeigende Wasseransammlung; und von dem Sitze der Krankheit. Am wenigsten gefährlich und am leichtesten zu heilen ist die Hautwassersucht. — Der zelluläre äussere Wasserkopf ist in der Regel nicht gefährlich und wird selbst von der Natur allein geheilt; der aponevrotische Wasserkopf wird bei richtiger Behandlung meistens geheilt, der periostische ist schlimm, indem hier meistens Beinfrass der Schädelknochen vorhanden ist. — Der chronische innere Wasserkopf ist zwar immer sehr gefährlich, aber nach *Gölis* Zeugniss [1]) in seiner ersten Entwicklung häufig und in seiner vollkommenen Ausbildung, wenn diese erst später nach der Geburt und langsam geschehen ist, zuweilen noch heilbar, doch bleiben in diesem Falle beinahe immer Geistes- und Körperschwäche zurück. — Die hitzige Gehirnhöhlenwassersucht ist im Stadium der Turgescenz und der Entzündung heilbar, doch immer sehr gefährlich, indem auch bei der besten Behandlung Ausschwitzung erfolgen kann; im Zeitraum der geschehenen Ausschwi-

1) A. a. O. II. 105.

tzung scheint die Krankheit unheilbar und immer tödtlich zu sein. — Weniger gefährlich ist die acute Ausschwitzung von Wasser zwischen den Gehirnhäuten. — Die mit Spina bifida verbundene Hydrorhachis ist beinahe immer tödtlich, die ohne gespaltene Wirbel vorkommende krankhafte Ansammlung von Wasser in der Wirbelsäule nicht so höchst gefährlich. — Die von einer acuten Krankheit bedingte Wasserergiessung in die Brusthöhle ist zwar gefährlich, doch verschwindet sie meistens wieder, die mit allgemeiner Cachexie in Verbindung stehende Brustwassersucht selten auf die Dauer heilbar. — Die Herzbeutelwassersucht ist höchst gefährlich und tödtet oft unerwartet schnell, doch ist sie, wenn sie auf eine acute Krankheit entstanden ist, heilbar; ist sie in Folge der wassersüchtigen Dyscrasie entstanden, so wird sie in der Regel nicht geheilt. — Die freie Bauchwassersucht kann eine lange Zeit andauern und wird erst in ihrem höchsten Grade nach langer Dauer tödtlich; sie ist übrigens schwer auf die Dauer heilbar. — Die Sackbauchwassersucht wird in der Regel nur in ihrem höchsten Grade gefährlich, doch entscheidet sie sich beinahe nie von selbst und ist selten heilbar. — Die Hydatiden in der Gebärmutter werden zwar öfters durch Blutungen gefährlich, doch werden sie wohl immer durch Zusammenziehungen der Gebärmutter ausgestossen. — Die Wassersucht der Eierstöcke wird erst nach Jahren gefährlich, doch vermögen in der Regel weder die Kräften der Natur, noch die Hülfe der Kunst, ausser durch den sehr gefährlichen operativen Eingriff das Uebel zu beseitigen.

§. 1596.

Behandlung der Wassersucht. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Hier verdient Folgendes besonders hervorgehoben zu werden: Immer ist genau zu untersuchen, ob die unterdrückte oder sparsame Harnabsonderung die Folge oder die Ursache der Wassersucht

und welches der Krankheitszustand der Nieren ist, der die Absonderung des Urins hindert; denn liegt z. B. ein entzündlicher Zustand der Nieren der Entstehung der Wassersucht zum Grunde, so schaden die gewöhnlich in Gebrauch gezogenen harntreibenden Mittel im höchsten Grade, und es sind dagegen oft Blutentleerungen angezeigt, und einhüllende Getränke und besänftigende Mittel von augenscheinlichem Nutzen. Ebenso dienen die letztern bei einem krampfhaft gereitzten Zustande der Nieren. — Dessgleichen ist der Zustand der Gedärme, der Leber und des ganzen Pfortadersystems zu berücksichtigen, und bei Verstopfungen und Stockungen die auflösende Methode zu Hülfe zu ziehen. — Trinkern müssen die geistigen Getränke so weit entzogen werden, als auf die Verminderung oder gänzliche Entziehung dieser Reitze nicht das Reactionsvermögen des Körpers zu sehr sinkt. An die Stelle des Branntweins setzt man eine mässige Quantität eines guten alten Weines. — Ist die Wassersucht durch unterdrückte Hautausdünstung oder zurückgetretene Ausschläge hervorgebracht, so ist eine starke Erwärmung des Körpers im Bette und der innere Gebrauch der schweisstreibenden Mittel dienlich, welches in der Regel die beste Heilmethode der Hautwassersucht ist, die auf das Scharlachfieber und bei der Krätze der Kinder entsteht. — Gegen die in Folge des Wechselfiebers entstandene Wassersucht ist die China oder das Chininum sulphuricum ein wahres Specificum.

§. 1597.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Die genannte Anzeige zerfällt in zwei Anzeigen: a) die der Beschränkung der Wasserbildung, das ist des Krankheitsprozesses, der die Wasseransammlung zur unmittelbaren Folge hat; b) die der Entfernung des schon vorhandenen Wassers. Hier entsteht die Frage, welcher von beiden Anzeigen zuerst entsprochen werden musse

Ist die Wasserbildung erst in ihrem Beginne, so verdient in der Regel die erste Anzeige die Hauptberücksichtigung, ist aber schon eine Menge Wassers vorhanden, so ist es öfters eine Lebensanzeige, das Wasser zu entfernen und man muss in diesem Falle, wenn etwa die Anwendung der Mittel, die der ersten Anzeige entsprechen, der Erfüllung der zweiten hinderlich sein würde, der zweiten Anzeige zuerst Genüge leisten; in den meisten Fällen jedoch wird sich die Behandlung so einrichten lassen, dass beiden Anzeigen zugleich entsprochen wird.

§. 1598.

a) *Beschränkung der Wasserbildung.* Ist der Krankheitsprozess, der die Wassererzeugung bedingt, eine Entzündung, so trete die antiphlogistische Methode ein, Blutentleerungen, die kühlende Salze, Calomel. Ist er nur eine krankhafte Reitzung, so dienen einhüllende und besänftigende Mittel und da doch häufig der Wasserbildung, ohne dass man deutliche Zeichen davon hat, ein gereitzter Zustand in den Capillargefässen zum Grunde liegen und auch ein verborgener Reitz auf die Nieren wirken kann, so verdienen die einhüllenden Getränke einen ausgedehnteren Gebrauch in derselben. Ich bediene mich zu diesem Zwecke gerne eines Thees von Rad. Althaea, Rad. Gramin. und Rad. Liquiritiae, den ich neben den übrigen Mitteln in der Regel gebrauchen lasse. In Beziehung auf die gegen einen gereitzten Zustand ebenfalls empfohlenen antagonistisch wirkenden Mittel ist zu bemerken, dass die Blasenpflaster nur mit Vorsicht angewandt werden dürfen, da sie eine etwa bestehende Reitzung der Nieren vermehren und dadurch eine Unterdrückung der Harnabsonderung veranlassen könnten. Zu den antagonistisch wirkenden Mitteln gehören übrigens auch die der zweiten Anzeige entsprechenden ausleerenden Mittel. Zuweilen ist ein deutlicher Krampfzustand im Körper zu bemerken, wo sodann ebenfalls die besänf-

tigende Methode und zwar oft die wirklichen krampfstillenden Mittel, selbst das Opium, in Anwendung gebracht werden müssen. Diese Mittel, welche gegen Entzündung, Reitzung und Krampf angewandt werden, gestatten in der Regel den gleichzeitigen Gebrauch der urintreibenden Mittel, doch müssen die scharfen und erregenden Diuretica vermieden werden.

§. 1599.

Hat der Krankheitsprozess, durch welchen das Wasser sich bildet, den Character der Schwäche und besteht er in fehlerhafter Blutbereitung und darniederliegenden Lebensprozessen in den Cappillargefässen, so sind gelind erregende und stärkende Mittel von grossem Nutzen, eine stärkende Diät, Fleischkost, ein guter Wein, der Aufenthalt in einer trockenen Luft und unter den Arzneimitteln die bittern Mittel in Verbindung mit den aromatischen, die China und das Eisen. Die China wirkt unter solchen Verhältnissen oft selbst diuretisch, indem sie durch andauernde Erregung der Lebensthätigkeit die darniederliegenden Absonderungen wieder in Gang bringt; in andern Fällen hemmen aber auch die tonischen Mittel die Absonderungen und man muss daher bei ihrem Gebrauch ein beständiges Augenmerk auf die Urinabsonderung haben und mit diesen Mitteln aussetzen, so bald jene gehemmt wird. Die stärkende Methode passt vorzüglich, wenn die Wasserbildung erst im Beginne oder schon grösstentheils verschwunden ist, selten bei einem hohen Grad der Wasseransammlung; mit ihr lassen sich sehr schicklich die harntreibenden Mittel verbinden.

§. 1600.

Die angegebenen Mittel sind vorzüglich wirksam, wenn man sie unmittelbar auf das Organ wirken lässt, in welchem der Prozess der Wasserbildung geschieht. Wir wenden daher örtlich bald Blutentleerungen, besänftigende Einreibungen und antagonistisch wirkende

Mittel, bald erregende und stärkende Mittel an, um die Lebensthätigkeit in dem leidenden Theile umzustimmen.

§. 1601.

b) *Ausleerung des schon vorhandenen Wassers.* Dieselbe geschieht in der Regel auf dem Wege der Absonderungen und zwar vorzüglich der des Urins, wobei zugleich die Resorption in dem leidenden Theile erhöht werden muss; ausserdem durch unmittelbare Entleerung des Wassers durch mechanische Mittel.

§. 1602.

Um die Absonderungen im allgemeinen zu befördern, dient vorerst eine hinreichende Menge von Getränk. Es wurde dieses in frühern Zeiten dem Kranken entzogen, es ist aber zuverlässig im Ganzen besser, dem Kranken dasselbe zu gewähren. Ich sah sehr häufig auf den Genuss von reichlichem Getränk eine Urinabsonderung eintreten, wodurch nicht allein das genommene Wasser, sondern auch die im Körper angesammelte Flüssigkeit ausgeleert wurde. Nur wenn der Harnabgang, z. B. wegen Desorganisation der Nieren, nicht mehr zu Stande zu bringen ist, muss sich der Kranke so viel wie möglich des Trinkens enthalten. Am schicklichsten sind im allgemeinen indiffirente, einhüllende oder gelind auflösende Getränke, wie z. B. die oben ausgeführte Abkochung von Graswurzel etc., indem sie in jeder Art der Wassersucht genommen und in ziemlich reichlichem Maasse getrunken werden dürfen; wählt man aber Getränke mit stärkerer Arzneiwirkung, wie z. B. diuretische oder erregende Getränke, so muss ihre Menge mehr beschränkt und ihre Wirkung bei der Anwendung der übrigen Arzneimittel mit in Rechnung gebracht werden. Giebt man Getränke, um auf die Harnabsonderung zu wirken, so lässt man sie mehr kühl nehmen, will man aber die Hautausdünstung erregen, warm.

§. 1603.

Der schicklichste Weg, um das Wasser auszuleeren, ist in der Regel die Harnabsonderung. Durch sie kann am schnellsten viel Wasser entfernt werden, die ausgeleerte Flüssigkeit führt meistens auf diesem Wege keine oder wenig ernährende Bestandtheile mit hinweg, die Ausleerung selbst erfordert keine grosse Anstrengung der Natur und die Anwendung der Heilmittel zerrüttet nicht so leicht, wie z. B. die der abführenden Mittel, die Verdauung.

Es können die diuretischen Mittel in folgenden Reihen aufgeführt werden:

a) Die kühlenden diuretischen Mittel: Der Cremor Tartari, Kali nitricum, insbesondere beide in Verbindung mit einander, Kali aceticum, Tartarus boraxatus und andere Salze, die kohlensauren Wasser, namentlich das Fachinger, das Selterser, das Rippoltsauer Wasser, die vegetabilischen und die Mineralsäuren, namentlich die verdünnte Schwefelsäure, so wie das Elixir acidum Halleri. Von Manchen wird auch das Calomel zu den diuretischen Mitteln gezählt. Diese Mittel sind vorzüglich in der entzündlichen Wassersucht passend, können jedoch auch mit einer gewissen Beschränkung im Hydrops frigidus neben den andern Mitteln gebraucht werden.

b) Die weder kühlend noch erregend wirkenden (indiffirenten) harntreibenden Mittel. Hier verdient vorzüglich die Digitalis purpurea (Nro. 90) erwähnt zu werden, welche zwar allerdings eine vorübergehende erregende Wirkung zeigt und sodann die Herzthätigkeit vermindert, aber in der kleinen Gabe, in welcher sie schon diuretisch wirkt, weder die eine noch die andere Folge hat oder nur in unbedeutendem Grade äussert, so dass sie sowohl in der entzündlichen als in der sog. kalten Wassersucht gebraucht werden kann. Auch kann man sie mit Mitteln in Verbindung geben, die die Gesammtwirkung des ge-

gebenen Mittels mehr der einen oder der andern Art der Wassersucht anpassen, so z. B. verbindet man die Digitalis im Hydrops inflammatorius mit Calomel und im Hydrops frigidus mit Squilla, aromatischen Wassern, dem Spiritus nitrico aethereus etc. Viele Aerzte geben eine halbe oder eine ganze Drachme in Aufguss; ich finde, dass diese Gabe in der Regel nicht lange ertragen wird, und dass dagegen 12—15 Grane im Aufguss von 6 Uncen, alle 2 St. 1 L. v., schon wirksam sind und längere Zeit anhaltend fortgebraucht werden können. — Hieher gehören auch die Wurzeln von Ononis spinosa, die Spargeln, gelbe Rüben, Pastinakwurzel etc.

c) Die erregenden, die scharfen und die tonischen harntreibenden Mittel. Oft sind mehrere dieser Wirkungen in einem Mittel vereinigt und sie finden auch sämmtlich ihre Anwendung in dem Hydrops frigidus, so dass sie hier zusammengefasst werden können. Man wählt übrigens nach dem Zustand der Lebenskräfte und nach andern Anzeigen, welchen durch die Nebenwirkung der nunmehr anzuführenden harntreibenden Mittel entsprochen wird, bald das eine, bald das andere derselben. Mehr in die erste Reihe gehören die Herba Petroselini, Baccae Juniperi, Turiones Pini, Herba Sabinae, Rad. Senegae, Rad. Levistici, die versüssten Säuren, namentlich Spiritus nitrico aethereus, Terpenthin und Terpenthinöl und die übrigen balsamischen Mittel. In die zweite Reihe können gesetzt werden die Selleriewurzel, Meerrettig, Squilla, (Nr. 92), (nach der Digitalis wohl das vorzüglichste Mittel in der Wassersucht), das Colchicum autumnale, der Tabak, die Coloquinten, so wie auch andere Drastica in kleinen, nicht abführenden Gaben, die Laugensalze, die Canthariden, so wie die Kellerwürmer etc. In die dritte Reihe endlich gehören die Pyrola umbellata, die Ballota lanata, die Radix caincae, die Folia uvae ursi.

Man wendet auch die urintreibenden Mittel äusserlich

an und lässt z. B. das Terpenthinöl in Spiritus Juniperi aufgelöst oder die Cantharidentinctur mit Weingeist verdünnt in die Nierengegend einreiben.

§. 1604.

Ein anderer Weg, um das Wasser auszuleeren, ist die Erregung von Durchfällen; man wählt denselben in der Regel, wenn die Urinabsonderung nicht mehr zu Stande gebracht wird, in hohem Grade der Wassersucht, und giebt die abführenden zwischen den harntreibenden Mitteln. Man wählt weniger die Salze, als die drastischen Mittel, das Calomel, in Verbindung mit Jalappenwurzel, die Senna, Aloe, Coloquinten, Gratiola, Scammonium, Gummi Guttae, Krotonöl. [1]) Diese Mittel schwächen übrigens sehr die Verdauung und die Kräften und vermögen auch Gelbsucht zu veranlassen.

§. 1605.

Die schweisstreibenden Mittel schaden nicht so leicht, als die so eben angeführten, und wirken, wo sie Platz finden können, vortrefflich, es lässt sich aber ein solcher Erfolg nur in wenigen Fällen von ihnen erwarten, da die Haut in der Regel durchaus nicht zum Schweisse geneigt ist. Sie sind angezeigt, wenn die Haut eine Neigung zur Ausdünstung zeigt, und sind oft in der Hautwassersucht, die in Folge von Rheumatismen, Rothlauf, Scharlachfieber, Krätze etc. entstanden ist, sehr wirksam. Man wählt die gewöhnlichen schweisstreibenden Mittel, den Liquor Ammonii acetici, den Brechweinstein in kleinen Gaben, das Doversche Pulver, schweisstreibende Thee, das Schweissbad etc.

1) Viele dieser Mittel sind in den sehr zusammengesetzten Pilul. hydragog. Janini enthalten, wovon die Formel in Selle Med. clin. zu finden ist.

§. 1606.

Die Brechmittel werden nicht angewandt, um durch das Erbrechen Flüssigkeit zu leeren, wiewohl auch schon die Krise auf diesem Wege geschah, sondern um durch die Erschütterung des Nervensystems sowohl eine Umstimmung in der Thätigkeit der resorbirenden Gefässe, als in den aussondernden Organen zu bewirken, und dadurch die Absonderungen wieder in Gang zu bringen.

§. 1607.

Indem man die Absonderungen erregt, wirkt man mittelbar, auf antagonistischem Wege, auch auf die Resorption der ausgetretenen Flüssigkeiten; es scheinen aber auch manche der angegebenen Mittel unmittelbar auf die Resorption zu wirken, ja es scheint zum Theil ihre, die Absonderungen befördernde Eigenschaft nur secundär zu sein. Die vorzüglichsten, bei der Wassersucht gebräuchlichen, auf die Resorption wirkenden Mittel sind die Antimonialien, vorzüglich der Tartarus emeticus in kleinen Gaben, die Mercurialien, vorzüglich das Calomel, die Digitalis, die Flores Arnicae und die Rad. Senegae, das Jod, von welchem ich übrigens bis jetzt noch keinen grossen Erfolg in der Wassersucht gesehen habe. — Diese Mittel unterstützt man mit äusserlichen: Einwicklung der wassersüchtigen Theile in erwärmte und mit aromatischem Rauche, z. B. von Wachholderbeeren oder Bernstein, durchdrungene Tücher; Compression durch Einwicklung, das Auflegen von erwärmten Sand-, Asche-, aromatischen Kräutersäckchen, erregende Einreibungen, z. B. von Spiritus Juniperi, mit Zusatz von Liquor Ammonii causticus oder der Tinctura cantharidum, Meerzwiebelessig etc., Einreibungen von erwärmten fetten Oelen, Hautreitze, Senfteige, Blasenpflaster, selbst Moxen.

§. 1608.

Ausser dem Wege der Absonderung kann auch das

Wasser unmittelbar durch Scarification und die Paracentese entleert werden.

§. 1609.

Was die in der Wassersucht zu befolgende Diät betrifft, so wurde schon oben das Nöthige über den Genuss des Getränkes angegeben. Bei der entzündlichen Wassersucht ist übrigens die antiphlogistische Diät und bei jener, die als wahre Cachexie erscheint, eine leicht verdauliche und gut nährende Kost zu wählen und das gesunkene Wirkungsvermögen durch den Genuss einer mässigen Portion Wein zu unterstützen. Auch ist dem Kranken eine trockene Luft und, so lange ihn es nicht zu stark angreift, eine mässige active oder passive Körperbewegung im Freien zuträglich.

§. 1610.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Unter den lästigen Zufällen der Wassersucht verdient die Verstopfung erwähnt zu werden, welche um so mehr durch leichte, die Verdauung nicht störende oder die Körperkräfte schwächende Mittel gehoben werden muss, als sie und die hiedurch veranlassten Stockungen im Pfortädersystem eine mitwirkende Ursache der Wassersucht werden können. — Die manchmal vorkommenden Harnbeschwerden sind zuweilen durch den Gebrauch der diuretischen Mittel selbst erzeugt, es muss sodann mit ihnen ausgesetzt und schleimigtes Getränk gegeben werden; sind Canthariden die Ursache, so dienen Emulsionen mit Kampher. — Den Husten, bei der Brustwassersucht, sucht man durch besänftigende Mittel, die Verdauungsbeschwerden bei der Bauchwassersucht durch Stomachica zu heben u. s. w.

§. 1611.

Die Regeln der Behandlung der Wassersucht, wie sie so eben angegeben worden sind, finden ihre An-

wendung bei allen einzelnen Arten dieser Krankheit, doch ist in Beziehung auf dieselben noch besonders zu bemerken:

Die *Hautwassersucht* darf, wenn sie mit innerer Wassersucht in Verbindung steht, nur mit besonderer Vorsicht mit den örtlichen, auf die Resorption wirkenden Mitteln, wie sie im §. 1607 angegeben worden sind und wozu man sich bei dem Oedem der Füsse auch des Schnürstrumpfes bedienen kann, behandelt werden, indem zuweilen bei Verminderung der Wasseransammlung in der Haut die innern Beschwerden zunehmen. Man darf dieselben nur in dem Falle fortsetzen, wenn auf ihren Gebrauch das Leiden der innern Theile nicht zunimmt und das Wasser reichlich fliesst. — Bei dem Oedem der Füsse ist eine horizontale Lage zu empfehlen. — Auf Scarificationen entleert sich manchmal nur wenig Wasser, so dass die Operation ohne Erfolg ist, oft aber auch eine ausserordentlich grosse Menge von Flüssigkeit, so dass hierdurch allerdings die Wassergeschwulst zusammensinkt, aber auch eine tödtliche Erschöpfung der Kräfte eintreten kann. Auch gehen zuweilen die scarificirten Stellen in den Brand über. — Durch Blasenpflaster wird in der Regel nur wenig Wasser entleert und es kann durch dieselben zu brandigen Hautstellen Veranlassung gegeben werden.

§. 1612.

Bei dem durch Quetschungen bei der Geburt entstandenen *äussern Wasserkopf*, dienen, insofern er sich nicht, wie die gewöhnliche Kopfgeschwulst, von selbst vertheilt, warme, aromatische Umschläge oder Umschläge von Salmiakauflösung, Bleiwasser, adstringirenden Abkochungen, und wenn die Geschwulst auf diese Weise nicht weicht und im Gegentheil mehr gespannt wird und die Wärme sich vermehrt, erweichende

Breiumschläge und nach *Gölis*[1]) ein auf den höchsten Gipfel der Geschwulst gesetztes Kaustikum, welches nur die Oberhaut verletzen darf und in einer geringen Eiterung erhalten werden muss; bildet sich Eiterung in der Geschwulst, so muss dieselbe geöffnet werden.

Die bei Neugeborenen vorkommenden umschriebenen Geschwülste, welche als partieller, aponevrotischer oder periostischer Wasserkopf oder als eine Blutgeschwulst (Cephalaematoma neonatorum), welche beide Krankheitszustände wohl nicht vor der Oeffnung der Geschwulst unterschieden werden können, erkannt werden, können mit aromatischen Umschlägen und dem Compressivverband 7 — 14 Tage hindurch behandelt werden und müssen sodann nach der ältern und von den meisten Neuern angenommene Methode mit der Lanzette geöffnet werden; nach *Gölis*[2]) jedoch werden sie passender mit dem Causticum behandelt. Nach demselben wird an dem höchsten Punkte der Geschwulst, die Haut mit Lapis infernalis, bis zur Verletzung des Oberhäutchens, leise gerieben, oder eine Pasta von Aetzstein und lebendigem Kalk, mit einigen Tropfen Weingeist bereitet, so lange auf die angegebene Stelle aufgelegt, bis gleichfalls Verletzung der Epidermis erfolgt, oder es wird durch ein Stückchen Vesicatorpflaster ein kleines Bläschen hervorgebracht. Die Verwundung durch das Causticum oder durch das Vesikatorpflaster darf nicht grösser als ein Silberkreuzer sein und wird durch Digestivsalbe in Eiterung erhalten.[3])

1) A. a. O. II. 195. — 2) A. a. O. II. 198. — 3) Gegen diese Behandlungsweise hat Zeller in seiner Inaugural-Dissertation (de Cephalaematomate recens nat. Heidelb. 1822. Praes. Naegele) Einwendungen erhoben, welche Gölis (in s. a. W. II. S. 201.) zu widerlegen sucht, und dabei anführt, dass von 91, von ihm auf seine Weise behandelten Kindern keines Gichter bekam und keines

Entsteht der partielle äussere Wasserkopf in Folge von Metastasen, in welchem Falle aber die Flüssigkeit meistens Eiter ist, oder in Folge der Zerreissung eines lymphatischen Gefässchens, oder bildet sich eine Wasserbalggeschwulst, oder eine Ansammlung von jauchigter Flüssigkeit in Folge von Gichtstoff, Scropheln oder venerischem Gifte, oder entsteht eine ähnliche, jedoch in der Regel Eiter enthaltende Geschwulst in Folge des Stiches eines Insectes, des Sonnenstiches etc., so ist in der Regel die Geschwulst zu öffnen und weiterhin chirurgisch zu behandeln. Hängt das Leiden, wie namentlich die erwähnte Ansammlung von Jauche unter der Beinhaut, mit einer Cachexie zusammen, so ist diese zu heben und in dem erwähnten Fall in der Regel die stärkende Methode passend. Bei dem allgemeinen äussern Wasserkopfe, welcher oft auf Unterdrückung von Ausschlägen und nässenden Stellen am Kopfe oder auch durch Metastasen von andern Theilen entsteht, sucht man die unterdrückte Absonderung wieder in Fluss zu bringen und öffnet die Geschwulst an der am meisten hervorragenden Stelle. Zertheilende Umschläge sind hier zu verwerfen, indem sie eine Metastase nach innern Theilen veranlassen können. Als Nachkur empfiehlt *Gölis* das Tag und Nacht fortgesetzte Tragen von Flanellhauben, welche von Zeit zu Zeit getrocknet, durchräuchert und mit Campher bestrichen werden müssen, oder Mützen, mit aromatischen Kräutern gefüllt, aufgesetzt.

§. 1613.

Der *innere chronische Wasserkopf*, welchen die meisten Aerzte für unheilbar erklären, wird nach *Gölis*

starb, während die Incisionen öfters Gichter veranlassen und bei der Behandlung mit Incisionen gewöhnlich der Zehnte starb.

Versicherung durch seine Heilmethode [1]) oft gründlich geheilt. Die Kopfhaare müssen kurz abgeschnitten werden und der Kopf einmal täglich mit einer Salbe von 6 Drachm. Ung .Juniperi und 3 Drachm. bis $\frac{1}{2}$ Unz. Ung. neapolitanum, in der Menge von 1 bis höchstens 2 Quentchen, gut durchschmiert werden, worauf eine genau passende Haube von Flanell oder dichtem feinem Tuch aufgesetzt wird. Ist der Kranke zu Durchfällen geneigt, so erhält er $\frac{1}{4}$ Gran, ist er hartleibig $\frac{1}{2}$ Gran Calomel ein- bis zweimal täglich; treten aber stärkere Durchfälle ein, so wird mit diesem Mittel ausgesetzt und nur mit den Einreibungen fortgefahren. Bei Spuren von Speichelfluss, so wie auch bei eintretender Besserung, werden beide Mittel in etwas längern Zwischenräumen in Anwendung gebracht, die Haube aber immer sorgfältig beibehalten. Hiebei werden von Zeit zu Zeit gelind reitzende Laugenbäder angewandt, die Diät aufs Sorgfältigste geordnet, wobei insbesondere, während des Gebrauches des Calomels, Säuren verhütet werden müssen, und die Kinder viel ins Freie gebracht. — Bemerkt man binnen 6 oder 8 Wochen keine Veränderung der Krankheit und geht der Urin sparsam, so werden leichte diuretische Mittel verordnet, z. B. die Terra foliata Tartari und das Oxymel squilliticum und Fontanelle zu beiden Seiten des Hinterhauptsloches oder auf beide Oberarme gesetzt. — Zuweilen thun bei der Anwendung dieser Heilmethode örtliche Blutentleerungen vorzügliche Dienste, wenn sich nämlich ein Entzündungszustand der Gehirnhäute oder Congestionen nach dem Kopfe zu dem chronischen Wasserkopf hinzugesellen. — Leidet der Kranke, neben dem chronischen Wasserkopfe, an einer Dyscrasie, z. B. Scropheln und Rhachitis, so verbindet

1) A. a. O. II. 128 u. d. f.

man mit den oben angegebenen Heilmitteln die gegen diese Cachexien gebräuchlichen Mittel, die meistens wohl zusammen passen, nur sind bei der Rhachitis reichlichere Gaben von Calomel weniger zuträglich, und es muss daher die Gabe auf $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{3}$ Gran alle 2 Tage beschränkt werden. Bei der scorbutischen Dyscrasie kann obige Methode gar nicht in Gebrauch gezogen werden und es muss daher ihrer Anwendung die Heilung des scorbutischen Leidens vorhergehen.

Ausser den bei dieser Methode angegebenen Mitteln sind sehr vielfache Heilmittel gegen den chronischen Wasserkopf empfohlen worden, schon von *Hippokrates* die Cauterien, von Andern Einschnitte, Blasenpflaster, Haarseile, aromatische Umschläge auf den Kopf, allmählige Compression des Schädels und verschiedene drastische, diuretische, schweisstreibende und stärkende Mittel. In der neuesten Zeit hat man wiederum die Punction in Vorschlag gebracht.

§. 1614.

Von *der hitzigen Gehirnhöhlenwassersucht* ist nunmehr folgende Behandlungsweise als die beste anerkannt: Im Zeitraum der Turgescenz müssen vor Allem Blutentleerungen und zwar in reichlicher Menge vorgenommen werden. *Gölis* bestimmt die Quantität derselben dahin, dass bei vollsaftigen Kindern in den ersten 6 Monaten 2, 3 und auch im dringendsten Falle, bei dem heftigsten tumultuarischen Eintritte, 4 Uncen Blut entleert werden sollen, von diesem Alter bis zu einem Jahre 3, 4, auch 5 Uncen; im zweiten, dritten und vierten Jahre erfordert die Heftigkeit der Zufälle oft eine Blutlassung von 4, 5 — 6 Uncen und in höherem kindlichen Alter könne noch mehr entleert werden. Die hier angegebenen grössern Quantitäten von Blut sind gewiss nur mit grosser Vorsicht und nur bei dem heftigsten Grade der Entzündung zu entleeren.

Neben den Blutentleerungen, die auch wiederholt werden können, wendet man das Calomel an, am besten, nach *Gölis*, Kindern von 1—5 Monaten ¼ Gran, von 6 Monaten bis zu 1 und 2 Jahren ½ Gran Calomel alle zwei Stunden. Bei hartleibigen Kindern kann man diese Gabe alle Stunde reichen und auch ein Paar Grane geröstete Jalappenwurzel zusetzen. Andere Aerzte geben 2, 3 und mehrere Grane Calomel pro dosi. Gut ist's, nebenbei einhüllend-besänftigende Mittel zu geben, eine Abkochung von Eibischwurzeln, die arabische Emulsion, dünne Oelmixturen. Das dritte Hauptmittel sind in dieser Periode kalte Umschläge von Wasser oder von gestossenem Eis, in eine Schweinsblase gehüllt, auf den Kopf, oder die, vorzüglich von *Formey* und *Heim* empfohlenen kalten Begiessungen des Kopfes, welche Tag und Nacht hindurch häufig wiederholt werden müssen. — Ausserdem sind empfohlen worden und können mit zu Hülfe gezogen werden Einreibungen von grauer Quecksilbersalbe am Halse und in den Weichen, warme Bäder, Fussbäder und Bähungen der Füsse mit Senfmolken, so wie Senfteige auf dieselben gelegt, Blasenpflaster in den Nacken, welche nur nach gebrochener Heftigkeit der Entzündung und im Zeitraum der beginnenden Ausschwitzung passend sein möchten. *Cullen* und *Monro* liessen ein grosses Blasenpflaster auf den abgeschorenen Kopf legen.

Im Zeitraum der erfolgten Ausschwitzung kann diese Behandlung, mit Ausnahme der Blutentleerungen, fortgesetzt werden; insbesondere empfiehlt *Formey* die kalten Begiessungen des Kopfes, die nach demselben noch in diesem Stadium zuweilen Heilung bewirken sollen. Man verbindet nun gewöhnlich mit dem Calomel die Digitalis, lässt Einreibungen von Meerzwiebelessig und Canthariden-tinktur am Unterleibe vornehmen und giebt, wenn Lähmungen sich einstellen, Arnica, Campher, Moschus.

Nach *Gölis*, mit dessen Erfahrungen auch bis jetzt die meinigen übereinstimmen, ist in diesem Zeitraum Rettung unmöglich, und er giebt daher den Rath, sich auf die Palliativkur zu beschränken, wo er besonders als ein nervenberuhigendes Mittel einen Aufguss der Digitalis empfiehlt.

§. 1615.

Um bei der, mit *Spina bifida* verbundenen Rückgrathswassersucht das Wasser zu entleeren, hat man die Punktion der Geschwulst, insbesondere durch Nadeleinstiche, empfohlen; es sind jedoch nur sehr wenige Fälle von geglückter Heilung bekannt. *A. Cooper* empfiehlt durch eine Bandage, welche fortdauernd liegen gelassen werden muss, die Geschwulst zurückzuhalten.

§. 1616.

Die Behandlung der *Brustwassersucht* ist nach den oben angegebenen Regeln der Behandlung der Wassersucht im Allgemeinen einzurichten. Oft muss man mit den harntreibenden Mitteln die Expectorantia verbinden, in welchem Falle man auch gerne solche Diuretica wählt, die zugleich den Schleimauswurf befördern, wie z. B. die Squilla und die Senega. Als Radicalmittel wird die Paracentese der Brust in seltenen Fällen anwendbar sein, indem bei der als Cachexie auftretenden Wassersucht die Heilung dadurch nicht erreicht wird und bei der als pleuritisches Extravasat erscheinenden Wasseransammlung in der Brusthöhle dieselbe in der Regel nicht nothwendig ist, da auch sehr bedeutende derartige Extravasate wieder aufgesogen werden; doch kann durch die Paracentese in dringenden Fällen die Erstickungsgefahr beseitiget und dadurch Zeit zur Heilung gewonnen werden.

§. 1617.

Die *Herzbeutelwassersucht* macht wegen der dadurch plötzlich eintretenden Gefahr die sorgfältigste Vermei-

dung der Gemüthsbewegungen und rascher Körperbewegung nothwendig. — Die von *Skielderup*[1]) empfohlene Trepanation des Brustbeins und Oeffnung des Herzbeutels wurde auch von *Laennec* vorgeschlagen, doch die Operation nicht von ihm ausgeführt.

§. 1618.

Bei der *freien Bauchwassersucht* ist, wenn die innerlichen Mittel nicht mehr wirken und der Leib gespannt und die Schwappung deutlich ist, die Entleerung des Wassers durch den Bauchstich angezeigt. Es ist diese Operation nicht allein ein Palliativmittel, sondern zuweilen selbst ein Radicalmittel; auch hat man bemerkt, dass nach der Vornahme derselben die Arzneimittel wieder wirksamer werden. Man räth gewöhnlich den Bauchstich wiederholtermalen vorzunehmen, bevor sich das Wasser in bedeutendem Grade ansammelt; dieser Rath scheint mir die Beschränkung zu verdienen, es nur dann zu thun, wenn die Ansammlung des Wassers nicht zu rasch geschieht, denn ist dieses der Fall, so hat die häufige Entleerung des Wassers, wegen der stets erneuerten und in sehr bedeutender Menge erfolgenden Absonderung in der entleerten Höhle, eine schnelle Verzehrung der Kräften des Körpers zur Folge, wo hingegen bei der einmal vorhandenen Wasseransammlung der Krankheitsprozess oft lange stehen bleibt oder nur langsam vorrückt.

Die *Bauchsackwassersucht* kann nicht wohl durch innerliche Mittel geheilt werden und es ist hier immer chirurgische Hülfe nothwendig.

§. 1619.

Gegen die *Wassersucht der Gebärmutter* werden die gewöhnlichen innern Mittel empfohlen; ausserdem

1) De trepanatione sterni et apertura pericardii, in Act. nov. Societat. Havniens. Vol. I. 1818 pag. 130.

werden gegen die Verschliessung des Muttermundes aus Krampf erweichende Dämpfe, Bäder und besänftigende Einspritzungen, bei Verschliessung des Muttermundes durch Lymphpfröpfe u. s. w., das Einbringen eines weiblichen Catheders in denselben, bei Verwachsung desselben, ihre Trennung durch schneidende Instrumente, oder bei deren Unmöglichkeit die Paracentese des Uterus angewandt.

§. 1620.

Die *Wassersucht der Eierstöcke* wird nicht leicht durch innerliche Mittel gehoben. Die Punction gewährt nur palliative Hülfe, weswegen verschiedene andere chirurgische Verfahrungsweisen angegeben worden sind, von denen aber bei der gewöhnlich gleichzeitig vorhandenen scirrhösen Entartung des Eierstockes nur die Exstirpation desselben radicale Heilung bewirkt.

Die Windsucht.

(*Pneumatosis.*)

Combalusier (Par. 1747). — *Delius* (a. d. Lat. 1759, Nürnb. 1762). — *Trnka de Krzowitz* (lat. Wien 1788). — *Ackermann* (Alt. u. Nürnb. 1800). — *Fodéré* (Strasb. 1829).

§. 1621.

Die zur Bezeichnung der krankhaften Gasansammlung gebräuchlichen Wörter haben eine verschiedene Bedeutung, indem die einen, wie Luftgeschwulst und Emphysema, blos das Vorhandensein von Luft in einem Theile, die andern aber, wie Windsucht und Pneumatosis, nicht sowohl das Vorhandensein von Gas, welches auch von aussen in das Zellgewebe oder die Höhlen des Körpers eingedrungen sein kann, als vielmehr einen krankhaften

Zustand des Körpers bezeichnet, in welchem sich auf eine krankhafte Weise Gas entwickelt, und in welchem derselbe gleichsam die Sucht, Gas zu bilden, zeigt.

Nur der letztere Krankheitszustand gehört eigentlich hieher, doch ist es zweckmässig, auch die Luftansammlungen zu betrachten, in welchen das Gas nicht durch einen Krankheitsprozess im Körper erzeugt, sondern in denselben auf irgend eine Weise hineingekommen ist.

§. 1622.

Im Allgemeinen giebt sich die Gasansammlung im Körper durch eine Geschwulst, die gespannt und elastisch ist, einen hohlen Schall oder ein knisterndes Geräusch beim Anschlagen oder Drücken derselben, mehr oder weniger gehemmte Verrichtung des leidenden Organs, und die eigentliche Windsucht noch ausserdem durch ein cachectisches Aussehen des Kranken und Abmagerung des Körpers zu erkennen.

§. 1623.

Die abnorme Gasansammlung hat ihren häufigsten Sitz im Unterleib (die Trommelsucht, Tympanites, Hydrops siccus et flatulentus) und zwar findet dieselbe entweder in dem Magen und den Gedärmen statt (Darmwindsucht, Tympanites intestinalis, Pneumatosis intest.), oder in der Bauchhöhle (Bauchwindsucht, Tympanites oder Tympania abdominalis).

Geringe Gasansammlungen (Blähungen, Flatulenz) kommen häufig in dem Magen und dem Darmkanal, oft bei sehr gutem Befinden vor und gehören nicht wohl zur eigentlichen Windsucht, indem sie nichts anderes zu sein scheinen als Entwicklung von Luft aus den in dem Darmkanal enthaltenen Stoffen. Die Gasansammlung im Magen giebt sich durch Auftreibung in der Herzgrube, Neigung zum Aufstossen und Austreiben von Blähungen (Ructus), welche geruch- und geschmacklos, aber auch sauer und von anderm übeln Geruche sein können, so

wie durch ein Gefühl von Spannung und zuweilen auch durch Magenkrämpfe, welche durch das Aufräupsen gemildert werden, zu erkennen. — Findet eine solche leichte Gasanhäufung in den Gedärmen statt, so äussert sich dieses durch ein Gurren und Kollern im Leibe, zuweilen durch kolikartige oder auch dem Seitenstich ähnliche Schmerzen, manchmal durch theilweise Auftreibung des Leibes und durch erleichternden Abgang von Blähungen.

§. 1624.

Bei Kindern ist die Flatulenz eine sehr häufige Erscheinung. Gewöhnlich veranlasst dieselbe Kolikschmerzen, wesshalb die Kinder oft stark schreien und mit den Füssen zappeln, bis Blähungen abgehen, worauf gewöhnlich der Schmerz nachlässt. Oft leiden sie zugleich an saurem Aufstossen, Erbrechen, Verstopfung oder Durchfall mit grünlichen, wie gehackt aussehenden, Stuhlentleerungen. Bei stärkerer Luftansammlung wird der Leib aufgetrieben und gespannt, besonders ist dieses in der Herzgrube der Fall und das Athmen wird hiebei kurz und ängstlich (das Herzgespann oder Angewachsensein). Zuweilen kommen selbst Zuckungen hinzu.

§. 1625.

In der ausgebildeten Windsucht des Unterleibes scheint in der Regel Darm- und Bauchwindsucht mit einander verbunden zu sein, und es lässt sich wohl auch selten die eine von der andern mit Sicherheit unterscheiden, wenn nicht die Geschichte der Entstehung den Sitz der Krankheit bestimmter anzeigt.

Bei der Darm- Bauchwindsucht schwillt der Leib oft ausserordentlich an, selbst wie im letzten Monate der Schwangerschaft, er ist meistens gleichförmig ausgedehnt, zeigt jedoch auch manchmal an einzelnen Stellen stärkere Auftreibungen als an andern, er ist sehr gespannt, elastisch und giebt bei dem Anschlagen einen starken Schall. Es fehlt das Schwappen und bei dem Umwenden

von einer Seite auf die andere sinkt nicht die Geschwulst auf diese Seite hin, wie dieses bei der Bauchwassersucht der Fall ist. Das Athmen ist mehr oder weniger erschwert, die Verdauung gestört, der Stuhl verstopft, der Kranke leidet an Erbrechen, Schluchzen, Brennen im Leibe, kolikartigen Schmerzen und findet vorübergehend Erleichterung, wenn Blähungen abgehen. Der Harn geht wie bei der Wassersucht sparsam ab und ist auch, wie in dieser Krankheit, meistens braun und trübe. Allmählig zehrt der Kranke ab und es bildet sich ein hectisches Fieber aus, oft aber gesellt sich zu der Trommelsucht die Bauchwassersucht hinzu oder es geht vielmehr die Windsucht in die Wassersucht über.

§. 1626.

Nicht selten bildet sich im Verlaufe von Nerven- und Faulfiebern, Darm- und Bauchfellsentzündung, dem Kindbettfieber etc. eine hitzig verlaufende Darm- und Bauchwindsucht (Meteorismus) aus, welche zwar die Gefahr der schon bestehenden Krankheit erhöht, doch wenn diese gehoben wird, ebenfalls verschwindet.

§. 1627.

Eine seltene Art der Windsucht ist die Luftansammlung in der Gebärmutterhöhle (Physometra). Es kann sich dieselbe bilden, wenn auf irgend eine Weise der Muttermund verschlossen wird. Die Gebärmutter wird hiebei wie in der Schwangerschaft ausgedehnt und ist als eine elastische Geschwulst in der untern Bauchgegend fühlbar. Zuweilen wird ein Theil der angesammelten Luft durch den Muttermund und die Scheide ausgetrieben (Flatus uterini). Auch sollen sich manchmal in der Schwangerschaft an den Eihäuten häutige Luftblasen bilden (Molae aereae, ventosae), welche zuweilen platzen.

§. 1628.

Häufiger ist die Luftansammlung in der Brusthöhle und in dem Lungengewebe.

Die Ansammlung von Luft in der Pleuralhöhle (Pneumothorax) hat als beständige Erscheinung einen gewissen Grad von Schwerathmigkeit, dagegen ist der Husten kein wesentliches Symptom. Die Erkennung dieses Zustandes kann übrigens allein mit Sicherheit durch die Vergleichung der Resultate geschehen, welche man durch die Untersuchung mit dem Stethoscop und durch die Percussion gewinnt. Wenn die eine Seite der Brust besser tönt als die andere, wobei sie zugleich auch ausgedehnt sein kann, und man dabei auf dieser Seite durchaus kein Respirationsgeräusch wahrnimmt, während es auf der andern, weniger gut tönenden Seite vorhanden ist, so ist es sicher, dass auf der, einen stärkern Schall gebenden Seite der Brust ein Pneumothorax vorhanden ist. Eine Täuschung kann hier eintreten, wenn die Lunge an einer Stelle mit der Brustwandung verwachsen ist, wo man sodann an dieser Stelle das Respirationsgeräusch wahrnimmt; man muss daher, um sicher zu sein, den Kranken an mehreren Stellen der Brust untersuchen. — Ist zugleich neben dem Pneumothorax ein wässerigtes, eiteriges oder blutiges Extravasat vorhanden, so erkennt man dasselbe, so wie seinen Sitz daran, dass bei Abwesenheit des Respirationsgeräusches an beiden Stellen, die Percussion an dem Sitze des Extravasates einen sehr matten Ton giebt, während dieselbe an der Stelle, wo Gas angesammelt ist, einen starken Schall zeigt; auch nimmt man, wie schon *Hippokrates* beobachtete, ein schwappendes Geräusch wahr, wenn man den Kranken an beiden Schultern fasst und etwas schüttelt. Dieses Geräusch bemerken die Kranken auch zuweilen selbst bei Bewegung des Körpers. — Ist Gas und tropfbare Flüssigkeit zugleich angesammelt und steht die Pleural-

höhle mit einem Luftröhrenast in Verbindung, wo sodann bei dem Athmen die eindringende athmosphärische Luft mit dem Extravasat in Berührung kommt, so hört man das metallische Klingen oder ein klingendes Geräusch, wie wenn man in einen Krug bläst.

§. 1629.

Bei der **Leichenöffnung** ist es, um den Pneumothorax zu erkennen, nothwendig, dass man den Thorax zuerst mit einem feinen Einstich öffne, damit man die Entweichung der Luft wahrnehmen kann. Die Lunge ist in den hintern Theil der Brusthöhle zurückgedrängt.

§. 1630.

Die Ansammlung der Luft in ausgedehnten Lungenbläschen, so wie der Austritt derselben in das Gewebe der Lunge oder des Pleuralüberzuges ist das **Lungenemphysem**. *Laennec* nimmt zwei Arten desselben an:

1) Das *Bläschen-* oder *eigentliche Lungenemphysem*. Die Kranken leiden an einer habituellen Engbrüstigkeit, welche sich beim Gehen, Treppensteigen, nach starken Mahlzeiten, Gemüthsbewegungen etc., und vorzüglich bei dem Hinzutritt eines hitzigen Catarrhes zu stärkern asthmatischen Anfällen steigert. In den leichtern Graden des Uebels bietet der Anblick des Kranken nichts Besonderes dar, in den höhern Graden aber hat derselbe eine erdfahle, an einzelnen Stellen ins Violette gehende Farbe, besonders an den Lippen, welche auch dick und aufgeblasen scheinen. Es ist wohl immer ein trockener oder auch von Schleimauswurf begleiteter Husten vorhanden. Wenn das Emphysem nur eine Seite einnimmt, oder auf einer Seite in einem höhern Grade als auf der andern besteht, so hat diese Seite einen grössern Umfang, die Zwischenräume zwischen den Rippen sind breiter und die ergriffene Seite giebt einen stärkern Ton bei der Percussion, obgleich auch die andere gut wiedertönt. Wenn beide Seiten leiden, giebt die Brust überall einen

sehr klaren Ton und hat eine beinahe cylindrische oder halb kugelförmige Gestalt, nach vorn und hinten gewölbt, statt der mehr eingedrückten Form, die ihr eigen ist. Bei Anwendung des Cylinders hört man in dem grössten Theil der ergriffenen Seite das Athmungsgeräusch nicht, obgleich die Percussion einen sehr guten Ton giebt, und an den Stellen, wo man es wahrnimmt, ist es sehr schwach. Ausserdem hört man von Zeit zu Zeit durch das Athmen oder den Husten, wie bei dem trockenen Catarrh, ein leichtes pfeifendes Rasseln oder das Ventilklappen, das bei der Hin- und Herbewegung des geballten Auswurfs vorkommt. Auch kommt jedoch sehr selten, ein trockenes, knisterndes Geräusch mit grossen Blasen vor, welches aber nur vorübergehend ist und nur an wenig ausgebreiteten Stellen gehört werden kann.

Diese Krankheit, welche sich schon im Kindesalter einstellen hann, hindert den Kranken oft nicht, ein hohes Alter zu erreichen, doch giebt die andauernde Respirationsbeschwerde eine böse Complication bei andern, sich zufällig einstellenden Krankheiten und die fortgesetzten, oft sehr bedeutenden Anstrengungen beim Athmen vermögen auch endlich eine Hypertrophie oder Erweiterung des Herzens hervorzubringen.

§. 1631.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Es ist in dieser Art des Lungenemphysems die Grösse der Lungenbläschen viel beträchtlicher, als gewöhnlich, und weniger gleichförmig; die meisten haben die Grösse eines Hirsekornes, einige erreichen die vom Hanfsamen und selbst von einem Kirschkerne oder einer Bohne. Diese letztern sind wahrscheinlich durch die Vereinigung mehrerer Luftzellchen, in Folge der Zerreissung ihrer Scheidewände hervorgebracht, doch giebt es auch solche, die durch Erweiterung einer einzigen Zelle gebildet zu sein

scheinen. Oft reichen die ausgedehnten Bläschen über die Oberfläche der Lunge nicht hervor, anderemale bilden sie leichte Vorsprünge, wo sodann das Lungengewebe Aehnlichkeit mit den blasigten Lungen der Batrachier gewinnt. Manchmal sind auch einige wie gestielt. Wenn man sie einschneidet, so sinkt der hervorragende Theil zusammen, unter ihm bleibt aber eine Höhlung zurück, in welcher man kleine Oeffnungen wahrnimmt, durch welche die erweiterten Luftzellchen mit den benachbarten Luftzellchen und mit Luftröhrenästchen in Verbindung stehen. Wenn die Ausdehnung der Lungenbläschen zu gross wird, so zerreissen manchmal dieselben und es bildet sich in dem die Lunge umgebenden Zellgewebe eine wahre Infiltration von Luft, derjenigen ähnlich, welche in dem Hautemphysem statt hat. Man findet sodann auf der Oberfläche der Lunge unregelmässige Blasen, welche man mit dem Finger verschieben kann und welche die Grösse eines Hanfsaamens und selbst die einer Nuss oder eines Eies haben. — Manchmal sind auch einzelne Luftröhrenäste erweitert. — Man erkennt die Charactere des Emphysems am Besten, wenn man die Lunge aufblaset, trocknet und mit einem Rasirmesser durchschneidet. — Das Emphysem kann beide Lungen oder nur eine oder nur einzelne Stellen ergreifen. Wenn das Emphysem eine sehr grosse Ausdehnung hat, so sinken die Lungen bei Oeffnung der Brusthöhle nicht zusammen, wie gewöhnlich, sondern entschlüpfen ihr gleichsam und bilden einen Vorsprung. Drückt man die Lunge in einem solchen Zustand mit den Fingern, so scheint ihr Gewebe fester als gewöhnlich zu sein und es ist schwerer, sie durch den Druck platt und schlaff zu machen. Wirft man eine emphysematöse Lunge in ein Gefäss mit Wasser, so senkt sie sich weniger, als eine gesunde Lunge ein. Das Lungengewebe ist weniger feucht, als im gesunden Zustand.

§. 1632.

2) Das *Emphysem zwischen den Lungenlappen* giebt sich durch eine, nach einer heftigen Lungenanstrengung plötzlich eintretende oder nach dem Croup, dem Catarrhus suffocativus etc. zurückbleibende, mehr oder weniger starke Schwerathmigkeit und vorzüglich durch das knisternde, trockene Geräusch mit grossen Blasen, welches in dieser Art von Emphysem sehr deutlich und andauernd ist, zu erkennen. Nebst diesem Geräusche erhält man gewöhnlich die Empfindung, wie wenn ein oder mehrere Körper mit Reibung gegen das Rippenbrustfell, oder gegen das Zwerchfell oder das Mediastinum oder die Lungenlappen herauf- und herabsteigen würden, so dass die aufsteigende Reibung bei dem Einathmen, die absteigende bei dem Ausathmen stattfindet. Diese Zeichen, welche das Stethoscop giebt, sind manchmal von einem Knistern, welches durch die Hand wahrgenommen werden kann, begleitet. Manchmal kann man das knisternde Geräusch erregen, indem man mit dem Finger an der leidenden Stelle den Raum zwischen den Rippen drückt. Die Brust giebt einen guten Wiederhall an derselben Stelle, wenn nicht zu gleicher Zeit eine Lungenentzündung oder eine andere Verstopfung der Lunge vorhanden ist. Besteht zu gleicher Zeit ein äusseres Emphysem, so trägt dieses zur Sicherheit der Diagnose bei.

§. 1633.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Dieses Emphysem besteht in einer Infiltration von Luft in dem zelligen Gewebe der Scheidewände der Lungenlappen. Diese Scheidewände erhalten eine Dicke von 1 bis 5 oder 6 Linien und manchmal beinahe von einem Zoll, und bilden auf der Oberfläche der Lunge und vorzüglich an ihren Rändern durchscheinende und genau umschriebene Streifen, welche sehr von der dunkeln Lungen-

substanz abstehen. Manchmal laufen mehrere solche Streifen paralell neben einander und lassen zwischen sich Inseln von gesunder Lungensubstanz. Oft bemerkt man am Rande von Gefässen und auch sonst unter dem Brustfelle Luftblasen, welche in grösserer Anzahl und viel gewöhnlicher vorhanden sind, als bei dem eigentlichen Lungenemphysem. Wenn dieses Emphysem an der Wurzel der Lunge sich befindet, so gewinnt es leicht das Mediastinum und verbreitet sich von da auf den Hals und in das Zellgewebe des ganzen Körpers. — Um die anatomischen Charactere gut zu untersuchen, muss man die Lunge aufblasen, um den emphysematösen Theil eine Ligatur anlegen und sodann dieses Stück trocknen.

§. 1634.

Die *Ansammlung von Gas im Zellgewebe unter der Haut* (Emphysema telae cellularis, der Hydrops siccus des Hippokrates) ist entweder nur auf einzelne Stellen beschränkt (Emph. tel. cell. partiale) oder über den ganzen Körper verbreitet (Emph. tel. cell. universale). Es äussert sich dieselbe durch eine elastische Geschwulst, wobei die Haut weder eine Veränderung der Farbe, noch der Temperatur zeigt. Beim Anschlagen an dieselbe tönt sie einigermassen und beim Drucken und Streichen nimmt man ein knisterndes Geräusch wahr, was nur in dem Falle nicht stattfindet, wenn zugleich Eiter, Wasser oder eine andere Flüssigkeit in der Geschwulst enthalten ist. Manchmal erreicht das Emphysem einen ungeheuern Umfang, wo sodann Erstickungsanfälle sich damit verbinden können.

§. 1635.

Die Ursachen der Gasanhäufungen im Körper sind das Eindringen von Luft in das Gewebe oder die Höhlen des Körpers und Ansammlung von Stoffen, die zur fauligten Zersetzung oder zur Gährung geneigt

sind, so wie verschiedenartige Zustände der belebten Theile selbst. (Vergl. §. 1636.)

Die Aufblähung der Gedärme, so wie die eigentliche Darm- und Bauchwindsucht, insbesondere werden veranlasst durch den Genuss schwer verdaulicher und blähender Nahrungsmittel, wie z. B. bei Kindern der Milch von einer Amme, welche schon lange gestillt hat, der Milch von einer im Gemüthsaffect begriffenen Mutter, eines schlecht bereiteten Mehlbreies, in Uebermass gereichte Nahrung, bei Erwachsenen der reichliche Genuss blähender Gemüse, vieles Wassertrinken etc., Verstopfung, eine sitzende Lebensart, Schwächung der Verdauung, Verkältung des Unterleibes, Durchfälle, Ruhren, entzündliche und krampfhafte Affectionen im Unterleibe, Unterdrückung der Hämorrhoiden, der monatlichen Reinigung, schnelle Unterdrückung von Durchfällen, die Hypochondrie, die Hysterie, Nerven- und Faulfieber etc. Die Bauchwindsucht wird noch ausserdem zuweilen hervorgebracht durch Verletzung der Gedärme, Zersetzung von in der Bauchhöhle befindlichem Wasser, Eiter, Blut, und durch den Brand der Gedärme.

Die Gebärmutterwindsucht kann veranlasst werden durch zufälliges Eindringen von Luft bei Ausdehnung der Gebärmutter, ferner durch das Dasein faulender Stoffe in derselben, z. B. von Resten der Nachgeburt, durch Verkältung etc.

Den Pneumothorax hat man durch Verwundung der Brustwandung und der Lunge, durch Oeffnung eines Eitersackes oder eines erweichten gangränösen Schorfes in die Brusthöhle, wodurch Luftröhrenäste mit der Brusthöhle in Communication gesetzt wurden und daher die Luft bei dem Einathmen in die Brusthöhle gelangen konnte, durch Zersetzung eines Extravasates in der Brusthöhle, und in Folge einer Brustfellsentzündung entstehen gesehen.

Das eigentliche Lungenemphysem wird vorzüglich durch einen heftigen, trockenen Catarrh hervorgebracht, ferner durch das Blasen von Instrumenten und überhaupt alle Anstrengungen, wobei die eingeathmete Luft längere Zeit in den Lungen zurückgehalten wird, durch das Einathmen von irrespirabeln Gasarten und durch Geschwülste, welche die Luftröhrenäste zusammendrücken. Die Windgeschwulst zwischen den Lungenlappen ist ebenfalls häufig die Folge der gewaltsamen Zurückhaltung der eingeathmeten Luft, z. B. bei der Entbindung, bei dem Heben schwerer Lasten etc.; bei den Kindern kommt diese Affection öfters nach dem Croup vor, bei Erwachsenen in Folge des Catarrhus suffocativus.

Die Ursachen der Windgeschwulst im Zellgewebe sind oft Verletzung der Athmungswege, z. B. der Luftröhre, auch die Luftgeschwulst zwischen den Lungenlappen, wodurch Luft aus den Athmungswegen in das Gewebe der Haut tritt, ferner Nerven- und Faulfieber, allgemeine Krämpfe, der Rothlauf, das Scharlachexanthem etc.

§. 1636.

Das Wesen dieser Krankheit scheint, abgesehen von den Gasansammlungen, welche durch eingedrungene Luft oder durch Zersetzung im Körper angesammelter faulender oder gährender Stoffe hervorgebracht sind, zuweilen in einer wirklichen, durch die Lebensprozesse selbst geschehenden Gasbildung zu bestehen, indem nämlich bei der, auch im gesunden Zustande ununterbrochen stattfindenden, Verwandlung fester und flüssiger belebter Theile in anorganische Stoffe (die rückwärtsschreitende Metamorphose) Gas im abnormen Verhältniss erzeugt und an fehlerhaften Stellen ausgeschieden wird. Die Krankheitszustände, bei welchen diese Gasbildung statt findet, sind verschieden, vorzüglich sind es Schwäche-

zustände, wie bei dem Meteorismus in Nervenfiebern und dem eigentlichen Tympanites, oft auch Krampf und selbst Entzündung, wenigstens kommt bei der Bauchfells- und Darmentzündung ein Meteorismus häufig vor. Das angesammelte Gas ist nach Verschiedenheit seines Ursprunges bald athmosphärische Luft, bald mehr kohlensaures Gas, Stickgas, Schwefelwasserstoffgas etc.

§. 1637.

Die Vorhersage kann im allgemeinen günstig gestellt werden, wenn die angesammelte Luft nur von aussen eingedrungen ist, indem sie oft leicht entleert werden kann und auch resorbirt wird, ebenso ist in der Regel keine Gefahr vorhanden, wenn die Luft sich aus den von aussen aufgenommenen Stoffen entwickelt, wie bei Darmblähungen, dagegen ist die Gasentwicklung eine sehr schlimme Erscheinung, wenn sie von einem krankhaften Zustand der belebten Theile abhängig ist; so ist der Meteorismus in den bösartigen Fiebern sehr ungünstig und die mit einer Cachexie in Verbindung stehende eigentliche Darm- und Bauchwindsucht ist meistens unheilbar und tödtlich.

§. 1638.

Behandlung. Nach Verschiedenheit der Ursachen genügt es, entweder nur das angesammelte Gas wieder aus dem Körper auszutreiben, was insbesondere bei der durch eingedrungene Luft entstandenen Windgeschwulst der Fall ist, oder es müssen die Stoffe, aus welchen sich Gas entwickelt, entleert werden, oder man muss die Lebensthätigkeit der belebten Theile auf die eine oder die andere Weise, je nach dem Character ihrer Abweichung vom gesunden Zustand, umändern. Am häufigsten ist die Erregung einer kräftigern Lebensthätigkeit nothwendig, zuweilen die Besänftigung krampfhafter Zustände, seltener ist ein entzündungswidriges Verfahren erforderlich.

§. 1639.

Bei der Flatulenz, so wie bei der eigentlichen Darm- und Bauchwindsucht muss vorerst dahin gewirkt werden, dass keine blähenden Speisen genossen werden, bei der Flatulenz der Kinder darf auch die Mutter oder Amme keine derartigen Nahrungsmittel geniessen, und sie darf auch das Kind nicht nach einer Gemüthsbewegung anlegen und dasselbe nicht stillen, wenn sie am weissen Fluss, Fussschweissen etc. leidet, oder wenn sie schon zu lange gesäugt hat; zu viel Nahrung muss vermieden werden, eine vorhandene Verstopfung muss durch Klystiere oder Abführungsmittel gehoben werden, der Leib muss durch eine warme Bedeckung vor Verkältung geschützt werden etc.

Um das vorhandene Gas zu entfernen, thun leichte Abführungsmittel und gewöhnliche Klystiere sehr gute Dienste (nach *Selle* Klystiere mit fixer Luft), ferner sind Mittel, die die Luft einsaugen sollen, empfohlen worden, wie das kalte Wasser, Kalkwasser, Magnesia, Kohlenpulver, sehr verdünnte Schwefelsäure, oxygenirte Salzsäure, sehr verdünnter Liquor Ammonii causticus, Klystiere von kaltem Wasser und Essig etc., auch hat man vorgeschlagen, das Gas, vermittelst einer in den After gebrachten Klystierspritze, auszuziehen und bei der Bauchwindsucht durch den Einstich dasselbe zu entleeren.

Zum Theil demselben Zwecke entsprechend, indem sie durch Erregung einer kräftigern peristaltischen Bewegung die Blähungen abtreiben, zum Theil die Gasbildung selbst beschränkend, durch kräftigere Erregung der vegetativen Prozesse, sind die flüchtig erregenden, so wie die tonischen Mittel, guter Wein, die versüssten Mineralsäuren, die Naphthen, der Liq. Ammon. caust. und der Liq. Ammon. anisat., vorzüglich die aromatischen Mittel, wie Chamillen, Fenchel, Anis,

Kümmel, Melisse, Pfeffermünze, die aromatisch bittern, wie die Wurzel von Calamus aromaticis, die cortices Aurantiorum, Absinthium, die rein bittern Mittel, die China, das Eisen. Mit der innern Anwendung dieser Mittel verbindet man den Gebrauch entsprechender äusserer Mittel, das Auflegen von erwärmten Deckeln, von mit Kümmel, Wachholderbeeren etc. durchräuchertem Flanelle, von erwärmten Kräutersäckchen, welche man mit Campher bestreichen kann, Einreibungen von flüchtigen Linimenten, aromatischen Geistern mit Oleum Caryophyllorum, Liquor Ammon. caust., von Oleum Carvi etc., aromatische Pflaster, aromatische Bäder, und nur in dringenden Fällen und mit grosser Vorsicht kalte Umschläge auf den Unterleib.

Bei einem krampfhaften Zustand dienen die Valeriana, die Asa foetida, das Castoreum und vorzüglich das Opium, womit besänftigende Umschläge und Bäder verbunden werden können.

Ist eine entzündliche Reitzung der Gedärme vorhanden, so leisten Blutegel und Cicutaumschläge auch gegen die Aufblähung gute Dienste.

§. 1640.

Gegen die Windsucht der Gebärmutter kann man ein ähnliches Verfahren in Anwendung bringen. Um die Luft auszutreiben, sucht man den Pfropf, der etwa den Muttermund verschliesst, durch Einführung einer Sonde zu beseitigen, den Krampf im Muttermunde durch laue Bäder etc. zu heben, und die Zusammenziehung der ausgedehnten Gebärmutter durch die bekannten Mittel zu befördern.

§. 1641.

Bei dem Pneumothorax können auch aromatische Einreibungen und ähnliche Mittel in Anwendung gebracht werden. Sind die Zufälle dringend, so muss durch den Schnitt oder den Einstich die Brusthöhle

geöffnet werden. Um bei der Operation keine Stelle zu treffen, an welcher die Lunge mit der Brustwandung verwachsen ist, untersuche man genau, ob an der zum Einschnitt gewählten Stelle die Percussion einen starken Ton gebe, das metallische Klingen wahrgenommen werde und keine Spur von Respirationsgeräusch gehört werde.

§. 1642.

Das Lungenemphysem empfiehlt *Laennec* wie einen trockenen Catarrh zu behandeln; man soll dabei, um die Empfänglichkeit zu neuen catarrhalischen Affectionen zu mildern, Oeleinreibungen vornehmen lassen und bei blassen, cachectischen Personen den Crocus martis aperitivus anwenden. Gegen heftige asthmatische Zufälle sind Narcotica anzuwenden, zuweilen ist aber auch eine Aderlässe nothwendig. — Wenn bei dem Emphysem zwischen den Lungenlappen die Infiltration mit Luft bis in das äussere Gewebe gedrungen ist, so mache man einige Einstiche mit der Lanzette.

§. 1643.

Bei der Windgeschwulst im Zellgewebe der Haut kann die Luft durch Einstiche mit der Lanzette und gelindes Drücken entfernt werden. Im Uebrigen behandelt man die Krankheit nach Verschiedenheit ihrer Ursachen und ihres Characters; insbesondere passen auch hier in der Regel aromatische Bähungen, Einreibungen etc.

Die Lustseuche.

(*Lues venerea, Syphilis, Morbus gallicus*).

(Ueber die Geschichte). — *Hensler* (2 Bde. Altona 1783 — 89 u. 94). — *Gruner* (Jena 1789 u. 1793). — *Kurt. Sprengel* (Beiträge zur Gesch. d. Med. 1ster B.). — *Schaufus* (Lpz. 1805). — *Simon*, jun., (2 Bde. Hamb. 1830).

Astruc (Par. 1736 ed nov. 1760, a. d. Franz. v. Heise, Frankf. u. Lpz. 1764). — *Fabre* (Par 1758, 82, a. d. Franz. von Schröder, Kopenh. 1777, Supplem. Edinb. 1786). — *Swediaur* (Lond. 1784, nach der 4ten franz. Aufl übers. v. Kneffel, mit Vorrede v. Sprengel, andere Uebers. v. Eyerel, 7 franz. Aufl. Par. 1817). — *Hunter* (a. d. Engl. m. 5 K. Lpz. 1787. — *Girtanner* (Gött. 1797 m. Zusätzen und Anmerk. herausg. v. Cappel, Gött. 1803). — *Clossius* (2te Aufl. Tüb. 1799) — *Hecker* (2te Aufl. Erf. 1801). — *Walch* (Jena 1811). — *Lagneau* (Par. 1812). — *Louvrier* (2te Aufl. Wien und Krems 1819). — *Wendt* (3te Aufl. Bresl. 1825). — *Ritter* (Lpz. 1819). — *Carmichael* (Lpz. 1819). — *Cullerier* (Dict. des scienc. med.) — *Delpech* (Par. et. Montpell. 1823. — *Devergie* (Par. 1826).

§. 1644.

Die Lustseuche ist die Dyscrasie, welche durch Ansteckung fortgepflanzt wird und sich vorzüglich durch eigenthümliche Geschwüre an den angesteckten Theilen und sodann durch Anschwellung der Leistendrüsen, den ursprünglichen gleichen Geschwüre in andern Theilen, flechtenartige Ausschläge, Knochenschmerzen, Knochenauswüchse und Beinfrass äussert.

§. 1645.

Ueber den Ursprung dieser Krankheit sind viele Untersuchungen unternommen und sehr verschiedene Meinungen ausgesprochen worden. Schon in der Zeit, in welche man die Entstehung der Lustseuche setzt, entspann sich ein Streit, ob die Krankheit eine neue oder alte sei. Auf der Seite der Vertheidiger der erstern Meinung standen vorzüglich *Leonicenus* und *Martin Pollich*, auf

der der Vertheidiger der letztern Ansicht *Simon Pistorius*. Die erstere wurde allmählig die herrschende und zuletzt die beinahe allgemein angenommene, doch haben in der neuesten Zeit wiederum Gelehrte, namentlich *Stoll*,[1]) *Krause*,[2]) *Harless*[3]) u. *Neumann*[4]) sich für das höhere Alter der Lustseuche ausgesprochen. Die gewöhnlichste Meinung derjenigen, welche die Lustseuche für eine in Europa neue Krankheit ansehen, ist die besonders von *Astruc* und *Girtanner* unterstützte Ansicht, dass sie amerikanischen Ursprungs sei, von der Mannschaft des Columbus nach Europa gebracht und von den Franzosen bei Gelegenheit des Feldzugs Karls VIII nach Neapel von den Spaniern ererbt worden sei. Andere schreiben die Schuld der Erzeugung und Verbreitung der Krankheit den Marranen, (den aus Spanien nach der Eroberung von Granada vertriebenen Mauren und Juden) zu. Diese Ansichten sind durch *Hensler* und *Sprengel*[5]) bestritten worden. *Schaufus*[6]) sucht das Vaterland der Lustseuche in Hindostan und glaubt, dass dieselbe im 15ten Jahrhundert durch die Zigeuner nach Europa gebracht worden sei. Andere suchen nicht sowohl den Ort als die Art der Entstehung auszumitteln, dahin gehören vorzüglich diejenigen, welche den Ursprung der Lustseuche in dem Aussatze finden wollen. Hieher gehört *Paracelsus*, welcher die Krankheit dadurch entstehen lässt, dass die Lepra bei einem Manne und ein schlieriges Geschwür bei der Frau gewesen sei, wo sodann aus der Begattung beider die Venusseuche entstanden sei, wie der Maulesel aus der Begattung des Esels mit der Stute. Auch *Sprengel* hält es für wahr-

1) Praelect. in divers. morb. chron. ed. Eyerel. Vienn. 1787 P. 5. — 2) Ueber das Alter der Menschenpocken etc. Hann. 1825. — 3) Spec. Nos. II. S. 495. — 4) Spec. Path. u. Therap. B. II. S. 89 u. d. f. — 5) Geschichte der Med. — 6) Neueste Entdeckungen üb. d. Vaterl. der Pocken u. d. Lustseuche.

scheinlich, dass die Krankheit sich aus dem Aussatze entwickelt habe. Endlich führe ich die Meinung von *Neumann* an, welcher dafür hält, dass die Lustseuche eine uralte Krankheit sei, welche früher in einer mildern Form vorgekommen, aber im Jahre 1494 durch eine ansteckende, lepröse Epidemie bösartiger geworden und seitdem wieder grösstentheils zu ihrer vorigen Milde zurückgekehrt sei.

Ich meines Theiles bin sehr geneigt, der zuletzt geäusserten Meinung im allgemeinen beizupflichten. Wenn man die zum Theil von *Sprengel* und besonders die von *Simon* gegebenen Nachrichten von dem Vorkommen der primären Lustseuche genau würdigt, so wird man wohl sich überzeugen, dass der Tripper und ansteckende Geschwüre an den Geschlechtstheilen in den ältesten Zeiten und vorzüglich im Mittelalter häufig genug vorgekommen sind, und wenn man bedenkt, dass das Alterthum von sehr vielen Krankheiten, die offenbar in den ältesten Zeiten, wie jetzt, vorhanden waren, uns keine genaue Beschreibung hinterlassen hat, ferner dass die Allgemeinkrankheit sehr leicht bei dem mangelnden Geiste der Forschung als lepröse Krankheit betrachtet werden konnte, wie sie denn auch noch am Ende des 15ten und im Anfange des 16ten Jahrhunderts von verschiedenen Schriftstellern unter den Namen der Lepra und Safath vorkommt, und dass wirklich Fälle bekannt sind, in welchen Personen an einer allgemeinen Krankheit, die von jenen örtlichen Geschwüren entsprungen war, starben, so wird man sich doch kaum des Gedankens enthalten können, dass jene Uebel der Hauptform nach die wirkliche Lustseuche waren. Auf der andern Seite ist es keinem Zweifel unterworfen, dass am Ende des 15ten Jahrhunderts besonders in den Jahren 1493 und 1494 eine Krankheit, von welcher die noch vorhandene Lustseuche abstammt, seuchenartig herrschte, welche von vielen Aerzten als

eine neu angekommene Krankheit betrachtet und von dem Volke mit neuen, den vermeintlichen Ursprung der Krankheit bezeichnenden Namen, wie Franzosenkrankheit und mal de Naples belegt wurde. Hiernach müsste, wenn beide, scheinbar sich widersprechende Thatsachen richtig sind, um dieselben zu vereinigen, angenommen werden, dass die ursprünglich vorhandene Lustseuche, um die genannte Zeit durch etwas Hinzugekommenes, wie z. B. eine leprose Epidemie sich sehr verschlimmert und theilweise eine neue Form angenommen habe, welche sie mit der Zeit allmählig wieder verloren hat, wie man auch Beispiele in der neuern Zeit hat, dass in einer Gegend mit einem Male eine Krankheit erschien, die wohl eine neue genannt werden konnte, doch eigentlich nur eine Modification der längst bekannten Syphilis ist, wie dieses bei dem Scherlievo der Fall ist, welcher eine im östreichischen Küstenlande von Fiume, Lucari und Novi einheimische Krankheit ist, die im Jahre 1831 als Epidemie herrschte und vor 1790 nicht vorhanden war. Hierzu kommt noch der um diese Zeit erwachte Geist der Forschung, der nun eine eigene Krankheitsart fand, die vielleicht der Hauptform nach schon früher vorhanden war, aber nicht als eine solche erkannt wurde, wie auch in der neuesten Zeit Krankheitsformen beschrieben worden sind, von denen man früher Nichts wusste, die aber sicher schon da waren.

§. 1646.

Die Krankheit beginnt mit krankhaften Erscheinungen an den Theilen, durch welche die Ansteckung geschah, gewöhnlich den Geschlechtstheilen, (die primären Zufälle oder die örtliche Lustseuche) und giebt sodann ihre Fortschritte durch krankhafte Veränderungen in Theilen, die entfernt von dem zuerst ergriffenen liegen, (die secundären Zufälle, oder die Lustseuche im engern Sinne oder die allgemeine Lustseuche) zu erkennen. Zu den primären

Zufällen rechnet man gewöhnlich den Tripper, den Schanker mit den aus ihm entspringenden Auswüchsen und übrigen Entartungen an den Geschlechtstheilen, und die Bubonen. Zu den secundären Symptomen oder der allgemeinen Lustseuche werden die syphilitischen Geschwüre im Halse, die Hautausschläge, die Knochenschmerzen, die Knochenauswüchse etc. gezählt.*)

§. 1647.

Das *primäre syphilitische Geschwür* (ulcus syphiliticum primarium, Schanker im engern Sinne des Wortes) ist gewöhnlich das erste Zeichen einer geschehenen wahren syphilitischen Ansteckung. Es bricht dasselbe fast immer an einer mit einer zarten Oberhaut versehenen Stelle des Körpers, insbesondere an der innern Seite der Vorhaut, zumal am Bändchen und an dem hintern Theile der Eichel, und bei Weibern zwischen den Schaamlefzen und den Nymphen aus, zuweilen kommt es auf der äussern Seite der Vorhaut und wenn die Ansteckung durch Küsse oder das Säugen eines mit der venerischen Krankheit behafteten Kindes etc. geschah, an den Lippen oder der Brustwarze vor. Die Zeit, in welcher der Schanker nach erfolgter Ansteckung entsteht, ist der 3te bis 4te Tag, doch soll auch die Krankheit zuweilen erst nach 21 Tagen zum Ausbruch kommen. Der Kranke empfindet ein Jucken an der einen oder andern der bezeichneten Stellen; es entsteht hier ein entzündetes Fleckchen und es bildet sich auf demselben entweder ein Bläschen, das aufplatzt, und eine Excoriation bewirkt (das schankerhafte Wundsein oder der krystallinische Schanker) oder es bildet sich, was der gewöhnliche Fall ist, ein kleines Knötchen, das in seinem obern Theile in ein Bläschen

*) Da der Tripper in der Mehrzahl der Fälle, wie es scheint, nicht eigentlich syphilitischer Natur ist, so wurde er von mir in einem eigenen Kapitel abgehandelt.

übergeht, welches sich mit einer hellen, aber bald eiterartig werdenden Flüssigkeit füllt. Diese Blatter bricht auf und geht dadurch in ein Geschwür über, welches aufgeworfene schwielichte Ränder und eine speckige Grundfläche hat, und eine scharfe, in den Theilen, die sie berührt, neue Entzündung und neue Schankerbläschen veranlassende Jauche absondert. Zuweilen frisst das Geschwür sehr schnell in die Breite und die Tiefe um sich, wobei es auch sehr schmerzhaft wird (der phagedänische Schanker), manchmal sind die Ränder sehr hart und meistens dabei wenig empfindlich, auch das Geschwür wenig um sich fressend (der kallöse Schanker); öfters zeigt auch das Geschwür ein schwammiges Fleisch und hat die Neigung, Auswüchse zu bilden (nicht ganz passend der varicöse Schanker genannt). Heilt das Geschwür, so bleiben vertiefte Narben zurück. Oft veranlassen die Geschwüre auch Verhärtungen, verschiedenartige Auswüchse, Risse und Schrunden, wie sie auch an andern Theilen des Körpers als Zufälle der allgemeinen Lustseuche vorkommen.

§. 1648.

Verbreitet sich die Krankheit weiter, so schwellen nun in vielen Fällen die Leistendrüsen an, was selbst nach manchen Beobachtungen zuweilen geschehen soll, ohne dass ein Schankergeschwür oder ein Tripper vorhanden ist. Glaubt man, dass die Anschwellung blos durch consensuelle Reitzung der Leistendrüsen geschehe, wie man dieses vorzüglich bei den im Tripper erfolgenden Anschwellungen annimmt, so nennt man dieses die consensuellen oder symptomatischen Bubonen, hält man aber dafür, dass dieselbe durch Aufsaugung von Lymphe bewirkt werde, in welchem Falle der schädliche Reitz unmittelbar auf die Leistendrüsen selbst wirkt, so werden sie idiopatische Bubonen genannt. — Den Anfang der Bildung der Bubonen bezeichnet eine spannende Empfindung in der

Leistengegend, womit ein oder mehrere Leistendrüsen anschwellen, die man in der Grösse von Bohnen und hart findet (Stadium invasionis). Indem nun stärkere und selbst stechende Schmerzen sich einstellen, nimmt die Geschwulst an Umfang zu und wird selbst so gross, wie ein Hühnerei, und die Haut über derselben wird roth und heiss (Stadium inflammatorium). Endlich wird, wenn die Zertheilung nicht vorher erfolgt, der Schmerz klopfend, die Geschwulst wird weich, schwappend, die Haut wird dünne und bricht zuletzt auf, und es entleert sich eine grössere oder geringere Menge Eiter (Stadium suppurationis). Das hiedurch entstandene Geschwür hat einen unebenen Grund und erhält oft aufgeworfene und callöse Ränder, oft bilden sich tiefe Fistelgänge und oft bleibt auch ein Theil der Geschwulst als Verhärtung zurück, so wie auch in andern Fällen in den geschwollenen Drüsen sich keine kräftige Entzündung entwickelt, sondern Verhärtung eintritt. Zuweilen erfolgt der Uebergang der Entzündung in Brand.

§. 1649.

Nachdem diese Veränderungen in den Leistendrüsen eingetreten sind, und noch häufiger ohne Entstehung der Bubonen und selbst oft nach bewirkter Heilung der primären Schanker wird der Kranke, wenn das Uebel sich weiter entwickelt, in einer unbestimmten Zeit, meistens 4 — 6 Wochen nach Entstehung der ersten Zufälle, oft unter etwas Fieber, von Halsweh und zuweilen zugleich von Heiserkeit und Schnupfen befallen. Die Mandeln sind etwas angeschwollen, das Gaumensegel und das Zäpfchen zeigen eine gefleckte Röthe, an einzelnen Stellen entstehen Geschwüre mit weissem speckigem Grunde und schwieligen Rändern, welche nicht sehr schmerzen. Oft entstehen Bläschen an der innern Seite der Wangen und an den Mundwinkeln, welche ebenfalls in Geschwüre übergehen. Es werden das Zäpfchen und

das Gaumensegel durch Verschwärung zerstört, wodurch die Kranken einen näselnden Ton bei der Sprache erhalten, und diese Zerstörung setzt sich selbst fort auf die harten Theile des Gaumens und auf die Weichtheile und die Knochen der Nase (Ozaena syphilitica), wobei ein äusserst stinkender Eiter oder Jauche aus der Nase ausfliesst und wodurch ein Einsinken der Nase bewirkt wird.

§. 1650.

Immer mehr entwickeln sich nun auch noch in verschiedenen andern Theilen des Körpers ohne bestimmte Reihefolge vielfältige krankhafte Zustände.

In der Haut entstehen selten vor, meistens geraume Zeit nach der Bildung der Halsgeschwüre mancherlei Hautausschläge, Geschwüre und Auswüchse. Vorzüglich bilden sich gerne finnenartige Knötchen von bläulichrother Farbe, welche oft lange Zeit hart bleiben, oft sich mit Eiter füllen, aufgehen, Krusten bilden und längere Zeit bläulichrothe Flecken zurücklassen, und auch oft in Geschwüre übergehen. Solche Knötchen, Flecken, Krusten und Geschwüre befinden sich oft in grosser Menge an der Stirne, was Corona Veneris genannt wird. — Auch kommen ohne Knötchenbildung kupferfarbene und violette Flecken zwischen den Schultern, an der Brust, an der Stirne und an andern Theilen vor, welche sich öfters abschuppen, nässen und Krusten bilden, und zuletzt oft in Geschwüre übergehen. — Häufig brechen flechtenartige Ausschläge an verschiedenen Stellen des Körpers aus, die sich von den gewöhnlichen Flechten oft gar nicht, oft aber auch dadurch unterscheiden, dass sie weniger eine zusammenhängende Fläche einnehmen, sondern in vielen runden Flecken von der Grösse eines Groschens oder Sechskreuzerstückes erscheinen. — Die Geschwüre bilden sich vorzüglich da, wo die Haut zunächst über Knochen liegt, sie sind sehr um sich fressend und zerstören selbst die Knochen, so dass z. B. das

Stirnbein durchfressen und die Hirnhäute blos gelegt werden. — An einzelnen Stellen der Haut, z. B. an der innern Fläche der Hände bilden sich Risse und Schrunden (Fissurae, Rhagades), welche nässen und eine übelriechende Materie von sich geben. — Warzen (Verrucae), das sind harte, schmerzlose und gefurchte Auswüchse, sie erscheinen am häufigsten an den Geschlechtstheilen, wo sie aber in der Regel nur Folge der Schanker sind, und zu den örtlichen Zufällen gehören, aber auch im Gesichte, an den Händen und an andern Theilen. — Feigwarzen (Condylomata, mariscae), das sind weiche fleischartige Auswüchse, sie kommen beinahe nur an den Geschlechtstheilen und um den After herum hervor. Man hat ihnen nach Verschiedenheit ihrer Gestalt verschiedene Namen gegeben, wie Hahnenkämme (Cristae), Feigen (Fici), Maulbeeren (Morae) etc. Diese Auswüchse nässen oft, vorzüglich wenn sie einen gefurchten Bau haben, auch verwandeln sie sich manchmal in ein secundäres Geschwür. — Durch Entartungen der Haut an behaarten Theilen gehen die Haare aus und es entstehen Plätze, und durch das Leiden derselben an den Nägeln fallen diese ab, es entstehen neue unförmliche Massen und oft auch Abscesse und Geschwüre.

§. 1651.

Sehr zu fürchtende Zufälle sind die Entzündung der Bindehaut des Auges (Ophthalmia syphilitica) und noch mehr die der Regenbogenhaut (Iritis syphilitica), indem dieselben oft sehr schnell das Auge zerstören.

§. 1652.

In der Regel entwickeln sich auch während des Auftretens der bisher beschriebenen Erscheinungen verschiedenartige Knochenleiden. Zuerst stellen sich in der Mitte von Röhrenknochen und in platten Knochen, vorzüglich in solchen, die nahe unter der Haut liegen, wie z. B. das Schienbein und die Schädelknochen, bohrende

und nagende Schmerzen (Dolores osteocopi) ein, welche am Tage gering sind, aber in der Nacht in dem Bette sehr quälend werden. — Gewöhnlich in den Knochen, in welchen vorzugsweise die Schmerzen stattfinden, entstehen nun verschiedene Veränderungen, oft bilden sich Hervorragungen, welche sich weich anfühlen lassen und von einer gallertartigen Masse herrühren, die von der, wohl auch zugleich entarteten Beinhaut abgesondert zu sein scheint, oft sind sie hart und bestehen aus fester Knochenmasse (Nodi, Exostoses), zuweilen bestehen sie mehr aus einer kreideartigen Masse und sind den veralteten Gichtknoten ähnlich (Tophi, d. h. poröse, tuffsteinartige Massen), zuweilen schwellen auch die Röhrenknochen in ihrer Länge auf und werden weich (Osteosarcosis, Osteomalacia), und manchmal kommt die Knochenauftreibung vor, die man Winddorn (Spina ventosa) nennt. Oefters gehen die Knochenauswüchse in Knochenfrass (Caries) über, häufiger aber werden die Knochen, wo Geschwüre sich befinden und an welchen die Knochenhaut zerstört ist, necrotisch und stossen sich in Stücken ab. Zuweilen entsteht auch eine zerstörende Entzündung in den Gelenken (Arthrocace syphilitica).

§. 1653.

Der Verlauf ist sehr langwierig, und die Krankheit kann sich selbst durch viele Jahre hinziehen. Die Heilung erfolgt meistens ohne andere kritische Ausscheidungen, als die, dass die Produkte abfallen, doch sind oft Schweisse und andere Absonderungen wohlthätig. Kommt die Heilung nicht zu Stande, so gesellt sich ein Zehrfieber hinzu, das die Kräften des Kranken, welche durch die in den Geschwüren und dem Knochenfrasse erfolgenden krankhaften Absonderungen, zu welchen oft noch Blutungen hinzutreten, und durch die äusserst quälenden Knochenschmerzen erschöpft sind, vollends aufreibt; zuweilen erfolgt auch der Tod von

einzelnen Organen aus, indem sich Desorganisationen im Gehirne, Verschwärungen und Auswüchse im Kehlkopfe etc. bilden, wodurch der Tod unter den Erscheinungen von Schlagfluss und Lähmung, von Kehlkopfschwindsucht etc. herbeigeführt werden kann.

§. 1654.

Auf die Form dieser Krankheit haben verschiedene zufällige Verhältnisse einen oft sehr bedeutenden Einfluss; dieselben sind vorzüglich folgende:

a) Die Constitution und das Alter des Kranken. Bei sehr lebenskräftigen Individuen macht die Krankheit raschere Fortschritte und ist zerstörender, als bei mehr schwachen, doch ist der Erfolg der Behandlung bei erstern bei weitem sicherer, als bei den letztern.

Bei Kindern zeigen sich, wenn sie bei der Geburt während des Durchganges durch die Scheide angesteckt wurden, einige Tage nach der Geburt, wenn aber die Ansteckung auf eine andere Weise, z. B. durch das Trinken an einer mit syphilitischen Geschwüren an den Brustwarzen behafteten Amme, statt fand, zu einer unbestimmten Zeit, besonders an den mit einer zarten Haut versehenen Theilen, wie an den Lippen, den Augenliedern, den Geschlechtstheilen, dem After, dem Nabel und zuweilen auch wegen grosser Zartheit der ganzen Haut, an andere Stellen Blätterchen und auch grössere Pusteln, die in Geschwüre mit weisslichem, speckigem Grunde und wulstigen Rändern übergehen. Oft gehen ihnen rothe und ins Kupferfarbene spielende Flecken voraus. In der Mundhöhle gleichen sie mehr der Mundfäule, auf der äussern Haut sind sie aber grössere Pusteln und an manchen Stellen wirkliche Bluteisen, welche aber mehr oder weniger kupferfarbig sind und leicht Geschwüre zurücklassen. Im Gesichte nehmen sie manchmal die Form der crusta serpiginosa an. Zuweilen bilden sich (nach *Mahon*) an den Fingern

und Zehen hervorstehende Pusteln, welche bald in Eiterung übergehen und den Verlust der Nägel nach sich ziehen. Diese verschiedenen Pusteln werden nicht selten missfarbig und brandig. Leicht werden die Kinder an verschiedenen Stellen wund und auch hier bilden sich um sich greifende Geschwüre, weniger dagegen kommen Schrunden, Risse und Feigwarzen vor. Die Augen werden sehr leicht von einer Augenentzündung befallen, welche sich durch ein blaurothes Ansehen der Ränder der Augenlieder und der Thränencarunkel, variköse Anschwellungen der Gefässe der Conjunctiva, einen starken eiterartigen Ausfluss und schnelle Zerstörung characterisirt. Nach einiger Zeit wird auch die Stimme heiser, das Athmen erschwert und aus der Nase fliesst eine eiterige, stinkende Materie. Ebenso stellt sich ein eiteriger Ausfluss aus den Ohren ein. An verschiedenen Stellen des Körpers schwellen die Drüsen an. Endlich kommen auch noch Knochenanschwellungen und Knochenfrass hinzu, wenn nicht früher das Kind, welches bald ein eingefallenes, runzliches Ansehen erhält, unter Erschöpfung und Gichtern stirbt oder die Heilung bewirkt wird. — Ist die Unterscheidung der Krankheit von den Scropheln schwierig, so muss auch noch der Gesundheitszustand der Mutter oder der Amme des Kindes berücksichtigt werden.

§. 1655.

b) Die Verbindungen mit andern Krankheiten. Mit dem Scorbute verbunden, erzeugt die Lustseuche insbesondere viele Geschwüre, die eine schwammige Beschaffenheit haben und aus welchen beerartige, leicht blutende Auswüchse hervorwuchern, die Knochen leiden dagegen weniger. — Bei Verbindung mit der Gicht entwickeln sich schmerzhafte, hartnäckige Gelenksleiden, — bei der mit Scropheln vorzugsweise Knochenleiden. — Nach reichlichem Quecksilbergebrauche verwickeln

sich oft die Zufälle der Lustseuche mit denen der Mercurialkrankheit, so dass es schwer und oft unmöglich ist, zu entscheiden, ob eine Erscheinung aus der einen oder der andern Ursache hervorgegangen ist.

§. 1656.

c) Die klimatischen und andern äussern Einwirkungen. In den wärmern Klimaten soll die Lustseuche, in Hinsicht der secundären Zufälle, viel milder sein, mehr die Haut und ihre Fortsetzungen ergreifen, und viel leichter heilbar sein, wogegen sie in den kalten Gegenden mehr die Knochen angreift und oft mit Hartnäckigkeit den Mitteln widersteht. Auch sind in gewissen Gegenden eigenthümliche Krankheitsformen einheimisch, die Modificationen der Lustseuche (Syphiloide) zu sein scheinen, so in Schottland die Sibbens, in Dalmatien und Istrien der Scherlievo, in Norwegen, Schweden etc. die Radesyge, in Holstein die Marschkrankheit und in Canada das Mal de Chicot. Vielleicht gehören auch die Yaws und Pians hieher.

§. 1657.

Ursachen. Es befällt die Krankheit Individuen von jedem Alter und jeder Constitution, und hebt keineswegs, wie dieses z. B. durch die Blattern geschieht, die Anlage zu derselben Art von Leiden auf. Nur Stellen des Körpers, die mit einer zarten Oberhaut versehen sind, sind die Zugänge, durch welche die Krankheit in den Körper gebracht wird. Die einzige Gelegenheitsursache zu dieser Krankheit ist die Ansteckung, welche nur durch die Stoffe, die in den Schankergeschwüren abgesondert werden, und also nicht durch das Blut und andere Säfte des Körpers zu geschehen scheint. Das Contagium ist ganz fix und wird am häufigsten durch den Coitus, Küsse und andere Berührung der bezeichneten Theile des Körpers mitgetheilt. Auch haftet das Gift an Trägern, z. B. Trinkgeschirren, durch

welche ebenfalls Ansteckung erfolgen kann. — Dass die Krankheit schon bei der Zeugung von einem der beiden Eltern oder während der Entwicklung des Foetus von der Mutter dem Kinde mitgetheilt werden könne, ist noch nicht entschieden.

§. 1658.

Das Wesen der Lustseuche ist wohl am wahrscheinlichsten ein krankhafter Lebensprozess in den Capillargefässen und im Gewebe der Organe, in welchem drei Factoren zusammenwirken, die Nerven, das Blut, nebst den übrigen, mit den Nerven in Wechselwirkung stehenden Stoffen und das aufgenommene Contagium. Hiernach trete ich der Ansicht derer bei, welche annehmen, dass das syphilitische Gift aufgenommen werde und an den Ort hin gelange, wo es wirke, und es ist mir nicht wahrscheinlich, dass das specifische Gift an andern Stellen, als der primär leidenden blos auf dem Wege des Consenses erzeugt werden könne und auf diesem Wege die allgemeine Lustseuche entstehe. Dass nach den Geschlechtstheilen zunächst der Hals ergriffen wird, scheint allerdings in dem polarischen Verhältniss zwischen dem Hals und den Geschlechtstheilen begründet zu sein, doch scheint das Leiden des Halses immer zunächst durch das resorbirte Contagium hervorgebracht zu werden, das diesen Theil vor allen andern in Krankheit versetzt, weil er durch das bezeichnete consensuelle Verhältniss in den Zustand einer krankhaft erhöhten Krankheitsanlage gesetzt ist.

§. 1659.

Vorhersage. Die Lustseuche wird nicht leicht tödtlich, wenn nicht durch besondere Vernachlässigung das Uebel den höchsten Grad erreicht hat. Am sichersten ist der Erfolg der Behandlung bei noch nicht veraltetem Uebel und wenn dieses sich noch auf die Weichtheile beschränkt. Am schwersten in die Heilung zu bewirken,

wenn gegen die Krankheit schon viel Quecksilber erfolglos gebraucht wurde und wenn Knochenfrass vorhanden ist. Oft glückt die Heilung nicht vollkommen, so dass das Uebel immer noch durch einzelne Erscheinungen sich kund giebt, oder es dauert ein nicht eigentlich syphilitischer, aber immerhin dyscrasischer und oft ein Schwächezustand fort. Oft bleiben organische Fehler zurück.

§. 1660.

Behandlung der Lustseuche. Durch die bekannten Behandlungsarten der Lustseuche scheinen wir bald auf die eine, bald auf die andere, der im §. 1404 angegebenen Verfahrungsweisen die fehlerhaft gewordenen Prozesse der Ernährung umzustimmen. Wir wirken unmittelbar auf die im Körper befindlichen fremden, schädlichen Stoffe ein, wenn es richtig ist, was man von dem Quecksilber annimmt, dass es das syphilitische Gift, das gleichsam ein parasitisches Leben im menschlichen Körper führe, zu zerstören vermöge, wir wirken jedenfalls durch das genannte Mittel verändernd auf die Säftemasse ein, wir erregen die Absonderungen in der Haut und in den Nieren durch die Holztränke, in den Speicheldrüsen durch das Quecksilber, im Darmkanal durch Abführungsmittel, wodurch vielleicht ebenfalls fremde Stoffe aus dem Körper ausgeführt werden, wir beschränken die krankhaften Bildungen und befördern die Wirkung der die Säfte durchdringenden und das syphilitische Gift zerstörenden Arzneistoffe durch die Hungerkur, wir stimmen durch die specifischen Mittel vielleicht auch die Thätigkeit der festen Theile unmittelbar um, doch fehlt die nähere Kenntniss, wie dieses geschehe.

§. 1661.

Mag nun die Heilung auf die eine oder die andere

Art bewirkt werden, folgendes sind die bewährtesten Kurmethoden der Lustseuche:

Die erste Stelle verdienen immerhin noch die verschiedenen Verfahrungsweisen, in welchen Quecksilber das Hauptmittel ist.

Manche wenden, so lange die Krankheit nur in dem ursprünglichen Schanker besteht, nur örtliche Mittel an, doch ist es sicherer, immer zugleich auch innerliche Mittel zu geben, um gewisser der Entstehung der allgemeinen Lustseuche vorzubeugen; wir verordnen jedoch bei der blos örtlichen Krankheit in der Regel nur die leichtern Präparate und kleinere Gaben derselben.

Zu den wichtigern allgemeinen, bei der Anwendung des Quecksilbers in der Lustseuche zu befolgenden Regeln gehören: Man bereite den Körper, wo es nothwendig ist, für den Gebrauch des Quecksilbers vor; bei gastrischen Unreinigkeiten können Brech- und Abführungsmittel gegeben werden, mit welchen letztern überhaupt, auch abgesehen von vorhandenen Stoffen, viele Aerzte die Kur zu beginnen empfehlen. Bei einem scorbutischen Zustand soll, vor der Anwendung des Quecksilbers, dieser möglichst durch Mineralsäuren und andere Mittel beseitiget werden etc. — Man wende im Anfange nur die mildern Quecksilberbereitungen und nur kleine Gaben an und gehe bei nicht gehörig eintretendem Erfolge zu stärkern Präparaten und zu grössern Gaben über. Oft genügt es, auch nur mit dem Mittel zu wechseln, ohne gerade ein stärker wirkendes Mercurialmittel zu wählen. — Die Nahrung sei sparsam, damit das Quecksilber vollständiger aufgesogen werde und kräftiger auf die reproductiven Prozesse wirke. Eine wirkliche Hungerkur wird als besonderes Heilverfahren in Anwendung gebracht (S. weiter unten). — Geistige Getränke müssen vermieden werden, um die schleichenden, zerstörenden Entzündungen nicht zu erhöhen. — Es versteht sich von

selbst, dass saure Dinge und Salze, welche die Mischung des Präparates verändern können, vermieden werden müssen. — Gleichzeitig mit dem Quecksilber bringt man gerne Mittel in Anwendung, welche die Absonderungen vermehren. Der Kranke muss sich warm kleiden und die Temperatur des Zimmers warm sein, um die Hautausdünstung zu erhalten; er trinke die auf die Hautausdünstung und die Harnabsonderung wirkenden Holztränke von Lignum Guajaci, rad. Bardanae, Saponariae, Liquiritiae, Lignum Sassafras (Spec. ad decoct. Lignor. Ph. boruss.) und vorzüglich auch von rad. Sarsaparillae. Bei manchen Methoden werden auch wiederholt Abführungsmittel zwischen dem Gebrauche der Quecksilbermittel gegeben. — Will man den Speichelfluss erregen, so dient die Anwendung des Quecksilbers in den Einreibungen der grauen Quecksilbersalbe, will man ihn vermeiden, was man bei den leichtern venerischen Uebeln beabsichtiget, so lässt man die Maassregeln eintreten, die in dem Paragraphen über die Behandlung des Speichelflusses nach den Anzeigen aus den Ursachen angegeben sind. — Leidet etwa der Kranke an einem entzündlichen Fieber und haben die örtlichen Entzündungen einen bedeutenden Grad erreicht, so müssen oft neben dem Gebrauche des Quecksilbers allgemeine oder örtliche Blutentleerungen vorgenommen werden; ist er aber sehr empfindlich, zu Magenschmerzen, Coliken, Durchfällen oder Krämpfen geneigt, so kann mit dem Quecksilber ein angemessener Gebrauch des Opiums verbunden werden.

§. 1662.

Die gebräuchlichsten mildern Quecksilberbereitungen sind das Calomel (Hydrargyrum chloratum) und der Mercurius solubilis Hahnemanni (Hydrargyrum ammoniato-nitricum oxydulatum), von welchem man zweimal täglich und später öfters einen halben oder ganzen Gran

giebt; auch gehören hieher der Mercurius saccharatus, der Merc. mellitus (nach *Swediaur*), der Merc. gummosus, Plenkii etc. Zwischen den mildern und den schärfern Quecksilberpräparaten steht nach *Sundelin* das salpetersaure Quecksilberoxydulat. Unter den schärfern Präparaten ist das gebräuchlichste der Sublimat (Hydrargyrum bichloratum) (Nro. 93), weniger häufig gebraucht wird der rothe Präcipitat (Hydrargyrum oxydatum rubrum), zweimal täglich zu $\frac{1}{12}$ Gran und allmählig steigend, das Hydrargyrum phosphoricum oxydatum zu $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Gran, das Proto- et Deutojoduretum Hydrargyri zu $\frac{1}{8}$ Gran ein bis zweimal täglich, das Brom-Quecksilber etc.

§. 1663.

In den gewöhnlichen, nicht allzuhartnäckigen Fällen genügt es, die so eben angegebenen Quecksilberpräparate in der bezeichneten Weise anzuwenden. Hiermit sind jedoch die örtlichen Mittel zu verbinden.

Primäre Schankergeschwüre suchen viele Aerzte, wenn sie frisch sind, durch Aetzen mit Höllenstein zu zerstören. Man bestreicht den Schanker mit einer Salbe mit weissem oder rothem Präcipitat, wäscht ihn mit einer Sublimatauflösung, mit dem phagedänischen Wasser, betupft schwielige Ränder mit Höllenstein, bei entzündlichem Zustande aber wendet man Bähungen und erweichende Salben an.

Die Bubonen sucht man in ihrer Entstehung zu unterdrücken und, so lange es noch möglich ist, zu zertheilen. Zu diesem Zwecke lässt man bei ihrer beginnenden Entwicklung Bleiwasserumschläge machen, setzt Blutegel, wenn sie entzündet sind, und lässt bei mehr torpidem Charakter die graue Quecksilbersalbe in dieselben einreiben, Mercurial- oder Cicutapflaster auflegen und erweichende Umschläge machen. Geht der Bubo in Eiterung über, so befördert man die Reifung durch Cataplasmen und geeignete Pflaster, überlässt aber

die Oeffnung desselben der Natur, doch sind zuweilen Erweiterungen der Oeffnung nothwendig, um Senkungen zu vermeiden. Das zurückgebliebene Geschwür behandelt man wie den Schanker. Zurückgebliebene harte Stellen sucht man durch Umschläge und die oben bezeichneten Einreibungen und Pflaster zu zertheilen. Bei alten hartnäckigen Verhärtungen der Drüsen kann, ausser den schon angegebenen Mitteln, auch die Jodsalbe in Gebrauch gezogen werden.

Gegen die syphilitischen Geschwüre im Halse dienen Gurgelwasser, Einspritzungen und Pinselsäfte mit Quecksilbermittel. Am gebräuchlichsten ist *Rust's* Pinselsaft (Nro. 94). Bei der Ozaena lässt man reinigende Einspritzungen, mit Zusatz von Sublimat, vornehmen. — Gegen syphilitische Ausschläge zieht man, nebst den innerlichen Mitteln gegen die Lustseuche, die gegen die Hautausschläge im allgemeinen gebräuchlichen innerlichen und äusserlichen Mittel zu Hülfe, so weit sie nicht die Wirkung des Quecksilbers beschränken; unter den äusserlichen Mitteln vorzüglich auch die Quecksilberbereitungen. — Die Auswüchse fallen gewöhnlich schon durch den innerlichen Gebrauch der Quecksilbermittel ab, geschieht dieses nicht, so wäscht man sie mit einer starken Sublimatauflösung, streut Sabinapulver auf, betupft sie mit dem Liquor Hydrargyri nitrici und andern Aetzmitteln, oder nimmt sie mit der Scheere oder dem Messer hinweg und wendet das Aetzmittel auf den noch zurückgebliebenen Rest des Aftergebildes an. — Gegen die Knochenschmerzen sind vorzüglich Einreibungen der grauen Quecksilbersalbe, mit Zusatz von Opium purum, dienlich, auch können nach Umständen Blutegel gesetzt, Cicutaumschläge gemacht und Cicuta- und Quecksilberpflaster aufgelegt werden. Auf dieselbe Weise werden auch die Gummata, Tophi und Exostoses behandelt und bei beiden letztern oft auch reitzende Mittel, wie Queck-

silberpflaster mit Ammoniak und auch Blasenpflaster angewandt.

§. 1664.

Genügen diese leichtern Verfahrungsweisen nicht, so muss man oft zu einer eingreifendern Quecksilberkur seine Zuflucht nehmen. Folgende verdienen besonders erwähnt zu werden:

Die *Weinhold'sche grosse Quecksilberkur* mit Calomel. Der Kranke nimmt Abends, ein paar Stunden vor dem Schlafengehen, 10 Grane Calomel und trinkt zwei Tassen Fleischbrühe darauf, nach einer halben Stunde dieselben Mengen Calomel und Fleischbrühe, und wenn es ein starkes Individuum ist, nach einer weitern halben Stunde fünf Grane Calomel und zwei Tassen Fleischbrühe, am andern Morgen ein Paar Tassen mässig starken Kaffe, und wenn nunmehr noch keine flüssigen Stuhlgänge eintreten, ein Pulver von 15 — 20 Grane Jalappe und ebensoviel tartarisirtem Weinstein, den 4., 7., 10., 13., 16., und den 19. oder 22. Tag dieselben Gaben des Calomels, welchen man von der 4ten oder 5ten Anwendung an, um noch fortdauernd flüssige Stuhlentleerungen zu Stande zu bringen, 6 — 16 Grane Jalappenpulver zusetzen muss. Zugleich lässt man eine leichte Abkochung der China nehmen. Bei dieser Kur muss sich der Kranke warm halten, die Diät soll kräftig sein, doch Fleisch und Wein in geringerer Menge genossen werden. Stellt sich Speichelfluss ein, so darf die Kur nicht fortgesetzt werden.

§. 1665.

Die *Dzondi'sche Sublimatkur.* Der Kranke nimmt von den in Nro. 95 angegebenen Sublimatpillen, von welchen vier einen fünftels Gran Sublimat enthalten, vier Pillen nach dem Mittag und nimmt sodann immer um den andern Tag zu derselben Zeit eine Portion, die jedesmal um zwei Pillen vermehrt wird, bis er

30 Pillen, also $1\frac{1}{2}$ Grane Sublimat auf eine Gabe nimmt. Die grössern Gaben können auch in mehrern kleinern zertheilt in kurzen Zwischenräumen nach einander genommen werden. Mit der zuletzt bezeichneten Gabe wird gewöhnlich der Schluss der Kur gemacht, nach dem also im Ganzen $11\frac{9}{10}$ Grane Sublimat verbraucht worden sind; in sehr hartnäckigen Fällen werden jedoch die grossen Gaben, wenn sie der Kranke verträgt, noch einigemale gegeben. Nebenbei muss der Kranke Sarsaparillthee trinken. Magenbeschwerden, namentlich Erbrechen, sucht man durch etwas Opium zu mildern, entwickelt sich jedoch ein entzündlicher Zustand des Magens, so muss die Kur unterbrochen werden. Tritt Speichelfluss ein, so wird mit dem Gebrauche des Sublimats, bis zur Beseitigung desselben, ausgesetzt, und sodann mit der Gabe wieder begonnen, bei welcher man stehen geblieben ist.

§. 1666.

Die *kleine Schmierkur*. Dieselbe besteht in Einreibungen der grauen Quecksilbersalbe, welche nur bis zu dem Zeitpunkt fortgesetzt werden, in welchen die ersten Spuren des Speichelflusses sich zeigen. Man lässt am warmen Ofen und mit der erwärmten Hand einen Tag um den andern, oder auch alle Tage und selbst jeden Tag zweimal eine halbe oder ganze Drachme, oder auch selbst eine grössere Quantität der bezeichneten Salbe einreiben, bis Speichelfluss sich zeigt, wo sodann die Kur beendet wird. — Man lässt hierbei den Kranken warme Bäder gebrauchen, sich warm kleiden und eine magere Kost geniessen.

§. 1667.

Die *grosse Schmier- und Hungerkur*. Es ist diese Methode, ihren wesentlichen Theilen nach, eine alte Heilmethode der Lustseuche. In Deutschland ist sie neuerdings wieder von *Louvrier* und *Rust* in Gebrauch

gebracht und von denselben auch verbessert worden. Der Körper des Kranken wird vorerst durch eine Vorbereitungskur für das Quecksilber empfänglich gemacht, so dass die Aufsaugung kräftiger von Statten geht und eine verhältnissmässig geringe Menge des Arzneimittels eine grosse Umstimmung hervorbringt. Der Kranke erhält zuerst ein Abführungsmittel, z. B. aus Jalappe mit Weinstein oder einen Senneaufguss mit Salz und Manna, sodann gebraucht er jeden folgenden Tag ein Bad, welches wo möglich 12 Tage fortgesetzt werden muss, doch kann auch die Zeit abgekürzt werden. Während des Gebrauchs der Bäder erhält der Kranke nur dreimal täglich eine Suppe von einem halben Quart Fleischbrühe mit etwas Grütze, Gerste, Reis, oder statt derselben etwas Kaffee und in den ersten Tagen auch etwas gekochtes Obst oder leichtes Gemüse. Bei alten und schwächlichen Leuten kann auch etwas Wein, Fleischbrühe mit Eigelb und dergl. gestattet werden; bei sehr vollsaftigen und kräftigen Individuen können aber eine oder selbst zwei Aderlässe vorgenommen werden. Zum Getränk erhält der Kranke eine Abkochung von Rad. Bardanae, Liquiritiae und Althaeae, er muss sich warm kleiden und das Zimmer desselben muss eine beträchtliche Temperatur haben. Nach Beendigung der Bäder wird noch einmal ein Abführungsmittel gegeben. Bei weiblichen Kranken muss die Vorbereitungskur so angeordnet werden, dass sie beendigt ist, wenn die monatliche Reinigung eintritt, damit die Einreibungen, welche in 25 Tagen vollendet sind, gerade in der Zeit zwischen zwei Reinigungen vorgenommen werden können. Tritt die Reinigung alle 14 Tage ein, so richte man die Kur so ein, dass dieselbe vorüber ist, wenn die kritischen Tage eintreten. Stellt sich die Menstruation während der Einreibungen ein, so werden dieselben so lange fortgesetzt, bis diese vorüber ist.

§. 1668.

Die Einreibungen werden mit einer Salbe, aus einem Theile Quecksilber und zwei Theilen Fett bereitet, mit der Hand, welche über Kohlen erwärmt ist, vorgenommen, und es werden dabei 1, auch nach Umständen 1½ und selbst 2 Drachmen in folgender Ordnung eingerieben: Am ersten Tag in beide Unterschenkel, am dritten in beide Oberschenkel, am sechsten in beide Arme, am achten in den Rücken, am zehnten in beide Unterschenkel, am zwölften in beide Oberschenkel und zwar an diesen Tagen jedesmal am Morgen, am vierzehnten Tag kann auch noch eine Einreibung gemacht werden, oder man wartet den Eintritt des Mercurialfiebers ab. Es verändert sich nämlich der Zustand des Kranken zwischen 14ten und 16ten Tag; derselbe wird unruhig, sein Athem wird beklommen, der Puls voll, seine Zunge belegt, er wird von Herzklopfen und Leibschmerzen befallen, es stellt sich selbst Irrereden ein etc. Endlich bricht ein heftiger, 1 und selbst 2 Tage anhaltender Schweiss aus, wodurch, so wie durch reichlichen Harnabgang und Stuhlentleerungen die Zufälle wiederum gemässigt werden und auch in der Hauptkrankheit eine bedeutende Besserung herbeigeführt wird. Vom 16ten Tag an werden nun wiederum immer um den andern Tag Einreibungen und zwar Abends vorgenommen, in allen dazwischen liegenden Tagen ein mildes Abführungsmittel gegeben und dieses Verfahren bis zum 25sten Tag fortgesetzt.

In dieser ganzen Zeit darf der Kranke die Wäsche nicht wechseln, sich nicht waschen, das Zimmer, das stark gewärmt sein muss, nicht verlassen, das Fenster nicht öffnen und muss sich mit der sparsamen Nahrung, wie in der Vorbereitungskur begnügen. Gewöhnlich stellt sich zwischen dem 3ten und 5ten Tag ein Speichelfluss ein, geschieht dieses früher, so muss die Kur abgebrochen werden, ist er zu reichlich, das ist mehr

als 3 Pfunde täglich, so muss zwei Tage mit den Einreibungen ausgesetzt und die Menge der Salbe vermindert werden. Schwillt die Zunge in dem Grade an, dass sie sich zwischen den Zähnen einklemmt, so bringt man etwas Korkholz zwischen dieselben. Ist die Geschwulst der Zunge so bedeutend, dass Erstickung droht, so müssen Blutegel gesetzt und in den dringendsten Fällen die Zunge scarificirt werden. Die Geschwüre an der Zunge und dem Zahnfleisch bestreicht man mit einer Mischung von 1 Unce Mandelöl und 1 Drachm. Campher. Um Verwachsungen der innern Fläche der Wangen mit dem Zahnfleische zu verhüten, soll der Kranke öfters den Mund recht weit öffnen. Wird durch Verkältung der Speichelfluss oder der Schweiss unterdrückt, in welchem Falle leicht Gefahr für den Kranken eintritt, so wendet man warme Bäder (wohl noch zweckmässiger Dampfbäder) an, lässt den Kranken mit erwärmten camphorirten Tüchern stark reiben, giebt innerlich schweisstreibende Mittel und nach Umständen auch ein Brechmittel, legt Senfteige etc. Wird während der Kur der Kranke sehr schwach, der Puls sehr klein und schnell, oder klein, langsam und aussetzend, stellen sich Ohnmachten, Zuckungen und andere bedenkliche Zufälle ein, so müssen die Einreibungen ausgesetzt und kräftige Brühen, Wein, Hoffmann'sche Tropfen etc. in Anwendung gebracht werden.

Nach beendigten Einreibungen, die selten vermehrt werden müssen und von welchen zuweilen auch 9 oder 6 hinreichen, erhält der Kranke ein Bad mit Seife und Weingeist, bekleidet sich sodann mit reiner Wäsche und bezieht ein anderes Zimmer. Der Uebergang zur kräftigen und festen Nahrung darf nur allmählig geschehen, und ebenso darf sich der Kranke nur allmählig der frischen Luft wiederum aussetzen. Die Heilung

des Speichelflusses wird in der Regel der Natur überlassen.

§. 1669.

Die *von Cirillo erfundene Junctionsmethode*, ohne Salivation und Hunger, wird neuerdings wieder von *Hufeland*[1]) anempfohlen. Nachdem der Kranke mehrere Tage durch Fussbäder die Füsse weicher gemacht hat, reibt er jeden Abend 1 Drachme von der Sublimatsalbe (Nro. 96) in die Fusssohlen ein, trinkt dabei eine Abkochung von Sassaparille etc., gebraucht immer um den andern Tag ein warmes Bad, beobachtet eine mässige, mehr vegetabilische Diät und hält sich in einem warmen Zimmer auf. Die Behandlung muss nicht allein bis zum Verschwinden der Zufälle, sondern noch eben so lange nachher fortgesetzt werden. Die Kur dauert sehr lange, zwei und selbst sechs Monate.

§. 1670.

Das *Zittmänn'sche Decoct.* Die Anwendungsweise dieses Mittels ist nach der Gebrauchsart von *Chelius* folgende: Der Kranke nimmt am ersten Tage Morgens 16 Stück Pilulae mercuriales laxantes; die vier folgenden Tage trinkt er Morgens eine Bouteille erwärmtes, *starkes*, (Nr. 97), Nachmittags eine Bouteille nicht erwärmtes, *schwaches* Decoct (Nr 98); am sechsten Tage wieder die abführenden Pillen, wie am ersten Tage, und die vier folgenden Tage das Decoct auf die angegebene Weise. Dabei geniesse der Kranke nur 4 Loth gebratenes Hammelfleisch und 4 Loth weisses Brod täglich, und an den Tagen, wo die Abführungsmittel gegeben werden, drei Suppen. — Der Kranke halte sich während der ganzen Kur im Bette, um die Schweisse gehörig abzuwarten. Nach Verbrauch des Decoctes lässt man den Kranken

1) Journ. der praktischen Heilkunde. März 1819.

einige Zeit sich noch im Zimmer halten, einen Thee aus Spec. lignorum oder Radix Sassaparillae trinken und noch magere Diät beobachten. Wäre der Kranke jetzt noch nicht geheilt, so wende man die ganze Kur zum zweiten Male an. Bei sehr robusten Kranken gebe man am eilften Tage der Kur noch einmal die abführenden Pillen.

§. 1671.

Unter diesen besondern Verfahrungsweisen, die in der Regel nur in Anwendung gebracht werden, wenn die gewöhnliche Art, das Quecksilber zu geben, nicht genügt, verdienen wohl in den meisten Fällen die Dzondi'schen Sublimatpillen und besonders, wenn schon viel Quecksilber gebraucht worden ist, das Zittmänn'sche Decoct den Vorzug. Für die hartnäckigsten Fälle bleibe die grosse Schmier- und Hungerkur aufgehoben, welches ohne Zweifel das grösste Mittel gegen eingewurzelte Lustseuche ist, doch oft auch bedenkliche Zufälle hervorbringt.

§. 1672.

Ausser dem Quecksilber sind verschiedene Pflanzen, Rad. Sassaparillae, das Lignum Guajaci, Rad. Bardanae, Saponariae, Liquiritiae, Lign. Sassafras, so wie rad. Caricis arenariae, rad. Chinae, Astragali exscapi, Stipites Dulcamarae, Turiones Pini, cortex viridis nucum Juglandis, cort. Mezerei, Chelidonium majus, Chelidonium glaucium, das Opium, Aconit, Cicuta etc., in verschiedenen Zusammensetzungen mit oder ohne Quecksilber, wie (ausser dem schon erwähnten Zittmann'schen Decoct) in dem Pollinischen Decoct, dem von *Feltz*, von *Struve*, *Cambieri*, Sainte Marie, Vigaroux, dem Struv'schen Syrup, dem *Roob von Laffecteur* etc. empfohlen worden.*)

*) Eine Angabe dieser Zusammensetzungen ist in dem Werke *Dierbachs*, die neuesten Entdeckungen in der Materia medica, Heidelberg 1828, zu finden.

§. 1673.

Aus dem Mineralreiche sind angewandt worden: die Mineralsäuren, besonders die Salpetersäure, Kupfer, Arsenik und vorzüglich Gold.*)

Das Gold wurde vorzüglich von *Chrestien* eingeführt und von *Niel* empfohlen. Es wird als Goldfeile, Goldpulver, Goldoxyd und salzsaures Gold gegeben. Von dem letztern (dem Chrestienschen Goldsalze) wird der erste Gran in 12, der zweite in 11, der dritte in 10 und der vierte in 9 Theile getheilt, und in eben so viel Tagen als er Theile hat, mit etwas Stärkmehl oder Bärleppulver vermischt in die Zunge, das Zahnfleisch oder die empfindlichen Stellen der Geschlechtstheile eingerieben.**)

§. 1674.

Endlich müssen die Versuche erwähnt werden, die man in der neuesten Zeit, vorzüglich in England und Hamburg, gemacht hat, die Lustseuche ohne specifische Mittel und insbesondere ohne Quecksilber und Metallpräparate zu heilen. Die Behandlung zerfällt in eine allgemeine und in die örtliche. Die erstere besteht in grösster Reinlichkeit, Ruhe und nach Umständen einem stärkern oder schwächern antiphlogistischen Verfahren. Die Kranken werden zuerst gebadet und müssen andauernd im Bette verweilen, alle Producte der Krankheit, wie Schleim und Eiter, müssen durch Abwaschen, Einspritzungen und Einlegen von Charpie aufs sorgfältigste entfernt werden. Der Kranke wird auf eine magere Diät gesetzt, so dass er anfangs nur 4 Loth Weissbrod, einen Schoppen Wassersuppe, in welche Mehl eingerührt ist, und

*) Ihre Anwendungsart ist in *Richters* Therapie B. V. beschrieben.

**) Nähere Nachrichten über den Gebrauch des Goldes findet man ebenfalls in *Dierbach.*

des Mittags 6 Esslöffel voll Gemüse erhält; zum Getränk giebt man einen dünnen Haberschleim, oder das Decoctum Lignorum oder einen Sassaparilltrank; erst wenn die Besserung schon bedeutende Fortschritte gemacht hat, darf ihm eine etwas kräftigere Nahrung gestattet werden. — Bei starker Constitution des Kranken und bei entzündlichen Zufällen, insbesondere starker Phimosis oder Paraphimosis wird eine Aderlässe vorgenommen. — Innerlich wird Bittersalz in solchen Gaben angewandt, dass im Anfang mehrere und später wenigstens täglich eine Oeffnung erfolgen. Stellen sich schwämmchenartige Excoriationen ein, so wird mit dem Gebrauch dieses Mittels ausgesetzt.

§. 1675.

Die örtliche Behandlung richtet sich nach dem jedesmaligen Zustande der örtlichen Veränderungen, ohne dass auf etwas Specifisches Rücksicht genommen wird. Bei Geschwüren mit entzündlichem Character werden örtliche Blutentleerungen vorgenommen; bei sehr schmerzhaften Geschwüren und solchen mit harten aufgeworfenen Rändern werden erweichende Breiumschläge gemacht. Sind die Geschwüre ohne diese Zufälle, so werden sie mit einer Auflösung von Blei, schwefelsaurem Zink, schwefelsaurem Kupfer oder Kalkwasser verbunden, gegen phagedänische und brandige Geschwüre werden mildernde Umschläge, verdünnte Schwefelsäure, Myrrhentinctur, Terpenthin, Auflösung von Höllenstein angewandt, bei indolenten Geschwüren reitzende Umschläge. — Gegen Bubonen wird ein drückender Verband, wobei bei Schmerzhaftigkeit derselben Blutegel gesetzt werden müssen, empfohlen; ist Eiterung entstanden, so soll der Abscess vermittelst des Höllensteins geöffnet und sodann die eiternde Stelle wie ein Geschwür behandelt werden. — Halsgeschwüre werden, so lange noch Entzündung vorhanden ist, mit Blutegeln an den Hals gesetzt be-

handelt; ausserdem werden angewandt: Cataplasmen, Gurgelwasser von einem Aufguss von Salbei, cort. Ulmi, Holderblüthen mit einem Zusatz von Liquamen Myrrhae, oder von Essig und einer schwachen Auflösung von Höllenstein. Bei ausgebreiteten Geschwüren wird zugleich der innerliche Gebrauch der Salpetersäure empfohlen. — Syphilitische Hautausschläge werden, wie die Lustseuche im allgemeinen behandelt (§. 1674) und ausserdem werden gegen dieselben die Mittel angewandt, welche im Gebrauch sind, wenn sie nicht syphilitischer Natur sind. — Ebenso werden die Knochenleiden einfach behandelt. Gegen Knochenschmerzen, welche in der Mitte oberflächlich liegender Knochen, namentlich des Schienbeins, der Schädelknochen, des Brustbeins und der Vorderarmknochen, ihren Sitz haben, werden Einschnitte bis auf den Knochen empfohlen, worauf die Wunde mit einem Cataplasma bedeckt wird.

Fergusson (med.-chir. Transact Vol. 4). — *Rose* (ebend. Vol. 8). — *Guthrie* (Rust's Magaz. B. 4). — *Hennen* (Grunds. d. Militair-Chirurgie, a. d. Engl. Weimar 1822). — *Hill* (Edinb. med. and surg. Journ. 1822). — *Thomson* (ebend). — *Alcock* (Lond. med. Repos. Vol. 9 u. 14). *Rousseau* (americ. med. Record. Vol. 5). — *Phiney* (new engl. Journ. Vol. 9). — *Ware* (ebend). — *Stevens* (med. and surg. Register of New-York hosp. 1820). — *Krüger* (Horns Archiv 1822). — *Hufeland* (i. s. Journ 1822). — *Huber* (Stuttg. u. Tübing. 1825). — *Otto* (Journ. v. Walther und Gräfe. B. 8). — *Oppenheim* (Hamburg 1827). — *Fricke* (Annal. d. chirurg. Abtheilung des allg. Krankenhauses in Hamburg. B. I. Hamb. 1828).

§. 1676.

Es ist nunmehr durch viele Erfahrungen bestätigt, dass durch die so eben beschriebene Methode die Lustseuche geheilt werden kann und es wird selbst behauptet, dass bei derselben niemals die secundären Zufälle, namentlich das Knochenleiden, einen so bösartigen Character annehmen, wie dieses zuweilen bei der Lustseuche der Fall ist, wenn Mercur angewandt worden ist und durch

denselben das Leiden nicht bezwungen wurde; es kann jedoch diese Methode nur dann in Anwendung gebracht werden, wenn von dem Kranken eine pünctliche Befolgung der vorgeschriebenen Verhaltungsregeln erwartet werden kann; auch scheint sie nicht so sicher als die Behandlung der Lustseuche mit Quecksilber zu sein, da doch nach dieser Methode ziemlich häufig die allgemeine Lustseuche auf die örtlichen Zufälle folgt, nach *Thomson* unter 12 Fällen einmal, nach *Guthrie* und *Hill* unter 10, nach *Hennen* unter 5 und nach *Rose* unter 3 Fällen einmal.

Die Syphiloiden.

§. 1677.

Die Syphiloiden sind ansteckende Dyscrasien, die im Ganzen der allgemeinen Syphilis gleichen, aber sich nicht aus den gewöhnlichen Vorläufern der Syphilis entwickeln, leicht anstecken, endemisch und epidemisch vorkommen und meistens noch durch einzelne eigenthümliche Erscheinungen, namentlich oft durch himbeerartige Auswüchse sich auszeichnen.

§. 1678.

Hieher gehört das erst seit dem Jahre 1790 im östreichischen Küstenlande in Fiume, Buccari, Novi, Scherlievo etc. vorkommende Syphiloid, Scherlievo genannt,[1]) das im September des Jahres 1801 von einer Bevölkerung von 38,000 mehr als 13,000 Individuen ergriffen haben soll. Meistens stellen sich zuerst Schmer-

1) *Jenniker* (med. Jahrb. des k. k. österr. Staates, 5ter B).

zen im Rückgrathe, den Röhrenknochen und den Gelenken ein, zugleich, oder nach, und oft auch ohne jene Schmerzen wird das Gaumensegel und der Rachen dunkelroth; es entstehen an den Lippen und in der Mund- und Rachenhöhle weisse Streifen, Pusteln und schankerhafte Geschwüre, welche die Weichtheile zerstören und sodann auch die Knochen angreifen; durch Ausbreitung dieser Geschwüre auf den Kehlkopf und die Luftröhre entsteht zuweilen Luftröhrenschwindsucht. Mancherlei Hautausschläge entstehen, die Psoriasis guttata, kupferrothe handbreite Flecken (Vitiligo cuprea, *Jenniker*) und ausgebreitete violett-blaue Flecken (Vitiligo violacea, *J.*), einzeln stehende Knötchen, die abtrocknen und schneeweise Flecken zurück lassen (Scerlievo Psora) und auch dicht beisammenstehende Blätterchen, die durch ihre Abschuppung dem Körper das Ansehen geben, wie wenn er mit Mehl gepudert wäre. Manchmal vereitern die Knötchen und gehen in Geschwüre über, die weisse Narben zurücklassen und zuweilen auch um sich fressen. Auch entstehen dunkelrothe oder blaue erbsengrosse harte Knoten, die an ihrer Spitze weisse Schuppen bilden, und nach mehreren Jahren in Verschwärung übergehen, so wie auch auf einem erythemartigen Grunde sitzende Bläschen, die in Geschwüre übergehen. Es geben die Geschwüre eine specifisch stinkende klebrige Jauche von sich, sie zerstören im Gesichte oft die Augen, die Nase, die Lippen etc., geben aber auch zu Verwachsungen Veranlassung, so dass die untere Kinnlade mit der Brusthaut zusammenhängt. Es entstehen Verhärtungen der Speicheldrüsen, lymphatische Geschwülste, Gliedschwämme, zuweilen der Elephantenfuss. In manchen Fällen werden die Knochen angegriffen, es entstehen Knochenschmerzen, Tophi und Caries. Die Krankheit kann 20 Jahre dauern.

§. 1679.

Grosse Aehnlichkeit mit dem Scherlievo haben die

Sibbens oder Siwwens,[1]) welche in Schottland zu Hause sind und in einigen Gegenden so häufig gewesen sein sollen, dass zuweilen drei Viertheile der Bevölkerung litten. Gegenwärtig kommt dieses Uebel nur selten vor. Es entstehen ebenfalls um sich fressende Geschwüre und hierauf mancherlei Hautausschläge, unter welchen vorzüglich schwammige, weissliche, himbeerartige Auswüchse bemerkenswerth sind (von welchen die Krankheit den Namen Siwwen erhalten hat). Die Knochen leiden selten. Zuweilen kommen an den Geschlechtstheilen Geschwüre vor, aber niemals im Anfang der Krankheit.

§. 1680.

Ein anderes Syphiloid ist das scandinavische Syphiloid oder die Radesyge [2]). Es kommt dasselbe in Schweden, Norwegen, Grönland und Lappland vor und besteht vorzüglich in kupferfarbigen und härtlichen Flecken am Gaumensegel, die allmählig in um sich fressende und selbst die Knochen angreifende Geschwüre übergehen, in einem tuberkulösen Ausschlag, der erbsengrosse Knoten darstellt, die zuerst nicht gefärbt sind, allmählig sich röthen und sich ebenfalls in um sich fressende Geschwüre umwandeln, und in einem Knochenleiden, das sich zunächst durch fixe Schmerzen äussert, worauf Exostosen entstehen, die aufbrechen und in schwammige Geschwüre übergehen.

§. 1681.

Wahrscheinlich aus der Radesyge durch Ansteckung entstanden (in den Jahren 1785—87) ist ein in Hollstein

1) *Gilchrist* (auserles. Abhandl. für pract. Aerzt. B. 24). — *Swediaur* (Trait. compl. des malad. syphilit.).

2) *Arbo* und *Mangor* (zwei Abhandl. a. d. Dän. m. e. Vorrede von Hensler. Alt. 1797). — *Pfefferkorn* (Alt. 1797). — *Osbeck* (Stockh. 1811, a. d. Franz. v. Meyer. Bremen 1815). — *Hünefeld* (Lpz. 1828).

vorkommendes Syphiloid, die Marschkrankheit oder Dittmarsche Krankheit.[1]) Es besteht diese Krankheit in Geschwüren im Halse, aber auch an den Geschlechtstheilen und dem After, Hautausschlägen, besonders an der Stirne, die oft auch in Geschwüre übergehen, Caries der Nasenknochen, Entzündung der Augenlieder, wobei sich diese Theile umlegen und die Wimpern verlieren, und zuletzt sich einstellenden colliquativen Schweissen und Zehrfieber.

§. 1682.

Das Mal de Chicot[2]) ist ein in Canada seit 60 Jahren vorkommendes Syphiloid, das zwar auch bei Erwachsenen, aber vorzüglich bei Kindern sich zeigt. Dasselbe besteht in kleinen, im Anfange den Aphthen ähnlichen Pusteln an den Lippen und in der Mundhöhle, die eine eiterartige Flüssigkeit ergiessen und grosse Zerstörungen veranlassen, so dass oft bei Kindern die Zunge fast ganz zerfressen wird, nächtlichen Knochenschmerzen, Anschwellung der Hals- und der Leistendrüsen, flechtenartigen, fressenden Ausschlägen, Exostosen und Knochenfrass.

§. 1683.

Endlich gehören hieher die Yaws und die Pians, welche von *Sauvages* unter dem gemeinschaftlichen Namen Framboesia (Himbeerausschlag) begriffen wurden, welcher Name übrigens weniger für die Yaws, als für die Pians passt, und auch für die andern Syphiloiden gebraucht worden ist.

1) *Brandis* (Hall. allgem. Literat.-Zeit. 1811). — *Struve* (Alt. 1820, auch in dessen Werk über d. Diät-Entziehungs- und Hungerkur in syphil. u. pseudosyphil. Krankh. Alt. 1822). — *Dührssen* (in Pfaff's Mittheil. 1833. B. I.).

2) *Meyer* (lat. Reval 1824). — *Albrecht* (Diss. Dorpat 1825).

Die **Yaws**,[1]) welche auch Variola magna genannt wurden, da sie den Blattern sehr ähnlich sehen, sind eine in ganz Africa, auf den westindischen Inseln, wohin die Neger verkauft werden, und in Ostindien endemische Krankheit. Es gehen dem Ausbruche nächtliche Knochenschmerzen, fürchterliche Träume, Melancholie, oft ein widernatürlicher Appetit nach ungeniessbaren Stoffen, z. B. nach Kohle, Erde oder Kreide, und oft auch ein schleichendes Fieber mehrere Woche vorher. Es schwillt nunmehr der Kopf auf und es brechen zuerst am Halse, besonders in der Gegend des Kehlkopfes, den Blattern ähnliche Pusteln, welche mit einem kleienartigen Staube bedeckt sind und sich immer mehr ausbreiten, besonders in den Achseln und den Weichen, mehrere Monate hindurch aus. Die meisten Vorläufer hören nach diesem Ausbruche auf, mit Ausnahme der Knochenschmerzen, die vorzüglich bei magern Personen oft in Knochengeschwüre übergehen. Die Blattern füllen sich mit einem zähen, weissen Eiter, der um sich frisst und hierdurch oft Blutungen erregt; auch schwellen immer umher die Venen sehr stark an. Die Geschwüre, die hierdurch erzeugt werden, haben kleiige Ränder, geben einen weisslichen Eiter von sich, und sehen, wenn sie in der Mundhöhle vorkommen, den venerischen gleich; in ihrem Umfang werden die Haare weiss. An den Gelenken, besonders an den Knöcheln, sammeln sich die Blattern zu grossen Geschwüren (die Mama- oder Meister-Yaws) an und an den Fusssohlen erscheinen oft schwielige Geschwüre mit Fleischgewächsen (die Crabbe-Yaws). Zuletzt kommen ein hektisches Fieber mit Nervenzufällen (oft Wasserscheu) und oft auch Magenruhr und Wasser-

1) *Schilling* (lat. Ultraj. ad Rh. 1770). — *Allamand* (nov. act. natur. curios. vol. IV.). — *Nielen* (Samml. auserles. Abhandl. B. 7). — *Sprengel* (Beiträge zur Geschichte d. Med. u. s. Pathol.).

sucht hinzu. Nicht selten geht die Krankheit in den raudigen Aussatz über.

§. 1684.

Die **Pians** [1]) sind ursprünglich an der Küste von Guinea einheimisch, kommen aber überhaupt bei den Negern in Afrika und Westindien vor und theilen sich seltener als die Yaws den Weissen mit. — Die Krankheit beginnt nicht sowohl mit Knochenschmerzen, wie die Yaws, als mit einem heftigen Fressen und Jucken der Haut, wozu sich oft auch ein schleichendes Fieber hinzugesellt. Es brechen nunmehr, meistens zuerst an den Geschlechtstheilen, kleienartige Flechten aus, zwischen welchen rothe Blüthen von der Grösse eines Stecknadelkopfes ausbrechen, welche später verschwären. Diese Geschwüre breiten sich sehr aus und sind mit gelblichen und zuweilen auch mit röthlichen Beerschwämmen, von der Gestalt der Himbeeren, besetzt (die weissgelblichen und die rothen Pians). Oft fliessen mehrere solcher Geschwüre in ein grosses zusammen, das tief um sich frisst (Mama- oder Meister-Pian). — Der Ausbruch der Hautkrankheit ist kritisch, indem die vorhergegangenen Erscheinungen oft nachlassen, doch treten oft noch nach demselben Knochenschmerzen ein und es bilden sich Exostosen und Erweichung der Knochen. Die Haut an den Fusssohlen und zuweilen die an den Händen verdickt sich oft und wird schmerzhaft, und zwischen den Fingern und den Zehen bilden sich Flechten, welches Uebel in Cayenne Sauauas genannt wird; oft geht dasselbe in krebshafte Geschwüre über (Crabben). An den Nägeln entstehen oft kleine kirschrothe, schmerzende Geschwüre (Guignes, Kirschen), welche, wenn die Nägel

1) *J. Hume* (med. Versuchen u. Bemerk. einer Gesell. in Edinb. B. 6.) — *Bajon* (Mém. pour serv. à l'histoire de Cayenne. vol. I). — *Sprengel* (in den beiden oben angef. Werken).

nicht abgeschnitten werden, die Knochen zerstören. Zuletzt kommen Nervenaffectionen, Wassersucht und Schwindsucht hinzu, und nicht selten geht das Uebel in das Mal rouge über.

§. 1685.

Ursachen. Es werden die erwähnten Krankheitsformen zum Theil mehr von dem Aussatze, zum Theil von der Lustseuche abgeleitet. Als mit dem Aussatze verwandt werden in der Regel die Yaws und Pians betrachtet, doch haben sie auch grosse Aehnlichkeit mit der Lustseuche, und die Pians pflanzen sich vorzüglich durch den Beischlaf fort, die andern genannten Krankheitsarten werden gewöhnlich der Lustseuche zugeschrieben, doch halten sie auch manche für Abkömmlinge des Aussatzes. Es pflanzen sich diese Krankheiten sämmtlich durch Ansteckung fort, und zwar auch während des Beischlafs, aber auch ohne denselben, bei Berührung des Körpers und vermittelst fester Träger, wie Betten, Kleider, Trinkgeschirre etc. Die Yaws und Pians sollen insbesondere oft durch Fliegen, die von einem Körper auf den andern sich begeben, fortgepflanzt werden. Von dem Scherlievo wird selbst von einigen Aerzten behauptet, dass das Contagium durch die Luft sich verbreite. Die Ansteckung geschieht zum Theil sehr leicht, so dass oft die Krankheit eine grosse Verbreitung erhält. Die Yaws sollen das nämliche Subject nur einmal befallen.

§. 1686.

Vorhersage. Die erwähnten Krankheitsarten werden häufig tödtlich, besonders durch Zehrfieber und Wassersucht, die sich zuletzt hinzugesellen; sie sind hartnäckig, aber sämmtlich heilbar, ja sie werden zuweilen durch die Naturkräfte allein geheilt, namentlich die Yaws. Ist Beinfrass vorhanden, so ist immer ein günstiger Erfolg der Behandlung sehr zweifelhaft.

§. 1687.

Behandlung. Gegen sämmtliche erwähnte Krankheiten ist das Quecksilber im Gebrauche, doch wurden dieselben, wie übrigens die Lustseuche selbst, auch mit Erfolg ohne Quecksilbermittel behandelt. Diese Verfahrungsweisen bestehen im allgemeinen: in sorgfältiger Entfernung der Producte der Krankheit durch fleissiges Abwaschen und andere Reinigungen der kranken Stellen, in der Entziehungs- oder Hungerkur, der Anwendung von Getränken von Sassaparill, Guajack, Lign. Sassafras, rad. Chinae etc., und auch der Anwendung von Antimonialien, Schwefel etc., so wie in Anwendung örtlicher Mittel, die sich nach Beschaffenheit der Geschwüre, des Ausschlags, der Condylome und der andern örtlichen Veränderungen richten muss.

Zweite Gruppe
der
DRITTEN ORDNUNG DER BILDUNGS-KRANKHEITEN.

Die Erweichung einzelner Gewebe.

Die Gehirnerweichung.
(*Encephalomalacia.*)

Lallemand (recherches anat. path. sur le cerveau etc. Par. 1821 u. 29, aus d. Franz. v. Weese. Lpz. 1825 u. 26.) — *Rostan* (2te Ausg. Par. 1823, ubers. v. Fechner. Lpz. 1824). — *Bouillaud* (tr. clin. et physiol. de l'encephalite etc. Par. 1825). — *Waldeck* (lat. Königsberg 1829).

§. 1688.

Die Gehirnerweichung ist während des Lebens nicht leicht mit Sicherheit zu erkennen, da auch andere Substanzveränderungen im Gehirne beinahe die gleichen Erscheinungen hervorzubringen vermögen, und selbst die nämlichen Zufälle vorkommen, und bei den Leichenöffnungen durchaus keine sichtbaren Veränderungen in der Substanz des Gehirnes angetroffen werden.

Die Individuen, bei welchen man Gehirnerweichung antraf, litten häufig an anhaltenden Kopfschmerzen an einer bestimmten Stelle des Kopfes, an Ohrenklingen, Lichtscheue, Schwindel, oft an Erbrechen, an Schmerzen in den Gliedern; ein Kranker, bei welchem sich eine sehr ausgebreitete Erweichung in der linken Hemisphäre

des grossen Gehirnes fand, litt einige Zeit vor seinem Tode vier Tage hindurch an heftigen Anfällen von Brustbräune und sodann an einer zermalmenden Nevralgie des linken Fusses; zuweilen leiden sie auch an krampfhaften Zusammenziehungen der Muskeln auf der der erweichten Stelle entgegengesetzten Seite des Körpers. Die Geisteskräfte, insbesondere das Gedächtniss, werden schwach, und es stellt sich das Gefühl von Taubheit und Ameisenkriechen in den Gliedern ein, zuweilen ist Delirium vorhanden. Der Puls soll hierbei sehr veränderlich sein, oft gereitzt sein, und wieder sehr langsam werden.

Es treten nun ziemlich schnell und zuweilen auch plötzlich, die Zeichen der theilweisen Unterdrückung der Gehirn- und Nerventhätigkeit hervor, was die zweite Periode der Krankheit bezeichnet. Der Kranke verliert das Gedächtniss oft ganz, wird schwerhörig, verfällt in einen schlafsüchtigen Zustand, es bilden sich Lähmungen aus, oder er wird auch plötzlich von einem Schlagfluss mit halbseitiger Lähmung auf der der Erweichung entgegengesetzten Seite befallen, wie dieses in dem oben erwähnten Falle geschah, in welchem auf die Anfälle der Brustbräune und die Nevralgie im linken Fusse plötzlich ein Schlagfluss mit Lähmung der rechten Seite erfolgte, ohne dass bemerkbare Zeichen eines Gehirnleidens vorangegangen waren. Nach *Rostans* Beobachtungen [1]) verfällt der Kranke in der Mehrzahl der Fälle zuletzt in ein adynamisches Fieber.

Wegen schwerer Erkennung der Krankheit, besonders in ihrer Entstehung, lässt sich schwer bestimmen, ob dieselbe in der Regel mehr einen hitzigen oder langwierigen Verlauf habe, doch scheint diese Substanzumbildung sich schneller zu gestalten und schneller

1) Am a. O. S. 18.

tödtlich zu werden, als dieses gewöhnlich bei den andern Substanzveränderungen im Gehirne der Fall ist.

§. 1689.

Ergebniss der Leichenöffnungen. In den geringern Graden ist die Consistenz der erweichten Substanz nicht viel geringer, als die normal beschaffene Hirnsubstanz, welche auch nicht immer ganz denselben Grad der Härte zeigt, so dass es oft schwer zu bestimmen ist, wo wirklich eine krankhafte Erweichung vorhanden ist; in den höchsten Graden ist das Gehirn beinahe so dünnflüssig wie Eiter, doch von diesem besonders durch die Farbe noch wohl zu unterscheiden, meistens ist die Mitte der erwähnten Substanz am dünnflüssigsten. Die Farbe der erweichten Masse ist meistens ein glanzloses Weiss, wie die Farbe der normalen Hirnsubstanz, oft aber auch gelblich, grünlich, bräunlich. Der Umfang der Erweichung ist sehr verschieden, sie kann selbst beinahe eine ganze Hemisphäre einnehmen. Jeder Theil des Gehirnes kann erweichen, am häufigsten scheint aber die Erweichung in den Centraltheilen der Hemisphären, in den Wandungen der Seitenventrikel, im kleinen Gehirne und in den gestreiften Körpern vorzukommen. Zuweilen ist die Gehirnerweichung mit Bluterguss in die erweichte Substanz verbunden. In den Gehirnhöhlen ist meistens Wasser angesammelt.

§. 1690.

Ursachen. Die Gehirnerweichung wird am häufigsten in den Leichen alter Leute angetroffen, wenn man die mit der hitzigen Hirnhöhlenwassersucht und mit dem chronischen Wasserkopfe verbundenen Erweichungen nicht hieher rechnet.

Als Gelegenheitsursachen werden beschuldigt, der Missbrauch geistiger Getränke, zu grosse Geistesanstrengungen, heftige Leidenschaften, Gehirnerschütterung, durchdringende Kälte, der Sonnenstich etc.

§. 1691.

Wesen. Der krankhafte Prozess, welcher die bezeichnete Substanzveränderung hervorbringt, wird von vielen Aerzten für eine schleichende Entzündung gehalten; doch kann, wie ich im allgemeinen Theil von der Darstellung der Krankheiten der Reproduction darzuthun mich bemüht habe, die Erweichung der Gewebe ohne Entzündung geschehen, und ich habe auch schon in mehreren Fällen von Gehirnerweichungen durchaus keine Spur von entzündlicher Gefässanfüllung angetroffen.

§. 1692.

Behandlung. Gegen die schon eingetretene Erweichung möchte wohl kein wirksames Heilverfahren aufgefunden werden können, und es beschränkt sich daher die Behandlung auf die Erfüllung einzelner Anzeigen aus den Zufällen, z. B. auf die Mässigung eines Blutandranges nach dem Kopfe, entzündlicher Zufälle etc.

Die Magenerweichung.

Jäger (Hufeland's Journ. B. 56). — *Rhades* (Horns Archiv. 1822). — *Cruveilhier* (a. d. Franz. v. Vogel, Liegnitz 1823). — *Camerer* (Stuttgardt 1828).

§. 1693.

Die erste Beschreibung von erweichten und durch Erweichung durchlöcherten Stellen des Magens, wie sie auch nach dem Tode zuweilen bei solchen, die an keiner Krankheit des Magens litten, vorkommen, gab *J. Hun-*

ter; [1]) die erste Beschreibung der Krankheit aber, von der hier die Rede ist, ist von *Jäger*.

Es ist die Krankheit sehr schwer und wohl kaum mit vollständiger Gewissheit zu erkennen, da mehrere Krankheiten der Unterleibsorgane und selbst die hitzige Gehirnhöhlenwassersucht mit denselben Zufällen auftreten können, und auch die zuletzt genannte Krankheit mit der Magenerweichung häufig in Verbindung vorkommt; ja selbst, wenn die Untersuchung der Leiche die unten näher zu bezeichnende Veränderung in dem Magen nachweist, kann es oft zweifelhaft sein, ob diese Veränderung noch während des Lebens sich bildete oder erst nach dem Tode eintrat, da die Beobachtungen von *Hunter*, so wie die Versuche von *Camerer* beweisen, dass die Erweichung nach dem Tode, ohne ein vorhergegangenes Magenleiden, unter gewissen Bedingungen leicht erfolgen. Zuweilen entwickelt sich die Krankheit nur allmählig, indem die Kranken, welches in der Regel nur Kinder von fünf Monaten bis $1\frac{1}{2}$ Jahren sind, allmählig den Appetit verlieren, zuweilen von Erbrechen befallen werden, an schleimigten Durchfällen, Empfindlichkeit des Unterleibes, oft auch an Schleimhusten eine oder mehrere Wochen lang leiden, bis das Uebel sich in seinen höhern Graden entwickelt, meistens jedoch bildet sich die Krankheit in rascherm Verlaufe aus. Die Kinder werden von einem heftigen Fieber, mit sehr starkem Durste, befallen, sie haben grosse Unruhe, wimmern und schreien viel und ziehen die Füsse gegen den Bauch, der meistens gespannt ist, aber auch weich sein kann, an. Es fehlt der Appetit, meistens haben die Kinder Erbrechen, welches oft seltener, oft aber auch anhaltend ist, in der Regel sind grünliche, sauerriechende

1) On the digestion of the stomach after death in den phil. transact. vol. 62.

und schleimigte Durchfälle vorhanden, das Athmen ist beengt, und es ist Husten vorhanden, die Kinder verfallen in einen schlafsüchtigen Zustand, aus dem sie jedoch, wenn nicht hitzige Gehirnhöhlenwassersucht hinzukommt, oft durch ein geringes Geräusch und die geringste Berührung erweckt werden, die Augen sinken in ihre Höhlen zurück, das Gesicht wird blass, und es fühlt sich, so wie die Gliedmassen, kühl an. Der Körper magert schnell ab, besonders am Halse. Zuletzt kommen Convulsionen hinzu.

In der Mehrzahl der Fälle dauert die Krankheit zwischen 3 und 5 Tagen, doch hat man sie auch innerhalb 24 Stunden tödtlich werden und auch zuweilen (*Jäger* und *S. G. Vogel*) einen mehr chronischen Verlauf von mehrern Wochen halten gesehen.

§. 1694.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Die erweichte Stelle befindet sich in der Regel am Grunde des Magens, insbesondere da, wo die Milz anliegt. Hier ist der Magen missfarbig, röthlichbraun, durchscheinend, fasst man ihn an dieser Stelle, so reisst er leicht ein und oft ist er auch schon durchlöchert. An der erweichten Stelle ist die Schleimhaut und oft auch die Muskelhaut in eine sulzige Masse verwandelt, die Erweichung ist in der Mitte am stärksten und wird gegen ihren Rand hin geringer, so dass die erweichte Substanz allmählig in die normale Substanz des Magens übergeht. Im Umfang der Erweichung fand man zuweilen entzündliche Gefässinjection, in andern Fällen nicht. Der Inhalt des Magens besteht in einer wässerigten, schleimigten Flüssigkeit von saurem Geruche. Zuweilen traf man auch Stücke von Gedärmen erweicht an, in welchem Falle sich ebenfalls die erwähnte Flüssigkeit vorfand. Die Gekrösdrüsen sind zuweilen angeschwollen, aber weich.

In dem Gehirne trifft man, nach *Camerer* fast ohne

Ausnahme, Spuren von Entzündung an, die Gefässe entzündlich injicirt, die Hirnhäute unter einander verwachsen, Lymphe zwischen dieselben und in die Hirnhöhlen ergossen, die Gefässe in der Hirnsubstanz mit Blut überfüllt, die Consistenz des Gehirnes oft weicher oder härter als gewöhnlich; in der Mehrzahl der Fälle soll der Pons Varolii und die Medulla oblongata widernatürlich fest sein.

§. 1695.

Ursachen. Die Krankheit befällt vorzüglich Kinder von dem angegebenen Alter, nach Manchen vorzüglich solche von scrophulöser und sonst cachectischer Anlage, nach Andern aber ebensowohl solche von guter Gesundheit.

Die Gelegenheitsursachen sind noch nicht gehörig bekannt, es werden aber vorzüglich eine schlechte Mutter- oder Ammenmilch und andere fehlerhafte Nahrungsmittel, besonders nach plötzlichem Entwöhnen des Kindes von der Brust, gestörte Hautausdünstung und Metastasen von Rheumatismus, Friesel etc., so wie auch der Keuchhusten, die Rose der Neugebornen und die hitzige Gehirnhöhlenwassersucht als entferntere Ursachen dieser Krankheit beschuldigt.

§. 1696.

Wesen der Magenerweichung. *Hunter, Meckel* u. A. glauben, dass die Erweichung des Magens erst nach dem Tode entstehe, indem der Magensaft die Magenhäute auflöse, was ersterer Schriftsteller eine Selbstverdauung nennt. *Jäger* nimmt eine Lähmung der Magennerven, insbesonders des Vagus an, wodurch der Magensaft eine saure (essigsaure) Beschaffenheit annehme und dadurch die Eigenschaft erhalte, zerstörend auf die Magenhäute einzuwirken. Die Fähigkeit des Magensaftes, so wie der Essigsäure, den Magen aufzulösen, hat *Camerer* nachgewiesen, jedoch nur in der Art, dass der

Magen einige Zeit nach dem Tode hierdurch aufgelöst wird. *Cruickshank* sucht die nächste Ursache in einer verstärkten Einsaugung der resorbirenden Gefässe, *Cruveilhier* in einer Reitzung, wodurch ein Andrang von weissen, zur Ausdünstung bestimmten Säften nach dem Magen Statt finde, und derselbe als ein sehr zartes Gewebe von denselben durchdrungen und aufgelöst werde. *Lenhosök* leitet die Magenerweichung von einem Gehirnleiden ab, das sympathisch auf den Magen wirke und einerseits dessen Organisation so verändere, dass sie der auflösenden Kraft der thierischen Säfte nicht mehr widerstehen kann, andererseits die Säfte des Magens wahrscheinlich durch vermehrte Entwicklung von Essigsäure ungewöhnlich scharf und ätzend mache. *Sundelin* leitet die Krankheit von einem fehlerhaften biochemischen Einfluss der Nerven des Magens, welcher oft metastatischen Ursprungs zu sein scheine, her. Manche Aerzte sehen die Krankheit für einen Ausgang der Magenentzündung an.

§. 1697.

Vorhersage. Die schon zu Stande gekommene Erweichung des Magens scheint unheilbar zu sein, wohl aber mag der Krankheitsprozess, der die Erweichung zur Folge hat, öfters durch die Hülfe der Kunst unterdrückt werden.

§. 1698.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Insofern ein Verdacht obwaltet, dass eine fehlerhafte Mutter- oder Ammenmilch die Schuld der Krankheit trage, muss schnell eine andere Amme gewählt werden, auch muss, wenn das Kind nicht durch die Mutterbrust ernährt wird, die grösste Sorgfalt auf die Nahrungsmittel gewandt werden, insbesondere werden Eichelkaffe mit Milch, Sago, Reis und Gerstenschleim mit Kalbs-Bouillon bereitet und Zwiebackbrei

mit Fleischbrühe empfohlen, doch möchte oft bei sehr gereitztem Magen reine, warme Milch das zweckmässigste sein.

§. 1699.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* So lange die Natur der Krankheit nicht mit einiger Bestimmtheit bekannt ist, und auch eine sichere Erkennung der Krankheit kaum möglich ist, wornach also nicht mit Sicherheit beurtheilt werden kann, ob bei glücklichem Erfolg wirklich die erwähnte Krankheit vorhanden war, lässt sich schwer bestimmen, welche Behandlung die zweckmässigste sei. — Aus den Erscheinungen der Krankheit, namentlich dem Erbrechen, den Durchfällen und den Schmerzen geht hervor, dass der Magen und der Darmkanal in einem gereitzten Zustande sich befinden, und man wird nur Nutzen gewähren, wenn man jedenfalls besänftigende Mittel anwendet, besänftigende Umschläge auf die Magengegend, Bäder und im Anfang der Krankheit wohl auch Blutegel, innerlich nach *Cruveilhiers* Rath das Opium, bei dem aber, besonders bei hervorstehendem Gehirnleiden, immerhin Vorsicht nothwendig ist. Da der Magen so sehr von dem Zustande des Gehirnes abhängt und in der Regel eine entzündliche Gehirnaffection vorhanden ist, so scheint es auch zweckmässig zu sein, Blutegel an den Kopf zu setzen, ja sie möchten zuweilen an dieser Stelle angewandt eine grössere Wirkung, als auf den Magen gesetzt, äussern. Da bei dieser Krankheit der Magensaft eine sehr saure Beschaffenheit erhalten soll, und die Essigsäure wenigstens im Tode den Magen aufzulösen im Stande ist, so möchten neben der besänftigenden Methode die säuretilgenden Mittel angezeigt sein. — Von der Ansicht ausgehend, dass der nervus vagus entzündet sei, empfiehlt *Camerer* Blutegel an den Hals gesetzt und Einreibungen von Quecksilber-

salbe an derselben Stelle, wobei er zugleich in der Voraussetzung eines lähmungsartigen Zustandes des Magens das von *Pommer* gerühmte salzsaure Eisen anwendet. *Jäger* empfiehlt in chronischen Fällen eine Mischung von kohlensaurem Kali, wässerigter Rhabarbertinctur, Extract von unreifen Pomeranzen, Diacodiensyrup und Fenchelwasser, welche Zusammensetzung für manche Fälle sehr zweckmässig zu sein scheint. *Nasse* rühmt die Salpetersäure, *Rhades* die oxygenirte Salzsäure und *Pitschaft* die brenzlige Holzsäure.

Dritte Gruppe
der
DRITTEN ORDNUNG DER BILDUNGS-KRANKHEITEN.

Die Erhärtung einzelner Gewebe.

Die einfachen Verhärtungen der Organe verdienen in eigenen Kapiteln abgehandelt zu werden, da sie, wie es scheint, nicht immer aus Entzündung entstehen und jedenfalls, wenn sie auch aus Entzündung entsprungen sind, lange Zeit für sich fortbestehende, von der Entzündung verschiedene Krankheitszustände sind und auch von den Afterbildungen, bei welchen das Gewebe zugleich verhärtet ist, wohl zu unterscheiden sind. Einstweilen habe ich, dem alten Herkommen gemäss, die Verhärtungen der einzelnen Organe blos gelegentlich bei der Darstellung der Entzündung dieser Theile beschrieben und mich begnügt, das Nothwendige über die Erhärtung als krankhaften Bildungsprozess in dem allgemeinen Theile der Bildungskrankheiten anzuführen und eben daselbst die allgemeinen Regeln über die Behandlung der Erhärtung der Gewebe anzugeben (§. 1406). — Hier, zwischen der Darstellung der Erweichung der Gewebe (von denen ich nur als Beispiel die Erweichung von zweierlei Organen angeführt habe) und der der Afterbildungen verdienen die Verhärtungen der einzelnen Organe beschrieben zu werden.

Vierte Gruppe
der
DRITTEN ORDNUNG DER BILDUNGS-KRANKHEITEN.

Die Afterbildungen.

Die Tuberkelbildung.

§. 1700.

Tuberkeln sind schon beinahe in allen Organen angetroffen worden. Es beginnt die Bildung derselben gewöhnlich in einem einzelnen Organ, späterhin werden aber meistens ein oder mehrere andere davon ergriffen. Es giebt verschiedene Arten der Entwicklung der Tuberkeln, im allgemeinen herrscht aber in der Form dieser Afterbildungen nach den verschiedenen Organen, in welchen dieselben vorkommen, eine grosse Uebereinstimmung und es mag daher genügen, die Tuberkelbildung desjenigen Organs hier allein zu beschreiben, das am häufigsten diesen Desorganisationen unterworfen ist. Es sind dieses die Lungen in der Lungenschwindsucht.

Die Lungenschwindsucht.
(*Phthisis pulmonalis*).

Morton (Lond. 1689, a. d. Lat. Helmst. 1780). — *Reid* (a. d Engl. v. Diel. Offenb. 1787). — *Portal* (a. d Franz. m. Anmerk. v. Mühry. 2 Bde., Hann. 1789 u. 1802). — *Storr* (Stuttg. 1809). — *Bayle* (Par. 1810). — *Duncan* (Edinb. 1814, a. d. Engl. von Choulant, Lpz. 1817). — *Southley* (Lond. 1814, a. d. Engl. von Radius, Lpz. 1820). — *Young* (Lond. 1815 u. in d. Samml. auserlesener Abhandl. B. 28). — *J. A. Walther* (2 Bde. Bamberg 1819). — *Engelhard* (Aarau 1823). — *Louis* (Par. 1825, a. d Franz. v. Weese, Lpz. 1827). — *Laennec* (de l'auscult. méd.). — *Lorinser* (Lehre von den Lungenkrankheiten).

§. 1701.

Unter Lungenschwindsucht versteht man in der Regel die Abmagerung des Körpers, welche durch ein Lungenleiden bedingt ist.

§. 1702.

Man nimmt gewöhnlich drei Arten von Lungenschwindsucht an:

1) Die *schleimige Lungenschwindsucht* (Phthisis pulm. pituitosa). Dieselbe besteht in einem langwierigen Catarrh oder einer langwierigen Luftröhren- und Bronchienentzündung mit reichlicher Schleimabsonderung, wodurch allmählig die Kräften und die Stoffe des Körpers verzehrt und ein hectisches Fieber herbeigeführt wird. Die Kenntniss dieses Krankheitszustandes und der Behandlung desselben geht aus dem hervor, was über den Catarrh, die Luftröhrenentzündung und das hectische Fieber bekannt ist.

2) Die *knotige Lungenschwindsucht* (Phth. pulm. tuberculosa). Aus dieser knotigen Lungenschwindsucht entwickelt sich in der Regel die eiterige und sie kann daher, in so weit dieses der Fall ist, als der erste Zeitraum der eiterigen angesehen werden, in so fern

es aber Knoten giebt, die niemals in Eiterung übergehen, muss sie als eine eigene Art der Lungenschwindsucht betrachtet werden. In der Natur kommen übrigens nicht wohl Fälle vor, in welchen neben andern Knoten nicht auch solche, die in Eiterung übergehen, vorhanden sind und es ist auch bei dem Lebenden unmöglich zu bestimmen, von welcher Beschaffenheit sämmtliche vorhandene Knoten sind, wesshalb es vergönnt sein wird, die Beschreibung der knotigen Schwindsucht in der Darstellung des ersten Zeitraums der tuberkulös-eiterigen Schwindsucht zu geben.

3) Die *eiterige Schwindsucht* (Phth. pulm. purulenta). Die Eiterbildung im Gewebe der Lunge kann sowohl durch Erweichung der Hepatisation oder eines gangränösen Schorfes als auch durch Erweichung von Lungenknoten geschehen. Die ersten beiden Krankheitsvorgänge wurden in dem Kapitel von der Lungenentzündung geschildert, der letztere ist nebst der vorausgehenden Tuberkelbildung die Krankheit, welche viele neuere Aerzte ausschliesslich Lungenschwindsucht genannt wissen wollen und es bleibt uns auch, da die übrigen Arten von Lungenkrankheiten, die zuweilen Abzehrung herbeiführen, schon in andern Kapiteln der besondern Krankheitslehre abgehandelt worden sind, nur noch übrig, die Tuberkelbildung und ihre Erweichung oder die Lungenschwindsucht in dem engern Sinne des Wortes darzustellen.

§. 1703.

Die Lungenschwindsucht (Phthisis tuberculoso-purulenta) durchläuft in der Regel drei Zeiträume, die man gewöhnlich das Stadium inflammationis s. Ph. incipiens, das Stad. suppurationis s. Ph. confirmata, und das Stad. colliquationis s. Ph. consummata nennt, die ich aber lieber den Zeitraum der Bildung der Knoten in der Lunge, den Zeitraum der Vereiterung der Lungenknoten und den Zeitraum der sympathischen Verschwärung nennen möchte, doch kann die Krankheit auch im ersten Zeitraum

schon tödtlich werden und die sympathische Verschwärung sehr frühe eintreten.

§. 1704.

1) *Zeitraum der Knotenbildung in der Lunge.* Die Individuen, welche von Lungenschwindsucht befallen werden, oder bei welchen sich die Lungenknoten zu bilden angefangen haben, haben meistens ein eigenthümliches Aussehen. Meistens bemerkt man mit Ausnahme der Farbe in der Mitte der Wangen eine eigene glanzlose weissliche und zuweilen ins Wachsgelbe spielende Gesichtsfarbe, besonders längs der Nase; die Wangen zeigen oft eine leichte nicht weit verbreitete Röthung, die am stärksten in der Gegend des Foramen infraorbitale ist und oft auch eine stärkere und bestimmt umschriebene Röthe, wie der rothe Fleck eines Apfels und sind hiebei mehr als gewöhnlich warm. Oft kann man an der Beschaffenheit dieser Röthe die leidende Seite erkennen, indem auf derselben die Röthe etwas stärker ist und auch einzelne mit Blut überfüllte kleine Gefässchen in ihr bemerkbar sind. Meistens sind die Kranken zu Morgenschweissen geneigt. Es glauben dieselben im Anfange nur an einem Catarrhe zu leiden, sie haben ein leichtes, trockenes oder mit Schleimauswurf verbundenes Hüsteln, und zuweilen einen stärkern, etwas Krampfhaftes zeigenden Husten, manchmal leiden sie auch an Herzklopfen. Die Percussion giebt noch überall einen hohlen Ton, doch ist dieselbe oft an einzelnen Stellen, besonders unter den Schlüsselbeinen und am häufigsten auf der rechten Seite etwas matter als an andern Orten. Vermittelst des Stethoscops nimmt man das Respirationsgeräusch noch überall wahr, doch ist es an einzelnen Stellen und zwar denselben, an welchen die Percussion einen etwas matteren Ton zeigt, unvollkommener als an andern, das heisst, man nimmt bei dem Einathmen des Kranken nicht die Vollfüllung einer so grossen Menge und dicht an

einander gedrängter Lungenbläschen wahr, wie bei der gesunden Respiration.

Bei der Zunahme der tuberkulösen Entartung, wobei aber in der Regel zugleich einige Knoten in Eiterung übergehen und daher die Erscheinungen des zweiten Zeitraums sich zu entwickeln beginnen, geben nun die leidenden Stellen eine immer matter werdende Percussion, wobei sie sich auch zuletzt bei dem Einathmen nicht mehr gehörig ausdehnen; man hört an diesen Stellen nur unvollkommen ein Respirationsgeräusch, welches oft mehr das Bronchialrauschen als das murmelnde Respirationsgeräusch ist, und mit etwas Schleimrasseln und einer Art Krächeln verbunden ist. Zuletzt verschwindet oft das Respirationsgeräusch gänzlich und man hört entweder an diesen Stellen durchaus Nichts, oder man nimmt bei völliger Abwesenheit des Respirationsgeräusches die Bronchienstimme wahr. Die Kranken leiden nun mehr am Husten, sie empfinden zuweilen Stiche und auch einen drückenden Schmerz in der Brust, sie sind mehr oder weniger engbrüstig, was sich jedoch oft nur bei stärkern Körperbewegungen zeigt, zuweilen zeigen sich hiebei die Halsvenen und die feinen venösen Gefässchen in den Wangen überfüllt, die Kräften der Kranken und ihr Körperumfang nehmen allmählig ab, sie haben oft fliegende Hitze in den Wangen, besonders nach Tisch, Hitze in den Handflächen, zuweilen Abends Frost, gegen Morgen Schweisse.

In den seltenern Fällen wird schon dieser Zustand, ohne dass sich ein reichlicher Eiterauswurf einstellt, tödtlich. Manchmal husten die Kranken kleine knochenartige oder den erdigen Concrementen ähnliche Stückchen aus. Meistens stellen sich Durchfälle ein. Die Beengung, die Kräfte- und Körperabnahme und das hectische Fieber werden immer stärker, zuletzt schwellen die Füsse an

und es kommen auch oft noch die Zufälle von Brust- und Herzbeutelwassersucht hinzu.

§. 1705.

2) *Zeitraum der Vereiterung der Lungenknoten.* Gewöhnlich, bevor sich die höhern Grade des so eben angeführten Leidens entwickelt haben, fängt der Kranke an, reichlicher auszuwerfen. Von Anfang ist es mehr Schleim mit einer weisslichen und gelblichen, dickeren Materie gemengt, oder man erkennt auch Bröckchen von käseartiger Materie der erweichten Lungenknoten, später wird es immer mehr vollkommen Eiter, welcher oft noch mit Schleim gemischt eine gelbliche und grünliche, zähe, oft sehr übel riechende Materie bildet, oder ganz rein ist und dickflüssige, gelbliche und grüne, runde Massen darstellt. Oft ist der Eiter mit Blut gemengt oder es stellt sich ein stärkerer Anfall von Bluthusten ein, wodurch zuweilen erst die Kranken auf ihr Leiden aufmerksam gemacht werden. Oeffnet sich eine grössere Ansammlung von erweichter tuberkulöser Masse (Eitersack, vomica) plötzlich, so wird oft eine ausserordentliche Menge von Eiter ausgeleert, und es kann auch durch Anfüllung der Luftröhrenäste mit Eiter ein Erstickungsanfall eintreten. Indem sich nun durch Erweichung der Lungenknoten Aushöhlungen bilden, zeigt das Stethoscop das cavernöse Rasseln und immer mehr eine Art Gegurgel von einer immer dünner werdenden Flüssigkeit, die Respiration und der Husten werden cavernös und es stellt sich der Brustton (Pectoriloquie) ein, welcher, wenn er unzweifelhaft ist, ein ganz sicheres Zeichen einer sog. tuberkulösen Aushöhlung ist. Der Brustton verschwindet oft vorübergehend wieder, wenn sich nämlich die Aushöhlung wieder mit Eiter vollfüllt. Ist eine Aushöhlung halb mit Eiter und halb mit Luft gefüllt, und steht der Weg offen, damit bei dem Athmen Luft in den leeren Raum der Höhle dringen kann, so

vernimmt man zuweilen das metallische Klingen. Ist die Aushöhlung sehr bedeutend, liegt sie nahe an der Oberfläche der Lunge und bildet ihre äussere Wand nur eine dünne Haut, so hört man zuweilen das Segelgeräusch. Bricht ein erweichter Lungenknoten in die Brusthöhle auf, was übrigens selten der Fall ist, so stellen sich die Zeichen des Empyems und meistens auch die des Pneumothorax ein.

Während nun die Vereiterung in den Lungenknoten vor sich geht, nimmt auch das hectische Fieber zu, die Schweisse werden schmelzender, der Harn wird trübe und soll zuweilen auf seiner Oberfläche ein schillerndes Häutchen und Fettaugen zeigen, die Kranken, die übrigens oft noch geraume Zeit ausser Bett sein können, und oft noch eine gute Esslust und keine Ahnung von ihrer schweren Krankheit haben, werden immer mehr abgezehrt und verlieren die Kräften.

§. 1706.

3) *Zeitraum der sympathischen Verschwärung und der vollendeten Abzehrung des Körpers.* Gewöhnlich ohne Leibschmerzen und selbst ohne Schmerz bei einem starken Druck auf die der Bauhinischen Klappe entsprechende Gegend des Unterleibs, zuweilen aber auch unter Leibschneiden stellen sich nun häufige, immer von neuem wiederkehrende Durchfälle ein, mit welchen oft die Speisen unverdaut abgehen, und in welchen zuweilen Blutspuren sich zeigen. Die Magengegend wird hiebei oft empfindlich, es stellen sich leicht Magenweh und Beschwerden der Verdauung ein. Während Durchfälle vorhanden sind, mildern sich oft die Schweisse, kehren aber doch immer wieder zurück und werden sehr schmelzend. Die Abzehrung erreicht allmählig den höchsten Grad, so dass die Kranken oft nur aus dem Gerippe und der Haut zu bestehen scheinen, ihre Augen liegen tief, die Jochbogen stehen hervor, die Nase ist spitz, die Haare

gehen aus, alle Rippen sind zu zählen, die Backenknochen ragen hervor, die vordern Glieder der Finger sind kolbig und die Nägel gekrümmt, um das vordere Ende des Knochens gebogen, die Stimme der Kranken ist heiser und sehr schwach, in dem Munde erscheinen Schwämmchen, die Füsse schwellen ödematös an. Hierbei sind die Kranken in der Regel in ruhiger und selbst in erhobener Gemüthsstimmung, sie glauben meistens nicht an ihren Tod, und entwerfen Pläne für eine ferne Zukunft, oft sehen sie auch ihr Ende mit Fassung herannahen, seltener sind sie ängstlich und kleinmüthig, was vorzüglich dann der Fall ist, wenn eine ausgebreitete Lungenverhärtung vorhanden ist, und dadurch oder durch Wassererguss in die Brusthöhle und die Höhle des Herzbeutels bedeutende Athmungsbeschwerden veranlasst werden. Der Tod tritt meistens aus Schwäche ein und zwar erlischt das Leben oft unversehens nach einer etwas anstrengenden Bewegung des Körpers, oft geht noch einige Zeit eine Schwerathmigkeit, wobei meistens der Auswurf stockt, voraus, und zuweilen stellt sich noch vor seinem Eintritt ein soporöser Zustand ein, manchmal macht ein Blutsturz vor völliger Abzehrung dem Leben unerwartet ein Ende.

§. 1707.

Nur in sehr seltenen Fällen tritt bei der Lungenschwindsucht Heilung ein oder vielmehr ein Aufhören der weitern Tuberkelentwicklung, wo sodann einzelne unentwickelte Tuberkeln und die durch die Tuberkelerweichung gebildeten leeren Höhlen zurückbleiben, der Kranke aber dabei sich wieder erholt.

§. 1708.

Es zeigt der Verlauf dieser Krankheit mancherlei Verschiedenheiten. Immer ist derselbe langwierig, doch ist die Zeit seiner Dauer sehr verschieden, indem dieselbe oft viele Jahre und oft nur einige Monate beträgt

(die galoppirende Schwindsucht). Zuweilen geräth das Lungengewebe im Umkreis der Tuberkeln in wirkliche Entzündung, wo man sodann das knisternde Geräusch wahrnimmt, und der Kranke mehr Stiche in der Brust fühlt. Diese Fälle sind es vorzüglich, in welchen der Verlauf der Krankheit schnell ist, eine stärkere Röthe der Wangen sich zeigt, mehr Hitze in denselben, so wie in den Handflächen vorhanden und eine grössere Reitzung im Pulse bemerkbar ist, (die blühende Schwindsucht, Phth. inflammatoria, sanguinea, florida). — Jn manchen Fällen besteht die Krankheit nach ihrer Haupterscheinung, den unbesiegbaren Durchfällen, mehr in einem Unterleibsleiden und es geben sich die Erscheinungen des Lungenleidens nur in geringerem Grade kund, so wie auch bei der Leichenöffnung in diesen Fällen oft nur eine geringere Tuberkelbildung in den Lungen, und dagegen eine ausgebreitete Verschwärung im Darmkanal und tuberkulöse Entartungen der Drüsen in grosser Menge gefunden werden. — Manchmal verlieren die Kranken nicht sehr viel von ihrem Körperumfang und sterben mehr an Erschöpfung der Kräfte in Folge des starken hectischen Fiebers, das zuweilen auch den nervösen und putriden Character annimmt. — Zuweilen bleibt die Lungenschwindsucht bis kurz vor dem Tode verborgen, was besonders dann leicht geschieht, wenn sie sich im Verlaufe einer andern chronischen Krankheit, z. B. des Scorbutes, der Lustseuche und während der Zufälle, die der Gebrauch einer grossen Menge von Mercur veranlasst, entwickelt. Man schreibt in diesen Fällen die Lungenschwindsucht gerne diesen Krankheiten zu und nennt sie scorbutische, venerische, mercurielle Lungenschwindsucht, doch leugnet *Laennec* den Ursprung derselben aus diesen Krankheitszuständen.

§. 1709.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Nach *Laennec*

entwickelt sich die tuberkulöse Materie unter zwei Hauptformen, der der *isolirten Körper* und der der *Infiltration.* Die erstern bilden vier Varietäten, die hirseförmigen Tuberkeln, die rohen Tuberkeln, die tuberkulösen Granulationen und die in einen Balg eingeschlossenen Tuberkeln (Balgtuberkeln), die letztere bietet drei Verschiedenheiten dar, die graue, die gallertartige und die gelbe Infiltration; immer aber hat diese tuberkulöse Materie im Anfange das Aussehen einer grauen und durchscheinenden, und nach und nach gelblich-dunkel und dicht werdenden Materie, welche sich allmählig zu einer eiterartigen Materie erweicht und durch die Luftröhrenäste ausgeleert wird und Höhlungen zurücklässt, welche unter dem Namen Lungengeschwüre bekannt sind und von *Laennec* tuberkulöse Aushöhlungen genannt wurden.

Die *hirseförmigen Tuberkeln* sind die gewöhnlichste Form; ihr Aussehen ist das von kleinen grauen halbdurchscheinenden Körnern, von einer geringern Consistenz als die der Knorpel, von der Grösse eines Hirsekornes bis zu der eines Hanfkornes, von unregelmässig rundlicher Form. Diese Körner vergrössern sich durch gegenseitige Aufnahme in einander, und vereinigen sich so nach Gruppen. Bevor diese Vereinigung geschieht, entwickelt sich ein kleiner gelblich-weisser und dunkler Punkt im Mittelpunkt von einem jeden Tuberkel und nimmt zuletzt, von dem Mittelpunkt nach aussen sich vergrössernd, das ganze Tuberkel ein. Endlich bildet die ganze Gruppe eine gleichförmige Masse von weisslich-gelber Farbe und von einem weniger festen und feuchterm Gewebe als die Knorpel sind. Man nennt sie das gelbe rohe oder einfach das *rohe Tuberkel.* Wenn die hirseförmigen Tuberkeln sehr getrennt von einander stehen, so erreichen sie oft, ohne sich mit einander zu vereinigen, die Grösse von einem Kirschkern und selbst von einer Mandel, man erkennt sodann meistens, dass

sie nur einen einzigen Kern haben, und sie behalten auch ihre rundliche Form bei. Im Anfange der Bildung der Knoten ist das Lungengewebe gesund und knisternd.

Die *tuberkulösen hirseförmigen Granulationen* sind gewöhnlich in grosser Zahl in der Substanz der Lunge zerstreute, vollkommen runde oder eirunde, ganz durchscheinende, farblose Körnchen, von der Grösse eines Hirsekorns, welche sich nicht zu Gruppen vereinigen, oder wenn sie auch ihrer Menge wegen sehr nahe beisammen stehen und daher feste Massen bilden, doch bei dem Einschnitt in dieselben durch gesundes oder mit Serum leicht infiltrirtes Gewebe von einander getrennt erscheinen. — Wenn die die tuberkulöse Aushöhlung gewöhnlich auskleidende, halb knorpelartige falsche Membran schon gebildet ist, bevor das Tuberkel erweicht ist, und also das rohe Tuberkel von ihr eingeschlossen wird, so stellt dieses das *Balg-Tuberkel* dar.

Die *graue tuberculöse Infiltration*, welch vorzüglich um die tuberculösen Aushöhlungen, aber auch ohne dieselben sich bildet, besteht in grössern Massen tuberkulöser Materie von dem ersten Grade ihrer Entwicklung. Das Lungengewebe ist dicht, feucht, gänzlich für die Luft unzugänglich und von einer grauen oder etwas dunklern Farbe, und wenn man ein dünnes Blättchen davon ausschneidet, so ist es beinahe so fest wie Knorpel, hat eine glatte, polierte Oberfläche, und man erkennt in ihrem Gewebe Nichts mehr von den Lungenzellen. — Die *gallertartige tuberkulöse Infiltration.* Man findet häufig zwischen den hirseförmigen Tuberkeln eine wenig ausgebreitete Infiltration von einer sehr feuchten oder vielmehr flüssigen, ungefärbten oder etwas blutigen, einer Gallerte ähnlichen Materie. Man unterscheidet diese Infiltration vom Oedem der Lunge dadurch, dass man mehr und mehr keine Luftzellchen erkennt, welche vielmehr in Gallerte umgewandelt zu sein scheinen;

auch bilden sich aus dieser Gallerte gelbe, rohe Tuberkeln. — Die *gelbe tuberkulöse Infiltration* bildet sich, indem in der grauen Infiltration eine gewisse Menge kleiner, gelber und schattiger Punkte sich entwickelt, welche sich vermehren, vergrössern und am Ende das ganze verhärtete Stück der Lunge einnehmen. Ebenso verwandelt sich die gallertartige Materie in diese gelbe, der Substanz der rohen, gelben Tuberkeln ähnliche Substanz, indem sie allmählig härter wird, wobei man in dem durchsichtigsten und flüssigsten Theile der gallertartigen Materie kleine, gelbe, offenbar tuberkulöse Punkte entstehen und in rohe, gelbe Tuberkeln sich umwandeln sieht. Diese gelben, tuberkulösen Massen der gelben Infiltration sind unregelmässig und eckig, und bilden, wenn sie an der Oberfläche der Lunge liegen, keinen Vorsprung. Sie nehmen zuletzt ganz die Farbe der andern rohen Tuberkeln an.

Auf welche Weise sich die rohen Tuberkeln auch mögen gebildet haben, so erweichen sie sich zuletzt und werden flüssig. Diese Erweichung geschieht immer zuerst in dem Mittelpunkt von jeder Masse. Die tuberkulöse Materie wird von Tag zu Tag weicher und wird in eine bröckliche, käseartige oder fettartige Materie verwandelt, in deren Mitte sich der erste Tropfen Eiter bildet. Endlich erreicht die Erweichung auch allmählig den Umfang des Tuberkels und wird vollständig. Die erweichte Materie gleicht bald einem dicken, geruchlosen, gelben Eiter, bald scheidet sie sich in zwei Theile, wovon der eine sehr flüssig, mehr oder weniger durchscheinend, und wenn er nicht mit Blut gemischt ist, farblos ist, der andere dunkel und von der Consistenz eines weichen, zerreiblichen Käses ist. In dem letztern Falle, welcher vorzüglich bei scrophulösen Subjecten vorkommt, gleicht die Materie oft den Molken, in welcher Theilchen einer käseartigen Materie schwimmen.

Wenn die erweichte Materie durch die Luftröhrenäste ausgeleert ist, so lässt sie eine Höhle zurück. Selten ist nur *eine* solche Aushöhlung vorhanden. Meistens sind diese Höhlungen von rohen und hirseförmigen Tuberkeln umgeben, diese erweichen sich allmählig und öffnen sich in die schon bestehende Höhle, wodurch die gewundenen Gänge entstehen, die oft bis in die entferntesten Theile der Lunge dringen. Diese Höhlen durchziehen oft Bande oder Säulen von verdichtetem und mit tuberkulöser Materie infiltrirtem Lungengewebe. Selten sind diese Säulen Blutgefässe, welche beinahe immer obliterirt sind; die Bronchienäste werden aber immer sehr schnell zerstört und öffnen sich in die tuberkulösen Aushöhlungen. — So wie diese Höhlen anfangen sich zu entleeren, umkleiden sich ihre Wände mit einer dünnen, gleichförmigen, dunkelweisslichen, ziemlich weichen und zerreiblichen falschen Haut, welche man leicht mit dem Messer hinwegschaben kann. Manchmal findet man an der Stelle dieser Haut eine pseudomembranöse Ausschwitzung, weniger dicht und mehr durchscheinend, als diese, und welche in der Regel die Wände der Aushöhlung nur stellenweise umkleidet. Manchmal findet man auch diese Ausschwitzung unter der erstern, welche sodann nicht gehörig anhängt und zerrissen ist. Es scheint, dass diese zweite Haut nur der erste Grad der Erweichung der erstern ist. Manchmal findet man auch weder von der einen, noch von der andern dieser Häute eine deutliche Spur, und die Wände der Aushöhlung bildet das Lungengewebe, welches verhärtet und mit tuberkulöser Materie infiltrirt ist. Wenn die Krankheit lange anhält, so bilden sich auf der der Aushöhlung zugewandten Fläche der erwähnten falschen Haut weisslich-graue, halbdurchscheinende Streifen, von einem dem Knorpel ähnlichen, aber etwas weichern Gewebe, welche grösser werden, sich

vereinigen und zuletzt eine knorpelartige Haut bilden, welche die Aushöhlung vollständig auskleidet und sich in der innern Haut der Luftröhrenäste, die sich in die Höhle öffnen, endiget.

Ausser diesen, in Erweichung übergehenden Lungenknoten trifft man auch knorpel- und knochenartige, so wie stein- oder kreidenartige Concretionen in den Lungen an. Dieselben sind entweder in Bälge eingeschlossen oder nicht, oft befinden sie sich in der Mitte von erweichter tuberkulöser Materie, wo sie leicht mit dieser ausgeworfen werden. *Laennec* hat nachgewiesen, dass diese kreidenartigen Concremente nicht aus eingeathmetem Steinstaube gebildet sind, da sie aus phosphorsaurem Kalke bestehen, während jener in der Regel andere Bestandtheile hat. Endlich findet man auch in der Lunge von Individuen, welche an einem der Lungenschwindsucht ähnlichen Krankheitszustand starben, die scirrhöse, die hirnartige Masse und die Melanose, worüber die Kapitel über den Markschwamm und die Melanose zu vergleichen sind.

§. 1710.

Die **Anlage** zur Lungenschwindsucht ist oft angeerbt und giebt sich durch eine eingedrückte Brust, langen Hals, flügelförmig hervorstehende Schulterblätter, umschriebene Röthe der Wangen, und im allgemeinen durch einen zarten Bau zu erkennen, auch bluten solche Individuen in dem Knabenalter viel aus der Nase; ferner sind die Scrophulösen zu dieser Krankheit geneigt, Weiber werden mehr als Männer von ihr befallen, und der Ausbruch geschieht vorzüglich in dem Alter nach der Entwicklung der Mannbarkeit bis zum 35sten Jahre, wiewohl man die Krankheit auch ziemlich häufig bei Individuen von jedem andern Alter wahrnimmt und selbst oft in Fötusleichen die Merkmale derselben findet.

§. 1711.

Gelegenheitsursachen. Bei vorhandener starker Anlage entwickelt sich die Lungenschwindsucht um eine bestimmte Zeit des Lebens von selbst und oft auch bei der sorgfältigsten Verhütung aller schädlichen Einflüsse unaufhaltsam. Als Gelegenheitsursachen wirken übrigens, besonders bei vorhandener Anlage, alle Ursachen, die entzündliche und catarrhalische Affectionen der Lunge oder Bluthusten hervorbringen können, insbesondere eine kalte Athmosphäre, daher die Krankheit mehr in den nördlichen, als südlichen Ländern zu Hause ist, das andauernde Einathmen von Staub und andern reitzenden Stoffen, daher die Krankheit häufig bei Müllern, Webern, Seilern, Steinhauern etc. vorkommt, zu reichlicher Genuss geistiger Getränke, unterdrückter Monatsfluss oder Hämorrhoiden, geheilte alte Fussgeschwüre, zurückgetretene oder unvollkommen geheilte Hautausschläge, insbesondere Krätze (von *Autenrieth*, so wie von *Hahnemann* wohl viel zu allgemein als die Ursache dieser Krankheit beschuldigt), vielleicht auch eine Art Ansteckung durch andauerndes Beisammenwohnen mit Schwindsüchtigen und Schlafen in dem Bette oder Tragen der Kleidungsstücke derselben, doch wird diese Ursache von *Laennec* geleugnet, auch manche schwächende Einflüsse, wie z. B. andauernder Kummer, lange dauernde Durchfälle, zu lange fortgesetztes Säugen, die Onanie etc., endlich werden auch der Scorbut, die Lustseuche, die Gicht, welche wohl manchmal zur Entstehung der erdigen Concremente beitragen mag, und der zu reichliche Gebrauch von Quecksilberpräparaten beschuldigt.

§. 1712.

Das **Wesen** der Krankheit ist, wie *Laennec* genügend bewiesen hat, nicht in Entzündung zu suchen, und die Krankheit kein Product der Entzündung, sondern sie ist ein Fehler der Ernährung, deren nähere Ursache

noch unbekannt ist. Mir scheint, ähnlich wie bei der Entzündung, ein Prozess statt zu finden, in welchem die sämmtlichen, im Organengewebe liegenden Stoffe eine wechselseitige Verbindung eingehen und sich zuletzt zu einem gleichförmigen Stoffe, dem Eiter, vereinigen. Es mögen hier wohl aus den Gefässen in das Gewebe Stoffe ausschwitzen, aber eine eigentliche Entzündung ist nicht vorhanden, indem das Blut nicht stockt und sich nicht in eine gleichförmige rothe Masse umwandelt. Ich habe Tuberkeln mit dem Mikroskop untersucht und gefunden, dass in ihnen durchaus keine entzündliche Blutüberfüllung vorhanden ist, und dass auch gewöhnlich das sie zunächst umgebende Lungengewebe ohne Entzündung ist. Dass der erwähnte Prozess zwischen den verschiedenen Substanzen des Lungengewebes statt finde, dafür spricht die Verzehrung des Gewebes, die Umwandlung des Gewebes in eine halbflüssige Masse, die wiederum sich in eine andere, in Eiter übergehende Substanz verwandelt, bei der gallertartigen Infiltration, und endlich die Eiterbildung selbst, welche bei der Entzündung das Resultat eines ähnlichen Vorganges ist. So scheint mir die Tuberkelbildung und Erweichung ungefähr derselbe Prozess zwischen den verschiedenen Substanzen des Organengewebes, namentlich zwischen Nervensubstanz und den ihr entgegenstehenden Substanzen im Gewebe selbst, etwa mit Theilnahme von Lymphe, welche aus den Gefässen ausschwitzt, zu sein, den wir in der Entzündung vorzüglich zwischen Nerven und Blut bestehend erkannt haben.

§. 1715.

Vorhersage. Die hier beschriebene Lungenschwindsucht ist in der Regel tödtlich, doch sieht man in seltenen Fällen Kranke, bei welchen sich das Uebel selbst zu einem bedeutenden Grade entwickelt hatte, wiederum genesen, wie ich selbst einige wenige derartige Fälle

beobachtet habe. Mit diesen Fällen sind nicht die auf Lungenentzündung oder auf Verwundung der Lunge folgende Eiterung und die bei der Luftröhrenentzündung oft eintretende eiterartige Absonderung zu verwechseln, welche viel häufiger einen günstigen Ausgang nehmen.

§. 1714.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Der Kranke muss aufs sorgfältigste Alles vermeiden, was Catarrh oder Brustentzündungen veranlassen könnte, und es müssen, sind solche Affectionen entstanden, dieselben sorgfältig behandelt werden, wobei bei entzündlichen Zuständen oft kleine Aderlässe von Nutzen sind. Der Kranke darf nur eine wenig reitzende Nahrung und keine geistigen Getränke geniessen, und muss sich mehr an eine Milchdiät halten, das Blasen von Instrumenten, Bergsteigen etc. muss er vermeiden, ein nachtheilig wirkendes Handwerk muss er, wo möglich, aufgeben, zur Schwindsucht geneigte Frauen dürfen ihre Kinder nicht stillen, doch setzt die Schwangerschaft den Fortschritten der Schwindsucht oft auf die Dauer derselben Grenzen, die Einwirkung der kalten Luft muss möglichst vermieden werden etc. Sowohl durch Vermeidung auf den Kranken wirkender nachtheiliger Verhältnisse, als auch zuweilen durch stattfindende wirklich wohlthätige Einflüsse ist oft die Veränderung des Wohnortes, welches *Laennec* für das vorzüglichste Mittel in der Lungenschwindsucht hält, sehr zuträglich. Es wird vorzüglich der Aufenthalt in warmen Ländern und am Meere gelegener Gegenden, der Aufenthalt auf dem Lande, an milden und mit Tannenwäldern versehenen Stellen von Gebirgen, das Wohnen in Kuhställen und besonders auch das Seereisen empfohlen. Auch soll der Aufenthalt in der mit Schwefelwasserstoffgas gemischten Luft an den Schwefelquellen zuträg-

lich sein, wie denn auch *Beddoes* das Einathmen von Stickgas, Wasserstoffgas etc. empfohlen hat. Bei vorhandener Scrophelkrankheit muss gegen diese gewirkt werden, glaubt man eine schlecht geheilte Krätze als Ursache der Schwindsucht annehmen zu können, so kann man die Brechweinsteinsalbe einreiben lassen, und den Schwefel, die Plummerschen Pulver etc. innerlich geben; auch ist selbst die Einimpfung der Krätze empfohlen worden; ebenso muss auf andere Cachexien Rücksicht genommen werden.

§. 1715.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Wir können uns zur Aufgabe setzen, neue Tuberkelbildung zu verhindern, schon gebildete Tuberkel aufzulösen, die tuberkulöse Erweichung zu befördern und eine zu reichliche Eiterung zu beschränken. — Die meisten als specifisch gerühmten Mittel können wohl zu dem einen oder zu dem andern Zwecke angewandt werden, doch ist keines aufgefunden worden, das die Krankheit auf die eine oder die andere Weise zu heilen vermöchte.

Um neue Tuberkelbildung zu verhüten, hat man wiederholte Aderlässe gerühmt, es lässt sich jedoch schon aus dem Grunde nicht viel von ihnen erwarten, dass die Tuberkeln nicht aus Entzündung hervorgehen, auch zeigt die Erfahrung, dass sie den bezweckten Erfolg nicht haben und dagegen leicht durch Schwächung der Kräfte schaden. Zu demselben Zwecke sind Blasenpflaster, Fontanelle, Haarseile, Einreibungen der Brechweinsteinsalbe, Aetzmittel und Moxen empfohlen worden, welche aber ebenfalls die Tuberkelentwicklung nicht aufzuhalten im Stande sind. Am meisten vermag noch die sorgfältigste Erfüllung der im 1714. Paragraphen angegebenen Vorschriften die Tuberkelbildung für einige Zeit zu beschränken; auch ist es vortheilhaft, die Lungenausdünstung zu befördern, was einigermaassen

durch reichliches Trinken von Selterserwasser mit Milch, von Molken, Abkochungen von Graswurzel, Eibisch, Süssholz etc. scheint bewirkt werden zu können.

Um schon gebildete Tuberkeln aufzulösen, scheint sich von den auflösenden Mitteln etwas erwarten zu lassen, doch haben sie auch noch wenig Erfolg gezeigt und die wirksamsten unter ihnen, namentlich Jod, werden, wegen ihrer eigenthümlich reitzenden Wirkung, oft nicht ertragen. Eher können gebraucht werden: die Extracte von Graswurzel, Taraxacum, Marrubium album etc., die auflösenden narkotischen Mittel, insbesondere die Digitalis und die blausäurehaltigen Mittel (Nro. 97), so wie auch Hyoscyamus, Cicuta, Aconit, das Phellandrium aquaticum (Nro. 98) etc., ferner der Salmiak, das Seewasser, die Milchlinge von Häringen, das Calomel, der Goldschwefel, die Seife, die Terra ponderosa salita etc.

Die Tuberkel in Erweichung zu bringen, hat man selten die Anzeige, indem es am vortheilhaftesten ist, dass die Entwicklung der Tuberkeln möglichst zurückgehalten wird, doch kann man dieselbe versuchen, wenn die Knoten zu sehr als Reitz wirken und das Athmen durch die tuberkulöse Anpfropfung zu sehr gehemmt ist. Man lässt erweichende Dämpfe einathmen und auch warme Umschläge auf die Brust machen. Auch scheinen der Salmiak, Antimonialmittel etc. die Auflösung und die Ausleerung der tuberkulösen Materie zu befördern.

Um eine zu reichliche Eiterung zu beschränken wendet man das isländische Moos (Nro. 99), das Millefolium, die Cardobenedicten, die Polygala amara, die Cascarille, die Alcornoque-Rinde, die China, das Blei (Nro. 100) an. Auch wird diese Wirkung der Myrrhe, dem peruvianischen, dem Copaivbalsam, dem Terpenthinöl, dem Asphaltöl etc. zugeschrieben. Zu demselben Zwecke mag auch das Einathmen der Dämpfe von Wachs, Pech,

Theer, Weihrauch, Storax etc., mit welchen entweder das Zimmer durchräuchert oder welche mit Vorsicht durch die Mudgesche Maschine eingeathmet werden können, in Anwendung gebracht werden. Um einen faulichten, übelriechenden Auswurf zu verbessern, hat *Beddoes* das Einathmen von fixer Luft empfohlen.

§. 1716.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die vorzüglichsten nachtheiligen Folgen der Tuberkelbildung und Vereiterung der Lunge sind die Abmagerung und das Schwinden der Kräfte. Man sucht dieselben möglichst aufzuhalten durch eine gute, nährende Kost, frisch gemolkene Kuhmilch, die Milch der Ziege, der Eselin, so wie auch Frauenmilch, die Molken, das Eigelb, Sago, Salep, Schneckenbrühe, Gallerte, gut bereitetes Fleisch u. s. w., so wie durch isländisches Moos, China etc. In dem letzten Zeitraum der Krankheit müssen Hoffmännische Tropfen und ähnliche Mittel in Bereitschaft gehalten werden, um bei den nun leicht eintretenden Ohnmachten gebraucht zu werden.

Kommt zur Tuberkelbildung Entzündung des Lungengewebes hinzu, so setzt man Blutegel oder nimmt eine kleine Aderlässe vor. Bei zu starkem Fieber kann man etwas Salpeter, verdünnte Mineralsäuren etc. geben und giebt zur Nahrung mehr Obstspeisen. Den gewöhnlichen Husten sucht man durch einhüllende und besänftigende Mittel und vor allem durch Opium und die Morphiumtropfen (Nro. 101) zu stillen. Dieses Mittel wird auch dem Kranken, um denselben durch Schlaf zu erquicken, um die Durchfälle zu mässigen, Kolikschmerzen zu heben etc., gereicht, und ist daher mit Recht Solamen Phthisicorum genannt worden. Gegen Durchfälle wendet man übrigens auch Columbo und andere Mittel an. Die Schweisse dürfen nur mit Vorsicht gemässigt werden, wozu die gegen die Ephidrosis überhaupt gebräuchlichen

Mittel in Anwendung gebracht werden können. Ebenso muss man die Schwämmchen etc. zu heilen suchen.

Die Kehlkopf- und Luftröhrenschwindsucht.
(*Phthisis laryngea, Phth. trachealis.*)

§. 1717.

Die Haupterscheinungen dieser Krankheit sind eine langwierige Heiserkeit und zuletzt beinahe gänzlicher Mangel der Stimme, ein Kitzel und ein Gefühl von Brennen und Stechen in dem Kehlkopf, zuerst trockener und sodann von schleimigem, eiterartigem und oft blutigem Auswurf begleiteter Husten und hektisches Fieber. Meistens gesellt sich Lungenschwindsucht hinzu, wenn diese Krankheit nicht schon vor der Luftröhrenschwindsucht, deren Ursache sie häufig ist, sich entwickelt hatte. Der Tod wird oft erst nach Jahren durch Auszehrung und zuweilen durch Erstickung herbeigeführt. — In den Leichen findet man in dem Kehlkopf und der Luftröhre entzündete Stellen, Geschwüre, Tuberkeln, Condylome etc.

§. 1718.

Die **Behandlung** muss besonders im Anfange der Krankheit gegen die die Verschwärungen meistens erzeugende schleichende Entzündung im Kehlkopf und der Luftröhre und gegen das dieselbe häufig bedingende scrophulöse, syphilitische, gichtische Leiden etc. gerichtet sein. Im Uebrigen wird die Krankheit wie die Lungenschwindsucht behandelt.

Die Bildung des Melanosengewebes.
(*Melanosis.*)

Bayle (Recherches sur la Phthisie pulm.). — *Laennec* (sur l'auscult. méd.). — *Breschet* (a. d. Franz. übers. in Harless neuen Jahrb. d. deutsch Med. und Chir. B. 5). — *Merat* (Dict. des Scienc. med.). — *Heusinger* (Eisenach 1823).

§. 1719.

Die Melanosen stellen schwarze, bei dem ersten Anblick oft drüsenartige Hervorragungen dar, welche

oft nur die Grösse eines Masernfleckes haben, oft aber auch die des grössten Tuberkels erreichen. Sie haben im Anfange die Consistenz der lymphatischen Drüsen, erweichen nach und nach, wo sich oft eine rothbräunliche mit schwarzen Krummen vermischte Flüssigkeit ausdrücken lässt, und verwandeln sich zuletzt in einen schwarzen Brei, wie mit Russ bereitet. Diese schwarzen Massen haben keinen eigentlichen organischen Bau, sie besitzen insbesondere keine Nerven und keine Blutgefässe, und zeigen nur etwas Körniges oder Blätterartiges. Sie sind entweder in Bälge eingeschlossen oder in das Gewebe eines Organs infiltrirt, oder auf seine Oberfläche abgelagert. Nach den von *Breschet* angeführten chemischen Analysen ist die Melanose ein Absatz der färbenden Materie und des Faserstoffs des Blutes, beide aber in einem besondern Zustande, in welchem sich dreierlei fettige Materien unterscheiden lassen.

§. 1720.

Die Melanosen kommen in den Lungen, der Leber, der Milz, im Zellgewebe, in der Haut, auf der Oberfläche der Eingeweide und auch, jedoch am seltensten im Gehirne und Rückenmarke vor. In den Lungen, wo sie am häufigsten angetroffen werden, erzeugen sie Husten und Athmungsbeschwerden und einen schleimigen Auswurf, womit zuweilen die erweichten Massen ausgeleert werden. Es entstehen hierdurch Aushöhlungen, welche durch die Pectoriloquie angezeigt werden. Die Kranken zehren hierbei ab und werden zuweilen auch wassersüchtig. *)

*) Da dieser krankhafte Zustand in der Regel nur nach dem Tode erkannt wird und wir auch noch kein Heilverfahren desselben kennen, so ist er bis jetzt noch mehr Gegenstand der pathologischen Anatomie als der Therapie.

Die krebshafte Verhärtung und der Krebs.

Roux (in Desault's auserlesenen chirurg. Wahrnehmungen, a. d. Franz. v. Dörner. Frankf. 1806). — *E. Home* (Lond. 1805). — *Bayle* (Bibl. med.). — *Wenzel* (Mainz 1815). — *Abernethy* (surg. Works). — *Scarpa* (Milano 1825). — *v. Walther* (Journ. für Chir. u. Augenheilk. B. 5). — *Recamier* (2 Vol. Par. 1829).

§. 1721.

Die krankhafte Verhärtung (Scirrhus) ist eine sehr harte (beinahe steinharte), in der Regel höckerige, begrenzte Geschwulst, welche meistens zuletzt in eine, alle Theile zerstörende, Verschwärung übergeht. Der Krebs ist die aus dem Scirrhus entstandene, um sich fressende Verschwärung.

§. 1722.

Entwickelt sich der Scirrhus in äussern Theilen, so erkennt man dieses an der Entstehung einer sehr harten Stelle im Gewebe des ergriffenen Organs. Dieselbe wird allmählig grösser, die hierdurch entstehende Geschwulst zeigt bei dem Befühlen höckerige Unebenheiten, selten ist sie glatt, manchmal an einzelnen Stellen weich und elastisch, sie ist schwer und gewöhnlich im Anfange unschmerzhaft. Die Haut, die die Geschwulst bedeckt, hat die natürliche Beschaffenheit.

§. 1723.

Geht der Scirrhus in den Krebs über, so empfindet der Kranke von Zeit zu Zeit heftige stechende Schmerzen in der Geschwulst und diese wird, indem sie zugleich grösser und höckeriger wird, auch andauernd empfindlich, die Haut über derselben wird violett-roth, es zeigen sich viele, sehr erweiterte Venen in der Haut, und diese

klebt nun mit der scirrhösen Geschwulst fest zusammen. Endlich zeigen sich eine oder mehrere kleine weiche Stellen, an welchen unter der Haut etwas Flüssigkeit zu sein scheint, und diese dünne wird und aufzubrechen droht (der verborgene Krebs, Cancer occultus).

Hat sich eine solche Stelle geöffnet (der offene Krebs, Cancer apertus), so fliesst eine sehr stinkende, bräunliche und oft blutige Jauche aus. Die Ränder um das hierdurch entstandene Geschwür sind meistens aufgeworfen und hart, der Boden sehr uneben, höckerig. Durch die Verschwärung wird nun zwar ein Theil der schon gebildeten scirrhösen Masse verzehrt, es entstehen aber im Grunde der Geschwüre schwammige Wucherungen, das scirrhöse Gebilde wächst selbst und im Umfange der Geschwulst geht immer mehr gesundes Organengewebe in scirrhöse Verhärtung über, so dass zuletzt die krebshafte Geschwulst eine sehr beträchtliche Grösse erhält. Gewöhnlich schwellen die benachbarten lymphatischen Drüsen an, zuweilen entwickelt sich die krebshafte Entartung auch noch in andern Theilen als in dem zuerst ergriffenen, der Kranke magert ab, erhält eine blasse und erdfahle Gesichtsfarbe und einen eigenthümlichen schmerzhaften Ausdruck in den Gesichtszügen, es stellt sich ein hektisches Fieber ein und durch dasselbe, so wie durch die heftigen Schmerzen und zuweilen durch Blutflüsse, welche sich aus den verschwärten Stellen ergiessen, werden die Kräften des Kranken vollends aufgerieben.

§. 1724.

Der Krebs zeigt in seiner Gestalt und in seinem Verlaufe mancherlei Verschiedenheiten, welche grösstentheils von der Verschiedenheit des Gewebes abhängen, in welchem derselbe Wurzel gefasst hat. So erscheint er unter verschiedenen Modificationen, je nachdem er in

Drüsen, in der Haut, in einer Schleimhaut, in Nerven oder in Knochen seinen Sitz hat.*)

§. 1725.

Der Krebs in innern Theilen giebt sich, auch wenn die harte Geschwulst sich nicht fühlen lässt, oft sehr deutlich durch den im Krebse vorkommenden eigenthümlichen Ausdruck im Gesichte des Kranken, durch die heftigen stechenden Schmerzen mit Störungen in den Verrichtungen des leidenden Organs und durch eigenthümliche Ausscheidungen zu erkennen.

§. 1726.

Der *Scirrhus in der Speiseröhre* ist oft lange Zeit unschmerzhaft und auch im spätern Verlaufe weniger schmerzkaft als der Magenkrebs, dagegen ist das Schlingen sehr erschwert und wird zuletzt unmöglich; gelangen die Speisen an die krankhafte Stelle, so werden sie wieder zurückgestossen und zuweilen wird zugleich ein heftiger Husten erregt, wie wenn ein Theil der Speisen in die Luftröhre gekommen wäre, woher der Verdacht erregt wird, das die vordere Wand der Speiseröhre und die hintere der Luftröhre durchgefressen wären und daher beide Kanäle mit einander in Verbindung stünden; doch fand ich ungeachtet solcher Zufälle die Kanäle der Luft- und Speiseröhre nicht in Verbindung getreten, sondern nur die Speiseröhre vom Scirrhus ergriffen. Der Kranke stirbt an Erschöpfung.

§. 1727.

Bei dem *Magenkrebs* (Carcinoma ventriculi)**) ist gewöhnlich der krebshafte Ausdruck im Aussehen des

*) Da der Krebs in äussern Theilen der Chirurgie anheim fällt, so kann die nähere Darstellung desselben füglich hier umgangen werden.

**) Schriften von *Petzold* (Dresd. 1787). — *Rahn* (Briefwechsel, 2te Samml.). — *Wichmann* (Id. z. Diagn.). — *Chardel* (franz. Par. 1808). — *René Pras* (a. d. Franz. v. Balling. Würzb. 1829).

Kranken sehr stark ausgesprochen und ein geübter Blick erkennt selbst den Sitz des Uebels. Es ist nämlich das Gesicht äusserst blass, erdfahl und mager, und zeigt einen besonders schmerzhaften Ausdruck, der sich vorzüglich durch zwei tiefe Furchen, welche von der Nase aus sich um den Mund herumziehen und durch einen etwas stieren Blick zu erkennen giebt. Der Kranke hat beinahe ohne Unterbrechung ein schmerzhaftes Gefühl in der Magengegend, welches nach dem Genusse von Speisen vermehrt wird und bei vorgeschrittenem Uebel, besonders dem offenen Krebse, sich wie von Nadelstichen oder einer glühenden Kohle herrührend darstellt. Die Magengegend ist aufgebläht und bei bedeutender Ausdehnung der Verhärtung fühlt man einen beweglichen harten Körper. Hat die Verhärtung ihren Sitz an dem Pförtner, so stellt sich nach einer halben oder ganzen Stunde, oft auch erst nach drei oder vier Stunden nach dem Essen, besonders nach dem Genusse von schwer verdaulichen Speisen ein Erbrechen ein, wodurch im Anfange nebst den Speisen ein sehr saurer Magensaft und späterhin, nach dem Uebergange in den offenen Krebs, eine ganz braune, der Farbe nach dem Kaffeesatz ähnliche Materie ausgeleert wird, und womit sich zuweilen ein Blutsturz verbindet. Hat die Verhärtung, was seltener der Fall ist, den obern Magenmund ergriffen, so wird das Hinabschlingen der Speisen immer mehr erschwert und am Ende ganz unmöglich gemacht, so dass der Kranke verhungert; hat dieselbe aber an der grossen Krümmung des Magens ihren Sitz, so fehlt zuweilen das Erbrechen und das Schlingen findet ungehindert statt. Hiebei ist gewöhnlich die hartnäckigste Verstopfung vorhanden und der Kranke wünscht sehnlichst den Abgang von Blähungen, deren Zurückhaltung er oft sein ganzes Leiden zuschreibt. Derselbe leidet vielen Hunger, indem er denselben wegen der durch die Speisen erregten Be-

schwerden nicht gehörig befriedigen kann; oft wird er, besonders wenn die Bauchspeicheldrüse mit in die Verhärtung gezogen ist, von einem starken Speichelfluss geplagt; sein Gemüth ist sehr niedergeschlagen und auch leicht erregbar, der Körper magert ab, die Kräften schwinden und zuletzt schwillt der Kranke wassersüchtig an, wenn nicht bälder durch einen Blutsturz dem qualvollen Leiden ein Ende gemacht wird.

§. 1728.

Der *Krebs in den Gedärmen.* Er kommt vorzüglich in der S förmigen Krümmung des Kolons und im Mastdarme vor. Er veranlasst oft Verstopfung, Aufblähung, sehr heftige Kolikschmerzen, und auch stechende und zerrende Schmerzen im Unterleib, zuweilen Erbrechen, das 8 bis 12 Stunden nach dem Genusse der Speisen eintritt, oft erschöpfende, sehr stinkende Durchfälle. Hat das Uebel seinen Sitz im Mastdarme, so sind ähnliche Beschwerden vorhanden, wie sie bei schmerzhaften Hämorrhoiden vorkommen, doch erreichen die Beschwerden einen viel höhern Grad. Zuweilen wird der Mastdarm und die Scheide durch das Krebsgeschwür durchfressen, wo sodann Koth durch die Scheide geht.

§. 1729.

Der *Krebs des Pankreas* tritt unter ähnlichen Erscheinungen auf, wie der Magenkrebs und ist auch häufig mit demselben verbunden. Schon im Anfange wird der Magen in Mitleidenschaft gezogen, der Kranke hat Uebelkeiten und öfters Erbrechen, wodurch ein sehr scharfer, saurer Schleim ausgeleert wird; bei grösserer Entwicklung der Krankheit ist das Magenleiden noch stärker, indem sich oft Magenkrampf und anhaltendes Erbrechen hinzugesellen. Auch stellt sich leicht ein heftiger Speichelfluss ein, wodurch nach einer Beobachtung von *Peter Frank* selbst 12 Pfund Speichel täglich entleert werden

können. Im Uebrigen sind die gewöhnlichen Zeichen des Krebses vorhanden.

§. 1730.

Die Entwicklung des *Scirrhus in der Gebärmutter* zeigt sich meistens zuerst durch eine schmerzhafte monatliche Reinigung an, bei welcher aber, sobald das Blut gehörig fliesst, die Schmerzen wiederum nachlassen; meistens tritt nun ein weisser Fluss ein, die Kranken haben oft das Gefühl von Schwere im Becken, und es erregen Erschütterungen des Körpers beim Fahren, so wie der Beischlaf zuweilen Schmerzen. Oft findet ein Drängen nach den Geschlechtstheilen statt und Beschwerden beim Harnlassen, und auch zuweilen beim Stuhlgange. Bei der innern Untersuchung findet man, wenn der Sitz der Krankheit am Muttermunde und Mutterhalse ist, was beinahe immer der Fall ist, die Gebärmutter hart, uneben, selbst knollig, und mit aufgeworfenen und gleichsam eingekerbten Lippen des Muttermundes.

Geht dieser Scirrhus in den Krebs über, so stellen sich plötzlich eintretende Stiche ein, die quer durch das Becken gehen, und die Kranke empfindet auch mehr andauernde, brennende Schmerzen im Unterleibe, welche das Sitzen, das Urinlassen und die Stuhlentleerungen sehr beschwerlich machen. Es fliesst nun eine scharfe, das Zimmer der Kranken mit fast unausstehlichem Geruche erfüllende Jauche aus. Bei der innern Untersuchung, die nunmehr der Kranken Schmerzen verursacht, findet man den Scheidentheil der Gebärmutter noch rauher, höckeriger und heiss und mit schwammigen Auswüchsen, die leicht bluten, behaftet. Die Kranke leidet an Verdauungsbeschwerden, an mancherlei schmerz- und krampfhaften Zufällen, sie magert ab, ein Zehrfieber stellt sich ein und dieses, so wie mehr oder weniger heftige Blutflüsse, die aus der verschwärten

Gebärmutter hervordringen, machen dem qualvollen Leben der Kranken ein Ende.

§. 1731.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Das scirrhöse Gebilde, welches von verschiedener Härte ist und oft nur die Consistenz eines festen Speckes, oft selbst die des Knorpels hat, zeigt beim Durchschnitt zweierlei Substanzen, eine fibröse, undurchsichtige, welche unregelmässig gelagerte und sich kreuzende Blätter darstellt, wodurch Zellen gebildet werden, und eine halbdurchsichtige, ohne bestimmte Organisation, gewöhnlich von hellbräunlicher, oft bläulicher und weisslicher Farbe, welche die durch die erstere gebildeten Zellen ausfüllt. Beide Substanzen sind in dem Scirrhus fest, die faserige insbesondere erreicht oft die Härte von Knorpel. — An den Stellen, wo der Scirrhus in den Krebs übergegangen ist, ist insbesondere die mehr durchscheinende Substanz erweicht und zuweilen ganz in eine dünne, gelbliche Flüssigkeit übergegangen. Manchmal trifft man auch in der scirrhösen Geschwulst Bälge an, welche mit einer verschieden gefärbten Flüssigkeit gefüllt sind. An den in Krebs übergegangenen Stellen, besonders an den offenen Geschwüren, befinden sich blutige, harte, schwammartige Bildungen, die den Fleischwarzen ähnlich, aber härter als diese sind.

§. 1732.

Dass wenigstens bei vielen Individuen, die von dieser Krankheit befallen werden, eine eigenthümliche Anlage bestehe, zeigt die oft ohne äussere Ursache eintretende Entwicklung und die in der Regel erfolgende Wiederkehr, auch bei frühzeitig geschehener Hinwegnahme der scirrhösen Geschwulst. Die Anlage soll oft erblich sein. Die Krankheit kommt am häufigsten im Alter, in welchem die Zeugungsfähigkeit schwindet und in zur Zeugung bestimmten Organen, wie der Gebärmutter,

den Brüsten und den Hoden vor.*) Weiber sollen von derselben häufiger, als Männer befallen werden. Auch scheinen Individuen von atrabilarischer Constitution eine besondere Anlage zu dieser Krankheit zu haben.

§. 1733.

Gelegenheitsursachen geben ein Stoss, andauernder Druck, eine zu reitzende Behandlung und Verletzung verhärteter Theile, die Entstehung scrophulöser und syphilitischer Geschwülste und Auswüchse, eine niedergebeugte Gemüthsstimmung, sitzende Lebensart, geheilte Fussgeschwüre, unterdrückte Flechten etc. — Der Magenkrebs insbesondere wird am häufigsten hervorgebracht durch fortgesetzten starken Genuss des Branntweines, wie es scheint auch häufig durch immer wiederkehrenden Verdruss, durch schlechte Nahrungsmittel, durch den Missbrauch der Brech- und Abführungsmittel, durch metallische Gifte, vielleicht wohl auch durch die Einwärtsbiegung des schwertförmigen Knorpels, durch Trinken von sehr kaltem Wasser etc. Dieselben Schädlichkeiten werden auch als die Ursachen des Krebses des Darmkanals und der Bauchspeicheldrüse beschuldigt. — Der Krebs der Gebärmutter kommt vorzüglich in der Zeit vor, in welcher die monatliche Reinigung aufhört, er soll am häufigsten bei Frauenzimmern angetroffen werden, bei welchen die Befriedigung des Geschlechtstriebes nicht statt fand, bei solchen, die sich der Onanie hingegeben haben, so wie auch bei öffentlichen Dirnen und unfruchtbaren Weibern, doch kommt er auch bei solchen vor, die Kinder geboren haben. Es werden ferner beschuldigt: häufige Missfälle, langwieriger weisser Fluss, vorhergegangene venerische Affectionen, Tripper, mechanische Verletzungen bei Geburten, ein ungeeigne-

*) S. *Chelius* Chirurgie.

ter Gebrauch kalter und zusammenziehender Einspritzungen etc.

§. 1734.

Ueber das **Wesen** des Krebses weiss man noch nichts Sicheres. Viele nehmen eine eigene Krebsschärfe an. Dieselbe mag wohl bestehen, wenn das krebshafte Geschwür schon gebildet ist, ihr Dasein aber vor der Entstehung des Scirrhus ist durch Nichts erwiesen. *Adams* hielt den Krebs, und zwar eigentlich den mit Bälgen, in welchem eine gallertartige Flüssigkeit enthalten ist, versehenen Krebs für ein Aggregat von lebenden Hydatiden. *Leurs*, *Schäffer* und *Harless* nehmen einen krankhaften Nerveneinfluss an. Ein krankhafter Nerveneinfluss findet gewiss auch statt, indem keine Organisationsveränderung ohne Betheiligung der Nerven geschehen kann und hier noch insbesondere der Einfluss des Kummers und des Verdrusses auf die Entstehung des Krebses den Antheil, den das Nervensystem hiebei hat, kund giebt, doch ist nicht erklärt, wie gerade diese Art der Desorganisation zu Stande komme. Viele Aerzte glauben, dass der Scirrhus aus einer schleichenden Entzündung hervorgehe, doch ist diese noch nicht mit Gewissheit nachgewiesen, und ist auch zur Erklärung der Entstehung dieser bestimmten Art von Desorganisation nicht genügend. — Die Fortpflanzung des Krebses auf andere Theile und die in Folge des Krebses sich entwickelnde allgemeine Dyscrasie scheinen vorzüglich durch Aufsaugung der krebsigten Jauche zu geschehen, indem in der Regel die lymphatischen Drüsen, welche zwischen der krebshaften Stelle und dem Ductus thoracicus liegen, anschwellen, doch ist hiebei auch das polarische Verhältniss der einzelnen Nerventheile mitwirksam, indem vorzüglich solche Theile secundär der krebshaften Entartung ausgesetzt sind, die mit dem zuerst

leidenden Organe in Beziehung stehen, wie z. B. die Gebärmutter bei dem Krebse der Brust.

§. 1735.

Vorhersage. Der Krebs in innern Theilen scheint unheilbar zu sein; auch möchten schwer sichere Beweise von glücklicher Zertheilung einer scirrhösen Verhärtung aufzubringen sein.

§. 1736.

Die Behandlung des Krebses durch die Operation und die ätzenden Mittel, insbesondere durch Arsenik, hat noch den meisten Erfolg; ihre Darstellung wird übrigens in den Lehrbüchern der Chirurgie gegeben. — Die innerlichen, gegen den Krebs empfohlenen Mittel sind meistens auflösende Mittel, namentlich die auflösenden Extracte, die narkotischen auflösenden Mittel, wie die Blausäure, das Extractum Belladonnae (in Kirschlorbeerwasser aufgelöst, nach *Hufeland*), das Extractum Cicutae, Hyoscyami, Aconiti, die Digitalis, ferner die Calendula, das Calomel, Jod, das salzsaure Gold, Arsenik, mit welch letzteren Mitteln, wegen ihrer reitzenden Eigenschaft, grosse Vorsicht nothwendig ist, damit nicht der Uebergang des Scirrhus in den Krebs durch sie beschleunigt werde.

§. 1737.

Mehr als durch die Versuche wirklicher Heilung vermag der Arzt in der Behandlung des Krebses durch Mässigung der Zufälle zu nützen, insbesondere durch Milderung der heftigen Schmerzen vermitte st des Opiums.

§. 1738.

Bei dem Magenkrebse können nur die milden, nicht reitzenden, auflösenden Mittel angewandt werden, wie die genannten narcotischen Mittel (unter welchen ich das Extract. Hyoscyami, in Aq. Laurocerasi aufgelöst, und gleichzeitig Morphium aceticum, schon öfter

mit grosser Linderung gegeben habe), auch die milden, auflösenden Extracte, Calomel, Einreibungen der grauen Quecksilbersalbe; auch narkotische und andere Mittel, auf endermatischem Wege angewandt.

Um die Ernährung des Körpers, so viel wie möglich, zu unterhalten, giebt man milde, aber kräftig nährende Nahrungsmittel, kräftige Fleischbrühe, Krebsbrühen, weichgesottene Eier etc. — Schmerzen und Erbrechen stillt man am besten durch Opium. — Wegen der hartnäckigen Verstopfung sind wiederholte Klystiere nothwendig. — In einem Falle, in welchem ein Scirrhus in dem untern Theile der Speiseröhre sich befand und in welchem bei dem Schlingen ein Krampf in der Speiseröhre sich noch hinzugesellt, so dass die Speisen nicht in den Magen gelangen konnten, bewirkte ich dadurch den Durchgang der Speisen durch die krankhafte Stelle, dass ich jedesmal vor dem Genusse derselben ein Säftchen mit Opium nehmen liess, wodurch dem Krampfe vorgebeugt wurde.

§. 1739.

Gegen den Scirrhus und den Krebs der Gebärmutter sind dieselben Mittel, wie gegen den Magenkrebs anwendbar, insbesondere die bezeichneten narkotischen Mittel; bei Verdacht des Ursprungs des Uebels aus der Lustseuche eine Quecksilberkur. Es können hier auch die angegebenen Mittel, z. B. eine Schierlingsabkochung, örtlich, vermittelst Einspritzungen, der Einbringung von damit befeuchteten und bestrichenen Charpiebäuschchen etc. in Anwendung gebracht werden. Endlich kann man auch versuchen, den krebshaften Theil durch Aetzmittel oder vermittelst des Messers hinwegzunehmen, wiewohl der Erfolg dieser Operation nur höchst selten günstig sein mag. Die Exstirpation der ganzen Gebärmutter mag in einzelnen Fällen glücklich vollbracht werden, doch wird hierdurch wohl nicht leicht das Leben der Patientin lange

gefristet werden (wegen meistens schon weiter gediehenen Krebsübels), in der Regel wird aber dasselbe durch dieses Verfahren sehr abgekürzt werden.

Der Markschwamm.

(*Encephaloide nach Laennec, weicher Krebs nach Wardrop, Medullarcarcinom, Fungus medullaris, Sarcoma medullare, auch Fungus haematodes (Blutschwamm), welche Benennung aber zur Verwechslung mit der Teleangiektasie Veranlassung geben kann.*)

Wardrop (aus d. Engl. v. Kühn, mit 8 K., Leipzig 1817) — *Laennec* (Dict. des Sciences méd art. Encephaloide). — *Breschet* (ebend. Art. Hematode). — *Maunoir* (a. d. Franz. Frankf. 1820). — *v. Walther* (Journal für Chirurgie u. Augenheilk. B. 5.). — *Hasse* (Diss. Berol. 1824, und in Rust's Magazin. B. 16.). — *Meyen* (Berlin 1828).

§. 1740.

Der Markschwamm ist die krankhafte, im Gewebe der Organe erzeugte Substanz, welche der Marksubstanz des Gehirnes ähnlich ist.

§. 1741.

Kommt der Markschwamm in äussern Theilen vor, so erkennt man ihn an einer, im Anfange kleinen, festen, aber nicht harten Geschwulst, welche wächst, mehr weich und elastisch wird und sodann auch eine Art Schwappung zeigt. Die Haut über der Geschwulst ist im Anfange von natürlicher Beschaffenheit, später wird sie dünn, bricht auf und es fliesst eine blutige Jauche aus. Aus der geschwürigen Oeffnung wuchert

nun eine schwammartige Masse von röthlicher Farbe hervor, welche leicht blutet. Nunmehr wird auch die Geschwulst, die allmählig grösser wird, empfindlicher, es durchfahren sie stechende Schmerzen, die benachbarten lymphatischen Drüsen und auch Drüsen in entferntern Theilen schwellen an, der Kranke erhält ein cachectisches Aussehen und zehrt ab. *)

§. 1742.

Die Encephaloide in innern Theilen ist sehr schwer zu erkennen. Der Markschwamm der harten Hinterhaut ist meistens auf der äussern Fläche dieser Haut befindlich und erzeugt, wenn die Geschwulst bedeutend ist, eine Oeffnung in den Schädelknochen. Mancherlei durch Druck auf das Gehirn erzeugte Zufälle werden durch diese Geschwülste hervorgebracht. In einem Falle, in welchem sich bei der Leichenöffnung eine Encephaloidengeschwulst von der Grösse eines kleinen Borstorferapfels auf der innern Fläche der harten Hirnhaut, zur Seite der Varol'schen Brücke, vorfand, beobachtete ich folgende Zufälle: Viele Monate hindurch heftige Kopfschmerzen, besonders unter dem Scheitel, heftige Schmerzen im Nacken, Vorwärtsbeugen des Kopfes, wie bei Spondilarthrocace der Halswirbel, späterhin einen, ohne Gebrauch von Mercur eingetretenen, heftigen Speichelfluss, schwarzen Staar an beiden Augen, Stumpfsinn, zuletzt erschwertes Schlingen und Röcheln.

§. 1743.

In den Lungen veranlasst dieses krankhafte Gebilde vorzüglich anhaltende und zuletzt sehr heftige, selbst Erstickung herbeiführende Athmungsbeschwerden, die Kranken haben mehr oder weniger Husten, der meistens mehr trocken, doch auch, besonders im spätern Verlaufe

*) Eine vollständigere Beschreibung des Markschwammes in äussern Theilen findet man in den Lehrbüchern der Chirurgie.

der Krankheit, mit einem trüben, halb gallertartigen, mit weissen Flocken gemischten, zuweilen auch eitrigen und blutigen Auswurf verbunden ist. Das Stethoscop zeigt an Stellen, wo die Encephaloidenmasse einen grossen Umfang erreicht hat, Abwesenheit des Respirationsgeräusches. Ein Fieber ist während der längsten Zeit der Krankheit nicht vorhanden. Die Kranken magern ab (Phthisie cancreuse, nach *Bayle*), doch sterben sie oft, ehe die Abzehrung einen beträchtlichen Grad erreicht hat, an Erstickung; leicht kommt auch Wassersucht hinzu. — Die Krankheit kann eine Dauer von ein bis zwei Jahre haben.

§. 1744.

Der Markschwamm der Gebärmutter tritt beinahe unter denselben Erscheinungen auf, wie der Gebärmutterkrebs, doch ist wegen der hier in der Regel stattfindenden grossen Masse der krankhaften Substanz das Gefühl der Schwere im Becken grösser, und aus demselben Grunde sind die Kreuzschmerzen und die Beschwerden bei dem Harnlassen und dem Stuhlgange bedeutender. Bei der innern Untersuchung findet man meistens viel grössere Geschwülste, als bei dem Krebse, und es ist auch mehr, als bei jenem, die Scheide davon besetzt, die Geschwülste sind aber weich anzufühlen. Ist der Markschwamm schon aufgebrochen, so findet man Blumenkohl ähnliche Wucherungen. Eine sehr stinkende und scharfe Jauche fliesst aus. Leicht stellen sich Blutungen ein, die oft sehr beträchtlich werden.

§. 1745.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Die Markschwammsubstanz hat, je nach dem Grade ihrer Entwicklung, eine verschiedene Dichtheit. In dem ersten Grade, der der Rohheit, hat sie die Consistenz des Speckes, ohne aber eine Spur von Fett zu enthalten, sie ist in zahlreiche Läppchen getheilt und in dünne Schichten

geschnitten, mehr oder weniger durchscheinend; in der zweiten Periode gleicht sie der Substanz eines Kinder-Gehirnes und ist ebenfalls in Lappen getheilt; in der dritten Periode, der der vollständigen Erweichung, stellt die erweichte Substanz eine dicke, Eiter ähnliche, breiartige Masse dar. — Die Farbe ist der der Marksubstanz des Gehirnes gleich, zuweilen ist sie aber von zahlreichen, sie durchdringenden Gefässchen oder von beigemengtem Blute röthlich, bräunlich und selbst ins Schwärzliche gehend. — Die schwammige Masse, welche nach dem Aufbruch der Markschwammgeschwulst aus derselben hervorwuchert, besitzt einen sehr grossen Reichthum von kleinen Gefässen. *Laennec* beschreibt dreierlei Arten des Vorkommens der hirnartigen Substanz. 1) Die in Bälgen eingeschlossenen Encephaloidemassen. Ihre Grösse ist die einer Haselnuss, bis zu der eines Apfels. Die Bälge haben eine Dicke von ungefähr einer halben Linie, ihre Farbe ist weisslichgrau, sie sind halb durchscheinend, ihr Gewebe gleicht ganz dem der Knorpel und ist nur weicher als diese. Man kann sie daher unter die unvollkommenen Knorpel zählen. Die in diesen Bälgen eingeschlossene hirnartige Substanz hängt nur leicht an denselben an, sie sind in mehrere Lappen durch ein feines, der Pia mater vergleichbares Zellgewebe getheilt, welches auch in der Beziehung der erwähnten Haut gleicht, dass eine grosse Anzahl von Gefässen dasselbe durchzieht. Diese Gefässe haben sehr feine Wände und dringen in das Innere der Marksubstanz ein. — 2) Die nicht in Bälge eingeschlossenen hirnartigen Massen. Dieselben sind viel häufiger, als die so eben beschriebene Art, ihre Grösse ist sehr verschieden, man findet sie bis zu der des Kopfes eines ausgetragenen Foetus. Ihre Oberfläche ist ebenfalls in Lappen getheilt und ihr innerer Bau ist ganz von derselben Art, wie der der eingebalgten Encephaloiden. —

3) Die in das Gewebe der Organe infiltrirte, hirnartige Substanz. Man unterscheidet dieselbe von der nicht eingebalgten hirnartigen Masse dadurch, dass diese Materie keine umschriebenen Massen bildet. Sie bietet einen sehr verschiedenen Anblick dar, nach den verschiedenen Verhältnissen ihrer Mischung mit den verschiedenen Organengeweben, in welchen sie sich entwickelt.

§. 1746.

Man hat für diese Krankheit, wie für den Krebs, eine eigenthümliche Anlage (Diathesis fungosa) angenommen. Die Gelegenheitsursache ist zuweilen eine mechanische Schädlichkeit, doch entwickelt sich meistens die Krankheit ohne eine erkennbare äussere Ursache und zuweilen in mehrern Theilen des Körpers. Es sind somit die Ursachen dieses Uebels beinahe völlig unbekannt.

§. 1747.

Vorhersage. Der Markschwamm in innern Theilen ist unheilbar und wohl immer tödtlich, und selbst der in äussern Theilen ist dieses in der Regel, da auch nach der Ausschälung der kranken Stelle das Uebel meistens wiederkehrt.

§. 1748.

Behandlung. Das einzige Verfahren gegen dieses Leiden, von dem noch einigermassen ein günstiger Erfolg erwartet werden kann, ist die frühzeitige Hinwegnahme alles Krankhaften durch die Exstirpation desselben oder die Abnahme des Gliedes, an welchem das Uebel haftet.

Fünfte Gruppe der DRITTEN ORDNUNG DER BILDUNGS-KRANKHEITEN.

Die Bildung parasitischer Thiere.

Die Wurmkrankheit.

(*Wurmsucht*, *Wurmbeschwerden*, *Würmer*, *Helminthiasis*, *vermitio*, *morbus verminosus.*)

Bloch (mit 1 K. Berlin 1782), — *Götze* (Leipz. 1782, m. K. Nachtrag, herausgegeben von Zeder, ebend. 1804). — *Zeder* (m. K. Bamb. 1803). — *Joerdens* (m. K. Hof 1801 — 2) — *Brera* (a. d. Ital. m. Zusätzen v. Weber, m. K. Lpz. 1803). — *Rudolphi* (entozoorum hist. natur. vol. III. Amsterd. 1808 — 1810, ej. entozoor. synops. c. tab. Berol. 1819). — *Bremser* (über lebende Würmer im leb. Menschen, m. Abbild. Wien 1819, und icon. helminth. systema Rudolphii entozoolog. illust. fol. Wien 1823).

§. 1749.

Unter Wurmkrankheit versteht man a) den Zustand des Körpers, der zur Wurmerzeugung beiträgt, b) die Zufälle, welche von dem Aufenthalt von Würmern im Körper herrühren und c) das Vorhandensein von Würmern.

§. 1750.

Man findet Würmer in den verschiedensten Theilen des Körpers, ausserhalb des Darmkanals den Fadenwurm (Filaria medinensis), im Zellgewebe unter der Haut; den Fühlwurm (Hamularia subcompressa), bis jetzt nur

einmal (von *Treutler*) wahrgenommen in den Bronchialdrüsen; den Pallisadenwurm (Strongylus Gigas) in den Nieren; den Leberegel (Distoma hepaticum) in der Gallenblase und vielleicht auch in der Leber selbst; das Vielloch oder den Fettblattwurm (Polystoma pinguicola), einmal von *Treutler* in dem verhärteten Fette des linken Eierstockes gefunden; die Finne oder den Blasenschwanz (Cysticercus cellulosae) im Zellgewebe der Muskeln, nach *Bremser* auch in dem des Gehirnes und von *Sömmering d. j.* im Auge gefunden; eine kleine Filaria und die Monostoma lentis von *Nordmann* in extrahirten Linsen von staarblinden Menschen entdeckt, und, wie man gewöhnlich annimmt die Hydatiden (Echinococcus humanus).

Das Vorhandensein einer eigenen Wurmart (Hydatide oder Hülsenwurm) im menschlichen Körper scheint noch nicht erwiesen zu sein. Hydatiden nennt man die im menschlichen Körper in verschiedenen Theilen vorkommenden, in eigenen Kapseln frei enthaltenen oder auch mit einem Organ verwachsenen und oft auf Stielen sitzenden Wasserblasen. Diese Hydatiden, besonders die frei in eigenen Kapseln liegenden, aber auch selbst die gestielten halten *Bremser* und mit ihm andere Naturforscher für Thiere; andere, namentlich *Rudolphi*, halten diese Blasen nicht für Thiere. *Bremser* glaubt, dass bei den Thieren, bei welchen deutlich die Echinococci (kleine, beinahe mikroscopische Thierchen, mit vier Saugmündungen und einem Hackenkranze) vorkommen, die Hydatiden auf die Weise entstünden, dass die Echinococci, welches die Jungen der Mutterhydatiden seien, die Hacken und Saugmündungen verlieren und sich zu einfachen Kügelchen umwandeln, die allmählig wachsen und die Hydatiden darstellen. Beim Menschen fände man zwar jene mit Saugmündungen und einem Hackenkranze versehenen Echinococci nicht, man müsse aber

die in den Hydatiden oft sich vorfindenden kleinen, glatten Kügelchen für eine Art Echinococcus halten, und da diese Bläschen wachsen und Hydatiden werden, auch die beim Menschen vorkommenden Hydatiden für Thiere halten. — Es scheint mir nicht, dass die Entstehung der Hydatiden durch eine Verwandlung des Echinococcus, wo derselbe auch wirklich vorkommt, erwiesen ist, ebenso scheint es nicht nachgewiesen zu sein, dass die in den Hydatiden des Menschen zuweilen vorkommenden kleinen Bläschen wirkliche Echinococci sind; das Vorhandensein eines Thieres können wir aber nur annehmen, wenn ein Körper thierische Organe besitzt oder an irgend einer Stelle desselben willkührliche Bewegung wahrgenommen wird, was beides bei den bezeichneten Wasserblasen nicht der Fall ist. Hiernach kann ich die Hydatiden des Menschen nicht als wirkliche Thiere anerkennen. Bei den Thieren, in welchen wirkliche Echinococci in den Hydatiden gefunden werden, sind diese Thierchen eine Gelegenheitsursache der Entstehung der Wasserblasen, bei dem Menschen aber hat man diese Ursachen der Hydatiden noch nicht mit Bestimmtheit aufgefunden.

§. 1751.

Innerhalb des Darmkanals des Menschen kommen folgende Würmer vor:

1) Der *Spulwurm* (Ascaris lumbricoides). Er ist am häufigsten vorhanden, hält sich in den Dünndärmen auf und kriecht auch zuweilen in den Magen und selbst in den Schlund. (Ascaris. Spindelförmig oder cylindrisch, beiderseits verdünnt; Mund mit drei klappenartigen Knötchen. Männliche Ruthe doppelt. — A. lumbricoides: Weisslich, bräunlich oder roth, gross (6 — 16″ lang, 1 — 2‴ dick), beiderseits längs gefurcht; das Hinterende stumpf).

2) Der *Madenwurm* (Pfriemenschwanz, Mastwurm,

Springwurm, Askaride, Oxyuris vermicularis, ascaris vermicularis). Derselbe kommt oft in grosser Menge im Mastdarm vor. (Oxyuris. Dünn, kurz, spindelförmig, zumal hinten zugespitzt; Mund kreisrund. Männliche Ruthe einfach, mit einer Scheide. O. vermicularis. Klein (2 – 5‴ lang), vorn dicker, mit zwei kleinen, blasenartigen Hautflügeln; Schwanzende beim Weibchen zugespitzt, gerad; beim Männchen stumpf, eingebogen).

3) Der *Peitschenwurm* (Trichocephalus dispar). Er kommt im Blind- und Dickdarm vor; ist übrigens selten Gegenstand der Behandlung, da er, wie es scheint, wenig Beschwerden verursacht und selten während des Lebens wahrgenommen wird. (Trichocephalus. Vordertheil haarförmig, dann plötzlich dicker cylindrisch; Mund kreisrund, ohne oder mit Stächelchen. Männliche Ruthe einfach mit einer Scheide. T. dispar. Der haardünne Theil am längsten (1 – 1½″), vorne ganz spitzig, unbewaffnet; der Hintertheil (½ – 1″ lang) beim Weibchen fast gerad, beim Männchen schneckenförmig gebogen, die Ruthenscheide umgekehrt eiförmig.)

4) Der *langgliedrige Bandwurm* (Taenia Solium, T. cucurbitina). Im Dünndarme. (Taenia. Lang, platt, gegliedert, mit Eierlöchern am Rande; der Kopf mit vier Sauglöchern und zuweilen mit einem ausstreckbaren Rüssel und einem Hackenkranze. T. Solium. Kopf halbkuglig, Rüssel stumpf, mit einem (doppelten) Hackenkranze; Hals nach vorne verdickt; die vordersten Glieder sehr kurz, die folgenden fast quadratisch, die übrigen länglich, alle stumpfeckig; Eierlöcher wechselständig. Einzeln abgehende Glieder sehen Kürbiskernen ähnlich.

5) Der *breite Bandwurm* (Bothriocephalus latus, Taenia lata). Er ist selten in Deutschland, kommt dagegen häufig in der Schweiz, Frankreich und Russland vor. (Bothriocephalus. Lang, platt, gegliedert, mit Eierlöchern auf der Fläche der Glieder; Kopf vierkantig, mit 2 oder 4 Sauggruben,

zuweilen vorne mit einzelnen Hacken oder langen Hackenrüsseln. B. latus. Kopf mit zwei länglichen Sauggruben ohne Hacken; kein Hals; die vordern Glieder sehr kurz, die übrigen fast quadratisch. Er soll bis 60 Ellen lang werden.) *)

§. 1752.

Die Zufälle, welche durch die Würmer erregt werden, sind: Häufig und ohne eine weitere Ursache wiederkehrende Leibschmerzen, welche eher bei nüchternem Magen, als nach dem Genusse von Speisen sich einstellen, oft nach dem Genusse von Zwiebeln, Knoblauch, Meerrettig und ähnlichen Stoffen zunehmen, aber nach dem einer reichlichen, milden Nahrung, insbesondere Milch- und Mehlspeisen, gestillt werden, Aufgetriebenheit des Leibes und zuweilen selbst harte Stellen an verschiedenen Theilen des Unterleibes, Verstopfung, zuweilen aber auch damit abwechselnde Durchfälle, viel Hunger, zuweilen aber auch Mangel an Appetit, meistens eine stark belegte Zunge, öfteres Zusammenlaufen des Speichels im Munde, morgens nüchtern Neigung zum Erbrechen, oft ein sehr übler Geruch aus dem Munde. — Das Gefühl von Jucken in der Nase, öfteres Niesen und zuweilen auch Nasenbluten, erweiterte, manchmal aber auch verengerte Pupillen, Schwäche des Gesichtes und auch zuweilen Lichterscheinungen, dunkle Ringe um die Augen, ein blasses, aufgedunsenes Antlitz, öfterer Schwindel, Kopfweh, selbst zuweilen Irrereden, Schmerzen in verschiedenen Theilen, leichtere Zuckungen in den Gesichts- und andern Muskeln, Herzklopfen, Husten und Athmungsbeschwerden, so wie auch zuweilen

*) Obige Beschreibungen der fünf, im Darmkanal des Menschen vorkommenden Wurmarten sind die von *Perleb* gegebenen. S. dessen Lehrbuch der Naturgeschichte, Zoologie. Freiburg 1831 — 35.

selbst Anfälle von Veitstanz, Fallsucht oder Starrsucht, zuweilen aber ein mehr andauerndes, schleichendes Fieber, Abmagerung des Körpers, Wassergeschwülste und zuletzt selbst allgemeine Wassersucht.

§. 1753.

Die Spuhlwürmer insbesondere bringen häufiges Grimmen hervor, oft kriechen sie in den Magen und erregen einen nagenden und krampfhaften Magenschmerz, zuweilen kriechen sie auch in den Schlund und veranlassen Würgen und Erbrechen, auch hat man schon diese Würmer in der Highmorshöhle angetroffen, wo sie bedeutende Beschwerden veranlassen. — Die Madenwürmer erregen ein oft sehr heftiges Jucken im After, Stuhlzwang und zuweilen selbst Schleim- oder Blutausflüsse aus dem Mastdarm; sie kriechen zuweilen in die Scheide und verursachen daselbst ein heftiges Jucken. — Der Bandwurm veranlasst heftige Coliken, oft ein Gefühl von einer wellenförmigen Bewegung in der Gegend des Nabels, oft auch plötzliche Stiche, wie von einer Nadel, das Allgemeinbefinden ist mehr als bei dem Vorhandensein anderer Würmer gestört, insbesondere kommen oft Krämpfe vor und es bildet sich leicht Wassersucht aus.

§. 1754.

Die Wiederherstellung der Gesundheit erfolgt durch den Abgang der Würmer und Heilung des krankhaften Zustandes des Darmkanals, insbesondere der Verschleimung, was am häufigsten allmählig bei dem Uebergang des Individuums von dem Knaben- in das Jünglingsalter geschieht. Oft gehen die Würmer bei hitzigen Krankheiten, namentlich dem Nervenfieber, von selbst ab, oft ohne irgend eine bekannte Veranlassung. Zum Tod führt die Krankheit durch Krampfanfälle, Fieber, Abzehrung, Wassersucht.

§. 1755.

Ursachen. Die Würmer kommen vorzüglich bei Kindern vor, mehr bei Weibern als bei Männern, bei Individuen mit trägem und verschleimten Darmkanal, ihre Entstehung und ihr Gedeihen werden befördert durch reichliche Nahrung, insbesondere von Milch und Mehlspeisen, Mangel an Körperbewegung, eine niedergebeugte Gemüthsstimmung und den Aufenthalt in einer feuchten, dumpfen Wohnung.

§. 1756.

Ueber die *Entstehungsweise der Würmer* im menschlichen Körper hat man verschiedene Hypothesen aufgestellt. Man glaubte früher (*Linné*, *Unzer*, *Tissot*), es kämen die in den Thieren lebenden Würmer auch ausserhalb des thierischen Körpers vor und würden, wenn nicht gerade selbst, doch ihre Eier, durch die Speisen und Getränke in den Körper des Thieres gebracht. — *Brera* glaubte, dass Würmer, die ausserhalb des Körpers leben, in den thierischen Körper gelangen, ihre Form verändern, und dass dadurch die Eingeweidewürmer entstehen. — Andere (*Pallas*, *Bloch*) waren der Meinung, der Saamen der Eingeweidewürmer würde bei dem Zeugungsacte, oder bei der Ernährung der Frucht im Mutterleibe und vermittelst der Muttermilch von den Eltern den Kindern mitgetheilt. — Die Unhaltbarkeit aller dieser Meinungen hat *Bremser* gründlich bewiesen. — Man glaubt nun ziemlich allgemein, die Eingeweidewürmer entstünden durch Generatio aequivoca und hält dafür, das sie aus einem Ueberschuss von Bildungsstoff entstehen, der im thierischen Körper in einen gewissen selbstständigen Bildungsprozess gerathe. Da dieser Bildungsstoff in verschiedenen Thierarten Besonderheiten zeigt, die dem anderer Thiere abgehen, so ist das Product des abnormen Bildungsprozesses in verschiedenen Thierarten häufig verschieden, woher es kommt, dass viele Thierarten ihre

besonderen Arten von Eingeweidewürmern haben. Die einmal vorhandenen Eingeweidewürmer pflanzen sich durch Begattung fort.

§. 1757.

Vorhersage. Die Wurmkrankheit wird selten lebensgefährlich; insbesondere sind bei erwachsenen Personen die Spuhlwürmer, die Madenwürmer und die Peitschenwürmer beinahe nie gefahrbringend, zuweilen jedoch bei Kindern. Leichter hat der Bandwurm lebensgefährliche Folgen. Zuweilen sind die Würmer schwer abzutreiben, insbesondere widersteht der langgliedrige Bandwurm oft den stärksten Mitteln.

§. 1758.

Behandlung. Wir haben drei Anzeigen zu erfüllen: 1) die vorhandenen Würmer abzutreiben, 2) die durch die Würmer hervorgebrachten Zufälle zu beseitigen und 3) die Wiedererzeugung der Würmer zu verhüten.

1) Die *Abtreibung der Würmer.* Es entsprechen dem angegebenen Zwecke zwei Reihen von Mitteln: a) solche, welche den Wurm krank machen und tödten, und b) solche, welche ihn aus dem menschlichen Körper hinwegschaffen. Die ersteren sind möglichst grosse Entziehung der Nahrung, die Kälte, daher reichliches Trinken von kaltem Wasser und insbesondere von kalten salzigen Mineralwassern, so wie auch beim Aufenthalt der Würmer in dem Mastdarm kalte Klystiere, stark gesalzene Speisen, z. B. Häringe, ferner Rettige, Knoblauch, Zwiebeln, gelbe Rüben, unter den eigentlichen Arzneimitteln Sem. Cinae, sem. Tanaceti, rad. Valerianae, Absinthium, rad. Filicis maris, Helmintochorton, Chenopodium anthelminticum, Spigelia anthelmia et marilandica, cortex viridis nucum Juglandis, Geoffroea surinamensis, cortex rad. Punicae Granati, Sem. Sabadilli, Asa foetida, Campher, Naphtha, Oleum Tanaceti, Oleum Filicis maris, Terpenthinöl, Oleum animale Dippelii,

Ol. empyreumaticum Chaberti, das laufende Quecksilber, Calomel, limatura Stanni, limat. martis, Vitriolum martis, Ammonium muriaticum, Aqua Calcis, Tartarus stibiatus etc.

§. 1759.

Um die geschwächten oder getödteten Würmer aus dem Körper hinweg zu schaffen, kann man irgend ein gehörig wirkendes Abführungsmittel geben, Bittersalz, Senne, Rhabarber, Calomel in Verbindung von Jalappe, Ricinusöl, so wie auch selbst Gummi Gutta, Gratiola, Helleborus niger, Oleum Crotonis etc.

§. 1760.

Es ist zweckmässig, zuerst einige Zeit Wurmmittel allein und sodann erst dieselben in Verbindung mit Abführungsmitteln oder diese allein zu geben. Oft genügt ein einziges Wurmmittel, oft ist es nöthig, mehrere Wurmmittel mit einander in Verbindung zu geben. Man lässt die Mittel gewöhnlich morgens nüchtern gebrauchen und auch den Kranken während der ganzen Kur eine sparsame Diät führen und den Würmern widrige Speisen geniessen. Man sagt, die Würmer liessen sich am leichtesten bei abnehmendem Monde abtreiben, was aber nicht der Fall zu sein scheint.

§. 1761.

Zur Abtreibung der Spuhlwürmer bedient man sich der leichtern der oben angeführten Mittel, insbesondere des Wurmsaamens, den man zu einem Kaffeelöffel voll in Wasser, oder auf Butterbrod oder in Honig, oder der Confectio sem. Cinae, oder in Wurmzeltchen und in verschiedenen Verbindungen mit andern Wurmmitteln und Abführungsmitteln anwendet (Nr. 97 u. 99).

§. 1762.

Gegen die Madenwürmer wendet man ausser den gewöhnlichen Wurmmitteln starke Abführungsmittel und Klystiere von kaltem Wasser, oder von einem Aufguss der Valeriana, Wurmsaamen, Absinthium, von

Knoblauch mit Milch gekocht, oder von Auflösungen der Aloe, der Asa foetida etc. und Stuhlzäpfchen von Speck oder Honig und Seife und den Dampf von Knoblauch in Milch gekocht, an den After geleitet, an.

§. 1763.

Um den Bandwurm abzutreiben, wendet man die stärkeren Anthelmintica in verschiedenen Zusammensetzungen, namentlich die Farrenkrautwurzel, die Zinnfeile, das Terpenthinöl, das Chabert'sche Oel, und nach deren Gebrauch die stärkeren Abführungsmittel, insbesondere starke Gaben von Calomel und Jalappe, Gummi Gutt und Ricinusöl, an. Mehrere Gebrauchsarten dieser Mittel haben sich einen besondern Ruf erworben. Dahin gehören:

Die *Odier*'sche Methode: Am Morgen 3 Drachmen des Pulvers von rad. Filicis maris und nach zwei Stunden 3 Uncen von Oleum Ricini, jede halbe Stunde 1 Esslöffel voll in Fleischbrühe.

Die von *Richter*: Der anhaltende Gebrauch der Farrenkrautwurzel alle 2 Stunden zu einer halben Drachme 14 Tage bis 3 Wochen lang fortgesetzt.

Das *Nuffer*'sche Mittel: Am Abend eine dünne Wassersuppe mit viel Butter und bei Verstopfung ein Klystier, am andern Morgen 3 Drachm. Farrenkrautwurzel, zwei Stunden nachher folgenden Bolus: ℞: Calomel, Scammon. sicc. aa gr. Xij. Gumm. Gutt. gr. V. — m. f. pulv. et ope confect. de hyacinth. bolus. Nach dem Anfang der Ausleerung etwas warmen Thee. Erfolgt kein gehöriges Abweichen noch 2 — 8 Drachm. englisches Salz.

Das *Herrenschwand*'sche Mittel: Zwei Tage nach einander des Morgens nüchtern und des Abends 2 Stunden nach einer leichten Mahlzeit 1 Drachme Farrenkrautwurzel, am dritten Tage früh nüchtern ℞: Gumm. Gutt. gr. Xij; Sal. Absinth. Drachm. dimid.; Sapon. Starkeyan. gr. ij. Drei Stunden nachher 1 Unc. Ricinusöl, welches

1 oder 2 Mal wiederholt werden kann. Geht der Wurm noch nicht ab, ein Klystier aus gleichen Theilen Wasser und Milch, und 3 Unc. Ricinusöl.

v. Beck's Methode. ℞: Mercurii dulcis Scrup. j; Corn. Cerv. ust., Cinnabaris Antimonii aa. gr. X. m. f. pulv. d. s. A. — ℞: Rad. Filic. mar. Drachm. j., rad. Jalapp., Gumm. Gutt., Herb. card. benedict., Ebur ust. aa. Drachm. ß. M. f. pulv. div. in part. iij aequal. d. s. B. oder Specificum. Nachmittags um 5 Uhr das Pulver A in einem Löffel voll Wasser, Abends eine Suppe und sodann 2 Unc. Mandelöl, am andern Morgen ein Pulver von B mit einem Esslöffel voll Syrupus Persicorum und Theewasser, worauf gewöhnlich innerhalb 2 Stunden zwei- bis dreimal Erbrechen entsteht. Geht hierauf der Wurm nicht ganz ab, nach zwei Stunden das zweite Pulver und wirkt auch dieses nicht, selbst das dritte. Bei sehr zarter Leibesconstitution des Kranken setzt man statt der Jalappe gr. XXX Herb. Gratiolae zu.

Das *Schmidt*'sche Verfahren: Einen Mittag nichts zu essen und den ganzen Tag Zuckerwasser, Abends einen Salat aus einem Häring, 8 Loth rohem Schinken, 4 Loth Zucker und etwas Zwiebeln (ohne Kartoffel), den andern Morgen ℞: Pulv. rad. Jalapp. gr. XV; Sem. Cinae. gr. X; Gumm. Gutt., Calomel aa. gr. Vj; Elaeosacchar. Tanacet. Drachm. j. M. f. pulv. d. s. nüchtern auf einmal mit Syrup z. n. Eine Stunde nachher schwarzen Kaffee mit viel Zucker, Mittags eine Mehlsuppe mit Zucker, Abends einen Häringsalat, den Tag über zum Getränk Zuckerwasser. Den dritten Tag ℞: Rad. Valerianae Drachm. Vj; Fol. Senn. Drachm. ij; Natr. sulphuric. crystallisat. Drachm. iij; infund. Aq. fervid.; Colatur. Unc. Vj add: Elaeosacchar Tanacet. Drachm. ij. D. s. Alle 2 Stunden 2 Esslöffel voll. Die Diät wie am Tage vorher. Den vierten Tag: von morgens 5 oder 6 Uhr an jede Stunde 6 Stücke von folgenden Pillen. ℞: Asae

foetid., Extract. Gramin. aa. Drachm. iij; Pulv. Gumm. Gutt., rad. Rhei, rad. Jalapp. aa. Drachm. ij, Ipecacuanh. herb. Digital., Sulphur. aurat. aa. gr. X; Calomel. Scrup. ij; Olei Tanacet., Ol. Anis. aa. gutt. XV. m. f. pilul. gr. ij; Consperg. Lycopod. mit Syrup z. n. Jedesmal eine halbe Stunde nach den Pillen 1 Esslöffel voll Ricinusöl. Gegen 8 Uhr schwarzen Kaffee, um 10 Uhr eine Tasse Fleischbrühe, Abends eine Mehlsuppe.

Das *Matthieu*'sche Mittel: Einige Tage hindurch wenig nährende, stark gesalzene Speisen, namentlich Häringe. Sodann ℞: Limatur. Stann. angl. Unc. j; pulv. rad. Filic. mar. Drachm. Vj; sem. Cinae Unc. dimid.; pulv. rad. Jalapp., sal. polychrest. aa. Drachm. j. M. f. c. mell. comm. q. s. Elect. S. Nr. 1. ℞: Pulv. rad. Jalapp., Sal. polychrest. aa. Scrup. ij; Scammon. Alepp. Scrup. j.; Gumm. Gutt. gran. X. M. f. c. mell. q. s. Elect. S. Nr. 2 — von Nr. 1 alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll 2 bis 3 Tage hindurch, und hierauf von Nr. 2 alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll. Geht der Bandwurm nicht nach ein paar Tagen ab, so wird dasselbe Verfahren wiederholt und auch Ricinusöl gegeben.

Hufeland's Methode: Morgens nüchtern eine Abkochung des Knoblauchs in Milch; früh, Nachmittags und Abends 1 Esslöffel voll Ricinusöl und täglich eine Latwerge aus einer halben Unce Limatur. Stann. und Conserv. Rosar. bereitet; den Unterleib öfters mit Petroleum eingerieben; viel saure und salzige Speisen und Abends ein Klystier von Milch. Dieses wird mehrere Wochen fortgesetzt. Geht das Kopfende nicht ab, so giebt man die nämlichen Mittel zwei Tage in stärkern Gaben und insbesondere 2 bis 4 Mal täglich 2 Esslöffel voll Ricinusöl in Verbindung von Pulv. herb. Gratiolae gr. Viij. Ist auch dieses ohne Erfolg, alle 2 Stunden 30 Tropfen Tinctur. Asae foetidae volatilis. Zuletzt das

Pyrmonter oder Driburger Mineralwasser alle Morgen wenigstens zu 2 – 3 Pfunden wochenlang fortgesetzt.

Kämpf und *Clossius* wendeten das Terpenthinöl als Probiermittel an, um über die Gegenwart des Bandwurms Gewissheit zu erhalten; eine Drachme Terpenthinöl mit Eidotter in einigen Uncen Wasser aufgelöst, des Abends vor Schlafengehen in zwei Portionen zu nehmen. Sehr kräftig aber zuweilen dem Kranken selbst Gefahr bringend ist die *englische Methode* der Anwendung des Terpenthinöls, wornach morgens nüchtern $1/2$ bis 2 Unc. Terpenthinöl gegeben werden. Man kann dasselbe in Verbindung mit etwas Syrup reichen.

Rosenstein und *Rudolphi* empfehlen das Oleum animale aethereum. Letzterer giebt dreimal täglich 5 – 10 Tropfen in einer Tasse Fleischbrühe.

Bremser rühmt sehr das zuerst von *Chabert* angewandte Oel, welches durch Mischung und Destillation von einem Theil stinkenden Hirschhornöls und 3 Theilen Terpenthinöl bereitet wird (Oleum empyreumaticum Chaberti). Zuerst eine gewöhnliche Wurmlatwerge (Nr. 98) 2 bis 3 Mal täglich einen Kaffeelöffel voll, bis die Latwerge verbraucht ist. Hierauf jeden Morgen und Abend 2 Kaffeelöffel voll des Oels mit einem Mund voll Wasser. Sind 2 bis 3 Uncen des Oels verbraucht, folgendes Abführungsmittel: ℞: Pulv. rad. Jalapp. Scrup. j.; Pulv. fol. Senn. Drach. dimid.; Tartar. vitriolat. Drachm. j. M. f. pulv. divid. in part. iij aequal. S. Alle St. 1 oder alle $1/2$ St. $1/2$ Pulver z. n. Hierauf wieder Wurmöl bis 4 – 5 und in hartnäckigen Fällen bis 6 oder 7 Uncen verbraucht sind. Der Wurm geht meistens verwest ab. – Es scheint mir, diese Methode vor allen andern den Vorzug zu verdienen. Ich habe sie schon öfters mit Erfolg angewandt.

Bourdier's Methode. Des Morgens nüchtern eine Drachme Schwefeläther in einem Glase einer starken Abkochung der Farrenkrautwurzel, eine Stunde später

2 Drachm. Ol. Ricini mit Syrup. Dieses am zweiten und dritten Tag am Morgen wiederholt.

Breton's Methode. Zwei Uncen der frischen Rinde der Wurzel von Punica granatorum werden mit 1½ Pinten Wasser bis zu ¾ Pinten eingekocht und hievon viermal hinter einander jede halbe Stunde ein Weinglas voll gegeben.

Auch wurde empfohlen, den Bandwurm, wenn ein Theil von ihm aus dem After heraushänge, nach einem gemachten Einschnitt in denselben mit Blausäure zu bestreichen.

§. 1764.

2) Um die *Zufälle*, welche durch die Würmer hervorgebracht sind, *zu mässigen*, ist das zuverlässigste Mittel, die Würmer schnell zu vertreiben. Lässt sich ihr baldiger Abgang nicht erwarten, so stehe man während des Vorhandenseins heftiger Zufälle von dem Versuche, den Wurm abzutreiben, ab und suche die Würmer durch die Darreichung von reichlicher Milch und Mehlnahrung zu beruhigen, und die Empfindlichkeit des Kranken durch die besänftigende Methode, z. B. durch etwas Opium, zu vermindern. Im Uebrigen sind die bezeichneten Krankheitszustände nach ihrer Natur zu behandeln.

§. 1765.

3) Um die *Neigung zur Wurmerzeugung im Körper zu tilgen*, lasse man den Kranken eine Diät halten, welche der Wurmbildung nicht günstig ist, daher nicht zu viel Nahrung und mehr Fleisch, Wein und Gewürze als Milch- und Mehlspeisen geniessen, zugleich wende man längere Zeit aromatische und bittere Mittel an.

Die Läusesucht.

(*Phthiriasis.*)

§. 1766.

Man glaubt, dass es einen eigenthümlichen krankhaften Zustand des Körpers gebe, der zur Läuseerzeugung beitrage, indem in manchen Krankheiten sich besonders leicht Läuse bilden und es selbst Fälle geben soll, in welchen Läuse aus innern Theilen, den Ohren, der Nase, dem Munde, dem After, der Harnröhre etc., in welchen Theilen sich viele Knötchen und Pusteln bilden, hervorkommen und auch aus solchen Pusteln bei der Oeffnung derselben herauskommen sollen. Die Lymphe und die ausgedünstete Materie sollen eine eigenthümliche, zur Läuseerzeugung beitragende Beschaffenheit haben. — Es giebt drei Arten von Läusen auf dem menschlichen Körper: Die Kopflaus (Pediculus capitis), die Kleiderlaus (P. vestimenti) und die Filzlaus (P. pubis, Morpion).

§. 1767.

Es kommen die Läuse besonders bei Kindern vor, bei vieler Schuppenbildung in dem behaarten Theile des Kopfes, bei vielem Schwitzen, bei der Lungenschwindsucht und andern langwierigen Krankheiten und bei grosser Unreinlichkeit. Auch werden beschuldigt: der reichliche Genuss der Feigen, des Vipernfleisches, der Genuss von verdorbenem Fleische etc.

§. 1768.

Behandlung. Fleissiges Kämmen, Waschungen mit einem Aufguss von Semina Sabadilli oder Staphisagriae, Beschmieren der Theile mit der grauen Quecksilbersalbe oder einer andern Mercurialsalbe.

ACHTE KRANKHEITS-FAMILIE.

Die Nervenkrankheiten.

Fr. Hoffmann (Diss. Halle 1708, Opp. omn. Tom. VII.). — *Boerhaave* (lat. 2 Tom. Lugd. Bat. 1761). — *de la Roche* (aus d. Franz. v. Merzdorf. 2 Bde. Halle 1794). — *Tissot* (a. d. Franz. v. Ackermann, 3 Bde. Lpz. 1789—91, v. Weber, 4 Bde. Königsberg 1781—85). — *Whyte* (aus d. Engl. Lpz. 1794). — *Reuss* (Prag 1788). — *Michell* (Wien 1798). — *Reil* (üb. d. Fieber, 4r Bd.). — *v. Hoven* (Nürnberg 1813). — *Georget* (aus d. Franz. v. Kummer, Lpz. 1823, Par. 1827). — *Fuerstein* (Lpz. 1828).

ERSTES HAUPTSTÜCK.

Von den Nervenkrankheiten im allgemeinen.

§. 1769.

Nervenkrankheiten im engern Sinne des Wortes nennen wir die Krankheiten, in welchen krankhafte Aeusserungen in der Empfindung, der Muskelbewegung oder den geistigen Verrichtungen als solche Krankheitserscheinungen auftreten, welche für sich eine Krankheitsart bilden, in so fern die letztern nicht wirkliche Seelenstörungen sind.

§. 1770.

Die drei angegebenen krankhaften Lebensäusserungen kommen sehr häufig als Symptome anderer Krankheiten

vor, z. B. der Schmerz in der Entzündung, eine zitternde Bewegung der Muskeln im Nervenfieber, das Irrereden in allen heftigen Fiebern, und sind auch für sich betrachtet wirkliche Nervenkrankheiten; doch konnten sie nicht von der Krankheitsform, mit der sie verknüpft sind, getrennt werden und mussten daher in andern Kapiteln der Krankheitslehre erwähnt werden. Auf der andern Seite kommen in Nervenkrankheiten; ausser den angegebenen drei Krankheitsäusserungen, noch andere krankhafte Zufälle vor, z. B. Veränderungen der Temperatur und der Absonderungen; diese Zufälle sind aber immer nur die Symptome deuteropathischer Krankheitsvorgänge und sind nicht ein Theil der reinen Nervenkrankheit, welche auch bestehen kann, ohne dass jene Zufälle eintreten. So z. B. ist Absonderung eines sehr blassen Urins ein gewöhnlicher Begleiter von Krampfkrankheiten, es bildet aber diese krankhafte Absonderung nicht einen Theil des Krankheitsprozesses, der den Krampf in den Muskeln darstellt, sondern hat ihren Sitz in einem ganz andern Organ und fehlt auch oft, ungeachtet Krampf vorhanden ist.

§. 1771.

Die Krankheitsform ist oft sehr einfach, so dass zuweilen nur eine einzige Krankheitserscheinung von den erwähnten drei Symptomenreihen vorhanden ist, z. B. Schmerz, oft ist sie aber zusammengesetzter, so dass fehlerhafte Empfindungen, krankhafte Muskelbewegungen und Störungen in den Aeusserungen der psychischen Thätigkeit zugleich vorhanden sind, wie z. B. in der Fallsucht.

Die Abweichungen vom gesunden Zustand bestehen entweder in vermehrten oder in der Art nach veränderten oder in verminderter Empfindung, Muskelbewegung und Aeusserung der geistigen Thätigkeit. — Vermehrt und häufig zugleich der Art nach verändert erscheint

die Empfindung bei erhöhter Empfindlichkeit der Sinnesorgane und bei Sinnestäuschungen, wie z. B. bei der Lichtscheue, der scheinbaren Wahrnehmung von Funken vor den Augen, dem Ohrenklingen etc., und bei krankhaften Empfindungen im Gemeingefühl, z. B. dem Schmerze. Vermehrt erscheint die Muskelbewegung in den tonischen und klonischen Krämpfen, wovon die erstern diejenige Krämpfe sind, in welchen die Muskeln andauernd zusammengezogen sind und also der vom Krampfe befallene Theil unbeweglich ist, oder sich langsam zusammenziehen und also den leidenden Theil langsam bewegen (meistens verdrehen), und die letztern in schneller Hin- und Herbewegung des Theiles (Zuckungen) bestehen. Vermehrt und verändert sind die Aeusserungen des geistigen Lebens in vielen Affecten und Leidenschaften, die Begleiter vieler Nervenkrankheiten sind, in der Schlaflosigkeit und in dem Irrereden, das in manchen Nervenkrankheiten vorkommt, wie z. B. in dem sogen. Delirium tremens. Dieses Irrereden ist sehr wohl von dem, die eigentliche Seelenstörung kund gebenden Irresein zu unterscheiden, indem es mit dem bestehenden Nervenleiden eng verknüpft und meistens nur vorübergehend ist, und nie einen moralischen Ursprung hat. — Vermindert oder aufgehoben erscheint die Empfindung bei Schwäche der Sinnesorgane und bei Mangel der Empfindungen, die das Gemeingefühl im normalen Zustand giebt, namentlich des Durstes und des Hungers, die Muskelbewegung bei der Starrsucht, Ohnmacht, Lähmung, die Aeusserung der geistigen Thätigkeit im schlafsüchtigen Zustande, Betäubung, Ohnmacht, Schlagfluss etc.

Oefters sind mit diesen Störungen noch solche in der Blutbewegung, Wärmebildung, den Absonderungen oder der Ernährung verbunden, so z. B. wird der Theil, welcher von Nevralgie befallen ist, oft röther und wärmer, als im gesunden Zustande, bei dem Krampfe

hat der Harn gewöhnlich eine blasse Beschaffenheit, der gelähmte Theil zehrt ab etc.

§. 1772.

Der Verlauf der Nervenkrankheiten ist bald hitzig, bald langwierig. Alle Nervenkrankheiten, mit Ausnahme derjenigen, in welchen das Nervenleben mehr oder weniger zernichtet ist, haben das Eigenthümliche, dass die Krankheitserscheinungen nie in derselben Heftigkeit ununterbrochen andauern, sondern nachlassen oder, was der häufigere Fall ist, zeitweise aussetzen. Diesemnach machen die meisten Nervenkrankheiten Anfälle und es scheint oft selbst, wie wenn in der Zeit zwischen den Anfällen durchaus kein krankhafter Vorgang im Körper statt finde. Der Anfall kehrt zuweilen in einer bestimmten, meistens jedoch in unbestimmter Zeit zurück, er entwickelt sich entweder allmählig oder tritt sogleich mit grosser Heftigkeit auf und verschwindet entweder allmählig oder hört plötzlich auf. Das Ende des Anfalls ist zuweilen von Ausscheidungen bezeichnet, doch kommen dieselben auch bei der nämlichen Krankheitsart, bei der sie zuweilen statt finden, nicht immer vor, und scheinen bei keiner einzigen Nervenkrankheit eine nothwendige Bedingung der Entscheidung zu sein. Wie der einzelne Anfall, so kann in jeder Nervenkrankheit das ganze Nervenleiden sich ohne sichtbare Ausscheidungen heben; öfters jedoch geschieht der Uebergang in Gesundheit unter Ausscheidung von Stoffen unter Schweissen, Ablagerungen im Urin, nach dem Zustandekommen der monatlichen Reinigung, der Hämorrhoiden, nach Bildung von Eiterheerden, von Geschwüren, nach Entstehung eines Rothlaufes, der Gicht etc. Zuweilen haben die Nervenkrankheiten Nachkrankheiten zur Folge. Manchmal sind dieses Nervenkrankheiten anderer Art, wie z. B. die Lähmung zuweilen auf Krämpfe folgt; oft sind es Congestionen, Entzündungen, Ge-

schwülste, Abzehrung, Wassersucht etc. Den Tod können die Nervenkrankheiten herbeiführen: entweder durch Hemmung der Verrichtung der wichtigern Theile des Nervensystems, z. B. des Gehirnes, wo sodann sich mit dem reinen Nervenleiden stets eine Störung in den vegetativen Lebensprozessen verbindet oder durch Erschöpfung der Kräfte. Auch können die Nachkrankheiten zum Tode führen.

§. 1773.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Nach den heftigsten Nervenzufällen findet man oft durchaus keine Veränderung in dem Gehirne, dem Rückenmarke und den Nerven, ja es scheint keine einzige Nervenkrankheit zu geben, die beständig mit einer bestimmten Structurveränderung in den Nerven verbunden wäre. Oft findet man aber auch in den Nerven oder ihren Hüllen oder in den angrenzenden weichen und harten Theilen Entzündungen, Ausschwitzungen, Eiterung, Erweichung, Verhärtung, Geschwülste etc.

§. 1774.

Anlage zu Nervenkrankheiten hat mehr das weibliche, als das männliche Geschlecht, besonders zart gebaute Frauenzimmer mit leicht erregbarem Gemüthe. In gewissen Perioden des Lebens ist der Körper auch mehr als in andern zu Nervenkrankheiten geneigt, so kommen im Kindesalter, besonders in der Zahnperiode, sehr häufig Zuckungen (Gichter) vor, zur Zeit der Geschlechtentwicklung bilden sich oft schwere Nervenkrankheiten aus, zur Zeit der monatlichen Reinigung, auch nach der Empfängniss, während der Entbindung und im Wochenbette sind die Frauenzimmer oft besonders zu Krämpfen geneigt. Im höhern Alter hören oft die Nervenkrankheiten, welche den Character der Erregung tragen, wie z. B. die Hysterie, auf, es treten aber eher solche mit Unterdrückung der Lebensäusse-

rungen, wie der Schlagfluss und die Lähmung, ein. Zuweilen ist die Anlage zu gewissen Nervenkrankheiten angeerbt; indem man zuweilen bei den Kindern eine Hinneigung zu demselben Nervenleiden, mit welchem eines der Eltern behaftet war, bemerkt; auch sollen zuweilen die Umstände, unter welchen die Zeugung vorgenommen worden ist, den Grund zur Anlage des Kindes zu Nervenkrankheiten legen; dieses soll namentlich bei dem bei Berauschung eines der Eltern, bei erzürntem Gemüth oder unter Abneigung des einen Theiles gegen den andern erfolgten fruchtbaren Beischlaf zuweilen der Fall sein.

§. 1775.

Die häufigsten *Gelegenheitsursachen* zu Nervenkrankheiten sind Gemüthsbewegungen, besonders häufig wiederkehrender Verdruss, anhaltender Kummer, Schrecken, z. B. bei dem Anblick eines Schauder erregenden Gegenstandes, wie namentlich der mit heftigen Krämpfen behafteten Personen, auch zu starke und zu frühzeitig stattfindende Geistesanstrengung, übermässige und besonders frühe vorgenommene Geschlechtsreitzungen und unbefriedigter starker Geschlechtstrieb, ferner Hemmung der monatlichen Reinigung, Erkältung, der Wurmreitz, der Missbrauch des Weines, des Kaffes, in den Körper aufgenommene Gifte und gewisse Contagien, Verletzungen der Substanz des Gehirnes, des Rückenmarks oder einzelner Nerven durch äussere Einwirkungen und mancherlei Krankheiten etc., auch grössere oder geringere Entziehung nothwendiger Einflüsse auf das Nervensystem, wie z. B. des Blutes, der athmosphärischen Luft, des Lichtes etc.

§. 1776.

Die Ansichten, die man über das W e s e n der Nervenkrankheiten aufgestellt hat, gründen sich auf sehr verschiedene Vorstellungsarten über die Wirkungsart der Nerven, die sich auf folgende zurückführen lassen:

1) Auf mechanische Vorstellungsweisen. Man hielt die Nerven für feste, elastische Fasern, deren Wirkung, wie die der Saiten musikalischer Instrumente durch schwingende Bewegung erfolge. Diese Meinung trifft man schon bei griechischen Aerzten an und sie hat sich auch bis in die neuere Zeit erhalten, doch wurde dieselbe nie die herrschende. Am meisten trug wohl zu ihrer Verbreitung die *Stahl*'sche Schule bei. — Indem man durch Anschauung erkannte, dass die Nerven nicht wie Saiten gespannt in den Geweben liegen, so nahm man an, dass das Nervenmark aus elastischen Kügelchen bestehe, welche durch Oscillation die Wirkung der Nerven hervorbringen sollen. — 2) Auf dynamische Vorstellungsweisen. Viel verbreiteter, als jene mechanischen Ansichten, war die Meinung, dass in den Nerven ein feines Fluidum sich bewege, das man Lebensgeist, Nervengeist oder Aether, Anima sensitiva, Nervenfluidum etc. nannte. Diese Ansicht stammt wohl von *Galen* her, und wurde von den berühmtesten Aerzten der ältern und der neuern Zeit auf verschiedene Weise modificirt wiederum vorgetragen, namentlich von *Fr. Hoffmann*, *Boerhave*, *Tissot*, *Sömmering*. In der neuesten Zeit hat *Ehrenberg*, vermittelst des Mikroskopes, entdeckt, dass Gehirn und Nerven aus äusserst dünnen Röhren bestehen, in welchen eine feine Flüssigkeit enthalten sei. Bestätigt sich diese Entdeckung, so wird sie uns einen Schritt weiter in der Kenntniss vom Nervenleben führen, so wie auch die Entdeckung von *Bell*, über die Verschiedenheit der vordern und hintern Rückenmarksnerven, über die Bewegungen im Nervensystem Licht verbreiten kann. Endlich hat man, auch ohne gerade bestimmte Strömungen eines Fluidums anzunehmen, den Grund der Wirkung der Nerven in einer Art Electricitätsentwicklung gesucht und das Nervensystem mit der Voltaischen Säule verglichen. — Die auf diese Meinungen gestützten

Theorien der Nervenkrankheiten leiten nun die Krankheitszufälle bald von einer zu grossen Spannung oder Erschlaffung der Nerven, bald von einer fehlerhaften Richtung in der Bewegung des Nervenfluidums, oder von Schärfe des Nervensaftes, so wie auch von einem Fehler in den Electricitätsverhältnissen zwischen den Nerven und der Aussenwelt etc. ab, doch ist die Theorie der Nervenkrankheiten noch beinahe gar nicht ausgebildet uud ermangelt beinahe ganz einer sichern Grundlage.

§. 1777.

Indem wir von der Physiologie nähern Aufschluss über die Vorgänge innerhalb der Nerven zu erhalten abwarten müssen, beschränke ich mich auf folgende Bemerkungen über das Wesen der Nervenkrankheiten: Bei sämmtlichen Nervenkrankheiten nimmt das Blut keinen unmittelbaren Antheil an dem Krankheitsprozess. Zwar liegt häufig in dem Blute die Ursache der Nervenkrankheit, es kann aber eine solche nur als die entferntere Ursache angesehen werden, indem in der Wechselwirkung zwischen Nerven und Blut weder die nächste Ursache der Empfindung, noch der Muskelbewegung, noch der Gedankenbildung liegt, und also auch eine Störung in dem normalen Verhältniss zwischen Nerven und Blut nicht die nächste Ursache einer fehlerhaften Empfindung, die äussere Gegenstände veranlassen, noch des Krampfes, noch des Irreredens sein kann. Dass die erwähnten Verrichtungen nicht in einem Wechselprozess zwischen Nerven und Blut begründet sind, geht schon daraus hervor, dass, wie ich häufig beobachtet habe, niedere Thiere, denen man alles Blut entleert, doch noch Berührung empfinden und vor dem Verfolger die Flucht ergreifen, also sich willkürlich bewegen und sich Vorstellungen zu bilden im Stande sind. Bewirkt das Blut eine Nervenkrankheit, so kann dieses dadurch ge-

schehen, dass das in den Gefässen angesammelte oder aus denselben ausgetretene Blut auf das Gehirn, das Rückenmark oder auf Nerven drückt, oder dass schädliche Stoffe in demselben enthalten sind, die die Nerven reitzen oder auf das Nervenleben zerstörend wirken, in welchem Falle aber auch diese Einwirkung des Blutes auf die Nerven nicht die nächste Ursache der Nervenkrankheit ist, welche vielmehr in einem andern Verhältniss, z. B. bei dem Krampfe in einem fehlerhaften Verhältnisse der Nerven zu den ihnen in dem Muskel entgegengesetzten Similartheilen, zu suchen ist, oder dadurch, dass durch Entziehung des Blutes die Nervenkraft nicht wieder ersetzt wird, wodurch secundär Gefühl, Muskelbewegung und geistige Thätigkeit gestört werden, oder dass durch plötzliche Aufhebung der Wechselprozesse zwischen Nerven und Blut momentan sich die Nervenkraft in höherm Grade auf die Muskeln wendet und Krämpfe erzeugt etc.

§. 1778.

Das Wesen des Krampfes scheint mir in einer krankhaften, in dem Gewebe der Muskeln und der übrigen, einer krampfhafhaften Zusammenziehung fähigen Gebilde vor sich gehenden Anziehung der in dieselben eindringenden Nerven auf die in dem Gewebe des Organs ihnen entgegenstehenden Similartheile zu bestehen. Es scheint die Muskelbewegung und also auch die krampfhafte Bewegung nach denselben Gesetzen zu geschehen, nach welchen die Bewegungen der Dotterkügelchen in den Eiern der Betrachier bei den mannigfaltigen Formbildungen, welche der bleibenden Gehirnbildung vorangehen, höchst wahrscheinlich bewirkt werden, und nach welchen auch die Bewegung des Chylus und des Blutes geschieht, insoweit sie nicht durch mechanische Einwirkung, allein bewirkt wird, nämlich durch die Einwirkung zweier, einander in ihren Kräften entgegen-

gesetzten Theile auf einander, wodurch Anziehung beider auf einander erfolgt, wie dieses auch bei der electrischen Anziehung der Fall ist. Der eine dieser die Bewegung bedingenden Factoren ist bei der Muskel- und Blutbewegung immer das Nervensystem, der andere bei der Bewegung des Blutes die Blutkügelchen und vielleicht auch die Blutflüssigkeit, bei der Muskelbewegung aber die, nebst der Nervensubstanz, das Gewebe des Organs bildenden Similartheile (Muskularsimilartheile).

§. 1779.

Vorhersage. Die meisten Nervenkrankheiten werden, ungeachtet ihrer scheinbaren Heftigkeit, in der Regel nicht lebensgefährlich, doch giebt es einige, wie der Schlagfluss und der Wundstarrkrampf, die dieses im höchsten Grade sind. Mehrere Nervenkrankheiten gehören zu den leicht heilbaren Krankheitszuständen, andere spotten unserer Kunst.

§. 1780.

Behandlung der Nervenkrankheiten. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man suche den Reitz zu entfernen, der noch fortdauernd auf's Nervensystem einwirkt. Man suche das Gemüth zu beruhigen, beuge der Onanie vor, entferne Würmer und andere gastrische Reitze, suche die monatliche Reinigung wiederum herzustellen, man suche den etwa stattfindenden Blutandrang nach den Centraltheilen des Nervensystems zu mässigen, Blutstockungen im Pfortadersysteme zu zertheilen, eine Entmischung des Blutes, die etwa entferntere Ursache der Nervenkrankheit sein könnte, zu heben etc. Ebenso suche man auch die normalen Reitze auf's Nervensystem, wo sie etwa fehlen, wiederum herzustellen, man suche die Bereitung eines bessern Blutes zu bewirken, empfehle dem Kranken einen Aufenthalt in einer sehr gesunde Athmospäre etc.

§. 1781.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Besteht die Nervenkrankheit in erhöhter Lebensthätigkeit im Nervensystem, so ist die besänftigende Methode angezeigt. In manchen Fällen genügen schon fette Mittel, so wie auch schleimige und zuckerhaltige Substanzen, und zwar hüllen diese Dinge nicht allein ein und wirken dadurch, dass sie einen fremden Reitz unschädlich machen, sondern vermögen die erhöhte Sensibilität wirklich zu mässigen. Sie wirken vorzüglich an dem Orte, auf den sie angewandt werden, wie z. B. bei Schmerzen in äussern Theilen, bei welchen Einreibungen von erwärmtem Oele, das Auflegen von Fettläppchen, Pflaster etc. gute Dienste thun, und bei Magen- und Darmkrämpfen, bei welchen Oelmixturen oft sehr nützlich sind; sie wirken aber auch auf entfernte Theile, so z. B. mässigen zuckerhaltige Stoffe den Husten, Oelmixturen den Blasenkrampf etc. Besänftigend wirken ferner feuchte und trokene Wärme, welche vermittelst Umschlägen, warmer Wasser-, Dampf- oder Luftbäder, Kräutersäckchen, erwärmten Tüchern, heissgemachten irdenen Deckeln, Wärmflaschen etc. angewandt werden. — Vorzüglich mässigen die Narcotica die erhöhte Sensibilität und unter ihnen am zuverlässigsten das Opium. Sie bringen diese Wirkung sowohl in dem Theil, auf den sie angebracht werden, hervor, als auch im ganzen Nervensystem; alle wirken mehr oder weniger die Gehirnthätigkeit unterdrückend, das Opium schlafmachend, mehrere zeigen noch ausserdem eine besondere Beziehung zu andern Theilen des Körpers, so wirken die Digitalis und die Blausäure auf das Herz, die Nux vomica auf das Rückenmark etc. — In manchen schmerzhaften und krampfhaften Krankheiten werden auch gewisse erregende Mittel, die zugleich eine schmerz- und krampfstillende Wirkung haben, mit Nutzen angewandt. Zu diesen Mitteln gehören die ver-

süssten Säuren (die Hoffmännischen Tropfen), die Naphthen, der Hirschhorngeist, die Chamillen, die Valeriana, das Chenopodium ambrosioides, Asa foetida, Castoreum, Moschus etc. Man sucht ihre Wirkung in einer gleichförmigen Vertheilung der Sensibilität durch allgemeinere Erregung der Lebensprozesse, doch scheint diese Erklärung nicht ganz zu genügen. — Mit Nutzen bedient man sich, um die erhöhte Sensibilität abzuleiten, der antagonistisch wirkenden Mittel, der Senfteige, Blasenpflaster, der Urtication und selbst der Moxen. Auf antagonistische Weise wirkt wohl auch die Erregung von Absonderungen, vorzüglich des Schweisses, welche oft vorzügliche Mittel sind, um Schmerzen und Krämpfe zu mässigen. — Zum Theil auf antagonistische Weise mögen gewisse in grössern Gaben Erbrechen erregende krampfstillende Mittel wirken, wie die Ipecacuanha, das Zincum oxydatum, Z. sulphuricum und Z. hydrocyanicum, Bismuthum nitricum, Kupfer-, Silber- und Goldpräparate etc, doch scheinen sie auch noch auf andere Weise besänftigend zu wirken, da sie auch bei Magenkrampf angewandt werden, wo sie aber immerhin unzuverlässige und leicht nachtheilig werdende Mittel sind. — In manchen Fällen ist auch eine psychische besänftigende Behandlungsweise von nicht unbedeutendem Einfluss und zwar sowohl unmittelbare Beruhigung des Gemüthes durch Tröstung etc., als auch Ableitung der Aufmerksamkeit auf andere Gegenstände, wodurch z. B. Krämpfe verhütet werden können. — Geht die Nervenkrankheit von einem einzelnen Nerven aus, so kann nach Umständen die Zusammendrückung und selbst die Durchschneidung des Nervens unternommen werden. — Endlich muss auch der thierische Magnetismus erwähnt werden, der, um zu besänftigen, vermittelst der einfachen Striche, des Handauflegens, des Fächelns etc., in Anwendung gebracht werden soll.

§. 1782.

Qualitative Abweichungen in der Nerventhätigkeit, z. B. Gefühlstäuschungen, sind meistens auch mit Veränderungen im Grade der Thätigkeit verbunden und können sehr häufig durch die besänftigende Methode, zuweilen auch durch ein, die Nerventhätigkeit erhöhendes Verfahren beseitigt werden. Ausserdem kann man auf verschiedene Weise die Nerventhätigkeit der Art nach umstimmen, z. B. durch Gemüthseindrücke, durch Veränderung der Gewohnheiten und der ganzen Lebensweise, durch die Eckelkur, Brechmittel, Begiessungen mit kaltem Wasser und vielleicht auch durch manche der gegen verschiedene Nervenkrankheiten als specifisch gerühmten Mittel.

§. 1783.

Liegt das Wesen der Nerventhätigkeit in verminderter Lebensthätigkeit der Nerven, so sind, um die Emyfindung und Bewegung wieder herzustellen oder zu erhöhen, die erregenden Mittel angezeigt, wie Pflanzentheile mit ätherischem Oele, namentlich die Herba et Flores Melissae, Majoranae, Menthae, Lavendulae, Serpylli, Chamonillae, rad. Valerianae, Angelicae, Serpentariae, flor. Arnicae, rad. Senegae. Sem. Anisi, Foeniculi, Carvi, Baccae Juniperi, die Nelken, der Zimmt, die Muskatnüsse, Vanille, Ingwer, Pfeffer etc., die aus diesen Stoffen bereiteten ätherischen Oele, der Wein, der Weingeist, die versüssten Säuren, die Naphthen, Ammonium, Castoreum, Moschus, Phosphor u. a., welche Mittel innerlich und äusserlich in Anwendung gebracht werden können. Oft ist es gut, mit diesen Mitteln aromatisch-tonische zu verbinden oder von den flüchtig erregenden den Uebergang zu denselben zu machen.

§. 1784.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Nicht selten gesellen sich zu den Nervenzufällen Andrang des Blutes und selbst ein entzündlicher Zustand in dem ergriffenen

Organ hinzu. Sind diese Zufälle nicht von der Bedeutung, dass augenblickliche Gefahr daraus zu entstehen droht, so hat man in der Regel nicht nothwendig, viel gegen dieselben zu unternehmen, indem meistens der Nervenzufall bald vorübergeht und sodann diese Erscheinungen ebenfalls verschwinden; werden jedoch dieselben Gefahr drohend, so muss zur Ader gelassen werden, oder es müssen Blutegel gesetzt, kalte Umschläge gemacht werden etc. Bringen die Nervenzufälle krankhafte Absonderungen hervor, so muss der erzeugte Stoff ausgeleert werden, und das gereitzte Absonderungsorgan vor Zerstörung geschützt werden. Leidet in Folge der Nervenkrankheit die Ernährung, so muss das geeignete Verfahren, um die Reproductionsthätigkeit zu erhöhen, in Anwendung gebracht werden.

§. 1785.

Eintheilung der Nervenkrankheiten. Da die Verrichtungen des Nervensystems, deren Störungen die eigentlichen Nervenkrankheiten sind, wie andere Funktionen in dreierlei Weise vom normalen Zustand abweichen können, indem sie blos krankhaft vermehrt, oder der Art nach verändert, oder krankhaft vermindert sein können, so könnte man auch die Nervenkrankheiten nach diesen drei verschiedenartigen Störungen des gesunden Zustandes in drei Ordnungen theilen; da jedoch die qualitativen Fehler immer auch mit quantitativen Störungen im Nervenleben verbunden sind, so kann man wohl sämmtliche Nervenkrankheiten in zwei Ordnungen theilen. Erste Ordnung: Nervenkrankheiten mit krankhaft erhöhter Nerventhätigkeit. Diese Ordnung enthält drei Krankheitsfamilien. a) Die krankhaft erhöhten Empfindungen (Hyperaesthoses), zu welchen gehören: die erhöhte Empfindlichkeit der Augen, des Ohres, der Organe des Geruches und des Geschmackes, der Haut, die schmerzhaften Krankheiten, der erhöhte Geschlechtstrieb, die

Hypochondrie und die Hysterie. b) Die Krämpfe (Spasmi) und zwar die der Muskeln der willkürlichen Bewegung, insbesondere die Fallsucht, die Eclampsia, der Veitstanz, und der Starrkrampf, und die der Muskeln der unwillkürlichen Bewegung, der Lungenkrampf, der Keuchhusten, das Herzklopfen, das Erbrechen. c) Vom Nervensystem ausgehende krankhafte Erregung der geistigen Thätigkeit: die Schlaflosigkeit, das Nachtwandeln, der Säuferwahnsinn. Zweite Ordnung. Nervenkrankheiten mit verminderter Nerventhätigkeit. Hieher gehören die verminderte Empfindlichkeit der Sinnesorgane, die Ohnmacht, der Scheintodt, die Starrsucht, der Schlagfluss und die Lähmung.

Als Anhang zu den Nervenkrankheiten mögen endlich einige Krankheiten angeführt werden, welche meistens nicht einfache Krankheitsarten und auch nicht immer reine Nervenkrankheiten sind, bei denen aber doch gewisse Nervenzufälle die wichtigsten und wesentlichsten Erscheinungen sind. Es sind dieses die durch Vergiftungen entstandenen Krankheiten und einige ihnen ähnliche Krankheitszustände, zu welchen letztern die durch verdorbene Würste hervorgebrachten Krankheitszufälle, die Kriebelkrankheit, die Cholera, die durch das Milzbrandcontagium entstandene Krankheit und die Hundswuth gehören.

ERSTE ORDNUNG DER NERVENKRANKHEITEN.

Nervenkrankheiten mit Aeusserung erhöhter Nerventhätigkeit.

Erste Gruppe: krankhafte Empfindungen.*)

Die Schmerzkrankheiten.

(*Nevralgiae.*)

§. 1786.

Es haben alle Schmerzen in dem Nervensystem ihren Sitz und es könnte daher der Ausdruck Nevralgie (Nervenschmerz) als ein Pleonasmus verworfen werden; doch nennt man nicht alle Schmerzen Nevralgien, sondern nur diejenigen, in welchen der Schmerz nicht im Gewebe eines Organs, sondern in Nervenstämmen oder Aesten seinen Sitz hat; auch erscheint bei den Nevralgien der Schmerz nicht blos als ein untergeordnetes Symptom

*) Die Schilderung der krankhaften Empfindlichkeit der Sinnesorgane kann hier umgangen werden, da die Darstellung der Augen- und der Gehörkrankheiten von diesem Lehrbuche ausgeschlossen sind und erhöhte Empfindungen in den übrigen nicht leicht als selbstständige Krankheiten auftreten und das Nöthige über diese Erscheinungen in der allgemeinen Krankheitslehre, Symptomatologie, von mir vorgetragen werden wird.

einer andern Krankheit, sondern ist immer sehr heftig, oft zermalmend und die einzige oder Haupterscheinung des Uebelbefindens.

§. 1787.

Nach Verschiedenheit des Sitzes des Schmerzes in dem einen oder dem andern Theile des Nervensystems hat man verschiedene Arten der Nevralgien angenommen, im Gehirne (Cephalalgia), im Rückenmark (Rachialgia), in dem Augenhöhlenstirnzweige des dreiästigen Nervens (Nevralgia frontalis), in dem Infraorbitalnerven (Nevr. infraorbitalis), in dem Unterkiefernerven (Nevr. maxillaris), in den Nerven des Saamenstrangs und Hodens (Nevr. ilioscrotalis), im ischiadischen Nerven (Nevr. femoro-poplitaea), im Schenkelnerven (Nevr. femoro-praetibialis), in den Sohlennerven (Nevr. plantaris), in dem Ellenbogennerven (Nevr. cubitodigitalis) etc.*) — Ich werde einige der wichtigern der hier angeführten Nevralgien vollständiger darstellen, ausserdem aber eine zweite Gruppe anführen, die man gewöhnlich nicht zu den Nevralgien zählt, das sind die Schmerzkrankheiten verschiedener Eingeweide. Hieher reche ich vorzüglich die Brustbräune, den Magenkrampf, und die Kolik.

*) Vergleiche *Chaussier* (Table synoptique de la névralgie, Par. 1801).

Das Nervenkopfweh.

(*Cephalalgia.*)

Fr. Hoffmann (Diss. Halle 1731). — *Brendel* (Diss. Gött. 1747). — *Nicolai* (Diss. Halle 1763, Jena 1785, 86, 88). — *S. G. Vogel* (kleine Schriften, Berl. 1814).

§. 1788.

Das Nervenkopfweh ist ein meistens heftiger, anfallsweise sich einstellender Kopfschmerz, welcher gewöhnlich als das einzige Symptom einer Gehirnaffection sich darstellt, oder wenn noch ein anderes Gehirnleiden besteht, sich nicht als ein Symptom dieses Krankheitsprozesses, sondern als eine deuteropathische Affection ausspricht.

§. 1789.

Es stellt sich das ganz reine Nervenkopfweh von Zeit zu Zeit als ein Kopfschmerz ein, welcher meistens sehr heftig wird, so dass oft die Kranken laut wehklagen und mit beiden Händen den Kopf halten. Der Schmerz ist oft mehr über den ganzen Kopf verbreitet, oft nur auf einer Seite (das halbseitige Kopfweh, Hemicrania, Migraine), oft aber nur auf *eine* Stelle beschränkt (Clavus). Meistens ist der Schmerz mehr stechend und reissend, oft aber auch drückend (Carebaria). Oft hält er nur wenige Minuten, oft mehrere Stunden und zuweilen, jedoch mit bedeutenden Nachlässen, einen Tag und länger an. Oft ist das Gesicht dabei blass und mit kaltem Schweisse bedeckt, oft wird es aber auch roth und heiss; doch ist dieses nur eine vorübergehende Erscheinung, ganz von der Heftigkeit des Schmerzes abhängig, und es ist nicht der andauernd fortschreitende Krankheitszustand zu bemerken, wie in der Gehirnent-

zündung.*) — Ist das Nervenkopfweh eine deuteropatische Affection von einem andern Gehirnleiden, so bestehen die Zeichen dieses Leidens gewöhnlich andauernd fort, z. B. die Zeichen eines Druckes auf das Gehirn, es gesellen sich aber von Zeit zu Zeit heftige Kopfschmerzen hinzu.

Der einzelne Anfall und die ganze Krankheit hört oft auf, ohne dass Ausscheidungen eintreten, oft auch, nachdem Entleerungen aus irgend einem Organe, z. B. dem Darmkanal, eingetreten sind, wodurch oft die entferntere Ursache des Kopfschmerzes hinweggeräumt wird. Zum Tod führt der Nervenkopfschmerz, wenn er eine organische Veränderung im Gehirne hervorbringt, vielleicht auch in sehr schweren Fällen ohne diese durch Verzehrung der Kräfte.

§. 1790.

Ergebniss der Leichenöffnungen. In einem Falle, in welchem Anfälle von zermalmendem Kopfschmerz mehrere Jahre hindurch sich sehr häufig eingestellt hatten, fand ich im Gehirne durchaus keine Veränderung, dagegen in der Leber Scirrhus, in einem andern Falle eine Encephaloidengeschwulst zur Seite der Varol'schen Brücke; auch werden Exostosen, Erhärtung des Gehirnes, Erweichung desselben etc. angetroffen.

§. 1791.

Ursachen. Es kommt das Nervenkopfweh vorzüglich bei Personen vor, die an einem gereitzten Zustand des Nervensystems leiden, namentlich bei Hypochondristen und den hysterischen Personen. Gelegenheitsursachen können alle Einflüsse werden, die Gehirnentzündung veranlassen können (Vergleiche §. 521), ausserdem sind dieses aber verschiedene chronische Uebel, wie Exostosen,

*) Vergl. den §. 519, in welchem die Diagnose der verschiedenen Arten des Kopfschmerzes angegeben ist.

Geschwülste in der harten Hirnhaut, Caries in den Schädelknochen, der Bandwurm, Scirrhus der Leber etc.

§. 1792.

Vorhersage. Es ist das Nervenkopfweh schwer auf die Dauer zu heilen, doch wird es selten gefahrbringend.

§. 1793.

Behandlung. Sorgfältige Vermeidung der erregenden Einflüsse, der Geistesanstrengung, erhitzender Getränke etc. und Hinwegräumung des etwa im Körper liegenden Reitzes, z. B. der Würmer. Ist irgend Verdacht einer entzündlichen Affection im Gehirne vorhanden, so müssen Blutegel oder selbst eine Aderlässe und kalte Umschläge angewandt werden. Bei dem reinen Nervenkopfweh dient die besänftigende Methode, Einreibungen von Opiatsalbe, das Auflegen von erwärmten Tüchern, Bähungen mit warmen feuchten Umschlägen von Cicutaabkochung etc., oder aromatischen Umschlägen, Auftropfen von Aether oder Einreibungen von aromatischen Geistern mit Aether, warme Fussbäder, Senfteige, Blasenpflaster etc. und innerlich bei vollkommenem Mangel von Blutcongestion das Opium oder besser das Morphium aceticum.

Das Zahnweh.

(*Zahnschmerzen, Odontalgia.*)

Die Schriftsteller über die Krankheiten der Zähne.

§. 1794.

Das Zahnweh ist oft nur ein leichtes, dumpfes, schmerzhaftes Gefühl, oft sind es heftige, reissende,

stechende und klopfende Schmerzen. Oft beschränkt sich der Schmerz auf *einen* Zahn, oft dehnt er sich über alle Zähne einer Seite und oft auch über die Schläfen, die Ohren und selbst auf das Gehirn aus. Der Schmerz wird bei der geringsten Berührung der Zähne, welche dem Kranken wie verlängert erscheinen, und durch zu warme und kalte Stoffe, die in den Mund kommen, vermehrt. Das Zahnfleisch schwillt an, der Speichel fliesst stark, es bildet sich oft Stomacace, zuweilen ein kleiner Auswuchs (Epulis) und oft auch ein kleines Abscesschen (Parulis), das Gesicht wird roth und es entsteht oft eine bedeutende Geschwulst, wobei aber meistens das Zahnweh nachlässt. Bei grosser Heftigkeit des Uebels können sich selbst Fieberbewegungen und Zuckungen hinzugesellen. — Es hält das Zahnweh oft nur wenige Stunden an, zuweilen, jedoch mit Remissionen, mehrere Tage und eine längere Zeit. Zuweilen entsteht Beinfrass und eine Zahnfistel.

§. 1795.

Ursachen. Der Zahnschmerz ist meistens durch einen hohlen Zahn (Caries des Zahnes) veranlasst; zuweilen kommt er ohne das Vorhandensein von hohlen Zähnen vor und ist sodann meistens rheumatischer Natur. Zuweilen scheinen die Zahnnerven entzündet zu sein. Die gewöhnlichen Veranlassungen sind scharfe Stoffe, die in den Zahn gelangt sind, und besonders Verkältung, z. B. durch den feinen Luftzug am Fenster, das Umhergehen mit blossen Füssen und das Liegenlassen durchnässter Kleider auf dem Körper. Ausserdem sind auch zuweilen Erhitzung des Körpers, gastrische Reitze, die Schwangerschaft, die Gicht, die Scropheln, die Lustseuche, der Scorbut Ursache des erwähnten Leidens.

§. 1796.

Für die beste **Behandlung** halte ich folgende: Bei der ersten Spur des Zahnweh's vollständige Reini-

gung des Zahnes von fremden Stoffen, sorgfältige Vermeidung jeder Verkältung, starke Erwärmung der Füsse durch das Anlegen von wollenen Strümpfen, selbst im Sommer und des Nachts im Bette, auch durch Fussbäder mit etwas Senfmehl, leichte Transpiration im Bette; genügen diese Mittel nicht, bei leichtern Graden des Zahnschmerzes ein Senfteig auf den untern Theil der Wange oder den Nacken gelegt, etwas Opiumtinctur in den Zahn gebracht und in die Wange eingerieben und selbst einige Tropfen derselben innerlich gegeben; bei sehr heftigem Schmerz vier Blutegel an die Wange oder 1 bis 2 an das Zahnfleisch gesetzt; bei immer wiederkehrendem Zahnweh die Herausnahme des hohlen Zahnes. — Ausserdem werden in Anwendung gebracht: besänftigende Mundwasser, z. B. Milch, in welcher Feigen gekocht sind, die Coccinella septempunctata, Curculio antiodontalgicus etc. zwischen den Fingern zerrieben an die Zähne gebracht, das reine Creosot auf Baumwolle in den hohlen Zahn gebracht (in einzelnen Fällen sehr nützlich, öfter unwirksam und zuweilen den Schmerz vermehrend), Cajeputöl, Gewürznelkenöl, Zimmtöl, Vitriolnaphtha in den Zahn gebracht, Branntwein, kalt Wasser in dem Mund gehalten, Kaumittel, wie Meerrettig, Bertramwurzel etc., das Tabackrauchen, das Ausbrennen des Zahnes (in seltenen Fällen helfen diese Mittel, häufiger vermehren sie den Schmerz sehr). — Zur Verhütung neuer Anfälle von Schmerz wird das Plumbiren angewandt, welches oft vortreffliche Dienste leistet, oft aber auch ein andauerndes Zahnweh veranlasst, in welchem Falle die Ausfüllung des Zahnes wieder herausgenommen werden muss.

Der Gesichtsschmerz.

(*Der Fotergill'sche Gesichtsschmerz, Nevralgia facialis, Dolor faciei, Prosopalgia, Trismus dolorificus Sauvag.*)

Fothergill (in s. Schriften B. 3, und Samml. auserles. Abhandl. B. 3). — *Pujol* (a. d. Franz. v. Schreyer. Nürnb. u. Altd. 1788). — *Lentin* (in Blumenbach's med. Bibl. B. 2, u. in s. Beit. z. ausübend. Arzneiw. B. 1 u. 3). — *Forstmann* und *Leidenfrost* (lat. Duisb. 1790). — *G. Cp. Siebold* (lat. Würzburg 1796 — 97). — *Langenbeck* (lat. Goett. 1806). — *Murray* (New-York 1816). — *Heyfelder* (Diss. Bresl. 1820). — *Barth* (mit einer Vorrede v. Dzondi. Lpz. 1825). — *Masius* (Heckers literar. Annal. d. gesammt. Heilk. 1826).

§. 1797.

Der Gesichtsschmerz ist ein anfallsweise sich einstellender heftiger, oft zermalmender Schmerz nach dem Laufe eines der Aeste des fünften oder siebenten Nervenpaares im Gesichte.

§. 1798.

Meistens stellt sich der Schmerzanfall plötzlich ein, oft gehen ihm aber auch Angst in der Herzgrube, ein Gefühl von Kitzel an der leidenden Stelle und zuweilen ein Gefühl von Ameisenkriechen voraus. Der Schmerz beginnt am häufigsten an der Stelle, an welcher der Infraorbitalnerve aus dem foramen infraorbitale hervortritt, er ist heftig, zuckend, zermalmend, wie ein electrischer Strahl über verschiedene Nervenzweige sich verbreitend, oft gerathen zugleich die Muskeln des Gesichts in eine zitternde Bewegung und manchmal wird auch die Stelle, welche vom Schmerz ergriffen ist, roth, wie entzündet, das ganze Gesicht wird oft roth und die Carotiden klopfen oft stark; manchmal stellt sich auch ein Thränen- oder ein Speichelfluss und oft auch Abgang von Blähungen, meistens mit Erleichterung ein. Der Anfall geht oft sehr schnell, selbst in wenigen

Secunden, oft aber auch erst nach einer Viertelstunde und einer längern Zeit vorüber. Zuweilen entsteht eine wässerigte Geschwulst im Gesichte, die einige Zeit zurückbleibt.

§. 1799.

Die beschriebenen Anfälle kehren oft nach wenigen Minuten und in einem Tag öfters und auf diese Weise viele Tage nach einander, häufig aber auch nur nach mehrern Tagen oder nach einer Ruhe von mehrern Monaten zurück. Zuweilen tritt der Anfall in ganz bestimmten Perioden, denen des Wechselfiebers gleich, ein. — Gewöhnlich sind im Anfange die Anfälle seltener und werden später immer häufiger. — Die Krankheit im ganzen kann viele Jahre dauern. — Zur Gesundheit geht sie über, indem die Anfälle wieder seltener und weniger heftig werden, oft indem sich die Gicht in den Gelenken ausbildet, oder Hämorrhoiden oder gastrische Ausleerungen eintreten etc. Zum Tode führt die Krankheit durch Abzehrung des Körpers, in Folge der beständig sich wiederholenden heftigen Schmerzanfälle, wobei sich zuletzt zuweilen der Gesichtskrebs ausbildet.

§. 1800.

Anlage haben Personen von höherm Alter, insbesondere Weiber nach Verlust der monatlichen Reinigung. Als erregende Ursachen beschuldigt man das Krebsgift (Fothergill), das venerische Gift (Masius), einen gichtisch-rheumatischen Stoff (Leidenfrost), unterdrückte Krätze, Flechten, weissen Fluss, Verkältung, gastrische Reitze und bei dem vollkommen periodischen Gesichtsschmerz die Ursachen des Wechselfiebers.

§. 1801.

Vorhersage. Die Krankheit widersteht zuweilen allen Mitteln. Am leichtesten zu heilen ist der eine bestimmte Periode haltende Gesichtsschmerz. Tödtlich wird die Krankheit selten.

§. 1802.

Behandlung. Nach den Anzeigen aus den Ursachen sind bei gastrischen Reitzen Brech- oder Abführungsmittel, bei einem bestimmt periodischen Typus des Leidens das Chininum sulphuricum, bei syphilitischem Ursprung eine Mercurialkur, insbesondere der Gebrauch des Sublimats, bei Entstehung des Uebels aus Rheumatismus oder Gicht ein antirheumatisches und antiarthritisches Verfahren angezeigt. — Spricht sich eine mehr entzündliche Natur des Leidens aus, so sind Blutegel an die leidende Stelle zu setzen, so wie auch der von *Steinbuch* empfohlene Salpeter oder das Calomel in Anwendung gebracht werden kann; auch können die ebenfalls empfohlenen kalten Umschläge (die wohl aber auch schaden können) und das Auftröpfeln von Vitriolnaphthe, so wie die Einreibungen von grauer Quecksilbersalbe gebraucht werden. Im übrigen ist die besänftigende Methode angezeigt: lauwarme Bähungen mit einem Cicutaaufguss, Auflegen von Fettlappen, leichte Einreibungen von Oleum Hyoscyami oder Opiatsalbe in die Umgegend der schmerzhaften Stelle, lauwarme Bäder, Streifen von Blasenpflaster, nach dem Verlaufe des Nervens gelegt, Fontanelle, Haarseile, die Acupunktur, Moxen, in verzweifelten Fällen selbst die Durchschneidung des Nervens. Hiermit verbindet man den innerlichen Gebrauch besänftigender Mittel, insbesondere narkotischer Mittel, des Opiums, der Belladonna, der von *Lentin* empfohlenen Tinctura Stramonii etc. Ausserdem sind noch als specifisch empfohlen worden: das Ferrum carbonicum (von englischen Aerzten dreimal täglich zu 15 bis 30 Granen), das Kali muriaticum oxygenatum (zu Grana iij täglich dreimal), die Terra ponderosa salita (von *Autenrieth* empfohlen), und der Arsenik.

Das nervöse Hüftweh.

(*Nevralgia ischiadica, Ischias nervosa postica Cotunni.*)

Cotunni (lat. Neapel 1764, a. d. Lat. Leipz. 1792). — *Petrini* (aus dem Engl. v. Spohr. Lemgo 1787). — *Bailly* (Paris 1803). — *Martinet* (a. d. Franz. Leipz. 1824).

§. 1803.

Das nervöse Hüftweh ist ein Schmerz, welcher vorzüglich zwischen dem grossen Trochanter und dem Sitzbein sich befindet, sich aber auch bis zur Lumbalgegend und bis zur Kniekehle verbreitet und genau dem Laufe des ischiadischen Nervens folgt; zuweilen erstreckt derselbe sich auch noch über die Nerven des Unterschenkels und der Fusssohle. Zuweilen hat im Anfange die Krankheit mehr den entzündlichen Character und es sind Fieberbewegungen vorhanden, meistens aber besteht das Leiden nur in einem mehr oder weniger heftigen Schmerz, mit welchem eine schwere Beweglichkeit des Fusses und Hinken, oder wegen der Grösse des Schmerzes vollkommene Unbeweglichkeit des Fusses verbunden sind. Hiebei ist weder eine Verschiedenheit in der Stellung der grossen Trochanteren, noch eine Ungleichheit in der Länge beider Füsse, noch der charakteristische Schmerz im Knie vorhanden, wie in der Coxarthrocace. Bei längerer Dauer wird der Fuss mager und es stellt sich eine lähmungsartige Schwäche ein.

§. 1804.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Zuweilen findet man einen Erguss von seröser Flüssigkeit zwischen den Nervenscheiden und den Nerven selbst; oft auch kleine Pseudomembranen.

§. 1805.

Die vorzüglichsten Ursachen sind die des Rheumatismus und der Gicht, besonders Verkältung, ausserdem aber mechanische Einwirkungen durch Stoss, das Heben schwerer Lasten etc., schnell geheilte alte Geschwüre, unterdrückte Hämorrhoiden, ein Leiden in den Beckenknochen und in den den ischiadischen Nerven umgebenden Weichtheilen; auch soll die Krankheit zuweilen venerischen Ursprungs sein.

§. 1806.

Vorhersage. Das Uebel ist zuweilen hartnäckig und kehrt auch leicht wieder zurück; wohl nie ist es für sich tödtlich.

§. 1807.

Behandlung. Sorgfältige Abhaltung der schädlichen Einflüsse, wie in dem Rheumatismus. Im Anfange bei entzündlichem Character eine Aderlässe am Fusse oder Blutegel und kühlende Abführungsmittel oder Klystiere, so wie auch Salpeter. Sodann Einhüllen des leidenden Theiles in Flanell und Wachstaffent, warme Wasserbäder, Dampfbäder, das Bad in heisser Luft (besonders wirksam) und ein Blasenpflaster, welches nach *Cotunni* 6 Zoll lang und 4 Zoll breit sein und so gelegt werden soll, dass es den Kopf des Wadenbeines bedeckt und die beiden eingeschnittenen Enden nach der Kniekehle herauf und nach dem Schienbein herunter reichen. Das Blasenpflaster wird öfters an der nämlichen Stelle wiederholt. Zieht der Schmerz weiter am Fusse herunter, so wird auch hier ein Blasenpflaster gelegt. In sehr hartnäckigen Fällen selbst die Moxen oder das Glüheisen. — Innerlich die gegen den Rheumatismus gebräuchlichen Mittel, bei heftigem Schmerz vorzüglich das Opium.

Der Brust-Nervenschmerz.

(*Die Brustbräune, Nevralgia pectoris interna, Nevralgia cordis, nach Laennec, Aagina pectoris, nach Heberden, Sternalgia, nach Baumes, Arthritis diaphragmatica, nach Butter, Asthma dolorificum, nach Darwin, Asthma convulsivum, nach Elsner, Syncope anginosa, nach Parry, Stenocardia, nach Brera, Pnigophobia, nach Swediaur, Sternodynia syncopalis, nach Sluis.*)

Heberden (Med. Transact. Lond. 1772, vol. 2, Commentar de morb. histor.). — *Fothergill* (Werke. B. 2). — *Elsner* (Königsberg 1778). — *Butter* (Lond. 1798). — *Parry* (Bath. 1799, a. d. Engl. 1801). — *Wichmann* (Id. z Diagn.). — *Sluis* (lat. Groening 1802). — *Brera* (Verona 1810, und in Hufelands Journal 1818, nebst Bemerk. v. Harless). — *Leutin* (Beiträge z. ausübenden Arzneiw.). — *Desportes* (Par. 1811). — *Jurine* (a. d. Franz. v. Menke, mit einer Vorrede v. Kreysig, Hannover 1816). — *Zucchinelli* (Padov. 1814). — *Laennec* (de l'auscult. méd.) — Die Schriftsteller über Herzkrankheiten.

§. 1808.

Der **Brust-Nervenschmerz**, wie ich die Angina pectoris nennen möchte, ist ein heftiger, oft zermalmender Schmerz, welcher anfallsweise sich einstellt, in der Tiefe der Brust unter dem Brustbein beginnt, sich nach verschiedenen Richtungen in der Brust und von da oft über die Arme und andere Theile verbreitet und mit dem Gefühl grosser Beengung und häufig auch mit Unordnungen in dem Herzschlag verbunden ist.

§. 1809.

Die Krankheit beginnt mit einem Anfall der erwähnten Erscheinungen, der meistens zuerst beim Gehen gegen den Wind, beim Treppensteigen, Erhitzung des

Körpers durch geistige Getränke oder nach einer Gemüthsbewegung, aber auch ohne erkennbare Veranlassung sich einstellt. Der Schmerz ist oft so heftig, dass die Kranken laut aufschreien (in einem von mir beobachteten Fall klagte der Kranke, es sei ihm, als ob die Arme an den Ellbogen abgehauen würden). Wirkliche Hemmung im Athmen ist weniger vorhanden, als mehr das Gefühl der Beengung. Der Herzschlag ist oft wenig verändert, zuweilen zu stark, oft sehr schwach und unordentlich. In den heftigsten Anfällen wird der Kranke ohnmächtig, kalt und ein kalter Schweiss bedeckt die Stirne. — Der Anfall dauert meistens nur wenige Minuten, zuweilen aber auch mehrere Stunden und selbst Tage, und geht sodann unter allmähligem Nachlassen der Zufälle, wobei sich oft Auswurf einstellt und auch zuweilen viele Blähungen abgehen, vorüber.

§. 1810.

Nach dem Anfalle befindet sich der Kranke oft mehrere Wochen ziemlich wohl, wenn nicht ein anderes Leiden neben der Brustbräune besteht. — Es kehren die Anfälle in unbestimmten Zeiträumen zurück und verlieren sich zuweilen allmählig wieder. — Meistens aber werden die Anfälle immer häufiger und stärker, bis der Kranke in einem solchen Anfalle oder nachdem sich Brustwassersucht oder Zufälle von organischen Herzfehlern, oder ein schlafsüchtiger Zustand, Schlagfluss, Zuckungen und Lähmung hinzugesellt haben, stirbt.

§. 1811.

Bei den Leichenöffnungen hat man öfters Verknöcherungen der Kranzarterien und der Klappen des Herzens gefunden, oft aber auch nicht, sondern andere Herzfehler, namentlich Fettmassen, Abscesse und Hypertrophie des Herzens, oder gar keine Herzfehler, zuweilen Geschwülste in der Leber oder

der Milz und Verhärtung des Magens. In einem Falle fand ich, neben Wasserergiessung in der Brusthöhle und dem Herzbeutel, geröthete Stellen auf der äussern Fläche des Herzbeutels, durch welche der Nervus phrenicus sich zog, und eben solche Stellen im Gewebe, durch welche im Mediastinum posticum der Nervus vagus geht, so wie auch Röthungen auf der innern Haut des Bogens der Aorta und eine *Gehirnerweichung*, welche die eine Hemisphäre beinahe ganz einnahme.*) In einem andern Falle fand ich mehrere kugelförmige Bälge (Végetations globuleuses, nach *Laennec*) an der innern Fläche des Herzens. Bei beiden Leichenöffnungen wurden keine Verknöcherungen am Herzen gefunden.

§. 1812.

Ursachen und Wesen. Am häufigsten beobachtete man die Krankheit bei Männern im vorgerückten Alter, insbesondere bei gichtischen Individuen. — Die ältere und früher beinahe allgemein angenommene Meinung vom Wesen der Brustbräune ist die, dass dieselbe nur ein Symptom von Verknöcherungen am Herzen sei. *Harless* hält das Leiden für einen Krampf des Herzens und seiner Gefässmündungen, *Laennec* für eine Nevralgie des Herzens. Ich habe im Anhange zu meiner Fieberlehre zu beweisen gesucht, dass die Krankheit eine Nevralgie sei, deren Sitz ich übrigens nicht vorzugsweise in das Herz legte, sondern mehr in die grossen Nervengeflechte in der Brusthöhle, wesswegen ich die Krankheit Nevralgia pectoris interna nannte. — Ein solches Nervenleiden scheint mir nun hervorgebracht werden zu können, durch alles, was Nevralgie veranlassen kann, durch Gicht, Rheumatismus, mechanische Verletzung, z. B.

*) Die Brustbräune wechselte in diesem Falle mit einer zermalmenden Nevralgie des einen Fusses und endigte mit Schlagfluss.

durch Druck von benachbarten Geschwülsten, Desorganisationen in den Theilen, in welchen Nerven sich befinden, z. B. bei organischen Fehlern im Herzen, so wie auch durch Desorganisation in entfernten Theilen des Nervensystems, z. B. bei Erweichung des Gehirnes etc.

§. 1813.

Vorhersage. Die Krankheit ist schwer zu heilen und häufig tödtlich.

§. 1814.

Behandlung. Nebst der Entfernung der die Krankheit erzeugenden und auch der den Anfall veranlassenden Einflüsse (§. 1809) muss das Nervenleiden nach seinem Character behandelt werden. Oft möchten im Anfange Blutentziehungen nothwendig sein, häufiger eine antirheumatische und antiarthritische Behandlung; daher die von *Wichmann* empfohlene Tinctura Antimonii Thedenii; die von *Goodwin* gerühmte Brechweinsteinauflösung, auch das von *Schlesinger* empfohlene Extract. Lactucae virosae, so wie die ableitenden Mittel, Blasenpflaster, Fontanelle und wohl auch Moxen. Vielleicht zeigen sich auch die Bäder, insbesondere Dampfbäder und Bäder von heisser Luft wirksam; so wie auch vielleicht das Einathmen von mässig erwärmter Luft nützlich ist. — Während des Anfalls sind besänftigende Mittel, namentlich Opium, dienlich.

Das Magenweh.

(*Der Magenkrampf, Gastrodynia, Cardialgia, Cardiogmus.*)

Trnka de Krzowitz (Wien 1785). — *Lentin* (Beiträge zur ausübenden Arzneiwissenschaft). — *Barras* (2e ed. Par. 1827).

§. 1815.

Das Magenweh ist jedes schmerzhafte Gefühl im Magen. Magenkrampf wird dasselbe genannt, wenn der Schmerz anfallsweise sich einstellt und dem Kranken sich als kneipend und zusammenschnürend darstellt.

§. 1816.

Das Magenweh besteht oft in einem drückenden Gefühl in der Herzgrube, welches meistens andauernd ist und durch einen Druck mit der Hand oder Erschütterung des Körpers erregt wird, und bald durch den Genuss von Speisen vermehrt, bald aber auch durch denselben gemässigt oder aufgehoben wird und dagegen bei leerem Magen an Heftigkeit zunimmt. Oft ist dieses Gefühl auch nagend, oder es werden leichte Stiche in derselben Gegend wahrgenommen; manchmal ist es das Gefühl von Brennen, welches besonders bei *der* Form von Krankheit vorkommt, die man das Sodbrennen nennt. In manchen Fällen ist die Magengegend sehr empfindlich, so dass der leiseste Druck auf dieselbe nicht ertragen wird; ja es giebt Kranke, welche glauben, ihre eigene Haut drücke sie. Während nun der Kranke ein solches andauerndes Magenweh empfindet oder auch ohne dass ein solches vorhanden ist, stellen sich oft in regelmässigen oder in unbestimmten Zeiträumen Anfälle von sehr heftig klemmenden, zusammenschnürenden Schmerzen

ein, welche in der grössten Heftigkeit oft nur einige Minuten anhalten, sodann etwas nachlassen und wieder heftiger werden und auf diese Weise einen Anfall bilden, der eine Stunde und längere Zeit dauern kann, aber auch wiederum Abwechslungen in Hinsicht des Grades des Schmerzes zeigt und jeden Tag ein- und mehreremale, aber auch in viel längern Zwischenräumen zurückkehren kann. Hat der Schmerzanfall einen sehr hohen Grad erreicht, so verbreitet sich der Schmerz oft gegen den Rücken und nach beiden Seiten hin, die Kranken sind gezwungen, sich zusammen zu beugen, manchmal erbrechen sie sich, oft werden dabei die Wangen roth und heiss und der Puls gereitzt; öfter aber auch wird bei den höchsten Graden des Schmerzes das Gesicht blass, die Augen eingefallen, die Hände und Füsse werden kalt, ein kalter Angstschweiss bedeckt die Stirne, der Puls wird klein und aussetzend, der Urin ist blass, manchmal kommen selbst Krämpfe in äussern Theilen und Ohnmachten hinzu. Die Schmerzanfälle endigen sich oft unter Erbrechen verschiedener Stoffe, insbesondere eines sehr sauren Magensaftes, einer grasgrünen Galle etc., oder sie lassen auch ohne Erbrechen allmählig nach.

§. 1817.

Diese Schmerzanfälle können vorhanden sein, ohne dass ein anderes Leiden des Körpers dabei bemerkt wird und bei dem Kranken ausserhalb der Anfälle irgend ein Leiden wahrgenommen wird (der reine Magenkrampf). Manchmal sind die Zeichen gastrischer Stoffe vorhanden, die Zeichen von Galle, von Säure etc. Das letztere ist gewöhnlich der Fall, wenn das Magenweh als sog. Sodbrennen (Pyrosis, Soda) erscheint. Der Schmerz ist in diesem Falle brennend, der Kranke hat das Gefühl, wie wenn ein brennender Dunst den Hals heraufsteige, er hat dabei Aufstossen einer wasserhellen, sauren oder

ranzigen Materie und manchmal auch saures Erbrechen etc. [1])

In manchen Fällen besteht neben dem mehr andauernden Magenweh und dem zeitweise wiederkehrenden Magenkrampf eine grosse Muskelschwäche und Schwindel, in andern Fällen kommen selbst Krämpfe in den Gliedern hinzu und es nähert sich sodann der Zustand dem der Cholerine, so wie bei der Cholerine und der asiatischen Cholera der Magenkrampf eine Haupterscheinung ist.

Ist das Magenweh ein weniger hervorstehendes Symptom, dagegen mehr Schwindel, grosse Mattigkeit und ein fieberhafter Zustand vorhanden, so nähert sich die Krankheit dem Nervenfieber oder wird es selbst.

Ist der Magenschmerz sehr bedeutend und andauernd, so ist er in der Regel ein Symptom der Magenentzündung, besonders wenn dabei Fieber und die übrigen Zufälle der Gastritis vorhanden sind. Es können hiebei die Schmerzen sich anfallsweise noch sehr vermehren, in welchem Falle der Magenkrampf in Verbindung oder im Gefolge der Magenentzündung auftritt.

Ebenso sind oft anhaltendes Magenweh und Magenkrampf nur die Symptome oder deuteropatischen Affectionen von andern Krankheiten des Magens, namentlich des Magenkrebses.

§. 1818.

Der Uebergang des Magenwehes und des Magenkrampfes in Gesundheit geschieht gewöhnlich allmählig, oft ohne Ausscheidungen, oft mit solchen, namentlich Erbrechen, Durchfall, Schweiss, manchmal auch, nachdem Hämorrhoiden fliessend geworden sind, eine gichtische Entzündung in den Gelenken sich gebildet hat etc. Den Tod hat der Magenkrampf nicht leicht zur unmittelbaren

1) Vergl das Kapitel von saurem Magensaft.

Folge, doch führt *Heister*[1]) ein Beispiel an, nach welchem ein Anfall von Magenkrampf tödtlich wurde, nachdem sich allgemeine Convulsionen und Tetanus hinzugesellt hatten. Der tödtliche Ausgang wird in der Regel nur durch diejenige Krankheit bedingt, die den Magenkrampf in ihrem Gefolge hat, doch kann auch ein reiner, aber heftiger Magenkrampf eine Magenentzündung veranlassen.

§. 1819.

Ursachen. Manche Personen, vorzüglich cholerische, haben eine besondere Anlage zum Magenkrampf, so dass die geringste Ursache ihn erzeugt. Vor der Pubertät kommt aber der Magenkrampf selten vor.

Gelegenheitsursachen sind von aussen aufgenommene Stoffe, die Gifte, mit schädlichen Stoffen untermengte oder verdorbene Nahrungsmittel, schwer verdauliche Nahrungsstoffe, wie Buttergebackenes, Käse, geräuchertes Fleisch, Schnecken etc., der Genuss säuerlicher oder zur ranzigen Verderbniss geneigter Speisen und Getränke, welcher vorzüglich zum Sodbrennen Veranlassung giebt; in sehr seltenen Fällen Insectenlarven, welche sich im Magen aufhalten, so wie Ueberladung des Magens etc. Ferner sind es häufig im Körper erzeugte Stoffe, namentlich verdorbene Galle, stark saurer Magensaft oder Würmer, vielleicht auch der Blutreitz bei Stockungen im Pfortadersysteme und Fortpflanzung einer Reitzung vom Darmkanal auf den Magen bei Colik aus Verstopfung u. s. w., antagonistische Reitzung des Magens durch Unterdrückung der Hautausdünstung (der rheumatische Magenkrampf), durch unterdrückte Hämorrhoiden, Gicht etc. Vorzüglich häufig bewirken Gemüthsbewegungen, namentlich Aerger, Magenweh und Magenkrampf, manchmal auch die Hypochondrie,

1) In den medizin. chirurg. Wahrnehmungen. S. 614.

die Hysterie, so wie auch die Schwangerschaft. Endlich ist der Magenkrampf oft eine deuteropatische Affection von Krankheiten des Magens, namentlich von Magenentzündung und Magenkrebs.

§. 1820.

Wesen. Das Magenweh ist, wie schon angegeben wurde, ein Symptom sehr verschiedenartiger Krankheitszustände des Magens, der Magenkrampf aber ist seiner Haupterscheinung nach, nämlich des anfallsweise sich einstellenden heftigen Schmerzes, eine Nevralgie der Magennerven, womit in der Regel eine krampfhafte Zusammenziehung in dem Magen verbunden zu sein scheint. Nicht jede krampfhafte Zusammenziehung des Magens bringt die Erscheinungen der Cardialgia hervor, wie dieses die heftigsten und andauernden Anfälle von Erbrechen, die oft schmerzlos sind, beweisen, und es kann daher die Cardialgie mit mehr Recht zu den Nevralgien als zu den Krampfkrankheiten gerechnet werden.

§. 1821.

Vorhersage. Der Magenkrampf wird nicht leicht lebensgefährlich und die Kunst vermag in der Regel den Schmerzanfall zu mässigen und zu beseitigen, doch hält es oft schwer, die Rückkehr der Anfälle zu verhüten. In dieser Hinsicht hängt die Prognose von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit die Ursache der Cardialgie zu entfernen, ab.

§. 1822.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Vorerst muss aufs Genaueste untersucht werden, ob Stoffe vorhanden sind, welche den Schmerz verursacht haben oder ihn unterhalten, und da die Ausleerung derselben vermittelst eines Brechmittels den Schmerz zu erhöhen, ja selbst vielleicht Magenentzündung hervorzubringen vermag, auf der andern Seite aber die Ausleerung derselben oft die Bedingung der Heilung

ist, mit der sorgfältigsten Erwägung aller Verhältnisse die Frage entschieden werden, ob Stoffe ausgeleert werden müssen oder nicht. Ausgeleert müssen die Stoffe immer werden, wenn sie sehr scharfer und giftiger Natur sind, daher insbesondere die in den Körper aufgenommenen eigentlichen Gifte, wenn man nicht etwa ein sicheres Mittel besitzt, sie im Körper selbst gänzlich unschädlich zu machen. In diesem Falle giebt die Cardialgia, selbst wenn sie einen hohen Grad erreicht hat, keine Gegenanzeige zum Brechmittel, nur wende man dasselbe mit den Vorsichtsmassregeln an, die bei der Behandlung der Magenentzündung über die Anwendung der Brechmittel angegeben worden sind. Man gebe insbesondere das Brechmittel, wo möglich nur, wenn der Schmerzanfall gerade nachlässt, und lasse seiner Anwendung den innerlichen und äusserlichen Gebrauch der einhüllenden und besänftigenden Mittel, unter letztern selbst den des Opiums, vorangehen. Gehören die Stoffe nicht gerade zu den giftigen Substanzen, zeigen sie aber doch offenbar eine nachtheilige Wirkung, so halte ich es für das Beste, sich in der Regel nach der Heftigkeit der Zufälle zu richten. Ist der Magenkrampf sehr heftig und die Empfindlichkeit der Magengegend sehr gross, so wird es in der Regel zuträglicher sein, vorerst kein Brechmittel zu geben, die vorhandenen Stoffe aber auf andere Weise unschädlich zu machen zu suchen und sogleich die gegen die Cardialgia unmittelbar gerichteten Mittel in Anwendung zu bringen; ist der Magenkrampf dagegen nicht heftig, und sind offenbare Zeichen nachtheiliger Stoffe vorhanden, so wende man unter Befolgung der angegebenen Vorsichtsmassregeln sogleich ein Brechmittel an. Endlich wende ich auch in dem Falle ein Brechmittel an, wenn auf die besänftigenden Mittel keine dauernde Besserung eintritt, sondern das Magenweh immer wieder von neuem zurückkehrt, der Magen

aber doch nicht so sehr empfindlich ist, dass von einem Brechmittel grosse Nachtheile zu befürchten wären und die Krankheit auch nicht Erscheinungen darbietet, die auf eine wirkliche Entzündung des Magens oder auf eine Desorganisation in demselben schliessen lassen. Das Brechmittel leert sodann doch in manchen Fällen einen im Verborgenen vorhandenen schädlichen Stoff aus und vermag auch vielleicht durch Erschütterung des Nervensystems und die mit dem Erbrechen verbundene Secretion eine Ausgleichung der Sensibilität zu bewirken.

Hält man die Anwendung des Brechmittels für zu gewagt, so suche man die vorhandenen Stoffe durch einhüllende Mittel oder solche, die sie neutralisiren, oder überhaupt ihre Wirkung vermindern, unschädlich zu machen. Man lasse daher schleimige Getränke, nach Umständen auch fette Dinge, bei genommenen Giften die Gegengifte,[1]) bei Säure die Magnesia und andere Säure tilgenden Mittel und bei Galle die Pflanzensäuren, z. B. den River'schen Trank mit Ueberschuss von Citronensaft, oder diesen allein nehmen. Bei Flatulenz wende man ätherisch-öligte Mittel an, gebe etwas Castoreum und ähnliche Mittel, Würmer suche man durch Milchklystiere in den untern Theil des Darmkanals zu ziehen oder durch Darreichung von Nahrung, z. B. Mehlbrei, zu beruhigen etc.

Wenn auch keine Stoffe im Magen die Ursache des Magenwehes sind, so geben doch leicht in denselben hineingebrachte Stoffe Veranlassung zu Erhöhung oder Erregung der Schmerzen und es ist daher bei der Anordnung der Diät, genau zu untersuchen, ob die Nahrungsmittel gut vertragen werden oder nicht.

Ausser den Stoffen im Magen sind auch die übrigen Ursachen der Cardialgie zu berücksichtigen, und es sind

1) Vergl. das über die Behandlung der Vergiftungen Gesagte.

desshalb bald wegen unterdrücktem Hämorrhoidalfluss Blutegel an den After zu setzen und wegen Stockungen im Pfortadersystem die auflösende Methode anzuwenden, bald wegen Rheumatismus oder Gicht die auf die Haut wirkenden Mittel in Gebrauch zu ziehen, vorzüglich aber ist diejenige Krankheit des Magens selbst zu beseitigen, von welcher der Magenkrampf eine deuteropathische Affection ist. Hier ist die Frage über das Vorhandensein einer Entzündung die wichtigste und es muss daher stets bei Behandlung des Magenkrampfes auf's Genaueste geprüft werden, ob keine Entzündung vorhanden ist. Lässt die andauernde grosse Empfindlichkeit des Magens, die Beschaffenheit des Pulses etc. auf eine solche schliessen, so setzt man Blutegel auf die Herzgrube, und macht Umschläge von einer Cicutaabkochung und wendet zugleich oder nach eingetretener Wirkung der antiphlogistischen Methode, die gegen den Magenkrampf wirksamen Mittel an, von welchen aber diejenigen nicht in Gebrauch gezogen werden dürfen, welche bei dem entzündlichen Zustande nicht passen, wie z. B. das Magisterium Bismuthi, die ätherischen Mittel etc.

§. 1823.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Da das Wesen der Cardialgie Nevralgie mit Krampf ist und die Behandlung des mit derselben manchmal verbundenen entzündlichen Zustandes des Magens als protopathische Affection bei der Angabe der ersten Kuranzeige dargestellt wurde, so kann hier nur von der Behandlung des reinen Nervenleidens die Rede sein. Das vorzüglichste von allen Mitteln ist das Opium, von welchem in geeigneten Zwischenräumen die Tinctur zu 6 — 15 Tropfen angewandt werden kann; an dasselbe schliessen sich die übrigen Narcotica, namentlich die Blausäure haltigen Mittel und das Extractum Hyoscyami, an, deren Wirkung

aber sehr unzuverlässig ist. Ferner wirkt vorzüglich gut eine Reihe von flüchtig erregenden Mitteln, wie die Chamillen, Baldrian, Melissen, Pfeffermünze, welche vorzüglich wohlthätig in Theeform wirken, von denen aber auch das ätherische Oel, so wie das Oleum Cajeput in Oelzucker gegeben werden können. Ferner die Hoffmännischen Tropfen, so wie die andern versüssten Säuren und die Naphthen, unter welchen die Essignaphtha vorzüglich empfohlen werden kann, und auch andere erregende und zugleich krampfstillende Mittel, wie das Castoreum, der Hirschhorngeist und die Asa foetida. An diese Mittel schliessen sich die Gewürze an, wie z. B. der Ingwer und an sie die erregend-tonischen Mittel, der rothe Wein, die Tinctur und Extracte von Pomeranzen, Columbo, Quassia etc. Ich glaube, dass die zuletzt genannten Mittel, welche übrigens mehr geeignet sind, die Anfälle von Magenkrampf zu verhüten, als einen heftigen Anfall zu mässigen und oft auch nicht ertragen werden, so wie zum Theil auch die flüchtig erregenden Mittel dadurch wirken, dass sie die im Uebermass in den Nerven des Magens angesammelte Nervenkraft durch Beförderung der Bereitung eines guten Magensaftes und Erregung einer kräftigen Verdauung verzehren. Vorzüglich gerühmt wurde von Einigen das von *Odier* zuerst empfohlene Magisterium Bismuthi zu $^1/_4$, $^1/_2$ bis 1 Gran. alle 1 bis 2 Stunden, welches besonders bei langwierigem, rein nervösem Magenschmerz anwendbar ist. Ebenso möchten auch die Zinkblumen, so wie das Zincum sulphuricum und hydrocyanicum, und auch das von *Berends*[1]) empfohlene krystallinische, salpetersaure Silberoxydulat zweimal täglich zu $^1/_{12}$ Gran sich in geeigneten Fällen nützlich erweisen. Endlich verdienen die Mineral-

1) Pract. Arzneiw. B. 8. S. 536.

säuren und die von *Löffler*[1]) empfohlenen Eispillen, so wie ganz kaltes Getränk erwähnt zu werden, welche vielleicht zurücktreibend auf die in dem leidenden Theil concentrirte Nerventhätigkeit wirken.

§. 1824.

Ausser den Arzneimitteln muss ich noch eines andern, vorzüglich besänftigenden Mittels, Erwähnung thun; es sind dieses die Nahrungsmittel. Es werden, wie oben schon angegeben wurde, die Speisen sehr häufig in dem Magenweh nicht vertragen; es giebt aber auch, wie ich schon öfters beobachtet habe, Fälle, in welchen der Magenschmerz um die Zeit eintritt, wenn der Magen nicht in dem Geschäfte der Verdauung begriffen ist, z. B. einige Stunden nach dem Frühstücke. Hier dient der Genuss von etwas Nahrung unmittelbar vor der Zeit, in welcher sich gewöhnlich der Magenschmerz einstellt. Auch bei der Wirkung dieser Mittel scheint der Magenschmerz dadurch aufgehoben zu werden, dass die übermässig angehäufte Nervenkraft auf die der Verdauung unterworfenen Stoffe sich entlade.

§. 1825.

Die Wirkung der angegebenen Mittel wird durch die äusserliche Anwendung besänftigender Mittel unterstützt und oft sind selbst diese zur Kur hinreichend. Dahin gehören das Auflegen eines erwärmten und in Tücher eingeschlagenen irdenen Deckels, eines erwärmten Flanelles, Umschläge von einer Abkochung der Chamillen oder der Cicuta, der aromatischen Species mit Wein, Einreibungen von Opiatsalbe oder von aromatischen und geistigen Dingen, z. B. der aromatischen Spiritus mit Ammonium und das Auflegen von aromatischen und Opiatpflastern. Auch dienen erweichende und besänftigende Klystiere von Chamillenaufguss und Milch etc.

1) *Hufelands* Journ. 1810 Jul.

Endlich verdienen die antagonistisch wirkenden Mittel Erwähnung und Empfehlung, vorzüglich die schweisstreibenden Mittel und die Hautreitze, namentlich Senfteige oder ein camphorirtes Blasenpflaster auf die Herzgrube gelegt.

§. 1826.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Das Erbrechen ist zu behandeln, wie das Erbrechen aus erhöhter Sensibilität[1]) und wird in der Regel durch dieselben Mittel gestillt, die auch den Schmerz mässigen. — Bei Kälte der Glieder lässt man erwärmte Tücher umschlagen, die Füsse auf Wärmflaschen stellen etc.

§. 1827.

Die Diät muss auf's sorgfältigste geordnet werden. Oft darf nur die nothdürftigste und die leichteste Nahrung gereicht werden, oft ist es besser, in kürzeren Zwischenräumen Speisen zu geben. Eine gute Fleischkost mit etwas gutem Wein ist meistens zuträglicher als Milch- und Mehlspeisen. Schwer verdauliche Dinge müssen vermieden werden, doch giebt es auch Fälle, in welchen auch derbere Speisen, wie z. B. selbst Schnecken, Pöckelfleisch und Erbsen mehr zu sagen als zartere.[2])

1) Vergl. die Behandlung des Erbrechens. — 2) Vergl. hierüber *Berends.* B. VIII. pag. 336.

Das Bauchweh.

(*Darmschmerz, Grimmen, Kolik, Colica, Dolor colicus, Enteralgia.*)

Purcell (Lond. 1714, übers. m. Anmerk. v. Gessner, Nördlingen 1775). — *Barthez* (Montpellier 1816).

§. 1828.

Die Kolik sind Schmerzen in dem Unterleibe, welche anfallsweise sich einstellen, einen zusammenziehenden und schneidenden eigenthümlichen Schmerz (Grimmen) darstellen und vorzüglich in der Umgegend des Nabels ihren Sitz haben.

§. 1829.

Zuweilen gehen Aufblähung des Leibes, Verstopfung, Neigung zum Erbrechen etc. dem Schmerzanfall voraus, oft auch stellt sich der Schmerz ohne vorhergegangene Zeichen von gastrischen Störungen ein. Der Schmerz ist oft gering, oft aber sehr heftig, so dass die Kranken sich zusammenkrümmen, laut wehklagen, oft heiss und roth im Gesichte werden, und der Puls gereitzt erscheint, oder selbst so heftig, dass die Kranken blass und kalt im Antlitz werden, ein kalter Schweiss die Stirne bedeckt, die Gliedmassen kalt werden und sich selbst krampfhafte Zufälle in den Gliedern einstellen. Der Unterleib ist dabei gespannt, oft aufgebläht und zeigt oft während des Anfalls einzelne hervorgetriebene Stellen von aufgetriebenen Gedärmen, zuweilen ist er aber auch einwärtsgebogen. Leicht gesellt sich zu den heftigern Kolikanfällen Erbrechen hinzu. Meistens ist Verstopfung vorhanden, oft auch Durchfälle. Der einzelne Schmerz geht oft in einigen Secunden und meistens in wenigen

Minuten vorüber, kehrt aber oft so schnell wieder zurück, dass diese wiederholten Schmerzen doch nur als *ein* Kolikanfall zu betrachten sind. Der Anfall hört auf, indem die Schmerzen sich allmählig verlieren, was oft unter dem Eintritt von Blähungen und Stuhlentleerungen geschieht. — Es kehren solche Anfälle oft nie mehr, oft in ganz unbestimmten Perioden, je nachdem die Veranlassung derselben früher oder später sich wieder einstellt, seltener in ganz bestimmten Zeiträumen zurück. Zum Tode führt die Krankheit durch Erschöpfung der Kräfte, durch die heftigen Schmerzanfälle, das wiederholte Erbrechen, das oft zum Kothbrechen (Ileus, Passio iliaca) wird und indem sie Darmentzündung und Brand zur Folge hat.

§. 1830.

Nach Verschiedenheit der Ursachen nimmt man verschiedene Arten der Kolik an. Die blos aus erhöhter Sensibilität entsprungene (die nervöse Kolik, Colica nervosa, auch Colica hysterica), wobei keine weitere äussere Veranlassung statt findet, als der gewöhnliche Reitz der in den Gedärmen enthaltenen Stoffe, und welche bei Individuen, die eine besondere Anlage zur Kolik haben, so wie auch bei solchen vorkommt, die überhaupt an einer erhöhten Empfindlichkeit der Nerven leiden, wie die Hypochondristen und die hysterischen Personen, — die von einem entzündlichen Zustand der Gedärme verursachte Kolik (Colica inflammatoria), — die von Hämorrhoiden und nicht zu Stande kommender Menstruation abhängende Kolik, wobei die Gefässe der Gedärme mit Blut überfüllt sind und oft auch ein entzündlicher Zustand vorhanden ist (die Blutkolik, colica sanguinea, colica haemorrhoidalis), — die von Verkältung abhängende Kolik, wobei häufig sonst noch rheumatische Zufälle sich zeigen (C. rheumatica), — die von Anhäufung von Koth, Würmern etc. veranlasste Kolik

(C. a sordibus), wobei oft hartnäckige Verstopfung vorhanden ist, und wobei oft noch besondere, aus der Beschaffenheit der angesammelten Stoffe hervorgehende Erscheinungen sich zeigen, grosse Aufblähung des Leibes (Windkolik, C. flatulenta), gallichte Erscheinungen (Gallenkolik, C. biliosa), Wurmzufälle (Wurmkolik, C. verminosa) etc., — die durch Bleivergiftung entstandene Kolik (die Bleikolik, C. saturnina),*) — endlich die von organischen Fehlern abhängende Kolik; es ist dieselbe oft bedingt durch einen Scirrhus in den Gedärmen, grosse Verschwärungen, Umschlingung der Gedärme durch das Netz, Ineinanderschiebung derselben (Volvulus), einen eingeklemmten Bruch (eine vorzüglich wichtige Ursache der Kolik) etc. Der eine ganz bestimmte Periode haltenden Kolik kann sowohl ein um eine bestimmte Zeit immer von neuem eintretende Gelegenheitsursache der Kolik, z. B. die um eine bestimmte Zeit nach dem Essen an eine krankhafte Stelle des Darmkanals gelangenden Fäces, als auch der Krankheitszustand, der das Wechselfieber bedingt, zum Grunde liegen.

§. 1831.

Vorhersage. Es hängt der Erfolg der Behandlung vorzüglich von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, die Ursachen der Kolik zu heben, ab. Tödtlich ist daher häufig die Krankheit bei der aus einem Volvulus, Umschlingung der Gedärme etc. entstandenen Kolik, leicht zu heilen aber, z. B. wenn sie durch Verkältung veranlasst ist.

§. 1832.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Oft sind Abführungsmittel nothwendig, zu-

*) Die Bleikolik, welche eigenthümliche Erscheinungen darbietet, wird in dem Kapitel von der Bleivergiftung beschrieben werden.

weilen Wurmmittel, meistens thun einhüllende Mittel, z. B. Oelmixturen, gute Dienste, oft auch Mittel gegen die Blähungen, z. B. ein aromatischer Thee. Bei der Blutkolik dienen Blutegel an den Damm gesetzt. Ist es nicht möglich, die Ursache der Kolik schnell zu entfernen und sind die Schmerzen sehr heftig, so müssen jedenfalls mit den gegen die Ursachen gerichteten Mitteln solche, die den Schmerz mildern, verbunden werden; so z. B. müssen bei der Kolik von Kothansammlungen, neben den Abführungsmitteln, die äussern besänftigenden Mittel und nicht verstopfenden innerlichen besänftigenden Mittel, bei sehr heftigen Schmerzanfällen aber auch Opium gegeben werden.

§. 1833.

b) Der *Anzeige aus dem Wesen* der Krankheit entspricht die besänftigende Methode. Oft genügt schon die Anwendung äusserlicher besänftigender Mittel, Einhüllen des Unterleibes in Flanell, Auflegen von erwärmten irdenen Deckeln, feuchte, warme Umschläge, Bäder etc. und leichte, innerliche, besänftigende Mittel, wie Oelmixturen, ein warmer Thee von Chamillen, Melissen u. s. w., in den stärkern Graden des Uebels ist aber in der Regel das Opium nothwendig, welches das zuverlässigste Mittel ist.

Der übermässige Geschlechtstrieb.

(Bei Männern Satyriasis, bei weiblichen Individuen Mutterwuth, Manntollheit, Nymphomania, Hysteromania, Furor uterinus.)

de Bienville (aus d. Franz. 1772). — *Robion* (Paris 1808). — *Herpian* (Par. 1812). — *Rothamel* (Heidelb. klin. Annal. 6r Bd.). — Die Schriftsteller über die Weiberkrankheiten.

§. 1834.

Zuweilen ist der Geschlechtstrieb so sehr erhöht, dass der Körper dadurch erkrankt und selbst Verstandesverwirrung eintritt. Durch die andauernde Begierde zur Geschlechtsbefriedigung ist das Nervensystem in einer beständigen Erregung, der Kranke ist schlaflos, der Puls beschleunigt, die Verdauung leidet, der Körper magert ab, bei den Männern finden ununterbrochene Erectionen statt, bei den Weibern sind die Geschlechtstheile angeschwollen und heftiges Jucken vorhanden. Die Kranken vermögen nicht mehr ihre Begierden zu verbergen, sie führen schamlose Reden, entblösen sich, fordern selbst zum Geschlechtsgenusse auf und greifen selbst Individuen von andern Geschlechtern an, oft verfallen sie in allgemeine Verwirrtheit und Raserei. Zuweilen lassen diese Zufälle nach vollzogenem Beischlafe nicht nach.

§. 1835.

Ursachen. Das erwähnte Uebel kommt am meisten bei Personen mit erethischer Constitution vor; es wird veranlasst durch Ausschweifungen der Phantasie, welche durch häufiges Romanlesen, schlüpferige Gespräche, häufigen Umgang mit Individuen des andern Geschlechts etc. unterhalten werden, dabei strenge Enthaltsamkeit, be-

sonders in den schon etwas vorgerückten Jahren und auch nach vorhergegangener, zur Gewohnheit gewordener häufiger Ausübung des Beischlafes, aus welchen Ursachen die Krankheit vorzüglich bei schon etwas ältern Mädchen und bei jungen Wittwen vorkommt; ferner Reitzungen der Geschlechtstheile durch unkeusche Betastungen, den Hämorrhoidalreitz, Askariden, die in die Scheide gelangt sind, Flechten, welche die Geschlechtstheile befallen haben etc.

§. 1836.

Behandlung. Es sind zur Vermeidung der Geschlechtserregung die nämlichen Mittel in Anwendung zu bringen, die in dem Kapitel von der Behandlung des Saamenflusses angegeben worden sind. Befinden sich die Geschlechtstheile in einem entzündlichen Zustand, so müssen Blutegel in die Nähe gesetzt oder eine Aderlässe vorgenommen, kalte Umschläge auf dieselben gemacht, der Kranke auf einer magern Diät gehalten und Antiphlogistica in Anwendung gebracht werden. Als specifisches Mittel, um den Geschlechtstrieb zu vermindern, wird der Kampfer empfohlen, der schicklich in Verbindung mit dem Salpeter gegeben wird.

Die Hypochondrie.

(*Milzsucht*, *Hypochondriasis*, *Malum hypochondriacum*, *Affectio hypochondriaca.*)

Fr. Hoffmann (Diss. Halle 1719). — *Kämpf* (neue Methode, die hartnäckigsten Krankheiten des Unterleibes, insbesondere die Hypochondrie, zu heilen, 2te Aufl. Lpz. 1786) — *Whytt* (a. d. Engl. nach der 2ten Aufl. Leipz. 1794). — *Stoll* (Diss. ed. Eyerel. Wien 1793). — *Storr* (Stuttg. 1805). — *Zimmermann* (Bamb. 1816). — *Reid* (Lond. 1816, a. d. Engl. v. Haindorf, Essen u. Duisb. 1819). — *Louyer-Villermay* (vol. 2 Paris 1816). — *Falret* (Paris 1822, a. d. Franz. v. Wendt. Leipz. 1822). — *Georget* (Paris 1824). — *Schnaubert* (Eisenb. 1827).

§. 1837.

Hypochondrie nennen wir den Zustand eines Individuums, in welchem dasselbe gewöhnlich die Eindrücke auf das Gemeingefühl sehr lebhaft empfindend, sich verkehrte Vorstellungen von dem Zustande des Körpers macht und dadurch in eine düstere Gemüthsstimmung versetzt ist.

§. 1838.

Die Beschwerden, über welche die Hypochondristen klagen — wer vermöchte von ihnen ein Verzeichniss zu geben und sie nur einigermassen so zu ordnen, dass sie ein zusammenhängendes Krankheitsbild darstellen? Fragen wir zunächst nach den Krankheitserscheinungen, welche der Krankheit eigenthümlich sind, so dass sie nicht fehlen dürfen, wenn nicht auch damit die bestimmte Krankheitsform verloren gehen soll, so finden wir gerade nur das Eigenthümliche, dass der Kranke über so Vieles klagt, dessen wirkliches Bestehen kaum angenommen werden kann und auf welches ein Anderer nicht Rücksicht nehmen oder wenigstens keinen so grossen Werth

legen würde. Es wird jede kleine Empfindung, die der Körper veranlasst, beschrieben und meistens vergrössert dargestellt, ausführliche Erzählungen über das Aussehen der Zunge, über den Appetit, mit welchem der Kranke jedesmal ass, über die Beschaffenheit der Stuhlentleerungen und des Urins, über den Schlaf etc. werden dem Arzte mündlich und schriftlich gegeben, über Beengung des Athmens wird geklagt, wenn auch die Luft ungehindert die ganze Lunge durchdringt, über Herzklopfen, wenn nur ein starkes Gehen das Vorhandensein der Herzbewegung bemerklich gemacht hat etc. Dabei bildet sich der Hypochondrist eigenthümliche Theorien über seinen Krankheitszustand, gebraucht andauernd Mittel und ist in einer düstern Gemüthsstimmung. — Die noch am meisten vorhandenen Störungen in den Verrichtungen der Organe, die von dem Arzte wirklich wahrgenommen werden, sind Unterleibsaffectionen, ein starker Beleg der Zunge, Aufblähung des Leibes, bald Verstopfung, bald Durchfälle, Hämorrhoiden etc. (die Hypochondrie mit Materie).

§. 1839.

Zuweilen verschwindet der hypochondrische Zustand nach Veränderung der äussern Verhältnisse, mit dem höhern Alter, nach dem Eintritt fliessender Hämorrhoiden etc. Die Hypochondrie schwächt die Lebenskräfte im allgemeinen und kann hierdurch zu Krankheiten in der Reproduction beitragen, zuweilen geht sie in wirkliche Seelenstörung (Melancholie und fixen Wahn) über.

§. 1840.

Anlage zur Hypochondrie haben vorzüglich Personen von melancholischem oder cholerischem Temperamente und solche, die sich sehr weich sind, auch häufiger Männer als Weiber. Gelegenheitsursachen sind eine sitzende Lebensart, grosse Geistesanstrengungen, Onanie, Uebermass im Genuss von Speisen und Getränken

gastrische Unreinigkeiten, Stockungen im Pfortadersysteme, Verhärtungen der Leber etc.

§. 1841.

Das **Wesen** der Hypochondrie sucht man gewöhnlich in Aufregung und Täuschung des Gemeingefühls; es sind übrigens nicht sowohl die krankhaften Gefühle selbst der Zustand, den man Hypochondrie nennt, als die Gemüthsstimmung, die sie bei dem Kranken veranlassen, indem dunkle und lebhafte krankhafte Gefühle im Unterleibe und in andern Theilen, deren Ursachen oft ebenfalls unbedeutend sind und oft nicht erkannt werden können, häufig vorkommen, ohne dass sie die Hypochondrie darstellen, wenn nämlich diese Zufälle bei muthvollen und lebensfrohen Personen sich einstellen. Diesemnach sehe ich die Hypochondrie mehr für einen bestimmten Zustand des Gemüthes an, der sich den Seelenstörungen, und zwar der Melancholie und zuweilen auch dem fixen Wahne nähert, aber noch innerhalb der Grenzen der Gesundheit liegt, wie es auch andere psychische Zustände giebt, die in gewissen Unvollkommenheiten bestehen, aber keine eigentliche Krankheiten sind, wie z. B. der Mangel an Muth.

§. 1842.

Behandlung. Der wichtigste Theil der Behandlung ist die psychische. Man tröste den Kranken, suche ihn zu erfreuen, leite seine Aufmerksamkeit und seine Thatkraft auf äussere Gegenstände, sein Gemüth auf etwas Höheres, und suche ihm auch auf geeignete Weise das Unmännliche seiner Gemüthsstimmung begreiflich zu machen. Hiebei suche man wirkliche Krankheitszustände zu beseitigen, insbesondere solche, die im Unterleibe ihren Sitz haben; man hebe die Leibesverstopfungen, suche die Verdauung zu verbessern, Stockungen im Pfortadersysteme zu heben, lasse den Kranken bei

erhöhter Sensibilität der Unterleibsnerven die Aqua Laurocerasi, die Asa foetida, Bäder und andere besänftigende Mittel gebrauchen etc.

Die Hysterie.

(*Mutterbeschwerde, Mutterkrankheit, Hysteria, Malum hystericum.*)

Whytt, *Zimmermann*, *Louyer Villermay*, *Georget* (in den bei der Hypochondrie angeführten Werken). — *Fr. Hoffmann* (Diss. Halle 1733). — *Manning* (aus d. Engl. v. Hanke. Wien 1790). — *Tate* (Lond. 1830).

§. 1843.

Hysterie nennen wir die bei dem weiblichen Geschlecht vorkommenden Nervenzufälle, welche in einer erhöhten Reitzbarkeit des Gemüthes, in krankhaften Gefühlen im Unterleibe und in Krampfanfällen, die im Unterleibe und im Halse sich zuerst zeigen und sodann die verschiedenartigsten Formen annehmen, bestehen, und meistens mit Störungen in den Geschlechtsverrichtungen in Verbindung stehen.

§. 1844.

Die hysterischen Personen haben, wenn sie nicht zugleich an Hypochondrie leiden, eine ganz andere Gemüthsstimmung, als die Hypochondristen. Es sind bei ihnen nicht die grosse Bekümmerniss um den Zustand ihres Körpers und das zu tausendfachen irrigen Vorstellungen führende Nachdenken über denselben zu bemerken, sondern Gemüthsregungen, die auf die Aussenverhältnisse sich beziehen. Die Hysterische fühlt sich unglücklich, weil sie, ohne Theilnahme zu finden, ver-

lassen in der Welt steht, viele Kränkungen erdulden musste etc., meistens wirkt hiebei der unbefriedigt gelassene Geschlechtstrieb mit, oder sie ist eine sehr empfindliche, zornmüthige Person, welche durch den häufigen Verdruss, dem sie hierdurch ausgesetzt ist, sehr angegriffen wird. Nur in seltenen Fällen entwickeln sich die hysterischen Zufälle, ohne dass einer von beiden Gemüthszuständen, die aber oft sorgfältig verborgen werden, besteht, und dieses möchte noch am meisten der Fall sein, wenn Störungen in den Geschlechtsverrichtungen vorhanden sind, z. B. die monatliche Reinigung in Unordnung ist, Desorganisationen in der Gebärmutter oder den Eierstöcken sich bilden etc. Es klagen die Hysterischen über mancherlei Beschwerden, die zum Theil wirklich vorhandene Krankheitszustände, zum Theil aber ungegründet sind, und zwar entspringen die zuletzt bezeichneten Angaben, wenn zugleich eine wahre Hypochondrie vorhanden ist, oft von falschen Vorstellungen vom Zustande des Körpers, sehr häufig sind sie aber absichtliche Uebertreibungen, wozu man bei vielen Hysterischen eine besondere Neigung bemerkt.

Die vorzüglichsten Erscheinungen sind mancherlei Nervenzufälle, die auf geringfügige Ursache auftreten. Ein unbedeutendes Ereigniss bringt heftigen Schrecken, Zittern der Glieder, heftiges Herzklopfen und selbst Ohnmacht hervor oder veranlasst einen den Körper erschütternden Verdruss, auch wechselt leicht die Gemüthsstimmung, so dass Lachen und Weinen leicht mit einander abwechseln. Die besonders characterischen Zeichen der Hysterie sind übrigens meistens auf Gemüthsbewegungen und oft auch von selbst sich einstellende Krämpfe, die, so mannigfaltig sie in ihrer Form sind, doch Eigenthümlichkeiten haben, durch welche sie ihren Ursprung sehr leicht verrathen. Die Kranken empfinden gewöhnlich zuerst eine Art von Bewegung

in der Gegend der Gebärmutter, oft sind damit Aufblähung und ein Gurren im Leibe verbunden, und zuweilen bewegt sich hierbei die vordere Bauchwandung sehr schnell abwechselnd ein- und auswärts. Hierauf stellt sich die Empfindung ein, wie wenn Etwas aus dem Unterleibe in den Hals heraufsteige und daselbst wie ein Brocken (Globulus hystericus) stecken bleibe, und es tritt nun ein krampfhaftes Würgen und eine eigenthümliche Auftreibung des Halses ein, wodurch das Athmen oft so sehr gehemmt wird, dass die Kranken von gehindertem Rückfluss des Blutes vom Kopfe ein aufgetriebenes und dunkelrothes Gesicht erhalten und oft in grosser Erstickungsgefahr zu schweben scheinen. Dieses Würgen und Auftreiben des Halses ist ein so beständiges und characteristisches Zeichen des hysterischen Krampfes, dass es auch meistens bei Ohnmachten und cataleptischen Anfällen der Hysterischen nicht ganz fehlt und dadurch die Natur dieser Krankheitszufälle kund giebt. Meistens befällt nun der Krampf auch die Gliedmassen, wodurch dieselben heftig verdreht werden und der Körper oft mit grosser Gewalt hin und her geworfen wird. Manchmal wird auch das Gehirn ergriffen, so dass das Bewusstsein unterdrückt wird und die Krämpfe den epileptischen sehr ähnlich werden, wie sie in andern Fällen mehr denen des Veitstanzes gleichen, zuweilen unter der Form des Tetanus auftreten und auch in cataleptische Anfälle sich umgestalten. Zuweilen zeigen sich bei diesen Krampfanfällen wilde Delirien. — Der Harn, der während der Zeit der Anfälle abgeht, ist meistens wasserhell. Ausser diesen Zufällen sind die Hysterischen noch mit mancherlei Leiden behaftet. Sie leiden oft an heftigen, aber stets den aussetzenden Typus haltenden Kopfschmerzen, welche zuweilen auf eine kleine Stelle beschränkt sind und das Gefühl darstellen sollen, wie wenn ein Nagel an dieser Stelle eingeschla-

gen wäre (Clavus hystericus). Manchmal ist dieser Kopfschmerz auch mit dem Gefühl, wie wenn ein Stück Eis aufgelegt wäre, verbunden. Oefters leiden die Kranken auch an Verdauungsbeschwerden, Magenkrämpfen, Aufblähung des Leibes, Unordnungen in der monatlichen Reinigung, weissem Flusse etc.

§. 1845.

Die Dauer der einzelnen Anfälle beträgt oft nur wenige Minuten, oft auch mehrere Stunden und selbst Tage, der ganze Krankheitszustand ist langwierig und oft beinahe habituell. Der einzelne Anfall geht durch allmähligen Nachlass der Zufälle vorüber oder hört auch plötzlich auf, ohne Krisen. Die ganze Krankheit verschwindet nach eingetretenen Aenderungen in den äussern Verhältnissen und gewissen Umänderungen im Körper, z. B. nach der Verehlichung und bei Frauen nach stattgefundener Schwangerschaft, in dem höhern Alter, nach Wiederherstellung der unterdrückten monatlichen Reinigung etc. Zum Tode soll zuweilen die Krankheit führen durch einen Schlagfluss und durch Erstickung in einem heftigen, hysterischen Anfall, eher kann der Tod aber durch allgemeine Schwäche und allmählige Abmagerung (Tabes nervosa) und durch starke tympanitische Auftreibung des Unterleibes, die zuletzt in Wassersucht übergeht, veranlasst werden.

§. 1846.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Zu den Veränderungen im Körper, die man in den Leichen hysterischer Personen und mit der Krankheit in einer ursächlichen Verbindung stehend annimmt, rechnet man Steatome, Hydatiden, Vereiterungen und andere Entartungen in den Eierstöcken und in der Gebärmutter.

§. 1847.

Anlage. Die Hysterie kommt beinahe nur bei weiblichen Individuen von der Zeit der Geschlechts-

reife bis zum Aufhören der Geschlechtsverrichtungen vor. Kinder haben die Krankheit durchaus nie und alte Frauen höchst selten. Ein sehr zarter Körperbau, Schwäche des Körpers, ein sehr reitzbares Nervensystem, frühe Geschlechtsreife und starker Geschlechtstrieb machen dazu besonders geneigt; auch soll die Krankheit erblich sein. — In seltenen Fällen kommt auch bei Männern ein der Hysterie ähnlicher Zustand vor. Ich hatte einen Jungling in der Behandlung, welcher Onanist war, und dessen Benehmen ganz weibisch war und dem einer empfindlichen, hysterischen Person glich. Derselbe bekam sehr häufig Krampfanfälle, die den hysterischen Krämpfen ganz ähnlich waren und insbesondere mit dem characteristischen Würgen im Halse und Auftreibung desselben verbunden waren.

§. 1848.

Gelegenheitsursachen sind zum Theil die Einflüsse, die die Ausbildung der oben bezeichneten Anlage begünstigen, daher alle schwächenden Einflüsse, wie eine sitzende Lebensart, schwächende Krankheiten, z. B. wiederholte Blutflüsse, weisser Fluss, Kummer, Sorgen, unglückliche Liebe etc., alle Einflüsse, welche die Sensibilität und insbesondere die Reitzbarkeit der Geschlechtstheile erhöhen, wie zu frühzeitige Ausbildung des Geistes, zu starke Erweckung der Thätigkeit der Phantasie und des Gefühls, z. B. durch vieles Romanenlesen, das Lesen schlüpfriger Darstellungen, häufiger gesellschaftlicher Umgang mit Männern, unsittliches Betasten der Geschlechtstheile und überhaupt Aufreitzungen des Geschlechtstriebes ohne Befriedigung, auch Unterdrückung des Monatsflusses, schleichende Entzündung und Entartungen in der Gebärmutter oder den Eierstöcken etc.

Die den hysterischen Anfall zur unmittelbaren Folge habenden Ursachen sind vorzüglich Gemüthsbewegungen, besonders häufig diejenigen, die durch einen Zank,

durch unglückliche Liebe, Eifersucht, den Widerwillen gegen einen mit Abneigung geheiratheten Mann hervorgebracht sind, auch scheint der Anblick von Individuen, die an einem Krampfanfall leiden, den Anfall bei dazu geneigten Personen erwecken zu können etc.

§. 1849.

Die nächste Ursache dieser Krankheit scheint in einem in dem Grade gereitzten Zustand der Nerven der Geschlechtstheile und zugleich der Nerven, in welchen die Gemüthsaffecte sich vorzüglich äussern, nämlich den Unterleibsganglien zu liegen, dass hierdurch abnorme Empfindungen und vorzüglich krampfhafte Zufälle entstehen, die zunächst sich in den unter den genannten Nerven stehenden Organen äussern, sodann aber über den ganzen Körper, insbesondere über die unter dem Einfluss der Rückenmarksnerven stehenden Theile sich verbreiten.

§. 1850.

Die Vorhersage kann in Beziehung auf die Erhaltung des Lebens günstig gestellt werden, indem an dieser Krankheit, so Gefahr drohend die Anfälle oft zu sein scheinen, wohl nur höchst selten jemand stirbt, so dass z. B. unter den Krankheitsfällen, die ich zu beobachten Gelegenheit hatte, kein einziger während des Anfalls tödtlich wurde. Stirbt das Individuum an Abzehrung, Wassersucht etc., so wirken wohl zur Entstehung dieser Zustände noch andere Ursachen mit. Der Erfolg der Behandlung ist übrigens in der Regel kein sehr glänzender, indem es ohne Umänderung der äussern Verhältnisse meistens nicht glückt, dem Nervensysteme die zu grosse Reitzbarkeit, die den hysterischen Anfällen zum Grunde liegt, zu nehmen.

§. 1851.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den*

Ursachen. Von der grössten Wichtigkeit ist die gehörige Berücksichtigung der Gemüthsstimmung der Kranken. Ist dieselbe von Kummer gebeugt, so sei der Arzt ein theilnehmender und tröstender Freund und suche das unglückliche Loos der Kranken möglichst zu verbessern. Man empfehle den Verwandten eine milde Behandlung der Kranken, suche die Kranke zu einer Reise, zu einem Aufenthalt in einem Bade zu bewegen, um ihr Gemüth aufzuheitern etc. Ist dagegen die Kranke eine launige, zu Zank und Intriguen geneigte Person, so muss der Arzt mit Festigkeit und so weit es in seiner Macht steht, selbst mit Strenge gegen sie verfahren, damit dieselbe ihren Launen, durch welche häufig neue Anfälle erregt werden, nicht ganz freien Lauf lasse. Da der Anfall oft halb willkührlich erregt wird, und jedenfalls ein kräftiges Ankämpfen des Willens gegen denselben dazu beiträgt, ihn seltener zu machen, so ist es oft sehr nützlich, auf den Willen der Patientin durch Erregung der Scham und der Furcht vor dem Anfall und auf andere Weise zu wirken. Ebenso wie auf das Gemüth der Kranken gewirkt werden muss, sucht man auch die Geschlechtsaufreitzungen möglichst zu verhüten, man untersagt die Romanenlecture, häufige Gesellschaft mit Männern, ist ein Verdacht vorhanden, dass Onanie statt finde, so lenkt man auf geeignete Weise die Aufmerksamkeit der Mutter der Kranken auf diesen Gegenstand, man wirkt darauf hin, dass die Kranke den ganzen Tag den Geist und die Körperkräfte in Anspruch nehmende Beschäftigung habe etc. Ist die monatliche Reinigung in Unordnung, so sucht man dieselbe wiederum herzustellen, leidet die Kranke an der Bleichsucht, an Blutflüssen, am weissen Flusse oder andern auf die Hysterie Einfluss habenden Krankheitszuständen, so sucht man sie bald zur Heilung zu bringen.

§. 1852.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die erhöhte Sensibilität zu beruhigen, wendet man sowohl während als ausserhalb des Anfalls einen Aufguss von Chamillen, Melissen, Pfeffermünze, Baldrian oder Raute, die Asa foetida, den Liquor Cornu Cervi succinatus, das Oleum animale Dippelii, die versüssten Säuren, das Castoreum, den Moschus, und wohl auch bei heftigen Anfällen, wobei das Gehirn frei bleibt, mit Vorsicht das Opium an, auch lässt man die Kranken an verbrannten Federn, an Hirschhorngeist, dem Dippelschen Thieröl riechen, aromatisch-geistige Einreibungen den Rücken herunter vornehmen, aromatische Bäder gebrauchen, Klystiere mit Valeriana, Asa foetida und dergleichen geben, und kann auch, sowohl um den Anfall zu beschränken, als die ganze Krankheit zu heben, den thierischen Magnetismus in Anwendung bringen.

Von grosser Wichtigkeit scheint es zu sein, in der Zeit zwischen den Anfällen einen angemessenen Verbrauch der Nervenkraft durch Muskelthätigkeit, mithin durch körperliche Arbeit, besonders im Freien, und durch Hinleitung derselben auf die oft ganz darniederliegenden vegetativen Prozesse zu bewirken. Zu letzterm Zwecke dienen das Extract der Pomeranzenschaalen, Calamus aromaticus, die China, die Eisenpräparate etc.

§. 1853.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Droht in einem Anfalle Gefahr der Erstickung oder eines Schlagflusses, so muss eine Aderlässe gemacht werden, doch darf man sich nicht zu leicht zur Vornahme einer Blutentleerung hinreissen lassen, indem scheinbar sehr gefährliche Zustände in der Regel doch ohne Nachtheil vorübergehen. — Ist Ohnmacht oder Starrsucht eingetreten, so werden diese Krankheitszustände auf die gewöhnliche Weise behandelt, doch wählt

man unter den erregenden Mitteln vorzüglich die antihysterischen. — Als Erweckungsmittel in diesen Zufällen, so wie überhaupt um die Kranke in den hysterischen Anfällen wieder zu sich bringen, kann man sich unter Andern auch der Bespritzungen des Gesichtes mit kaltem Wasser mit Vorsicht bedienen. — Bei Herzklopfen und Blutwallungen wendet man die verdünnten Mineralsäuren an. — Die Aufblähungen des Leibes, die Verstopfungen und Stockungen im Pfortadersystem verdienen eine besondere Berücksichtigung. — Bei Abnahme der Kräfte die stärkende Methode.

Zweite Gruppe
der
ERSTEN ORDNUNG DER NERVEN-KRANKHEITEN.

Die Krämpfe.

Clarus (der Krampf in pathologischer und therapeutischer Hinsicht. Lpz. 1822).

Die Fallsucht.
(*Fallende Sucht, Epilepsia, Morbus sacer, herculeus, divinus, comitialis, lunaticus, caducus, daemoniacus, puerilis, Sti. Valentis, Sti. Joannis.*)

Tissot (Lausann. 1770, a. d. Franz. Lpz. 1771). — *Greding* (advers. med. pract. Vol. I — III u. in s. vermischten Schriften). — *Lentin* (in s. Beiträg. B. III). — *Löbenstein Löbel* (Lpz 1818). — *Mansford* (a. d. Engl. 1819 v. Cerutti, Lpz. 1822). — *Portal* (Par. 1827, a. d. Franz. v. Hille, Lpz. 1828).

§. 1854.

Die Fallsucht ist die Krankheit, die sich durch Anfälle zu erkennen giebt, in welchen der ganze Körper, vorzüglich die Glieder, von heftigen Zuckungen befallen und auch von tonischen Krämpfen verdreht wird und Empfindung, und Bewusstsein und überhaupt alle Merkmale der Seelenthätigkeit mangeln.

§. 1855.

Verlauf des einzelnen Anfalls. Wenn die Zuckungen und die Unterdrückung das Bewusstsein mit

Vorboten eintreten, wird der Verlauf des Anfalls in 3 Stadien eingetheilt: 1) das der Vorboten, 2) das der Zuckungen und Bewusstlosigkeit und 3) das des schlafsüchtigen Zustandes. Die Vorboten beschränken sich zuweilen auf Symptome eines Ergriffenseins des Gehirns, Schwindel, Betäubung, Schwere und Schmerz im Kopfe, Ohrensausen, Funken vor den Augen, ein Thränen der Augen, einen stieren wilden Blick, Zittern der Augenlieder, eine stammelnde Sprache und kurz vor dem Anfall zuweilen die Empfindung eines Rauschens und Krachens im Kopfe. Oefters zeigen sich die ersten Erscheinungen nicht im Gehirne, sondern der Kranke wird noch bei wenig eingenommenem Kopfe von grosser Angst befallen, hat Herzklopfen, empfindet einen Druck in den Präcordien, zuweilen Aufblähungen etc., wo er sodann unmittelbar vor dem Anfalle oft das Gefühl hat, wie wenn Etwas von der Herzgegend oder einer andern Stelle in den Kopf hinauffahre, in welchem Momente das Bewusstsein verloren geht und die Krämpfe beginnen. Ebenso giebt es Fälle, in welchen der Kranke in einer der Gliedmassen einen warmen, häufiger einen kalten Hauch, oder ein Ameisenkriebeln oder eine Art electrischen Schlages (Aura epileptica) wahrnimmt, welcher sich von einer bestimmten Stelle aus, insbesondere einer Narbe, nach dem Verlaufe der Nerven gegen das Gehirn hinzieht, wo sodann, so wie er dieses erreicht hat, Bewusstlosigkeit und die Krämpfe eintreten. Die häufigsten Fälle sind übrigens die, in welchen auch in diesem Stadium das Gehirn vorzüglich ergriffen erscheint, wobei jedoch als weniger bedeutende Erscheinungen auch Aufblähung des Leibes, Neigung zum Erbrechen u. s. w. vorhanden sein können. In der Regel ist in diesem Zeitraum auch das Gemüth sehr verstimmt, der Kranke ungewöhnlich zornmüthig oder niedergeschlagen. Oft empfindet der Kranke ein Ziehen und Reissen in den

Gliedern, oft hat er jetzt schon einige Zuckungen. Der Urin ist gewöhnlich blass.

§. 1856.

Nach verschieden langer Dauer der erwähnten Zufälle, oft nach wenigen Augenblicken, oft auch ohne alle Vorboten wird der Kranke von allgemeinen heftigen Zuckungen und von Bewusstlosigkeit befallen. Er läuft gewöhnlich einige Schritte vorwärts, wobei sein Kopf auf die eine Seite gewendet und er selbst oft in einem Kreise gedreht wird und stürzt unter einem heftigen Schrei nieder. Der Kopf wird hin und her geschleudert und oft mit grosser Schnelligkeit auf den Boden aufgeschlagen. Das Gesicht, das aufgetrieben und oft dunkelroth wird, ist in einer Abscheu erregenden Bewegung, der Mund wird oft schnell in die Länge gezogen und wieder rüsselförmig hervorgetrieben, die Zähne knirschen, und die etwa zwischen die Zähne gebrachte Zunge wird verletzt, so wie selbst Zähne abspringen können, Schaum ist vor dem Munde, die Augen rollen, die Augenlieder werden entweder krampfhaft geschlossen oder stehen unbeweglich offen, oder zittern, die Pupille erweitert und verengert sich abwechselnd, und die Iris ist oft in einer zitternden Bewegung, die Haut der Stirne und der behaarte Theil des Kopfes werden hin und her bewegt. Die Arme werden verdreht oder schlagen oft mit grosser Gewalt nach einer bestimmten Richtung z. B. auf die Brust, oder auch nach einer unbestimmten Richtung, der Daumen ist in der Regel fest eingeschlagen und die Hand bildet eine Faust. Ebenso werden die Füsse verdreht und mannigfaltig bewegt, und durch die Zusammenziehungen der Muskeln des Rumpfes wird der Körper bald auf die eine, bald auf die andere Seite gebogen und hin und her geworfen. Das Athmen ist erschwert, der Kranke stöhnt und stösst ungewöhnliche Töne aus, der Puls und der Herzschlag sind unregelmässig, zuweilen

zitternd, man vernimmt ein Gurren im Leibe, die Hoden sind gegen den Bauchring angezogen, das Glied in Erection, der Saamen und der Urin werden ausgespritzt, der Koth ausgeleert. Hiebei ist der Kranke völlig ohne Bewusstsein und ist auch gewöhnlich ohne Gefühl, so dass z. B. weder auf Ueberraschung, noch auf den schmerzhaftesten Eindruck, selbst auf starke Verbrennung irgend eine Veränderung an ihm wahrgenommen wird. — Nachdem die heftigen Zuckungen einige Zeit angedauert haben, gehen sie häufig in einen tonischen (tetanischen) Krampf über, der sich wieder in Zuckungen auflöst, welche sodann allmählig, oft unter übelriechendem Aufstossen und wirklichem Erbrechen oder Abgang von Blähungen oder Durchfall nachlassen, und worauf der Kranke zu einigem Bewusstsein kommt.

§. 1857.

Ein solcher Anfall dauert 10, 15 Minuten, selten eine halbe Stunde und darüber. Hierauf verfällt der Kranke in der Regel in einen sehr tiefen Schlaf, aus welchem er nicht leicht erweckt werden kann und in welchem der Puls voll und regelmässig und die Respiration freier wird und gewöhnlich ein reichlicher übelriechender Schweiss ausbricht. Nach dem Erwachen fühlt sich der Kranke abgespannt, er ist noch eine Zeit lang schläfrig, eingenommen im Kopfe, missmuthig und erholt sich nach und nach. Zuweilen verfallen die Kranken nach dem Anfalle in eine Art von Somnambulismus. Sie gehen hin und her mit offenen, aber meistens stieren Augen, sprechen und singen, geben auch selbst einige Antwort auf die an sie gestellten Fragen, kommen aber zu keinem klaren Bewusstsein, so dass sie sich in einer Art Traumleben befinden. Dieser Zustand dauert oft mehrere Tage, bis er gänzlich vorübergeht.

§. 1858.

Verlauf der ganzen Krankheit. Den ersten Anfällen gehen oft sehr lange Zeit Anfälle von Schwindel und von leichten Zuckungen, insbesondere im Gesichte, vorher, oft ist es den Kranken, wie wenn ihnen plötzlich von der Herzgrube aus Etwas nach dem Kopf stiege, worauf ein schnell vorübergehender Schwindel eintritt; zuweilen haben sie auch Anfälle von Catalepsie, namentlich der leichtern Art derselben, die ich unter dem Namen das *Staunen* beschreiben werde, welche Anfälle oft nach längerer Zeit in die Epilepsie übergehen; oft haben sie auch nur häufiges Kopfweh und Wüstigkeit des Kopfes; in manchen Fällen bricht die Fallsucht aus, ohne diese Erscheinungen zu Vorläufern zu haben. Selten geht die Krankheit mit *einem* Anfalle vorüber und selten setzen die Anfälle ganze Jahre hindurch aus, gewöhnlich kommen sie in kürzern Zwischenräumen zurück, z. B. alle Monate, alle Woche, ja alle Tage und jeden Tag mehrere Male, öfters halten sie bestimmte Perioden, gewöhnlich thun sie aber dieses nicht. Haben sie längere Zeit ausgesetzt, so kommen sodann gerne mehrere Anfälle schnell aufeinander. Gewöhnlich vermehren sich die Anfälle, je länger die Krankheit dauert. Die ersten Anfälle sind in der Regel die leichtern, die spätern die heftigern, doch kann auch der umgekehrte Fall statt finden.

Die Krankheit hat einen sehr chronischen Verlauf und haftet oft an dem Kranken bis zu seinem Tode. In Gesundheit geht die Krankheit öfters bei dem Eintritt des Kranken in das Alter der Geschlechtsreife und dem Eintritt der monatlichen Reinigung, nach Abgang von Würmern, öftern, gewöhnlich sehr übelriechenden Schweissen etc. über, doch geschieht dieses nicht mit einem Male, sondern allmählig, indem die Anfälle immer seltener und schwächer werden. — Zum Tode

kann die Epilepsie durch Nachkrankheiten, so wie auch durch Schlag- oder Stickfluss während eines heftigen Anfalls führen. — Folgekrankheiteu sind: düstere und zornige Gemüthsstimmung, Schwäche des Gedächtnisses, der Urtheilskraft, zuletzt wirklicher Blödsinn oder Verrücktheit, Taubheit, seltener Blindheit, Neigung zum Schlagfluss, Lähmung, Abzehrung, Wassersucht.

§. 1859.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Es möchte wohl kaum eine bekannte Veränderung im Gehirne geben, die man nicht auch nach der Fallsucht angetroffen hat, verschiedene Fehler im Bau des Schädels, z. B. eine schiefe Stellung der Schädelknochen, auffallende Dickheit derselben, Knochenauswüchse, Verengerung der Löcher, aus welchen die Gefässe und Nerven aus der Schädelhöhle treten, Verknöcherungen der Dura mater, Anschwellungen der Pachionischen Drüsen, Erweichung und Verhärtung des Gehirns, Veränderungen der Zirbeldrüse, starke Anfüllung der Gefässe des Gehirns mit Blut, wässerigte und lymphatische Ausschwitzung zwischen den Hirnhäuten und in den Hirnhöhlen, Hydatiden der Adergeflechte etc. *Wenzel* will constant bedeutende Veränderungen in dem Gehirnanhang gefunden haben; beide Lappen desselben seien mehr oder weniger von einander entfernt, der Zwischenraum mit einer dünnen, meistens farblosen, etwas klebrigten Feuchtigkeit ausgefüllt, zuweilen auch kleine hirseförmige durchscheinende Körperchen in demselben vorhanden, der Gehirnanhang selbst oft sehr gross, weich, die Oberfläche desselben im hintern Lappen dunkelblau, im vordern sehr roth etc. [1])

Zuweilen hat man auch Fehler im Rückenmark und den Nerven und ihren Umgebungen gefunden, insbeson-

1) Vergleiche dessen Schrift über den Hirnanhang fallsüchtiger Personen.

dere Balggeschwülste, erdige Concremente etc., durch welche die Nerven gedrückt wurden.

Ausserdem fand man noch verschiedene Abnormitäten in den Lungen, dem Herzen, der Leber, der Milz, dem Magen etc., die zuweilen wohl als entferntere Ursachen zur Entstehung der Fallsucht mitwirken konnten, oft aber auch in keiner Beziehung zu derselben gestanden haben mochten. — Oft findet man auch in den Leichen der Fallsüchtigen keine organischen Veränderungen.

§. 1860.

Verschiedenheiten der Fallsucht nach den Ursachen stellen dar die Epilepsia hereditaria et acquisita, die E. idiopathica et sympathica, nach ihrem ursprünglichen Sitze die E. cerebralis, spinalis, abdominalis, extremitatum; nach ihren Erscheinungen und Verlaufe E. completa et incompleta, E. diurna et nocturna, E. atypica et periodice recurrens, E. acuta et chronica.

§. 1861.

Die Anlage zur Epilepsie ist oft angeerbt und angeboren, und es sind zu derselben sowohl Personen mit sehr empfindlichem Nervensysteme und leicht beweglichem Gemüthe, als auch mit Congestionen nach dem Kopfe behaftete Individuen geneigt.

Gelegenheitsursachen sind a) solche, die unmittelbar aufs Gehirn wirken: Erschütterung des Gehirns, Verletzungen des Schädels, der Sonnenstich, übermässige Geistesanstrengungen etc.; b) consensuell und antagonistisch wirkende: Würmer, Gifte und andere Reitze im Magen und Darmkanal, anhaltende Verstopfung und Stockungen im Pfortadersysteme, Fehler in den Geschlechtsverrichtungen, insbesondere zur Zeit der eintretenden Geschlechtsreife, das Nichterscheinen der monatlichen Reinigung, Onanie, Schwangerschaft und schwere Geburten, das beschwerliche Zahnen, zurückgetretene

Hämorrhoiden, Gicht, Fussschweisse, Hautausschläge etc.; c) allgemein aufs Nervensystem wirkende: heftige Gemüthsaffecte, insbesondere Zorn und Schrecken, der Anblick eines Epileptischen, heftige Körperbewegung, grosse Hitze und Berauschung, so wie auch ein stärkerer Blut- und anderer Säfteverlust und andere schwächende Einflüsse.

§. 1862.

Ueber das **Wesen** der Fallsucht kann nur so viel mit einiger Bestimmtheit angenommen werden, dass die Krankheit in einer zeitweise eintretenden Hemmung der Gehirnthätigkeit und in allgemeinen durch den krankhaften Zustand des Gehirns bedingten Krämpfen bestehe. *Tissot*[1]) erklärt die Krankheit aus einer Zusammendrückung und Zusammenziehung des Gehirns, wodurch die Lebensgeister in die bewegenden Nerven getrieben werden.

§. 1863.

Vorhersage. Die Krankheit ist zwar selten tödtlich, sie wird aber auch selten geheilt; tödtlich ist sie am leichtesten bei Individuen mit Neigung zum Schlagfluss, heilbar noch am meisten, wenn ihre Ursache entdeckt wird und entfernt werden kann, wenn die Zeit der Geschlechtsreife noch nicht vorüber ist, wo sie oft mit der Vollendung dieser Periode von selbst aufhört (nach *Hippokrates* ist die Krankheit bei Kranken von mehr als 25 Jahren unheilbar), und wenn sie nicht so lange gedauert hat, dass sie zu sehr zur Gewohnheit geworden ist oder selbst Desorganisationen im Gehirne veranlasst hat.

§. 1864.

1) *Die* **Behandlung** *während des Anfalles.* Es kann und soll in der Regel hier nichts gethan als der

1) Abhandlungen über die Nerven. Von der fallenden Sucht. Artikel 2.

Kranke vor Verletzungen bewahrt werden. Man halte denselben nicht, suche ihm nicht die Daumen aufzubrechen, sondern lasse den Krämpfen freien Lauf und bringe den Kranken nur in eine Lage, in welcher er sich nicht beschädigen kann, man lege unter das Haupt und auf die Brust, wenn er auf dieselbe schlägt, ein Kopfkissen, und, wenn er die Zunge zwischen die Zähne bringt, zwischen die beiden Reihen der Zähne ein Stückchen Korkholz. Nur wenn während des Anfalls Gefahr drohende Erscheinungen eintreten, namentlich Stick- oder Schlagfluss zu fürchten ist, hat man die geeigneten Mittel anzuwenden; in den angegebenen Fällen eine Aderlässe und im letztern Falle auch kalte Umschläge auf den Kopf oder kalte Begiessungen desselben, so wie das Auftröpfeln von Schwefeläther.

Um den schon in seinen Vorboten auftretende Anfall zu unterdrücken, hat *Richter*[1]) Brechmittel empfohlen; auch hat man das Trinken von kaltem Wasser, das Ableiten der Aufmerksamkeit, magnetische Manipulationen und wenn der Anfall mit dem epileptischen Hauch in einer der Gliedmassen beginnt, das feste Anlegen eines Bandes gerühmt; das letztere Mittel soll jedoch dem Kranken oft eine ausserordentliche Angst veranlassen, die nur durch die Lösung des Bandes und den Eintritt des Paroxysmus gehoben wird.

§. 1865.

2) *Behandlung der Krankheit ausserhalb des Anfalls.* a) *Die Anzeige aus den Ursachen* ist in der Behandlung dieser Krankheit die wichtigste, indem man, wenn keine noch fortwirkende Ursache auffindbar ist und entfernt werden kann, seine Zuflucht zu den specifischen Mitteln nehmen muss und von diesen meistens ohne

1) Spec. Therap.

Hülfe gelassen wird. Ist die Krankheit bei einem Kinde von der Mutter aus angeerbt, so darf es nicht von derselben gestillt werden, sondern muss an die Brust einer gesunden Amme gelegt werden. Die Mutter oder Amme eines epileptischen Kindes muss sich vor Leidenschaften und dem Genuss geistiger Getränke hüten, sie muss eine leichte Kost geniessen etc. Sehr häufig dienen, besonders bei Kindern, wegen Säure im Magen und Stoffen in den Gedärmen, Brechmittel, Säure tilgende Mittel, Abführungsmittel, noch öfter wegen Wurmreitz, die wurmabtreibenden Mittel. Geheilte Geschwüre und zurückgetretene Ausschläge sucht man wieder herzustellen. Ausschweifungen in den Geschlechtsverrichtungen sucht man zu verhindern. Eindrücke der Schädelknochen entfernt man durch die Trepanation. Geschwülste, die auf die Nerven drücken, schneidet man aus, verletzte Nerven durchschneidet man vollends. Bei Narben, von denen die Aura epileptica ausgieng, hat man mit glücklichem Erfolg Aetzmittel angewandt etc.

§. 1866.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* So wenig man über das Wesen der Epilepsie noch im Klaren ist, so weiss man doch Einiges über die Natur derselben, was bei der Behandlung einen Fingerzeig geben kann.

a) Es ist gewiss, dass bei der Epilepsie immer das Gehirn entweder primär oder secundär leidet und meistens, wenigstens im Anfalle, eine Blutüberfüllung im Gehirn und oft auch, wie es scheint, eine vorübergehende Bewegung in den Nerven nach diesen Theilen stattfindet; es sind daher alle Veranlassungen zu Congestionen nach dem Kopfe möglichst zu vermeiden und vom Gehirne ableitende Mittel anzuwenden, nach Umständen Fussbäder, kühlende eröffnende Mittel, Fontanelle und Blasenpflaster,

häufiges kaltes Waschen und leichte Begiessungen des Kopfes mit kaltem Wasser etc.

b) Man erkennt oft deutlich den primären Sitz der Krankheit und kann sodann die Mittel auf das ursprünglich leidende Organ richten. Geht z. B. die krankhafte Bewegung von den Ganglien des Unterleibes aus, so sind oft Brechmittel nützlich und es kann bei gesteigerter Sensibilität dieser Theile leichter als bei primärer Gehirnaffection das Opium angewandt werden. Zuweilen ist auch in diesem Falle ein verlarvtes Wechselfieber im Spiele und es dient die China und das Chininum sulphuricum. Vielleicht könnte auch die Bewegung in den Nerven von den Ganglien auf das Gehirn durch das Auflegen von Blasenpflastern, Einreibung der Brechweinsteinsalbe oder das Aufsetzen von Moxen auf die Herzgrube oder in der Mitte des Rückens einigermassen gehemmt werden, wie man einen ähnlichen Erfolg von der Anwendung von Aetzmitteln bei Narben, von denen und Aura epileptica ausgieng, beobachtete.

c) Wir können oft aus vielen Thatsachen schliessen, dass im Gehirn und Nervensystem keine materielle Veränderung und überhaupt kein sehr tiefes Leiden vorhanden ist, und dass die Epilepsie mehr blos in einer zur Gewohnheit gewordenen fehlerhaften Nervenbewegung besteht. Hier scheint es vorzüglich darauf anzukommen, durch Verhütung der Anfälle diese Gewohnheit aufzuheben, was oft am Besten durch die wiederholte Anwendung der Brechmittel, besonders vor den Anfällen geschieht, welche durch die Erschütterung des Nervensystems, insbesondere des Gangliensystems, eine freiere Bewegung in den Nerven wieder herzustellen scheinen; doch habe ich auch beobachtet, dass durch Brechmittel Anfälle erregt werden.

d) Zuweilen hat die Fallsucht deutlich den einen oder den andern der Hauptkrankheitscharactere angenom-

men. Ist es ein hypersthenischer Zustand, so dienen von Zeit zu Zeit kleine Blutentleerungen, kühlende Mittel, eine magere Diät, im entgegengesetzten Fall die stärkende, seltener die erregende Methode.

d) Die eine Haupterscheinung der Krankheit ist ihrem Wesen nach immer Krampf und es können daher die krampfstillenden Mittel mit der gehörigen Auswahl angewandt werden, wobei insbesondere die Vorsorge getroffen werden muss, dass durch ihre Anwendung nicht die andere Haupterscheinung, die Unterdrückung des Bewusstseins und Gefühls, verschlimmert werde, das ist, das Gehirn nicht verletzt werde. Aus diesem Grunde erfordert die Anwendung des Opiums die grösste Vorsicht. Die krampfstillenden Mittel sind grösstentheils als Specifica gegen die Epilepsie gerühmt worden und werden bei der Angabe dieser Mittel namentlich angeführt werden; sie können aber sehr häufig den erwünschten Erfolg nicht haben, da die Krämpfe in der Regel nur die Folge des Gehirnleidens sind und dieses meistens durch die krampfstillenden Mittel nicht gehoben werden kann.

f) *Lentin* [1]) giebt den Rath, genau zu beobachten, unter welchen Ausscheidungen der einzelne Anfall aufhöre und auf diese zu wirken, so z. B. lasse man bei Trockenheit der Haut ausser dem Anfall und reichlichem Schweisse nach demselben den Kranken von Zeit zu Zeit in ein warmes Bad bringen und mit einem mit Seife geriebenem Schwamme abreiben, bei Aufstossen und Erbrechen gebe man wiederholt Brechmittel, bei Abgang von Blähungen abführende Mittel etc.

§. 1867.

Die als specifisch wirkend gerühmten Mittel sind grösstentheils krampfstillende, aber auch erregende, schweisstreibende, auf den Darmkanal ableitende Mittel u. s. w., und

1) Beiträge B. III, S. 144 u. d. f.

besitzen oft mehrere dieser Wirkungen zugleich. Die vorzüglichsten sind: die Valeriana (zu 1 Scrupel bis ½ oder ganzen Drachme 4 — 5 Mal täglich), welche schon von *Dioscorides* empfohlen und von *Tissot* als das erste unter den specifischen Mittel gerühmt worden ist;[1]) die Folia Aurantiorum, Lignum Visci querni; die Radix Paeoniae officinalis, ungefähr zu derselben Gabe; die von *Burdach*[2]) gerühmte Rad. Artemisiae vulgaris, immer um den andern Tag und am besten ½ Stunde vor dem Anfall einen gehäuften Theelöffel voll, etwa 50 — 70 Grane, in erwärmtem Bier gegeben, wobei der Ausbruch des Schweisses durch warme Bedeckung im Bette befördert werden muss;[3]) das Oleum animale Dippelii zu 5 — 10 Tropfen auf Zucker oder 2 Scrup. in 2 Drachm. Schwefeläther gelöst zu 10 — 30 Tropfen 4 Mal täglich; das Oleum Terebinthinae in grossen Gaben, der Hirschhorngeist, die Asa foetida, Castoreum, Moschus, der Kampher, Phosphor — das Opium, die Belladonna, Hyoscyamus etc. — das Kali carbonicum, die Flores Cinci, das Cuprum sulphurico ammoniacum täglich 2 Mal zu ½ Gran, das Magisterium Bismuthi, das Argentum nitricum fusum früh und Abends ½ Gran und allmählig steigende Gaben bis zu 1 oder 2 Granen, Sedum acre von der getrockneten Pflanze das Pulver zu 15 Granen bis zu 1 Scrup., endlich zu 1 Drachm. pro dosi, ebenso der Agaricus muscarinus, der Saft der weissen Zwiebeln, die Brechmittel, die drastischen Mittel, wie Helleborus, Pulsatilla nigricans, Gratiola etc., der unreife Traubensaft (das Omphacium) 4 Mal zu einem halben Esslöffel voll, gestiegen bis zu ½ Obertasse voll mit Wasser verdünnt, die Mineralsäuren, Quecksilber, China, Eisen, — die Electricität, der

1) Nervenkr. B. III. S. 389. — 2) *Hufelands* Journ. B. 58. — 3) Vergl. *Dierbachs* neuest. Entdeck. in der Mat. med. S. 217 und *Richters* spec. Therap. B. X. S. 377.

thierische Magnetismus, — Schröpfköpfe, Blasenpflaster, Fontanelle, Haarseile, Moxen und das glühende Eisen auf den Nacken oder selbst auf den Kopf — kalte Begiessungen, Bäder, insbesondere Seebäder — Einreibungen von geistigen, ätherisch-öligten und narcotischen Dingen in den Rücken und die Herzgrube etc.

Die eigenthümlichen Convulsionen der Gebärenden.

(*Eclampsia parturientium.*)

Kelp (Diss. Argent. 1747). — *Engelmann* (Diss. Altd. 1752). — *Gehler* (Diss. Lips. 1776 u. 77 und in seinen kl. Schriften d. Entb. 1r Bd. Lpz. 1798). — *G. F. Hoffmann* (Frankf. a. M. 1795). — *Hamilton* (Journ. d. ausl. Literatur 1802). — *Boer*, *Siebold*, *Nägele* u. a. Schriftsteller üb. Geburtshülfe u. Weiberkrankheiten

§. 1868.

Mit dem Namen Eclampsie der Gebärenden werden höchst gefährliche, vor, während oder sogleich nach der Geburt vorkommende Krämpfe belegt, die in der Form mehr oder weniger mit der Epilepsie übereinkommen, aber eine hitzig verlaufende Krankheit sind. *)

§. 1869.

Dem Krampfanfalle gehen oft Mattigkeit, Kopfschmerz, Betäubung, Sausen vor den Ohren, Verdunklung des Gesichtes, über den Rücken herablaufende

*) Auch bei Kindern kommen, nebst den übrigen Krampfformen, hitzige, die Form der Epilepsie darstellende Krampfanfälle vor (Eclampsia infantum), welche häufig von gastrischen Reitzen, Zahnreitz, entzündlicher Gehirnaffection etc. veranlasst sind.

Schauder, Angst und Herzklopfen vorher. Sodann brechen Zuckungen in den Gliedmassen, welche mit tonischen Krämpfen abwechseln, aus, die Kranke verliert bald das Bewusstsein, das Gesicht wird verzerrt, die Augen verdreht, die Pupille ist erweitert, Schaum vor dem Munde, das Athmen erschwert, der Puls klein, der Körper mit einem kalten Schweisse bedeckt, Stuhl- und Urinabgang unwillkührlich. Während der Krämpfe oder auch schon vorher, öffnet sich der Muttermund, das Kind macht gewöhnlich, wenn es nicht schon abgestorben ist, sehr lebhafte Bewegungen, und es erfolgt zuweilen unter heftigen Contractionen der Gebärmutter, wobei diese zerreissen kann, die Geburt.

Nach dem Anfalle sinkt die Frau in einen tiefen, von Schnarchen begleiteten Schlaf, und weiss nach dem Erwachen nicht, was mit ihr vorgegangen ist.

Solche Anfälle kehren wiederholt zurück, oft schon nach $1/4$ Stunde, und treten besonders mit dem Eintritt einer Wehe ein; haben sie sich schon öfters wiederholt, so kommt die Kranke in der Zwischenzeit nicht zum klaren Bewusstsein und redet irre oder erwacht gar nicht aus dem Schlafe. Die Anfälle hören meistens auf, wenn die Geburt erfolgt ist, können aber auch noch nach der Entbindung zurückkehren, und tödten häufig, ohne dass diese zu Stande kommt.

§. 1870.

Wesen und Ursachen. Diesen Zufällen scheint vorzugsweise ein starker Blutandrang nach dem Kopfe zum Grunde zu liegen. — Es werden mehr vollsaftige und blühende als hysterische Personen und besonders Erstgebärende davon befallen. — Die Gelegenheitsursachen kennt man nicht hinreichend, es werden übrigens beschuldigt: Ueberladung des Magens, Gemüthsaffecte, Verkältung, das Absterben des Foetus, schwierige Geburten.

§. 1871.

Vorhersage. Die Krankheit ist sehr gefährlich, sich überlassen endigt sie sich meistens mit dem Tode, und bei der besten Behandlung soll ungefähr die Hälfte der Kranken sterben.

§. 1872.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man zögere nicht, die künstliche Entbindung vorzunehmen, weil sie das noch am häufigsten Rettung bringende Mittel ist, und ohne Vollendung der Geburt die Krämpfe meistens nicht aufhören; werden die Zuckungen aber hierdurch vermehrt, so lasse man mit den Versuchen einstweilen nach.

§. 1873.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen.* Die eigentlichen Antispasmodica, namentlich das Opium, sind selten dienlich und nur mit grosser Vorsicht anzuwenden. Dagegen beweisen sich Aderlässe, warme Bäder, kalte Ueberschläge auf den Kopf, eröffnende Klystiere, reitzende Fussbäder und andere Ableitungsmittel heilsam (nach *Richter* das Uebergiessen der Füsse mit heissem Wasser).

§. 1874.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Man sorge, wie bei der Epilepsie, dafür, dass die Kranke sich nicht verletze. Das Festhalten der Kranken und das Aufbrechen der Daumen ist hier ebenfalls zweckwidrig.

Der Veitstanz.

(*Chorea St. Viti*, *Scelotyrbe*, *Epilepsia saltatoria*, *Ballismus*, *Tarantismus*.)

Wedel (lat. Jena 1682). — *Brückmann* (lat. Frankf. 1785). — *Wichmann* (Id. z Diagnost.). — *Bernt* (lat Prag. 1810). — *Wagner* (Nürnb. 1818). — *Stransky* (lat. Wien 1822).

§. 1875.

Der Veitstanz ist die chronische Krankheit, welche in anfallsweise wiederkehrenden, clonischen, schnell wechselnde Bewegungen darstellenden Krämpfen, bei welchen das Bewusstsein völlig frei ist oder Ecstase und Irrereden vorhanden ist, besteht.

§. 1876.

Es gehen dem Krampfanfall meistens einige Vorboten voraus, eine besondere Launenhaftigkeit oder Niedergeschlagenheit, Schwindel, Herzklopfen, das Gefühl von Griebeln in den Gliedern etc. Hierauf und auch ohne diese Vorboten, stellen sich Krämpfe ein, welche in keinen sehr gewaltsamen Zuckungen, aber in schnell mit einander wechselnden Zusammenziehungen der meisten Muskeln des Körpers besteht, so dass hierdurch die mannigfaltigsten und sonderbarsten Bewegungen hervorgebracht werden. Der Kranke verzieht abwechselnd das Gesicht zu verschiedenen Grimassen, er dreht die Arme im Kreise, schleudert sie hin und her, schlägt einen Gegenstand (Malleatio), krümmt die Finger, macht Drehungen mit dem Rumpfe, wirft die Füsse über einander, hinkt, läuft schnell vorwärts (Epilepsia procursiva) und macht Bewegungen, wie bei einem komischen Ballettanze. Zuweilen kommen solche Krämpfe nur auf *einer* Seite des Körpers vor (Chorea

semilateralis). Hiebei sind meistens die Kranken in vollem Gebrauche ihrer Geisteskräfte, zuweilen in Ecstase, wobei sie häufig die Neigung haben, die Zufälle, welche die Umstehenden oft in Erstaunen oder Lachen versetzen, absichtlich zu vermehren, zuweilen befinden sie sich in einer Art Somnambulismus, wobei die Kranken zwar nicht beim Bewusstsein sind, ihre Geistesthätigkeit aber nicht unterdrückt ist, wie in der Fallsucht, sondern dieselben in einer Art Traumleben sich befinden, so dass sie reden, lachen, singen, aber die Eindrücke der Aussenwelt gar nicht oder nur theilweise wahrnehmen.

Ein solcher Anfall dauert eine Viertel- bis zu einer ganzen Stunde, worauf die Krämpfe nachlassen. Der Kranke fühlt sich ermattet, aber nicht in der Art angegriffen, wie in der Fallsucht.

§. 1877.

Die Anfälle kehren meistens in unbestimmten, zuweilen aber auch in bestimmten Zeiträumen zurück und treten oft ohne äussere Veranlassung, oft auch auf eine solche, namentlich auf Gemüthsbewegungen, ein. — Die Krankheit verliert sich oft von selbst, besonders bei dem Uebergang des Individuums in eine andere Lebensperiode. Zum Tode führt sie für sich nie, doch kann sie in eine schwerere Nervenkrankheit, namentlich die Fallsucht, sich umwandeln, oder es kann eine andere Krankheit, namentlich Melancholie, Nervenschwindsucht, Schlagfluss hinzukommen.

§. 1878.

Anlage haben vorzüglich zart gebaute und nervenschwache Knaben und Mädchen, kurz vor und während der Zeit des Mannbarwerdens. Gelegenheitsursachen sind Onanie, nicht zu Stande kommende monatliche Reinigung, Gemüthsbewegungen, insbesondere Schrecken, Würmer, gastrische Unreinigkeiten, Erkältung, zurückgetretene Ausschläge, Verletzung eines Nervens etc.

§. 1879.

Von dem Wesen des Veitstanzes kann nur so viel angegeben werden, dass derselbe eine Krampfkrankheit ist und dass die Krämpfe nicht vom Gehirne, wie in der Epilepsie (welches Organ hier meistens gar nicht oder nur secundär leidet), sondern, wie es scheint, vom Rückenmarke ausgehen.

§. 1880.

Vorhersage. Die Krankheit wird nicht leicht habituell, wie die Epilepsie, und ist in der Regel nicht gefährlich.

§. 1881.

Die Behandlung während des Anfalls kann sich darauf beschränken, den Kranken vor Verletzung zu schützen. Bei länger dauernden Anfällen können die gewöhnlichen krampfstillenden Mittel zu Hülfe gezogen werden. Nützlich ist es, die Zuschauer zu entfernen, weil sie oft zur Vermehrung der Zufälle mittelbar beitragen.

In der Zeit ausser dem Anfalle sucht man die Ursachen der Krankheit zu entfernen, namentlich der Onanie vorzubeugen, die monatliche Reinigung in Gang zu bringen oder Würmer zu entfernen, und zieht krampfstillende Mittel, namentlich die Valeriana, Fol. Aurantiorum, Zinkblumen, den thierischen Magnetismus, lauwarme Bäder, und bei allgemeiner Schwäche China und Eisen in Gebrauch.

Der Brustkrampf.

(*Der Lungenkrampf, die krampfhafte Engbrüstigkeit, Asthma im engern Sinne, Asthma spasmodicum, s. caducum, Epilepsia pulmonum.*)

Floyer (nebst Ridley's Beobacht. aus dem Engl. v. Scherf. Lpz. 1782). — *Withers* (Lond. 1786, a. d. Engl. Lpz. 1796). — *Ryan* (Lond. 1793, a. d. Engl. Leipz. 1796). — *Bree* (Birmingh. 1800, a. d. Engl. Lpz. 1800) — *Brodhag* (Freiburg 1826). — *Hoffbauer* (Leipzig 1828).

Ueber das Asthma der Kinder: *Millar* (Lond. 1769, a. d. Engl. v Krause. Leipz. 1769). — *Wichmann* (Id. z. Diagnost.). — *J. Ch. Albers* (lat. mit Vorrede v. J. Alb. Albers. Goetting. 1817). — Die Schriftsteller über Kinderkrankheiten.

§. 1882.

Der Brustkrampf ist eine heftige, anfallsweise sich einstellende Beengung, welche mit den Zeichen des Krampfes verbunden ist.

§. 1883.

Diese Krankheit zeigt in ihrem Verlaufe einige Verschiedenheiten, je nachdem sie bei erwachsenen Individuen oder bei Kindern vorkommt.

Die *krankhafte Engbrüstigkeit der Erwachsenen* (Asthma adultorum) macht gewöhnlich zuerst des Nachts einen Anfall. Der Kranke erwacht unter heftiger Beengung und unter dem Gefühle des Zusammenschnürens in der Brust und in dem Kehlkopfe aus dem Schlafe, er bemüht sich, den Athem einzuziehen, wobei meistens in dem Kehlkopfe ein pfeifender und rauher Ton erregt wird. Oft sind die Athmungsbeschwerden so stark, dass der Kranke aus dem Bette springt, das Fenster aufreisst, um frische Luft einzuziehen, die Brust durch Anstrengung der Arme unterstützt, um mehr Luft zu schöpfen etc.

Hiebei ist das Gesicht entweder blass und eingefallen oder dunkelroth, das Herz klopft stark oder ist in einer zitternden Bewegung, der Puls ist aussetzend und krampfhaft, der Harn hat, wenn ein solcher gelassen wird, eine blasse, mehr wasserhelle Farbe. Das Stethoscop zeigt in solchen Augenblicken Abwesenheit des Respirationsgeräusches.

Ein solcher Anfall hält in der Regel einige Minuten und zuweilen eine viertel, eine halbe und mehrere Stunden an, er lässt sodann allmählig nach, wobei gewöhnlich unter etwas Husten, ein schleimiger Auswurf sich zeigt und der Harn dunkler wird und einen Bodensatz erhält.

§. 1884.

Gewöhnlich kommen solche Anfälle mehrere Nächte hinter einander, sie setzen sodann eine geraume Zeit, oft Monate und selbst Jahre lang aus, bis wieder ein neuer Anfall, dem wieder eine Reihe anderer folgt, eintritt. Nur in seltenen Fällen halten die Anfälle ganz bestimmte Perioden.

In der Zeit zwischen den Anfällen befindet sich der Kranke, besonders in dem Anfange der Krankheit, ziemlich wohl, doch verändert sich auch in dieser Zeit sein Befinden allmählig. Zuerst empfindet er nur kurz nach dem Anfalle noch einige Athmungsbeschwerden, Mattigkeit etc. und es stellen sich auch einige Zeit vor dem Anfalle, gewöhnlich eine Stunde nach dem Mittagessen und gegen Abend, Vorboten des Anfalls, wie leichte Beweglichkeit des Gemüthes, Eingenommenheit des Kopfes, Ziehen zwischen den Schultern und im Nacken, Aufblähung des Leibes etc. ein. Späterhin bleibt auch in den Zwischenräumen der Anfälle eine gewisse Engbrüstigkeit zurück, auch kommen nun leichter Anfälle am Tage auf starke Körperbewegung, Gemüthsbewegung etc. zu stande, endlich gesellt sich oft ein schleimiger, eiteriger und blutiger Auswurf hinzu, es

entwickelt sich oft wirkliche Lungenschwindsucht oder es bildet sich, was häufiger der Fall ist, Brustwassersucht aus; nicht selten entstehen auch im Verlaufe der Krankheit Anevrysmen des Herzens und der grossen Arterien.

Die Dauer des ganzen Leidens beträgt oft eine lange Reihe von Jahren, in Gesundheit geht die Krankheit durch allmählige Besserung über, auch unter Ausscheidungen, Entstehung von stellvertretenden Krankheiten etc., der Tod wird selten durch den Anfall selbst herbeigeführt, und tritt sodann unter Stick- und Schlagfluss ein, meistens ist er die Folge der sich nach langer Dauer der Krankheit oft ausbildenden Brustwassersucht oder Lungenschwindsucht.

§. 1885.

Der Brustkrampf ist entweder ohne Verbindung mit einer andern Brustkrankheit vorhanden oder es besteht eine solche neben demselben und kann die Ursache des Asthmas sein, doch kann eine davon herrührende Beengung nur dann Brustkrampf genannt werden, wenn durch die bestehende Lungenkrankheit das Athmen nicht unmittelbar gehemmt, sondern zuerst hierdurch ein Krampf in den Athmungsorganen hervorgebracht wird. Das Bestehen des Lungenkrampfes erkennt man vorzüglich an dem eigenthümlichen, zusammenschnürenden, den Krampf besonders bezeichnenden Gefühl in der Brust und dem pfeifenden Ton in dem Larynx. Fehlen diese krampfhaften Zufälle, so kann keine, auch noch so heftige Beengung, mit welchem Brustleiden sie in Verbindung stehen mag, Asthma genannt werden.

§. 1886.

Als eine eigene Art von Asthma nimmt *Laennec* das *Asthma mit kindlichem Respirationsgeräusche* an. Es findet hier eine Schwerathmigkeit statt, ohne dass irgend eine materielle Veränderung in der Brusthöhle

oder in den Lungen wahrgenommen wird, oder ein Herzfehler vorhanden ist, welche oft bei vollkommener Körperruhe ganz verschwindet, aber bei einiger Körperbewegung erregt und oft zu einem hohen Grade gesteigert wird. Hierbei ist aber das Athmen nicht wirklich gehemmt, und man nimmt bei der Untersuchung mit dem Stethoscop nicht Abwesenheit des Respirationsgeräusches, wie bei dem eigentlichen Lungenkrampf, sondern das kindliche Respirationsgeräusch wahr. Auch ist hiebei wohl nicht der pfeifende und rauhe Ton in dem Kehlkopfe wahrnehmbar. — *Laennec* schreibt diesen Zustand, sehr scharfsinnig, einer Vermehrung des Bedürfnisses der Respiration zu, wahrscheinlich in unbekannten Modificationen des Nerveneinflusses begründet; ein wirklicher Lungenkrampf ist derselbe jedoch nicht.

§. 1887.

Das *krampfhafte Asthma der Kinder* (hitziges Asthma, Millarsche Asthma, Asthma spasmodicum infantum, Asthma Millari, von *Millar* selbst sehr passend Cynanche trachealis spasmodica oder spasmodic Croup genannt) besteht in sehr heftigen, nach vorhergegangenem leichtem Athemholen, eintretenden Erstickungsanfällen mit einem rauhen Ton im Kehlkopfe, welche oft sehr schnell tödtlich werden. Ohne Vorboten, als etwa leichten catarrhalischen Zufällen, stellt sich meistens in der Nacht der erste Anfall ein. Die Kinder erwachen unter Schreien mit einem rauhen, hohlen Ton, sie schnappen nach Luft, und suchen diese mit Gewalt in die Brust einzuziehen, sie haben das Gefühl von Zusammenschnürung in der Brust, ihr Gesicht wird blauroth, der Puls ist unterdrückt, die Haut trocken, zuweilen gesellen sich auch allgemeine Krampfzufälle hinzu. Nach einigen Minuten oder einer viertel oder halben Stunde lässt der Anfall nach, wobei oft etwas Husten und Niesen mit Schleim-

auswurf, oder auch Erbrechen und Stuhlentleerungen sich einstellen.

In der Zwischenzeit ist das Kind matt, traurig oder mürrisch, es zeigen sich manchmal leichte Zuckungen im Gesichte und in andern Theilen, das Athmen geht übrigens leicht von Statten.

Nach 12 bis 24 Stunden kommt ein neuer und heftiger Anfall und so kehren sechs und mehr Anfälle in immer kürzer werdenden Zwischenräumen und mit grösserer Heftigkeit, oft aber auch nach scheinbarem Nachlasse von Neuem zurück, bis ein Anfall oft unerwartet, unter Erstickung und Krampfzufällen, tödtet. Geht die Krankheit in Gesundheit über, so werden die Anfälle immer seltener und schwächer, doch zeigen sie sich in leichterm Grade oft noch zwei und drei Wochen hindurch.

Ich habe diese Krankheit in einem einzigen, jedoch unzweifelhaften Falle, beobachtet, und glaube denjenigen Aerzten, die dieselbe noch nicht gesehen haben, eine ziemlich vollkommene Vorstellung von der Krankheit geben zu können, wenn ich die Anfälle des Millarschen Asthmas mit dem krampfhaften Einathmen, das in dem blauen Husten zwischen dem convulsivischen Husten eintritt, vergleiche. Dieses eigenthümliche Einathmen tritt nach Zwischenräumen, in welchen die Respiration ganz frei ist, ein, das Kind wird zuweilen vor dem Anfalle unruhig, es stellt sich aber durchaus kein Husten oder höchstens ein ein- oder zweimaliges kurzes Hüsteln ein, worauf sodann die grosse Beklemmung mit dem bei dem Einziehen der Luft statt findenden, dem Keuchhustentone ähnlichen, jedoch etwas rauhern Tone in dem Kehlkopfe eintritt. In den schwersten Anfällen des Asthmas kommt, wie in den schwersten Anfällen des Keuchhustens, das Einziehen der Luft nicht wirklich zu Stande, sondern der Athem wird ganz unterdrückt und

das Kind befindet sich in der höchsten Erstickungsgefahr, was plötzlich und ohne vorhergegangenes Schreien des Kindes eintritt.

§. 1888.

Anlage zum Brustkrampf haben Personen mit sehr reitzbaren Nerven, von dem mittlern Alter und mehr Männer als Weiber. **Gelegenheitsursachen** sind Gemüthsbewegungen, Verkältungen, eine sehr rauhe Witterung, starke Körperbewegungen durch schnelles Laufen, Singen etc., Diätfehler, zurückgetretene Gicht, Unterdrückung von Ausleerungen etc.

Als Ursache des Millarschen Asthmas wird von Millar die feuchte und veränderliche Witterung im Frühlinge und Herbste, von *Wichmann* Erkältung im strengen Winter beschuldigt. Der von mir beobachtete Fall kam bei einem dreivierteljährigen Knaben vor, dessen schwächlicher Vater an krampfhaften Zufällen litt, die er sich wahrscheinlich durch Umgang mit metallischen Giften zugezogen hatte; vielleicht wurde das Kind selbst den Dämpfen metallischer Gifte ausgesetzt. Auch war, nach der Aussage der Eltern, denselben schon ein Kind an derselben Krankheit in dem vierten Anfall gestorben.

§. 1889.

Das **Wesen** des eigentlichen Asthmas ist ein tonischer Krampf in der Lunge, wie es scheint in den Ringfasern, die nach *Reisseisens* und *Laennecs* Untersuchen da anfangen, wo die Knorpelringe aufhören und welche vielleicht sich bis in die Lungenbläschen fortsetzen, und dem Kehlkopfe selbst. Dieser Krampf kann sowohl durch die Empfindlichkeit der Lungensubstanz selbst und der Lungennerven, so wie durch die unmittelbar auf die Lungen wirkenden Gelegenheitsursachen, als auch durch ein Leiden der Centralorgane des Nerven-

systems bedingt sein, was jedoch bei der gewöhnlichen Form des Asthmas ein seltener Fall zu sein scheint.

Mehrere Aerzte, namentlich *Autenrieth*, *Hecker*, *Jurine* und *Albers*, haben die Existenz des Millarschen Asthmas geleugnet und behauptet, dass die Aerzte, die diese Krankheit gesehen haben wollen, die häutige Bräune dafür gehalten hätten, und *Puchelt* ist geneigt, eine Verwechslung mit der häutigen Bräune oder mit der Carditis infantum anzunehmen; doch sieht man nicht ein, warum diese Krampfform allein bei Kindern, welche doch sonst zu Krämpfen eher eine grössere als eine geringere Anlage als Erwachsene haben, nicht soll vorkommen können, und es giebt auch eine nicht geringe Anzahl von ganz zuverlässigen Beobachtern, die diese Krankheit gesehen hat, dahin gehören *Wichmann*, *Lentin*, *Wiegand*, *Wendt*, *Hufeland*, *Heim*, *Formey*, *Gölis* etc. — In dem von mir beobachteten Fall schien der Krampf vorzugsweise in dem Kehlkopfe statt zu finden, wodurch die Krankheit allerdings einige Aehnlichkeit mit dem Croup erhielt; sie unterschied sich aber dadurch von demselben, dass sie vollständig intermittirte und die Anfälle unzweideutig das Gepräge des Krampfes hatten.

§. 1890.

Vorhersage. Das Asthma der Erwachsenen wird in den Anfällen selten lebensgefährlich, doch ist es schwer heilbar und es entwickeln sich leicht im Verlaufe der Zeit andere, zuletzt tödtlich werdende Brustleiden. Das Millarsche Asthma ist eine höchst gefährliche Krankheit und kann schon in den ersten Anfällen tödten.

§. 1891.

Behandlung *des Asthmas der Erwachsenen*. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen*. Insofern die Ursachen der asthmatischen Zufälle in dem Aufenthaltsort oder in dem Gewerbe des Kranken liegen, müssen diese verändert werden; ist die Krankheit von oxydirten

metallischen Substanzen veranlasst, so empfiehlt *Haase* den innerlichen Gebrauch der Schwefelleber mit Campher und das vorsichtige Einathmen von geschwefeltem Wasserstoffgas; der Kranke muss das Einathmen einer sehr kalten Luft, die Gemüthsbewegungen, Diätfehler etc. zu vermeiden suchen. Der Arzt muss aufs Genaueste untersuchen, ob nicht irgendwo im Körper ein Reitz liege, der die Krampfzufälle errege, und muss denselben zu beseitigen suchen.

§. 1892.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Ist es ganz sicher, dass die Beengungszufälle rein durch Lungenkrampf bedingt sind, wozu jedoch die genaueste Untersuchung des Kranken, insbesondere durch das Stethoscop, nothwendig ist, so ist sowohl während als ausserhalb des Anfalls die krampfstillende Methode angezeigt. Die kräftigsten Mittel sind ohne Zweifel, besonders um die Anfälle zu mässigen, Opium und Morphium aceticum, neben welchem man gerne schwarzen Kaffe trinken lässt, ferner das Extractum Lactucae virosae, das Lactucarium, Extr. Hyoscyami, die Nux vomica, die Digitalis, die Blausäure, die Belladonna, der Spiritus sulphurico aethereus, Naphtha vitrioli, Spirit. corn. cerv. succinat. und pyro-oleosus, Valeriana, Asa foetida, Moschus, die Ipecacuanha in kleinen Gaben, Zinkblumen, Brechmittel, auch stärkende Mittel, wie die China und Eisentinkturen. Hiermit kann man verbinden das von *Hegewisch* empfohlene vorsichtige Rauchen der getrockneten Blätter von Datura Strammonium, das Einziehen erweichender und narkotischer Dämpfe, krampfstillende Klystiere, Einreibungen von erwärmtem Fett, narkotische und flüchtige Einreibungen in den Hals, die Brust und zwischen die Schulterblätter, aromatische Bähungen, Bäder, reitzende Fussbäder, Senfteige, Blasenpflaster, Einreibungen der Brechweinsteinsalbe etc.

§. 1893.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* In den höchsten Graden der Erstickungsanfälle ist, wenn die angegebenen Mittel nicht ausreichen und besonders wenn eine Blutstockung damit verbunden ist, eine Aderlässe vorzunehmen. Zeigt sich nach den Anfällen eine Verschleimung der Lunge, so giebt man Salmiak, Goldschwefel, und bei sehr zähem Schleime und passivem Zustande die Meerzwiebel, das Gummi Ammoniacum etc.

§. 1894.

Gegen das Asthma der Kinder ist von *Millar* die Asa foetida empfohlen worden, von *Wichmann* der Moschus, welcher nunmehr von den meisten Aerzten als das Hauptmittel anerkannt wird und welchem gegen das Ende der Krankheit auch China zugesetzt werden soll, ausserdem das Opium, das Extractum Hyoscyami, der Goldschwefel, erweichende Bähungen, auf den Kehlkopf und die Brust gelegt, Senfteige und Blasenpflaster. — In dem von mir beobachteten Fall liess ich, da das Knäbchen sehr feist war, zuerst einige Blutegel auf die Brust setzen und gab ein abführendes Mittel, sodann gab ich Moschus und Opium, und als die Anfälle demungeachtet mit grosser Heftigkeit zurückkehrten, ein Brechmittel. Von diesem Augenblick war die Kraft der Anfälle gebrochen, worauf ich sodann bis zum völligen Verschwinden der Anfälle noch Moschus nehmen liess.

Der Keuchhusten.

(*Der blaue Husten, Stickhusten, Eselshusten, Schafshusten.*)

Butter (Lond. 1775, a. d. Engl. v. Scherf. Stend. 1782). — *Danz* (Marb. 1791). — *Jahn* (Rudolst. 1805). — *Hufeland* (Bemerk. üb. d natül. u. inocul. Blattern, verschiedene Kinderkrankh. u s. w.). — *Whatt* (Glasg. 1813). — *Marcus* (Bamberg u. Leipzig 1816). — *Desruelles* (Par. 1827, a. d. Franz. von v. dem Busch, Bremen 1828).

§. 1895.

Der Keuchhusten ist ein heftiger convulsivischer Husten, welcher von einem gedehnten, ebenfalls krampfhaften und mit einem eigenen, pfeifenden Tone begleitenden Einathmen unterbrochen wird und sich häufig unter Erbrechen endiget.

§. 1896.

Von dem Croup, dem Catarrh, der Bronchitis und der Lungenentzündung unterscheidet sich der Keuchhusten durch den heftigen, mit den Zufällen einer etwa zugleich vorhandenen Bronchitis durchaus in keinem Verhältniss stehenden, oft Erstickung drohenden Husten, durch den Krampf in den Respirations-Organen, welcher während der Anfälle bei dem Einathmen statt findet und sowohl durch den eigenthümlichen Ton, als auch durch die Abwesenheit des Respirationsgeräusches bei dem Einziehen der Luft erkannt wird, und durch die, neben dem Husten öfters vorkommenden, allgemeinen krampfhaften Affectionen.

§. 1897.

Verlauf der Krankheit. Man theilt den Verlauf der Krankheit gewöhnlich in drei Stadien ein, in das catarrhalische, das convulsivische und das Stadium des

Nachhustens oder der Abnahme, welche Abtheilungen jedoch weder durch eine plötzliche Umänderung der Symptome streng von einander getrennt sind, noch ein bestimmtes Zeitmaass haben.

Die Krankheit beginnt mit gewöhnlichen catarrhalischen Zufällen, welche oft nur einige Tage, oft aber auch zwei Wochen und länger andauern, ehe der Character des Keuchhustens deutlicher hervortritt, doch ist meistens schon in diesem Zeitraum der Husten etwas stärker und dabei trockener als beim gewöhnlichen Katarrh.

Es entwickelt sich nun immer mehr der convulsivische Husten. Der Anfall des Hustens zeigt sich gewöhnlich an durch ein eine kurze Zeit vorher eintretendes leichtes Schleimrasseln mit etwas erschwertem Athmen, die Kinder werden unruhig, sie zeigen einige Angst und aus ihrem Benehmen scheint hervorzugehen, dass sie einen Druck auf der Brust spüren. Sodann tritt der Anfall des heftigen Hustens ein, wobei die Kinder um sich greifen, sich zu halten suchen und den Oberleib vorwärts beugen. Die Exspirationen geschehen Stossweise, folgen äusserst schnell auf einander und sind ganz kurz, so dass zwischen ihnen keine Luft in die Lungenbläschen aufgenommen zu werden scheint, das Gesicht der Kinder wird dabei roth und bläulich, die Venen am Kopfe schwellen an und es tritt selbst manchmal Blut unter die Conjunctiva der Augen aus oder es fliesst Blut aus Mund und Nase; der Puls wird dabei unterdrückt, Hände und Füsse kalt, junge Kinder lassen gewöhnlich den Urin gehen, oft geht selbst der Husten in einen anhaltenden Lungenkrampf über, wobei Husten und Athem fehlt, welcher höchst ängstliche Zustand oft eine geraume Zeit andauert. Auf ein solches heftiges Husten folgt eine Bemühung des Einathmens, es scheint jedoch dabei ein Hinderniss im Larynx statt zu finden,

wodurch ein eigener, hoher, von Manchen dem Eselsgeschrei verglichener Ton hervorgebracht wird und die Luft verhindert wird, bis in die Luftzellchen in dem Umfange der Lunge einzudringen, was durch den in diesem Augenblick statt findenden gänzlichen Mangel des Respirationsgeräusches erkannt wird. Nach diesem unvollkommenen Einziehen der Luft in die Lunge stellt sich das heftige Husten von neuem ein, und so wechseln der Husten und die unvollkommenen Athmungsversuche mehrmals bis nach einer halben, einer ganzen oder mehrere Minuten der Anfall sich gewöhnlich unter Auswurf eines zähen Schleimes und oft auch unter Erbrechen endiget. Oft verbinden sich mit den Anfällen Zuckungen und Verdrehungen der Glieder.

§. 1898.

Solche Anfälle kehren oft nur einigemal am Tage zurück, kommen etwas häufiger in der Nacht, als am Tage vor, wiederholen sich aber oft auch jede halbe Stunde und werden insbesondere durch den Zorn der Kinder, aber auch durch starke Bewegungen des Körpers, durch den Genuss von Speisen und auch ohne alle äussere Ursachen hervorgebracht.

§. 1899.

Das Befinden der Kranken in der Zeit zwischen den Anfällen ist verschieden; bei manchen bemerkt man kein Unwohlsein, ihr Athem geht sehr leicht, hebt man das Ohr an die Brust der Kinder, so vernimmt man ein vollkommenes reines Respirationsgeräusch, das in der Regel nur kurze Zeit vor einem Anfalle etwas Schnarchen und Schleimrasseln zeigt, die Kinder haben keine Hitze, ihr Puls ist ruhig, sie haben Appetit, sie sind munter und gehen den Spielen nach, meistens bemerkt man zwischen hindurch einen leichten catarrhalischen Husten. Andere Kinder sind auch zwischen den Anfällen mehr oder weniger bedeutend krank, sie haben ihre Munter-

keit verloren und suchen den Schooss der Mutter oder liegen schwerer krank in dem Bette; ihr Auge ist trübe, sie haben Hitze in den Wangen, einen häufigen und schnellen Puls, und in den stärkern Fällen eine schnelle und kurze Respiration. Legt man das Ohr an die Brust der Kranken oder untersucht man mit dem Stethoscop, so hört man einen schnellen, starken, über die ganze Brust verbreiteten Herzschlag, das Respirationsgeräusch ist mit Pfeifen, Schnarchen und Schleimrasseln verbunden und in manchen Fällen hört man in irgend einem Theile der Lunge das knisternde Geräusch. — Oft ist im Anfange des Keuchhustens der zuerst beschriebene Zustand vorhanden und das bedeutendere und andauernde Lungenleiden entwickelt sich erst allmählig, oft aber fängt die Krankheit sogleich mit Hitze und der stärkern so eben beschriebenen Brustaffection an; diese aber steigert sich entweder auf einen hohen und Gefahr drohenden Grad oder verschwindet mit Hülfe der Kunst oder von selbst allmählig und hinterlässt sodann den einfachen Keuchhusten.

§. 1900.

Nachdem die Krankheit die grösste Höhe erreicht hat, nimmt sie allmählig und ohne offenbare Krisen wieder ab und geht sodann in einen einfachen Husten, den Nachhusten, über. War die Schleimhaut der Lunge stärker ergriffen oder selbst das Parenchym der Lunge entzündet, so tritt die Besserung nicht leicht ein, ohne dass Krisen, insbesondere Schweisse, sich einstellen. Oefters wird der Auswurf vollkommen eiterförmig, doch verliert er oft nach einiger Zeit dieses Aussehen und die Lunge erhält die gesunde Beschaffenheit wieder.

§. 1901.

Die Dauer der ganzen Krankheit ist nicht leicht kürzer, als acht Wochen, oft beträgt sie auch das doppelte und eine noch längere Zeit. Manchmal stellt sich, wenn

die Krankheit schon in dem Stadium des Nachhustens begriffen ist, besonders nach Verkältung, aber auch ohne alle erkennbare Ursache ein neuer heftiger Husten ein, welcher zuweilen mit einem bedeutenden und andauernden Leiden der Lunge verknüpft ist, oft aber auch in wenigen Tagen gefahrlos vorübergeht.

§. 1902.

Der Tod wird durch diese Krankheit vorzüglich auf zweierlei Wegen herbeigeführt. a) Manchmal brechen während heftiger Anfälle des Krampfhustens tödtlich werdende Gichter aus, wovon zum Theil die Ursache in der durch den gehemmten Athem bedingten Blutüberfüllung im Gehirne liegen mag; doch scheinen mir auch diese Zuckungen ohne Theilnahme des Gehirns durch starkes Ergriffensein des Nervensystems entstehen zu können; auch habe ich beobachtet, dass der Husten ausblieb und, ohne dass narcotica gebraucht worden waren oder eine andere Veranlassung statt fand, tödtliche Gichter sich einstellten. b) Durch Luftröhrenentzündung oder Blutüberfüllung und wirkliche Entzündung der Lunge, durch welche die Kranken entweder noch während des Verlaufs des Keuchhustens oder längst nach Beendigung desselben durch Auszehrung hinweggerafft werden, wobei auch manchmal bei scrophulösen Kindern zugleich Tuberkeln in der Lunge sich bilden. Seltener stirbt ein Kind während des Anfalls durch wirkliche Erstickung oder durch Schlagfluss oder einen Blutsturz. Ueber die übrigen Ursachen des Todes, die denselben erst späterhin herbeiführen, vergleiche den Paragraphen über die Nachkrankheiten des Keuchhustens.

§. 1903.

Der Keuchhusten hinterlässt oft langwierige Lungenbeschwerden, Aneurysmen des Herzens und der Aorta, Kröpfe, Gehirnaffectionen, Schwäche des Gedächtnisses und des Verstandes, Epilepsie, Brüche und Vorfälle.

§. 1904.

Bei mehrern **Leichenöffnungen** habe ich, in Uebereinstimmung mit den Beobachtungen Anderer, die Schleimhaut der Lunge, der Luftröhre und des Kehlkopfes theilweise entzündet gefunden, das Gewebe der Lunge mit Blut überfüllt und hepatisirt, pleuritisches Extravasat in der Brusthöhle, das Brustfell mit einer falschen Membran, wie nach der Pleuritis, überzogen und in einem Falle den Theil desselben, welcher die Brustwandung umzieht, auf seiner rauhen Seite mit einzeln stehenden, fast das Bild eines Ausschlags darstellenden Eiterpunkten besäet, wobei die kleinen Ansammlungen von Eiter in Kapseln eingeschlossen waren, welche denen in erweichten Tuberkeln ähnlich waren. *Autenrieth* fand in einem Falle weder in den Lungen, noch am Herzen und dem Brustfell eine Spur von Entzündung, dagegen die herumschweifenden Nerven, so wie auch die grossen sympathischen Nerven mit ihren Ganglien innerhalb der Brusthöhle entzündet. *Holzhausen* und *Clarus* fanden bei einem am Keuchhusten gestorbenen Knaben die Zwerchfellsnerven lockerer und nach unten zu etwas angeschwollen, die Stämme des Nervi vagi ebenfalls dicker, lockerer und breiter, als im natürlichen Zustande, den Sympathicus magnus und die von ihm entspringenden Splanchnici, besonders letztere von festerer Consistenz als sonst, und den Plexus coeliacus fester als gewöhnlich und etwas aufgetrieben.

§. 1905.

Ursachen. Es haben zum Keuchhusten vorzüglich Individuen vom kindlichen Alter Anlage, bei Erwachsenen kommt jedoch die Krankheit in höchst seltenen Fällen ebenfalls vor und man bemerkt auch zuweilen, dass einzelne Erwachsene von einem starken Husten befallen werden, wenn der Keuchhusten unter den Kindern herrscht. Die Anlage wird in der Regel durch die Krankheit selbst getilgt.

Der Keuchhusten herrscht immer als Epidemie, die Ursache davon ist jedoch nicht genügend bekannt; *Wendt* hält dieselbe für ein Miasma, das mit dem, wodurch die Masern veranlasst werden, nahe verwandt ist, indem Masern- und Keuchhusten Epidemien oft mit einander abwechseln. Ueber die Ansteckungsfähigkeit des Keuchhustens wird noch fortwährend gestritten, für dieselbe erklären sich *Rosenstein*, *Cullen*, *Schäffer*, *Autenrieth*, *Jahn*, *Henke* u. a., gegen dieselbe *Stoll*, *Danz*, *Sprengel*, *Wendt* u. a., und es werden für beide Meinungen gewichtige Gründe angeführt. Dafür: dass die Krankheit, ähnlich den contagiösen Fiebern, eine gewisse nothwendige Dauer habe, dass sie dasselbe Subject nur einmal befalle, dass gewöhnlich mehrere Kinder in einer Familie von dem Keuchhusten befallen werden, wenn er einmal eines ergriffen hat; Gründe dagegen: die Krankheit zeige grosse Verschiedenheiten von den contagiösen Krankheiten, insbesondere bemerke man nicht, wie bei jenen, Blüthen oder Semina in Hautausschlägen und Geschwüren, wodurch sich die Krankheit fortflanze, sie sei eine reine Nervenkrankheit und diese sei nie ansteckend, das gleichzeitige Befallenwerden mehrerer Kinder in einer Familie lasse sich auch durch ein Miasma erklären. — Mir scheint, nach vielfältigen Beobachtungen, die Krankheit Ansteckungsfähigkeit zu besitzen. Zwar kann ich eine solche einer reinen Nervenkrankheit nicht zuschreiben, doch lässt sich denken, dass, wie in der Hundswuth, ausser den Nervenzufällen andere Krankheitsvorgänge statt finden, an denen das Blut einen unmittelbaren Theil nimmt und welche wahrscheinlich in den Capillargefässen des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Luftröhrenäste ihren vorzüglichen Sitz haben. Vielleicht werden die Nerven der Lunge nur secundär, durch die specifische Reitzung der Schleimhaut der Lunge ergriffen.

§. 1906.

Wesen. Bei dem Keuchhusten ist stets die Schleimhaut der Bronchien in geringerm oder in stärkerm Grade ergriffen, indem auch in den leichtesten Fällen der Krankheit doch wenigstens eine veränderte Secretion wahrgenommen wird, oft spricht sich eine wirkliche Bronchitis durch die deutlichsten Zeichen aus, und manchmal ist selbst Pneumonie vorhanden, die Leichenöffnungen zeigen auch die Schleimhaut der Bronchien geröthet und öfters auch die Lungensubstanz entzündet. Diese Umstände sprechen für die Ansicht *Whatts*, *Marcus* und Anderer, welche den Keuchhusten für eine Bronchitis erklären. — Dieser Ansicht steht die von *Hufeland*, *Jahn* und Anderen, dass die Krankheit eine Nervenaffection, namentlich des nervus vagus mit den von ihm und den sympathischen Nerven gebildeten Lungengeflechten und des Nervus phrenicus sei, gegenüber. Diese Ansicht scheint auch wenigstens darin die richtigere zu sein, dass der Keuchhusten nicht blos eine einfache Bronchitis oder blos ein catarrhalisches Leiden der Lungenschleimhaut sei, sondern immer zugleich in einem heftigen und wie es scheint eigenthümlichen Nervenleiden bestehe, denn die Bronchitis und die Pneumonie der Kinder sind nur dann, wenn sie in einer Epidemie des Keuchhustens vorkommen, von den Symptomen des Keuchhustens begleitet, bieten aber, wenn sie sporadisch erscheinen, ein von dieser Krankheit sehr verschiedenes Krankheitsbild dar, und bei dem Keuchhusten sind auf der andern Seite häufig die der Bronchitis eigenen Zufälle nicht deutlich ausgesprochen, dagegen deuten die wesentlichen Erscheinungen der Krankheit, der convulsivische Husten, der krampfhafte Zustand bei den Inspirationen, der öfters vorkommende Lungenkrampf und die manchmal vor oder statt der Anfälle des Hustens

sich einstellenden allgemeinen Krämpfe unverkennbar auf ein Nervenleiden hin.

Hufeland sucht das Wesen des Keuchhustens auf folgende Weise zu erklären: Der Keuchhusten entsteht durch einen eigenthümlichen Nervenreitz, der vorzüglich in dem herumschweifenden und Zwerchfellsnerven, so wie in den von dem erstern und den sympathischen Nerven gebildeten Lungen- und Magengeflechten stattfindet. Dieser Reitz bringt zunächst das stossweise erfolgende convulsivische Husten hervor. Die gestörte Wirkung des Zwerchfellsnerven zeigt sich insbesondere durch eine das pfeifende Einathmen hervorbringende Zusammenschnürung der Stimmritze, welche von diesen Nerven mit mehreren Zweigen versehen wird. Der regelmässige Antagonismus zwischen den Bewegungen des Ein- und Ausathmens, oder vielmehr zwischen der Wirkung des herumschweifenden und des Zwerchfellsnervens wird aufgehoben; diese Nerven bringen krampfhafte und unordentliche Bewegungen in den Lungen, wie in dem Zwerchfelle, hervor, und ist diese unregelmässige Thätigkeit aufs Höchste gestiegen, so wird sich die krampferregende Wirkung des herumschweifenden Nervens auch bis auf den Magen erstrecken, und in diesem eine Zusammenziehung und Erbrechen erregen, mit welchem der Reitz von den Lungen abgeleitet und der Anfall beendiget wird. Das Erbrechen ist daher als eine dem Lungenkrampf entgegengesetzte Convulsion zu betrachten, es erfolgt aber erst dann, wenn der Krampf einen höhern Grad erreicht und die abnorme Thätigkeit der Lungennerven auch das Magengeflecht in Mitleidenschaft zieht, oder vielmehr sich auf dasselbe fortpflanzt.

Durch diese Annahmen sind die meisten Zufälle des Keuchhustens erklärt, doch ist nicht angegeben, worin der Reitz bestehe, der auf die Nerven wirkt, und es sind noch zwei Erscheinungen da, welche durch eine

einfache Nervenreitzung nicht erklärt werden können. Es ist dieses die Dauer der Krankheit, welche nicht wie die der andern Krampfkrankheiten oder die der schmerzhaften Krankheiten von Zufälligkeiten abhängt, sondern ähnlich den contagiösen Fiebern durch einen innern Vorgang, welcher niemals unter einer gewissen Zeit vollendet wird, bedingt zu sein scheint, und die Ansteckungsfähigkeit des Keuchhustens. Es ist die Erklärung dieser Erscheinung um so schwieriger, als die Hauptzufälle des Keuchhustens nicht wie die Prozesse in den contagiösen Fiebern zwischen Nerven und Blut, sondern lediglich in dem Nervensysteme statt finden; es lässt sich aber wohl annehmen, dass der krankhafte Prozess, welcher zu seiner Beendigung eine bestimmte Dauer erfordert und wodurch ein Contagium sich entwickelt, in den Capillargefässen der Lunge vorgehe, und die Affectionen, welche von den Nervenstämmen ausgehen, nur Begleiter jener Krankheit seien. — *Autenrieth* glaubt, dem Keuchhusten liege ein materielles Substrat, eine pathische Schärfe zum Grunde, *Harless* hält denselben für eine exanthematische Infection der innern Membran der Bronchialäste und ihrer Nerven. [1])

§. 1907.

Die Vorhersage hängt vorzüglich ab von dem Zustand der Lunge in der Zeit zwischen den Hustenanfällen, ferner von der Heftigkeit der Anfälle, von dem Vorhandensein oder dem Mangel allgemeiner Zuckungen, von dem Alter der Kindes, indem die Krankheit bei ganz jungen Kindern gefährlicher ist, als bei solchen von mehreren Jahren, von der Constitution des Kranken, indem die Krankheit bei den Kindern, welche sehr schwächlich sind und an Scropheln, Rhachitis oder

1) System I. 107.

Atrophie leiden, am leichtesten tödtlich wird, und von dem Character der Epidemie.

§. 1908.

Behandlung des Keuchhustens. Da es nach meinen bisherigen Erfahrungen keine Behandlungsweise giebt, wodurch der Keuchhusten in seinem Verlaufe unterbrochen und beseitigt werden kann, und da in den gewöhnlichen Fällen die Natur die Krankheit von selbst heilt, so beschränke ich die Behandlung darauf, die Zufälle zu beseitigen oder zu mässigen, durch welche der Tod herbeigeführt werden kann.

In den ganz leichten Fällen ist es genügend, die kranken Kinder warm zu kleiden, insbesondere Brust und Füsse und sie vor einer rauhen Luft zu schützen; auch ist es gut, ihnen leichte, besänftigende und den Schleim lösende Dinge zu geben, warmes Zuckerwasser, insbesondere mit Kandiszucker, eine Abkochung von Eibischwurzel mit Süssholz, einen Thee von den Species ad infusum pectorale Ph. B., Brustsäftchen von Syrupus Atthaeae, Liquiritiae, Capillorum Veneris, Gerstenzucker, Süssholzsaft, bei etwas stärkerm Krampfhusten, die Trochisci Ipecacuanhae oder auch ein Infusum Ipecacuanhae 4 — 6 Grane auf 2 Uncen Wasser und 1 Unce Syrup, Kaffelöffelvollweise zu nehmen. Zugleich können Einreibungen von erwärmtem Schmalz in die Brust, das Tragen von Opiatpflaster mit Kampfer auf der Brust und andere äusserliche besänftigende Mittel zu Hülfe gezogen werden. Dabei kann man auch leichte Ableitungsmittel, insbesondere Fussbäder, anwenden, wozu *Wendt* den Zusatz des 7ten Theiles scharfen Essigs empfiehlt, allgemeine Bäder etc.

Die Behandlung der schwererern Fälle von Keuchhusten besteht vorzugsweise:

a) In der Mässigung der heftigen krampfhaften Nervenaffection. Es ist hier, nach meinen Erfahrungen,

das Opium das vorzüglichste Mittel, welches nicht allein den Husten sehr mässigt, sondern die allgemeinen Zuckungen aufzuheben und zu verhüten vermag, wenn sie nämlich nicht von einem Gehirnleiden, dem in seltenen Fällen hinzukommenden Hydrocephalus acutus, entspringen. Ich gebe das Opium auch den jüngsten Kindern und zwar diesen mit der Vorsicht, dass ich ihnen das Mixtürchen selbst bereite, indem ich einen Tropfen Tinctura thebaica mit 6 oder 4 Kaffelöffel voll Zuckerwasser verdünne und von diesem zuerst einen, und wenn keine Wirkung sichtbar wird, zwei Kaffelöffel voll gebe. Oft ist eine solche Dosis zur Milderung der Zufälle hinreichend, wo sodann an demselben Tage keine weitere Gabe dieses Mittels gereicht wird, oft müssen mehrere solche Dosen in einem Tage gegeben werden, jedoch immer nur in Zwischenräumen von wenigstens zwei Stunden, und es muss die Darreichung des Opiums sogleich unterbrochen werden, wenn sich eine grosse Neigung zum Schlafe zeigt. Oft genügt es, nur an einem Tage, an welchem gerade heftigere Krampfzufälle eintreten, das Opium zu geben, oft ist es nothwendig, dasselbe eine längere Zeit fortzusetzen, doch muss man Kindern unter drei Jahren nicht leicht mehr als 2 — 3 Tropfen an einem Tage reichen und dabei beständig den Leib durch Klystiere oder innerliche Mittel offen erhalten. Kindern über drei Jahren können etwas grössere Dosen gegeben werden. Bei dieser vorsichtigen Anwendungsart des Opiums habe ich oft die herrliche Wirkung dieses grossen Mittels gesehen und niemals ist ein Unglück durch dasselbe herbeigeführt worden.

b) Es sind in den schwerern Fällen die krankhaften Veränderungen, welche sich in der Schleimhaut oder dem Parenchym der Lunge oder dem Brustfell auszubilden anfangen, zu bekämpfen. Die Veränderungen beginnen meistens mit Entzündung, welche sowohl gleich

im Anfange des Keuchhustens vorhanden sein kann, als auch, nach meinen Erfahrungen in den häufigern Fällen, sich erst während des Verlaufes des Keuchhustens entwickelt. Man hat daher die Kranken täglich genau mit dem Ohr oder vermittelst des Stethoscops zu untersuchen und sobald man hierdurch, so wie durch die übrigen Zeichen, die Entzündung in einem der genannten Theile erkennt, die antiphlogistische Methode eintreten zu lassen. Man setzt Blutegel, giebt kühlende Salze, verdünnte Säuren, späterhin Salmiak, oder wendet den Tartarus emeticus an. Oft ist es nothwendig, mit der antiphlogistischen die krampfstillende Methode zu verbinden; man kann daher den Tartarus emeticus, in Verbindung mit Opium, geben. Ist die entzündliche Affection beseitiget, so setzt man mit diesen Mitteln wieder aus und behandelt die Krankheit wie den leichtern Grad des Keuchhustens.

In den Fällen, in welchen sich in dem Lungengewebe Veränderungen auszubilden drohen, jedoch nicht bei einer wirklich ausgebildeten Pneumonie, so wie auch in den Fällen von heftigem und hartnäckigem Krampfhusten, wende ich auch die stärkern Ableitungsmittel auf die Haut, nämlich die von *Autenrieth* empfohlene Brechweinsteinsalbe an, welche, nach der Pharmacopoea borussica, aus 1 Theile Brechweinstein und 2 Theilen Schweinefett besteht, aber hinreichend stark ist, wenn auf eine Unce Fett 2½ Drachmen Tartarus emeticus genommen werden. Die Salbe wird dreimal täglich in die Herzgrube eingerieben und damit fortgefahren, bis die entstehenden Pusteln sich in Geschwüre verwandeln. Gewöhnlich muss diese Behandlung 8 – 12 Tage fortgesetzt werden, wobei man die Salbe immer an den weniger stark mit Pusteln besetzten Stellen einreiben lässt. Heilen die Pusteln und Geschwüre nicht von selbst,

so lässt man dieselben mit einer Abkochung von Schierlingskraut bähen.

§. 1909.

Ausser den beiden angegebenen Verhältnissen, welche in der Behandlung des Keuchhustens vorzugsweise berücksichtiget werden müssen, hat man auch auf die Kräften der Kranken Rücksicht zu nehmen. Liegt die Reaction des Körpers sehr darnieder, so ist es oft nothwendig, erregende Mittel anzuwenden, einen Aufguss der Senega, der Arnica, etwas Kampher, die versüssten Säuren oder auch die China. — Endlich müssen auch frühzeitig gegen die sich entwickelnden Nachkrankheiten des Keuchhustens die geeigneten Mittel angewandt werden, z. B. gegen das sich bildende pleuritische Extravasat und die allgemeine Wassersucht die Digitalis und andere gegen Hydrops wirksame Mittel.

§. 1910.

Unter den vielfachen, gegen den Keuchhusten als specifisch gerühmten Mitteln verdienen folgende erwähnt zu werden: Narcotische Mittel, wie die von *Schäffer, Jahn, Ettmüller, Wiedemann* und *Wetzler* empfohlene Belladonna; nach *Schäffer* 4 — 8jährigen Kindern täglich 2 — 2 ½ Gran der Wurzel der Belladonna, bis Trockenheit im Halse und Verdunklung des Gesichtes erfolgt (ist gefährlich), nach *Henke* ½ — 1 Gran der Wurzel, mit ebensoviel Goldschwefel, nach *Wendt* aber nur 1/48 Gran des Extractes einem Kinde unter 4 Jahren täglich 3 — 4mal und 1/96 Gran bei noch jüngern Kindern. — *Störk* und *Butter* empfehlen das Conium, — *Hufeland* Hyoscyamus, einem Kinde von 1 Jahre täglich 2 Grane des Extractes, — *Löbel* das Extract der Pulsatilla nigricans zu ⅛ — ½ Gr. täglich dreimal, mit Zusatz von 2 — 4 Gr. Baldrianpulver, — *Hufeland* und *Thilesius* das Extractum Nicotianae, — *Memminger* die von *Stütz* gegen Tetanus empfohlene Methode. — Das

Opium ist vielfältig empfohlen worden, in Verbindung mit der Ipecacuanha, mit dem Tartarus emeticus und von *Henke* mit der China. — Ferner nicht narcotische, krampfstillende Mittel. Hieher gehören die Zinkblumen, die Asa foetida, die Ipecacuanha, von *Hufeland* empfohlen, der Spiritus Salis dulcis, nach *Werlhof* 1 Theil auf 8 Theile Syrup, alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll (ist für ein sehr junges Kind wohl zu stark), der Moschus von *Home*, *Hufeland* u. a. empfohlen zu ½ bis einem ganzen Grane. — Ferner auflösende Mittel. — Nach *Horst* der Schwefel zu 4 — 10 Gr. dreimal täglich. — Auf die Nieren ableitende Mittel, die von *Lettsom* und *Armstrong* empfohlene Canthariden. — *Thiel* hat die Salzsäure zu 2 — 3 Drachmen im Tage in Aqua und Syrupus Rubi Idaei, — *Rosenstein*, *Löbenstein Löbel* u. a. haben die China gerühmt.

Unter den äusserlichen Mitteln müssen erwähnt werden: Senfteige, Blasenpflaster, Fontanelle, die Brechweinsteinsalbe, welche *Autenrieth* nach der oben angegebenen Methode ohne innerliche Mittel anwendet, Fussbäder, allgemeine Bäder, Einreibungen von Unguentum nervinum, Linimentum volatile, Cajeputöl etc.

Das nervöse Herzklopfen.

(*Palpitatio cordis nervosa.*)

Die B. I. S. 466 angegebenen Schriftsteller über die Krankheiten des Herzens. — *Laennec* (de l'auscult. méd.).

§. 1911.

Das nervöse Herzklopfen sind die vermehrten und unordentlichen Herzbewegungen, welche anfallsweise

sich einstellen und allein durch eine Affection des Nervensystems hervorgebracht sind.

§. 1912.

Es stellen sich bei dieser Krankheit meistens auf äussere Einflüsse, insbesondere Gemüthsbewegungen, mehr oder weniger heftige Anfälle von Herzklopfen, die in beschleunigtem Rhythmus, verstärktem Stoss und etwas vermehrtem Geräusch bestehen, ein, wobei aber der Umfang des Herzschlages nicht vermehrt ist, die Percussion einen guten Ton giebt und das Feilengeräusch und Katzenschnurren, welche bei organischen Fehlern des Herzens, z. B. Verknöcherung der Klappen, vorkommen, fehlen; doch giebt es auch einen krampfhaften Zustand des Herzens, in welchem diese Geräusche oder wenigstens das Blasbalggeräusch, wahrgenommen werden. Meistens ist bei dem nervösen Herzklopfen kein oder wenigstens kein so bedeutendes Gefühl von Beengung und Angst vorhanden, wie bei manchen organischen Herzfehlern, bei welchen mehr oder weniger der Blutlauf gehemmt ist. In der Zeit zwischen den Anfällen ist der Herzschlag ganz normal, wodurch ebenfalls das nervöse Herzklopfen sich von den organischen Herzfehlern unterscheidet, wiewohl bei dem oben erwähnten krampfhaften Zustand des Herzens, der mit dem Blasbalggeräusch und zuweilen mit dem Katzenschnurren verbunden ist, manchmal die erwähnten Geräusche mehr anhaltend vorkommen sollen, wobei aber doch wohl meistens sich ein organischer Fehler, namentlich Erweiterung der Ventrikel, zu entwickeln beginnen möchte. — Oft dauert die Krankheit viele Jahre und hat bei so langer Dauer zuweilen Anevrysma und Hypertrophie des Herzens zur Folge.

§. 1913.

Anlage haben sehr reitzbare, nervenschwache Personen, insbesondere Hysterische und Hypochondristen

und solche, bei welchen das Nervensystem durch Onanie geschwächt ist. Gelegenheitsursachen sind vorzüglich Gemüthsbewegungen, insbesondere Schrecken.

§. 1914.

Vorhersage. Der Anfall verschwindet, nach vorübergegangener äusserer Ursache, schnell wieder und wird nur in höchst seltenen Fällen, z. B. bei sehr heftigem Schrecken, tödtlich. Auch die besondere Anlage zu diesem Leiden verliert sich meistens mit dem Eintritt des gesetztern Alters wieder. Eine lange Dauer der Krankheit kann, wie schon bemerkt wurde, organische Fehler des Herzens veranlassen.

§. 1915.

Behandlung. Was die Entfernung der Ursachen betrifft, so ist die psychische Behandlung des Kranken von Wichtigkeit. Bei entkräfteten und nervenschwachen Personen müssen oft China und Eisen in Gebrauch gezogen werden. — Zur Beruhigung der abnormen Herzthätigkeit dienen lauwarme Bäder, Fussbäder, die Digitalis, Blausäure, auch Salpeter, verdünnte Mineralsäuren etc. Ist mehr andauernd eine abnorme Herzthätigkeit zu bemerken, namentlich durch das Blasbalggeräusch, so hat man die Krankheit wie ein beginnendes Anevrysma und Hypertrophie des Herzens zu behandeln.

Der Schluchzen.

(*Singultus.*)

Brüning (lat. Traject. 1758).

§. 1916.

Der Schluchzen ist ein unwillkürliches, schnelles und kurzes, mit einem schallenden Geräusch in dem Kehlkopfe verbundenes Einathmen, welches in Zwischenräumen von wenigen Secunden wiederkehrt, oft nur einige Augenblicke, oft aber auch Tage und Wochen hindurch fortdauert und für sich nicht leicht gefährlich wird, doch hat es, wenn es sehr lange dauert, zuweilen Ohnmachten und Erbrechen zur Folge, und kommt oft in Begleitung von schweren Krankheiten vor.

§. 1917.

Ursachen: Schnelles Schlucken von kaltem Getränke, von einem grossen Bissen, Verkältung, gastrische Stoffe, grosse Aufblähung des Unterleibes bei der Tympanitis, in bösartigen Fiebern etc., ein hoher Grad von Bauchwassersucht, Entzündung und Brand des Zwerchfelles, des Magens oder der Gedärme, Eindruck des schwertförmigen Knorpels, Bruch einer Rippe, Kopfverletzungen, Verletzungen des Rückenmarkes etc.

§. 1918.

Für das Wesen des Schluchzens sieht man eine schnelle, krampfhafte Zusammenziehung des Zwerchfells mit krampfhafter Verengerung der Stimmritze an.

§. 1919.

Behandlung. Nebst der Beseitigung der Ursachen dienen in den gewöhnlichen leichtern Fällen das Anhalten des Athems, Ablenken der Aufmerksamkeit, die

Erregung einer plötzlichen Gemüthsbewegung, z. B. durch leichtes Erschrecken, das feste Anlegen einer Binde um die Brust; in den schwerern Fällen Einreibungen von Opiatsalben und andern besänftigenden Mitteln, warme Bäder, Klystiere, Senfteige, Blasenpflaster und der innerliche Gebrauch krampfstillender Mittel, insbesondere des Opiums.

Das Erbrechen.
(*Vomitus.*)

Wichmann (Ideen z. Diagnost.). — *Magendie* (a. d. Franz. v. Dittmar. Brem. 1814).

§. 1920.

Das **Erbrechen** ist die unwillkürliche, unter Begleitung von Uebelsein und mit Heftigkeit erfolgende Entleerung der im Magen befindlichen Stoffe durch den Schlund, den Mund und die Nase.

§. 1921.

Meistens geht dem Erbrechen die Empfindung von Uebelkeit vorher, der Kranke muss viel ausspeien, die Lippen und die Haut an dem Kinne zittern beim Sprechen, das Gesicht wird blass, der Kranke fühlt sich sehr schwach, endlich kommen Anstrengungen zum Erbrechen (Vomituritiones) und oft auch Würgen hinzu, und es werden nun, oft aber auch ohne dass die zuletzt genannten Vorläufer sich eingestellt haben, die im Magen enthaltenen Stoffe oft in grossem Strahl durch den Mund und zum Theil durch die Nase ausgestossen. Zuerst werden gewöhnlich die Speisen ausgeleert, bei

wiederholtem Erbrechen aber nur etwas Magensaft und Galle und zuweilen selbst etwas Blut. Der Kranke ist dabei sehr angegriffen, entweder roth von der Anstrengung oder blass und mit kaltem Schweisse bedeckt, er fühlt sich äusserst schwach und zittert selbst mit den Gliedern.

Nach dem Erbrechen fühlt sich der Kranke erleichtert, und meistens geht das Erbrechen schon nach dem ersten oder nach einigen Anfällen vorüber, besonders wenn durch das Erbrechen selbst die Ursache desselben (fehlerhafte Stoffe im Magen) entfernt wird, bei sehr heftigen Anstrengungen und bei sehr häufigen Wiederholungen hat das Erbrechen aber auch zuweilen Congestionen und Blutungen, Abortus, Bruch, Vorfall der Gebärmutter und Erschöpfung der Kräfte zur Folge.

§. 1922.

Ursachen des Erbrechens sind zum Theil Stoffe im Magen, welche denselben zur antiperistaltischen Bewegung reitzen, wie Ueberladung mit Speisen und Getränken (Vomitus heluonum, Vom. a crapula), Stoffe, gegen welche eine Ideosynkrasie vorhanden ist, Gifte, Brechmittel, Galle, eine grosse Menge sauren Magensaftes etc.; zum Theil rein erhöhte Sensibilität (Vomitus nervosus), oft Entzündung des Magens oder Geschwüre oder Verhärtungen in demselben, so wie auch Druck auf den Magen durch Geschwulst und Verhärtung der Leber, die durch die Schwangerschaft ausgedehnte Gebärmutter etc., ferner auf den Magen fortgepflanzte antiperistaltische Bewegung wegen Verstopfung, Volvulus oder Umschlingung der Gedärme, einen eingeklemmten Bruch etc., consensuelle Erregung des Magens bei Gehirnentzündung, Kopfverletzungen, dem Schwindel, im Anfange der Schwangerschaft etc., so wie auch allgemeine Affectionen des Nervensystems, wie z. B. bei der unordentlichen Bewegung und der Erschütterung des

Körpers bei dem Fahren im Wagen und auf dem Meere. *)

§. 1923.

Vorhersage. Das Erbrechen wird selten für sich tödtlich, begleitet aber häufig sehr gefährliche Krankheiten.

§. 1924.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Ist das Erbrechen durch Stoffe im Magen hervorgebracht, so darf man es, so lange noch solche entleert werden, nicht stillen, und muss es selbst zuweilen, wenn die Natur dasselbe nicht gehörig zu Stande bringt, befördern, so wie man auch die Stoffe, die oft nicht gänzlich entleert werden können, einzuhüllen und zu neutralisiren sucht. **) Es dürfen nur die Speisen genossen werden, die der Magen verträgt. Oft ist es nothwendig, Oeffnung zu bewirken oder einen eingeklemmten Bruch zu operiren. Bei dem Fahren auf dem Meere ist es zuträglich, andauernd eine Rückenlage auf einem feststehenden Ruhebette, besonders auf dem Verdecke beizubehalten etc.

*) Die Seekrankheit (Vomitus marinus) ist eigentlich nur ein Erbrechen, welches oft sehr heftig ist, meistens aufhört, so wie das Schiff verlassen wird oder die Bewegung der Wellen ruhiger wird, so wie auch meistens bei der Gewöhnung an das Seefahren, daher in der Regel nach wenigen Tagen, wiewohl es auch längere Seefahrten hindurch mit einzelnen Unterbrechungen fortdauern kann. — Schriftsteller sind: *Ludwig* (Diss. Lpz. 1758). — *Autenrieth* (Hufelands Journ. B. 2.). — *Miller* (Albers amerik. Annal. Th. 1.). — *Wollaston* (Gilberts Annal. d. Physik. 1812). — *Larrey* (Mem. de Chirurgie milit., übersetzt v. Engelmann. Lpz. 1813) — *Keraudren* (Hufelands Journ. 1814).

**) Vergl. das Kapitel über die Vergiftungen.

§. 1925.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die krampfhafte, antiperistaltische Bewegung zu hemmen, werden mit Vortheil gebraucht: das Opium, der Riveri'sche Trank (Nro. 60) oder das Brausepulver (Nro. 61), so wie ein durch Zucker zu starkem Musiren gebrachtes kohlensaures Wasser und der Champagner, die versüssten Säuren, namentlich die Hoffmännischen Tropfen, die Naphthen, insbesondere die Essignaphthe, Chamillen, Melissen, Pfeffermünze, Zimmt in Theeform oder der Form von Oelzuckern, etwas warmer Wein, so wie auch frisch gemolkene Milch, kaltes Wasser und äusserliche Mittel, ein erwärmter Deckel, das Emplastrum opiatum oder Empl. aromaticum mit Kampher auf die Magengegend gelegt, desgleichen ein in Kirschenwasser getauchtes dickes Papier, aromatische und weinigte Umschläge, Einreibungen von aromatischen Geistern, mit Oleum Caryophyllorum oder Ammonium causticum oder von dem flüchtigen Linimente, der Opiumtinctur etc. in die Magengegend, und auch Senfteige oder Blasenpflaster auf dieselbe gelegt, aromatische und krampfstillende Klystiere etc. — Um das Erbrechen zu verhüten, z. B. bei dem Fahren im Wagen und auf dem Meere, ist es sehr zuträglich, erregend auf die Thätigkeit des Magens durch kräftig erregende Getränke und Speisen zu wirken, z. B. durch rothen Wein und etwas gesalzenes Fleisch (Schinken); auch dienen, besonders bei dem chronischen Erbrechen, zu demselben Zwecke die aromatisch-bittern Mittel.

Der Starrkrampf.

(*Tetanus.*)

Ackermann (lat. Goett. 1775, deutsch. Nürnb. 1778). — *Trnka de Krzowitz* (lat. Wien 1777). — *Stark* (lat. Jena 1781). — *Theden* (neue Bemerkungen und Erfahrungen. Berl 1782). — *Bilguer* (Berl. 1791). — *Mursinna* (neue med. chirurg. Beobacht. Berlin 1796). — *Rush* (Samml. auserles. Abhandl. B. 2.). — *Fournier de Pescay* (Par. 1803). — *Stütz* (Stuttg. 1804). — *Larrey* (Mém. de Chirurgie milit. vol. 1 u 3.). — *Walther* (Abhandl. Thl. 1.). — *Bergamaschi* (Pavia 1820). — *Beck* (Heidelberg. klin. Annal. Bd. 1.). — *Pelletier* (Revue méd. 1827).

§. 1926.

Der **Starrkrampf** ist der Krampf in dem ganzen Körper oder in einzelnen Theilen, bei welchem die ergriffenen Theile steif und unbeweglich sind.

§. 1927.

Geht der Starrkrampf von einer Wunde aus, so empfindet der Kranke meistens zuerst ein schmerzhaftes Ziehen von der verwundeten Stelle aus nach dem Verlaufe der Nerven, wozu sich sodann eine Spannung im Nacken und die übrigen Erscheinungen des Starrkrampfes hinzugesellen.

Gewöhnlich geben sich die ersten Spuren des Starrkrampfes durch ein erschwertes Schlingen zu erkennen, wobei die Kiefer nicht gehörig von einander gebracht werden können und der Kranke mit dem Unterkiefer eine Art kauende Bewegung macht, ferner durch eine veränderte Stimme, eine bleibende Verziehung im Gesichte und ein spannendes Gefühl im Nacken, wobei oft ziehende Schmerzen im ganzen Körper vorhanden sind. Sodann wird die untere Kinnlade fest an die obere gepresst, so dass der Mund nicht geöffnet werden kann (Trismus),

wobei die Kaumuskeln oft gespannt und aufgeschwollen sind und schmerzen, der Mund ist zusammengezogen und geschlossen, die Pupille meistens verengt und Lichtscheue vorhanden, die Augäpfel sind meistens verdreht. Oft wird der ganze Körper steif und grad ausgestreckt (Tetanus im engsten Sinne des Wortes), oft ist der Rumpf rückwärts gebogen, und zwar oft in der Art, dass der Kranke nur an den Absätzen und dem Kopfe aufliegt und der übrige Körper hohl liegt (Opisthotonus), in seltenern Fällen ist der Körper in einem Halbzirkel nach vorne gebogen (Emprosthotonus) oder seitwärts gekrümmt (Pleurothotonus). Hiebei ist der Unterleib gewöhnlich hart und einwärts gezogen, der Stuhlgang und Harn zurückgehalten, die Wärme und der Puls sind oft unverändert, oft ist der Puls aber beschleunigt, zuweilen auch seltener als gewöhnlich und aussetzend, das Athmen bleibt lange unverletzt, meistens wird es aber späterhin keuchend und es stellt sich von Zeit zu Zeit ein eigenthümlicher Krampf unter dem Brustbein ein, das Schlingen wird immer beschwerlicher und es ist zuweilen eine Scheu gegen Flüssigkeit, wie in der Hundswuth, vorhanden, das männliche Glied wird oft steif und es erfolgen Samenergiessungen, das Bewusstsein ist oft unverletzt, zuweilen unterdrückt, oft stellen sich anfallsweise heftigere Schmerzen und Convulsionen ein.

§. 1928.

Der Krampf dauert nicht mit gleicher Heftigkeit ununterbrochen fort, sondern lässt von Zeit zu Zeit, wiewohl meistens nur sehr wenig, nach, so dass die Zähne so weit von einander gebracht werden können, um dem Kranken die Arzneien und etwas Speise beizubringen. — Der Uebergang in Genesung erfolgt durch allmähligen Nachlass des Krampfes, oft unter Eintritt eines allgemeinen Schweisses und eines ruhigen Schlafes,

manchmal nachdem vorher der tonische Krampf in allgemeine Zuckungen übergegangen ist. — Zum Tode führt die Krankheit durch Erschöpfung der Kräfte und nachdem sich der Krampf auf das Herz oder die Lunge geworfen hat oder durch Schlagfluss, meistens nach Verlauf von etwa 4 Tagen, zuweilen auch schon nach 24 Stunden. — In seltenen Fällen dauert die Krankheit mehrere Wochen.

§. 1929.

Bei Leichenöffnungen findet man zuweilen Blutüberfüllung, Extravasate und Entzündung im Gehirne, Blutüberfüllung in den Häuten des Rückenmarkes, seröse Ausschwitzung im Kanal der Wirbelsäule, Knochenfrass der Wirbel und die Nerven in der Gegend der Verwundung und an ihrem Ursprung aus dem Rückenmark entzündet.

§. 1930.

Eine besondere Anlage zum Starrkrampfe, in der Form des Kinbackenkrampfes, bemerkt man bei neugebornen Kindern (Trismus neonatorum). Zum Wundstarrkrampfe sind vorzüglich junge kräftige Individuen geneigt.

Gelegenheitsursachen sind: Verwundungen (Tetanus traumaticus), insbesondere Quetschwunden und vorzüglich solche, in welchen sehnigte Theile oder Nerven verletzt sind oder fremde Körper die Weichtheile reitzen, wie z. B. bei complicirten Knochenbrüchen, und auch vorzüglich Wunden der Finger, der Zehen, des Saamenstranges, des Halses, des Gesichtes, und zur Zeit der Eiterung, insbesondere wenn die Wunde hiebei eine schlechte Beschaffenheit erhält, wiewohl auch der Wundstarrkrampf noch bei schon erfolgter Vernarbung eintreten kann; zugleich eine mit der Verwundung einwirkende hohe Temperatur der Athmosphäre (die Tropenländer), schneller Wechsel der Temperatur,

eine feuchte Luft, verdorbene Luft in den Hospitälern, Gemüthsbewegungen etc.; ferner Vergiftungen, Metastasen auf das Gehirn und Rückenmark, Entzündung und andere Krankheiten dieser Organe, heftige Schmerzen, heftige Gemüthsbewegungen, Hysterie etc. Der Kinnbackenkrampf der Kinder insbesondere wird oft veranlasst durch hitzige Gehirnhöhlenwassersucht, Entzündung irgend eines Organes, gastrische Reitze, z. B. Säure und zurückgehaltenes Kindspech, fehlerhafte Behandlung des Nabelstranges, Verkältung, verdorbene Luft in der Kinderstube, Gemüthsbewegungen der Mutter während des Säugens etc.

§. 1931.

Das Wesen des Starrkrampfes ist ein tonischer Krampf in den betreffenden Muskeln. — Eine Entzündung der Nerven oder des Rückenmarkes kann immer nur, wie jede andere Reitzung der Nerven, als entferntere Ursache des Krampfes angesehen werden und ist auch nicht immer vorhanden.

§. 1932.

Vorhersage. Der Wundstarrkrampf ist meistens tödtlich, höchst gefährlich auch der Kinnbackenkrampf der Kinder, von geringerer Bedeutung der bei der Hysterie vorkommende Starrkrampf.

§. 1933.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Bei dem Wundstarrkrampfe entfernt man fremde Körper aus der Wunde, durchschneidet halb zerrissene Sehnen und Nerven, erweitert bei stockendem Eiter die Wunde, lässt erweichende Umschläge machen etc. Von *Larrey* ist die Amputation des verwundeten Gliedes vorgeschlagen worden, doch möchte bei dem Beginne des Uebels diese Operation von dem Kranken nicht leicht zugegeben werden und bei vollständiger Entwicklung der Krankheit dieselbe nutzlos

sein; mehr scheint dagegen von dem Ausbrennen der Wunde erwartet werden zu dürfen. — Gegen entzündliche Affection des Gehirns oder des Rückenmarkes, gastrische Reitze, die Hysterie etc. wendet man in dem einen Fall Blutentleerungen und Calomel (von *Walther* in Beziehung auf die antiphlogistische Kraft als das Hauptmittel empfohlen), nebst Einreibungen von der grauen Quecksilbersalbe, in dem andern Brech- und Abführungsmittel, in dem dritten Castoreum und Moschus an etc.

§. 1934.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Das vorzüglichste krampfstillende Mittel, das Opium, ist auch bei dem Starrkrampfe, namentlich dem Wundstarrkrampf, als das Hauptmittel anerkannt; doch darf es bei dem Kinnbackenkrampf der Neugebornen, wenn er von einem Gehirnleiden ausgeht, nicht in Anwendung gebracht werden. Bei dem Wundstarrkrampfe giebt man das Opium in grossen Gaben, wenigstens alle zwei Stunden einen Gran und selbst zu 5 oder 10 und mehr Granen, und, wenn es durch den Mund nicht beigebracht werden kann, in Klystieren. Hiermit verbindet man, nach *Stütz* Methode, das Kali carbonicum, abwechselnd mit dem Opium gegeben, und lässt zugleich Laugenbäder gebrauchen. — Ausserdem hat man empfohlen: Blausäure (*Klein*), Kampher, Moschus, Cantharidentinctur, Terpenthinöl, Arsenik etc., so wie Cauterien auf den Rücken, besonders den Nacken, angewandt, welches letztere Mittel sich schon öfters hülfreich erwiesen hat.

Dritte Gruppe
der
ERSTEN ORDNUNG DER NERVEN-KRANKHEITEN.

Vom Nervensystem ausgehende krankhafte Erregung der geistigen Thätigkeit.

Die Schlaflosigkeit.
(*Agrypnia, Pervigilium, Vigilium morbosum.*)

Cloquet (Par. 1808). — *Joerdens* (Hufel. Journ. 17ter B.). — *Ammon* (lat. Gött. 1820). — *Heusinger* (lat. Eisenach 1820). — *Buchholz* (m. e. Vorrede v. Hufeland, Berl. 1821). — *Waller* (Frankf. 1824).

§. 1935.

Die Schlaflosigkeit erscheint häufig als Symptom anderer Krankheiten, oft aber kommt sie, ohne dass sonst ein Leiden wahrgenommen wird, vor und besteht auch oft, ohne dass eine äussere Veranlassung aufgefunden werden kann. Oft wird der Schlaf nur einige Male in der Nacht unterbrochen, wo sodann auch gewöhnlich derselbe nicht sehr fest ist und viele Träume sich einstellen, oft werden die ganze Nacht und oft mehrere Nächte hinter einander schlaflos zugebracht. Die Folgen sind: Eingenommenheit des Kopfes, vermindertes Vermögen zu geistigen Arbeiten, Schwindel, Neigung zum Schlagfluss und unter gewissen Verhältnissen zum Delirium tremens, allgemeine Schwäche, Verdauungsbeschwerden und Abmagerung des Körpers.

§. 1936.

Anlage: Das höhere Alter. **Gelegenheitsursachen:** Verschiedene Affectionen des Gehirns, insbesondere Gehirnentzündung, Entzündungen anderer Organe, Fieber, Schmerzen, gastrische Reitze, insbesondere reichlicher Genuss von Speisen und geistigen Getränken oder von Thee oder Kaffe unmittelbar vor dem Schlafengehen, Gemüthsaffecte und wirkliche Gemüths- und Geisteskrankheit, Aufregung des Geistes oder der Sinne unmittelbar vor dem Schlafengehen, übermässige Körperanstrengungen etc.

§. 1937.

Behandlung. Man entferne den Krankheitszustand, von dem die Schlaflosigkeit ein Symptom ist, und suche alle äussern schädlichen Einflüsse abzuhalten; insbesondere vermeide der Kranke des Abends anstrengende Geistesbeschäftigung, den Geist erregende Gesellschaft und das Gemüth reitzende Gespräche und geniesse nur ein mässiges Abendessen. — Um das Nervensystem zum Schlafe zu stimmen, dient frühes Aufstehen und mässige Ermüdung durch Gehen, Fahren im Wagen, angemessene Beschäftigung und Bäder im Freien. Sind diese Mittel nicht anwendbar oder genügen sie nicht, so giebt man das Opium oder das Morphium aceticum. Das ebenfalls empfohlene Lactucarium, der Hyoscyamus, die Belladonna, der Moschus, der Kampher etc. gewähren wenig Nutzen.

Das Schlafwandeln.

(*Nachtwandeln, Somnambulismus Noctambulatio.*)

Richter (Diss. Goetting. 1756). — *Meyer* (Halle 1758). — *Pigatti* (a. d. Ital. Nürnberg 1782). — *Wienholt* (Lemgo 1805). — *Schlözer* (Wilna 1816).

§. 1938.

Das Schlafwandeln ist der Zustand eines Individuums, in welchem dasselbe im Schlafe Handlungen wie im Wachen begeht.

§. 1939.

Einige Stunden nach dem Eintritt des Schlafes erhebt sich der Schlafwandler im Bette, spricht, singt und benimmt sich, wie wenn er das eine oder das andere Geschäft verrichten würde (das unvollkommene Nachtwandeln), er steht auf, geht im Hemde umher, zieht sich an, und nimmt verschiedene andere Verrichtungen, wie im wachenden Zustande, vor. Meistens entsprechen die Handlungen des Nachtwandlers seinem gewöhnlichen Benehmen; zuweilen klettern die Kranken aber auf die Dächer und auf andere hohe Punkte, oft mit grosser Geschicklichkeit, was besonders zur Zeit des Mondscheins geschehen soll, und manchmal befinden sie sich in einem Zustande von Wuth (Somnambulismus furens). Bei diesen Unternehmungen hat der Kranke entweder die Augen geschlossen oder geöffnet, in welch letzterm Falle aber dieselben sich nicht bewegen und die Pupille auch sich nicht beweglich zeigt. Nach einiger Zeit gehen die Kranken wieder in das Bett zurück und schlafen ruhig fort; am andern Tage wissen dieselben Nichts von dem, was sie in der Nacht gethan haben.

§. 1940.

Meistens verliert sich das Uebel mit dem Vorrücken des Alters wieder, zuweilen geht es aber in andere Nervenkrankheiten, namentlich in die Epilepsie über.

§. 1941.

Ursachen. Es kommt dieser Zufall vorzüglich bei jugendlichen Individuen, mehr bei Jünglingen als Mädchen und solchen mit lebhafter Phantasie vor, oft wird er durch übertriebenes Studiren und lebhafte Eindrücke auf Geist und Gemüth, und auch nach Manchen durch den Samenreitz, den Missbrauch geistiger Getränke, narkotischer Stoffe etc. erregt und ist oft auch der Begleiter und die Folge von Gehirn- und Nervenkrankheiten, namentlich der Fallsucht; oft vermag man gar keine Ursache aufzufinden.

Ueber die nächste Ursache wird man so lange nichts mit Bestimmtheit anzugeben vermögen, bis man über den Zustand des Menschen im Schlafe nähere Auskunft erhalten hat.

§. 1942.

Behandlung. Kann eine Ursache aufgefunden werden, so suche man sie zu entfernen. — Man hat das Opium empfohlen, um einen festern Schlaf zu bewirken, auch Kampher und andere Mittel, um das erregte Nervensystem zu beruhigen. Oefters thaten Erweckung aus dem Schlafe, während des Anfalls, und Bestrafung gute Dienste, doch darf die Erweckung, wie es sich von selbst versteht, nicht vorgenommen werden, wenn der Nachtwandler sich gerade an einem gefährlichen Orte befindet; auch darf sie nicht alzuschnell und gewaltsam bewirkt werden.

Der Alp.

(*Das Alpdrücken, die Trute, Incubus, Ephialtes, Pnigalion.*)

Reil (Fieberlehre). — *Waller* (a. d. Engl. v. Wolf. Frankfurt 1820).

§. 1943.

Der Alp sind während des Schlafes sich einstellende Anfälle, welche in dem Gefühl von Erstickung, wobei oft das Gesicht des Kranken bläulich-roth wird, und zu gleicher Zeit in phantastischen Träumen besteht, wobei sich der Kranke insbesondere häufig vorstellt, dass ein Ungeheuer auf seiner Brust sitze oder eine schwere Last auf ihm liege. Der Kranke sucht sich zu befreien, kann sich aber nicht bewegen, bis er endlich erwacht, wo sodann die Beengung und die Phantasiegebilde verschwinden.

§. 1944.

Es ist der Alp eigentlich keine besondere Krankheitsart, sondern besteht in Brustaffectionen verschiedener Art, namentlich Blutcongestionen nach den Lungen und verschiedenen Herzkrankheiten, bei welchen während des Schlafes Hemmungen in der Respiration und dem Blutlauf sich einstellen und wodurch die bezeichneten schreckhaften Träume erregt werden.

§. 1945.

Die Behandlung besteht in der Behandlung der vorhandenen Lungen- oder Herzaffection, und insbesondere in sorgfältiger Beseitigung alles dessen, was die Beengungs-Anfälle in der Nacht erregen könnte, wesshalb der Kranke am Abend nicht viel geniessen darf, die geistigen Getränke vermeiden muss, gehörige

Leibesöffnung bewirkt werden muss etc. Zeigt der Kranke im Schlafe Unruhe, was den beginnenden Anfall anzeigt, so muss man ihn aus dem Schlafe erwecken.

Der Säuferwahnsinn.

(*Delirium tremens potatorum.*)

Th. Sutton gab die erste, diese Krankheit von andern genauer scheidende Beschreibung (Lond. 1813, a. d. Engl. v. Heinecken, m. e. Vorrede v Albers, Bremen 1820). — Ausserdem: *Rayer* (Par. 1819). — *Lind* (lat. Hann. 1821). — *Göden* (Berl. 1825). — *Möhl* (Gerson u. Julius Magaz. 1826). — *Barkhausen* (Bremen 1828). — *Léveillé* (Par. 1831).

§. 1946.

Der Säuferwahnsinn ist das bei Trinkern im nicht berauschten Zustande vorkommende Irrereden, das als selbstständige Krankheit auftritt und mit Schlaflosigkeit und starkem Zittern der Glieder, insbesondere der Hände, verbunden ist.

§. 1947.

Gewöhnlich zittern die Trinker schon lange vor dem Ausbruch der Krankheit stark mit den Händen und leiden oft an Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen etc. Es wird nun der Schlaf unruhig, im Einschlafen gehen dem Kranken viele verworrene Bilder vorüber und es bleibt zuletzt der Schlaf ganz aus oder es tritt vollkommene Schlaflosigkeit plötzlich ein. Nunmehr verfällt der Kranke unter Zunahme des Zitterns der Hände in ein wunderbares Delirium. Er sieht die mannigfaltigsten Gegenstände, Kröten hüpfen auf seinem Bette, Eidechsen und Schlangen schlüpfen darauf hin, ein Geier droht auf ihn herabzustossen, ein Krokodill öffnet seinen Rachen, eiserne Stangen schiessen aus den Ecken des

Zimmers hervor, und er wehrt diese Gegenstände von sich ab, ein Leichenzug geht an dem Fenster vorüber, Männer mit glühenden Zangen wollen hereindringen, der Doctor hat weisse Flecken am Kleide und der Kranke ist bemüht, sie ihm abzuwischen, der Hirschwirth von N. geht vorüber und hat zwei Tannbäume auf dem Kopfe, Leute spritzen Wasser aus dem Fussboden herauf und der Kranke müht sich ab, seine Kleider dagegen zu schützen, stets sieht er mit scheuem Blick von einer Stelle zur andern, wo sich ihm stets die nämlichen oder immer neue Erscheinungen darstellen. Dabei erkennt der Kranke gewöhnlich seine Umgebungen und giebt meistens auf die an ihn gestellten Fragen, in so fern ihn nicht in diesem Augenblick die Luftgebilde foppen, genügende Antwort. Der Puls, die Temperatur und die Absonderungen sind wenig verändert.

§. 1948.

Der Anfall dauert einige Tage, bis von selbst oder durch die Kunst erregt Schlaf eintritt, nach welchen gewöhnlich das Delirium beendigt ist; in den Tod geht sie nach acht Tagen und später über, indem sich ein comatöser Zustand und manchmal auch plötzlich ein Schlag einstellt. Zuweilen wird die Krankheit chronisch, so zwar, dass das Delirium nur mit Unterbrechungen erscheint, z. B. bei einbrechender Dunkelheit.

§. 1949.

Bei den Leichenöffnungen findet man oft Blutüberfüllung, seröse Ausschwitzungen und andere Zeichen von Entzündung im Gehirne, welche Veränderungen übrigens auch bei Trinkern vorkommen, die nicht am Delirium tremens gelitten haben.

§. 1950.

Ursachen. Die Krankheit kommt nur bei Trinkern, insbesondere Brandtweintrinkern vor; zum Ausbruch tragen oft auch Gemüthsbewegungen bei.

§. 1951.

Wesen. Man hat die Krankheit für Entzündung des Gehirns erklärt, was sie aber nicht ist, wenn auch oft ein entzündlicher Zustand des Gehirns damit verbunden ist. Ueber den wesentlichen Unterschied zwischen diesem Delirium und den Seelenkrankheiten vergleiche das Kapitel von dieser Krankheitsfamilie.

§. 1952.

Vorhersage. Die Krankheit wird bei richtiger Behandlung in der Regel schnell geheilt.

§. 1953.

Behandlung. Der Weg der Heilung ist der Schlaf und das Mittel, durch welches dieser bewirkt werden muss, das Opium. Ich gebe gewöhnlich Abends einen Gran Opium und nach jedesmaligen Zwischenräumen von 2 Stunden zwei bis drei weitere gleiche Gaben. Tritt kein Schlaf ein, so wird am andern Nachmittag frühzeitig mit dem Gebrauche des Opiums angefangen und am Abend die einzelne Gabe auf zwei Grane erhöht. Meistens genügen diese Gaben, doch ist es zuweilen nothwendig, zu noch grössern zu steigen, so dass ich in einem Falle innerhalb eines Tages 30 Grane Opium purum geben musste, um Schlaf hervorzubringen, was übrigens ohne nachtheilige Folgen geschah. Bei Vollblütigkeit und bei der Darreichung stärkerer Gaben des Opiums muss man das Gehirn schützen durch kalte Umschläge auf den Kopf und eine Aderlässe. Ist Verstopfung vorhanden, so gebe man kühlende eröffnende Salze; doch bewirkt das Opium in grössern Gaben oft keine Verstopfung, sondern eher Durchfälle.

ZWEITE ORDNUNG DER NERVENKRANKHEITEN.

Nervenkrankheiten mit verminderter Nerventhätigkeit.

Der Schlagfluss.
(*Schlag, Apoplexia.*)

Wepfer (lat. Amst. 1724). — *Zuliani* (lat. Brix. 1789). — *Kirkland* (Lond. 1791, a. d. Engl. Lpz. 1794). — *Bethke* (Lpz. 1797). — *Ottensee* (v. Vorrede v. Fritze, Berl. 1805). — *Burdach* (Lpz. 1806). — *Portal* (Par. 1811). — *Hopf* (Stuttg. 1817). — *Moulin* (Par. 1819, a. d. Franz. v. Caspari, Lpz. 1820). — *Richelmy* (a. d. Franz. v. Gräfe. Berl. 1821). — *J. H. Beck* (Nürnberg 1826).

§. 1954.

Der Schlagfluss ist die plötzliche Beraubung des Bewusstseins, mit welcher zugleich mehr oder weniger vollständige Lähmungen eintreten.

§. 1955.

Es erscheint der Schlagfluss unter mannigfaltigen Formverschiedenheiten, wesshalb es schwer ist, ein allgemeines Bild desselben zu entwerfen.

Oft gehen dem Anfalle längere oder kürzere Zeit Vorboten vorher. Der Kranke hat öfters das Gefühl, wie wenn ihm Etwas plötzlich in den Kopf steige, wobei Ohrenklingen entsteht, er wird sodann von stärkerm Schwindel befallen, der entweder nur vorübergehend ist oder auch mehr anhält und bei dem Aufrichten oder Drehen des Kopfes zunimmt und zuweilen so bedeutend

wird, dass der Kranke in Gefahr ist, umzufallen. Derselbe empfindet zuweilen Lichterscheinungen, wie wenn es blitze, manchmal bemerkt man an demselben eine allmählige Abnahme des Gedächtnisses, eine ungewohnte Schläfrigkeit, wobei aber der Schlaf doch wegen schweren Träumen sehr unruhig und nicht erquickend ist, und beschwerliches Sprechen und selbst Stammeln; zuweilen hat der Kranke langwierige Kopfschmerzen an einer bestimmten Stelle, er hat das Gefühl von Schwäche und Ameisenkriechen in den Gliedern, manchmal auch Reissen in denselben, krampfhafte Zufälle, eine Neigung zum Erbrechen, Herzklopfen etc. Diese Vorboten können eine sehr verschieden lange Zeit dem Anfalle vorausgehen, oft nur wenige Stunden und oft Monate lang und selbst mehrere Jahre hindurch von Zeit zu Zeit erscheinen.

§. 1956.

Auf diese Erscheinungen oder auch gánz ohne alle vorhergegangene Anzeigen folgt sodann der Schlaganfall. Gewöhnlich empfindet der Kranke einen heftigen Kopfschmerz, Kribeln in der Stirngegend und Schwindel, seine Sprache wird lallend, die Lippen und verschiedene Muskeln des Gesichts zucken auf der einen Seite, zuweilen werden der Kopf und die Augen verdreht. Der Kranke fällt um ohne Bewusstsein, zuweilen unter allgemeinen Zuckungen, die aber bald wieder aufhören, das Athmen ist schnarchend und langsam und hie und da unterbrochen, der Mund steht offen, es steht Schaum vor demselben und es fliesst Speichel aus. Gewöhnlich sind der eine Mundwinkel, die eine Wange und das eine Augenlied herunterhängend. Der Kranke bewegt nur den Arm und den Fuss der eine Seite, die Gliedmassen der andern Seite sind gelähmt. Der Puls ist oft wenig verändert, meistens ist er langsam, manchmal sehr voll und hart, zuweilen auch aussetzend; ein kalter Schweiss

bedeckt die Stirne, Koth und Harn gehen unwillkührlich ab.

§. 1957.

Von diesem Krankheitsbild, welches die am häufigsten vorkommende Form des Schlagflusses darstellt, weichen die Krankheitszufälle oft auf verschiedene Weise ab. Oft wird bei dem Anfall das Bewusstsein nicht vollkommen geraubt und die lähmende Wirkung desselben deutet sich nur durch Schwere der Zunge und erschwerte Sprache, so wie durch ein Kriebeln in einzelnen Gliedern an; in seltenen Fällen zeigt sich dieses Kriebeln oder ein Gefühl von Eingeschlafensein mehr oder weniger in allen Gliedern; es ist dasselbe in der Regel mit Muskelschwäche verbunden. Oefters kommen Lähmungen einzelner Theile, z. B. der Zunge, des einen Augenliedes, des einen Fusses vor, welche oft unter geringem Schwindel und nur momentaner und unvollkommener Unterdrückung des Bewusstseins sich einstellen. Diese verschiedenen Formen begreift man unter dem Namen Parapoplexia oder Apoplexia imperfecta. Wird dagegen im Anfall das Bewusstsein vollkommen unterdrückt und stellen sich ausgebreitete und vollkommene Lähmungen ein (in der Regel eine Hemiplegia), so nennt man diesen Zustand die Apoplexia exquisita s. perfecta. In andern Fällen endlich wird das Leben so schnell zernichtet, dass die characteristischen Zeichen dieser Krankheit nicht mehr gehörig hervortreten können. Der Kranke sinkt plötzlich zusammen und giebt keine Zeichen des Bewusstseins mehr, er hat ein leichenartiges Ansehen, wird schnell kalt, der Puls und der Athem bleiben aus, letzterer wird oft noch röchelnd und es tritt zuweilen auch etwas Schaum vor den Mund (Apoplexia fulminans), doch sind nicht alle derartige plötzliche Zufälle dem Schlagflusse zuzuschreiben, indem sie auch von andern Ursachen, z. B. einem Herzfehler herrühren können.

§. 1958.

Wie in den wesentlichen Erscheinungen des Schlagflusses mancherlei, jedoch meistens nur in dem Grade des Leidens, so wie in der Verschiedenheit der ergriffenen Nervenparthien beruhenden Verschiedenheiten sich kund geben, so giebt es auch wichtige Unterschiede in dieser Krankheit, die sich auf die die Nervenzerrüttung bedingenden, jedoch in Beziehung zu ihr nur als entferntere Ursache anzusehenden oder sie nur begleitenden und modifizirenden Krankheitszustände beziehen. Nach diesen Verhältnissen können folgende Arten des Schlagflusses angenommen werden:

1) Der Schlagfluss von oder mit Congestion oder der *blutige Schlag* (Apoplexia sanguinea). Wir können das Vorhandensein desselben mit Sicherheit annehmen, wenn das vom Schlag getroffene Individuum stark und vollsaftig ist, einen kurzen Hals hat, sein Gesicht sehr roth und bläulich ist, die Venen von Blut strotzen, die Augen hervorragen und prall anzufühlen sind, der Puls voll und hart ist, der Kranke starken Schwindel hat, Funken und Blitze vor den Augen und Ohrensausen empfindet und wenn die Gelegenheitsursache geeignet war, eine Blutcongestion hervorzubringen, wie z. B. der übermässige Genuss geistiger Getränke, die Einwirkung starker Hitze auf den Kopf, die Unterdrückung gewohnter Blutflüsse etc. Oft fehlen übrigens die meisten dieser Merkmale und es ist doch ein Blutschlag vorhanden. Man kann in solchen Fällen sein Dasein vermuthen, wenn nur die eine oder andere dieser Erscheinungen mehr oder weniger hervortritt und der Anfall nicht die Charactere der andern Arten des Schlagflusses deutlich und rein darbietet.

§. 1959.

2) Der *seröse Schlagfluss* (Apoplexia serosa, hydrocephalica) ist selten, indem die wässerige Ausschwitzung, die die Unterdrückung in dem Nervenleben bedingt,

gewöhnlich nur allmählig eintritt und sodann die Form der hitzigen Gehirnhöhlenwassersucht darstellt; geschieht die Ausschwitzung aber wirklich in der Art, dass jene Hemmung der Verrichtung der Nerven plötzlich, das heisst als Schlagfluss, eintritt, so werden die Kranken unter Beraubung des Bewusstseins plötzlich von halbseitigen Zuckungen und tetanischen Krämpfen befallen, worauf Lähmungen, erschwertes Athmen und der Tod eintreten. Zur Erkennung dieser Art des Schlages ist es auch nothwendig, die erregenden Ursachen zu berücksichtigen; man kann z. B. auf dieselbe schliessen, wenn die bezeichneten Zufälle plötzlich nach zurückgetretenem Scharlachausschlag sich einstellen etc.

§. 1960.

3) Der *Schlag von organischen Fehlern* (Apoplexia ex vitiis organicis). Diese Art des Schlagflusses erkennt man oft an den dem Anfalle meistens lange vorhergehenden Zufällen einer Desorganisation im Gehirn, an dem auf eine bestimmte Stelle beschränkten Kopfschmerz, dem Gefühl von Druck, einem von einer bestimmten Stelle ausgehenden Schwindel etc.; oft fehlen aber auch diese Vorläufer und der Schlaganfall tritt unerwartet ein. In diesem Falle deuten nur die Abwesenheit der bei dem blutigen Schlage gewöhnlich vorkommenden Erscheinungen und der Mangel der den Nervenschlag meistens bedingenden äussern Veranlassungen auf die bezeichnete Quelle des Uebels hin, doch wird in diesem Falle immer ein Zweifel übrig bleiben, ob der Schlag von einer Desorganisation herrühre oder ein blutiger oder ein Nervenschlag sei.

§. 1961.

4) Der *Nervenschlag* (Apoplexia nervosa s. immaterialis). Seine Unterscheidung vom Blutschlag ist von der grössten Wichtigkeit, da das vorzüglichste Heilmittel beim Blutschlag, nämlich die

Aderlässe, hier nicht angezeigt ist und selbst den schwachen Lebensfunken vollends zum Erlöschen bringen kann. Wir können das Vorhandensein eines Nervenschlags annehmen, wenn das vom Schlag getroffene Individuum alt, mager und abgelebt ist oder auch, wenn es ein jüngeres Individuum ist, das ein sehr reitzbares Nervensystem besitzt, hysterisch, hypochondrisch oder cholerisch ist, nicht vollblütig und dick, sondern blass und mager ist, einen mehr schlanken Körperbau und langen Hals besitzt, keine dunkle Röthe im Gesicht und den Augen, kein harter voller Puls, kein schnarchendes Athmen etc., sondern mehr ein leichenartiges Aussehen, ein kleiner schwacher und aussetzender Puls und nur in längeren Zwischenräumen erfolgende kurze Athemzüge sich zeigen, die bei dem Blutschlag angegebenen Vorboten nicht vorhanden waren und die Ursachen des Schlaganfalls von der Art waren, dass sie zunächst zerrüttend aufs Nervensystem einwirken mussten, wie z. B. eine heftige Gemüthsbewegung, wiewohl eine solche Ursache auch den Blutschlag veranlassen kann, da eine Erregung des Nervensystems leicht auch auf die Blutbewegung zurückwirkt.

§. 1962.

Die Ausgänge des Schlagflusses sind: 1) Die Genesung. Es kehrt zuerst das Bewusstsein zurück, das oft nur für einen Augenblick geraubt oder nicht einmal vollständig verloren war, aber auch mehrere Stunden und selbst Tage lang fehlen kann, und sodann verschwinden allmählig der Schwindel und nach längerer Zeit die Lähmungen. — 2) Nachkrankheiten. Dieselben sind ein öfters wiederkehrender oder auch ein mehr andauernder Schwindel, Schwäche oder gänzlicher Verlust des Gedächtnisses und anderer Geisteskräfte, eine erschwerte Sprache, Lähmungen einzelner Glieder, insbesondere halbseitige Lähmung. — 3) Der Tod. Es

erfolgt derselbe oft augenblicklich, oft auch, meistens unter Zunahme der schlagflussartigen Zufälle oder unter Wiederkehr des Anfalles, nach einigen Minuten oder Stunden, oder erst in einigen Tagen und selbst nach noch längerer Zeit, in welch letzterm Fall der Kranke mehr oder weniger betäubt daliegt, die Zunge trocken, braun und rissig wird, und sich eine Art Status nervosus ausbildet.

§. 1965.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Nach dem Blutschlag trifft man die Gefässe und grossen Blutbehälter des Gehirnes mit Blut überfüllt an und zugleich oft etwas Lymphe zwischen die Gehirnhäute und in die Hirnhöhle ergossen, zuweilen auch ausgetretenes Blut zwischen dem Schädel und den Hirnhäuten, zwischen diesen und dem Gehirne, in der Hirnsubstanz und vorzüglich auch in den Hirnhöhlen, welche durch die grosse Menge des Extravasats oft bedeutend ausgedehnt sind, auch findet man zuweilen Bluterguss in dem Kanal der Wirbelsäule. — Nach dem serösen Schlag findet man die Veränderungen, die in dem Kapitel von der hitzigen Hirnhöhlenwassersucht angegeben worden sind, — nach dem Schlag aus Desorganisation verschiedene Substanzveränderungen im Gehirne, Erweichung, Vereiterung, Verhärtung, Hydatiden, Steatome, nach den Untersuchungen von *Riobe*, *Rochoux* u. a. auch Narben im Gehirne und häutige Bälge, die Folge früher bestandener Blutextravasate, ferner krankhafte Veränderungen in den das Gehirn umgebenden Theilen, Knochenfrass und Eiteransammlung unter den Schädelknochen, Knochenauswüchse, stark angeschwollene Pachioni'sche Drüsen, die Hirnhäute an einzelnen Stellen verdickt und verknöchert, Verknöcherungen in den Häuten der Gefässe des Gehirnes etc. Diese Veränderungen trifft man meistens in der der gelähmten Seite des Körpers gegenüberstehenden Hälfte

des Gehirnes an. — Nach dem reinen Nervenschlag endlich findet man meistens gar keine Veränderungen in dem Gehirne, oft sind die Blutgefässe etwas zu stark mit Blut angefüllt, was aber nicht die genügende Ursache des Schlagflusses sein kann, öfters soll aber das Gehirn auch auffallend blutleer sein.

§. 1964.

Anlage zum Schlagfluss, mit Ausnahme der zum sogen. Wasserschlage, haben beinahe nur erwachsene Personen, und zwar vorzüglich solche männlichen Geschlechtes und von dem Alter von 40 — 60 Jahren. Uebrigens spricht sich nur zu dem Blutschlage eine besondere Anlage durch den Habitus des Körpers aus. Ein solcher Bau (Habitus apoplecticus) giebt sich zu erkennen durch einen untersetzten, mehr oder weniger fetten Körper, etwas grossen Kopf, kurzen Hals (statt 7 nur 6 Halswirbel), breite Schultern, rothes Gesicht, das beim Bücken dunkelroth wird und wobei ein solches Individuum leicht Schwindel empfindet. Der Nervenschlag kommt mehr bei magern und sehr reitzbaren Personen vor, doch ist der Schlagfluss bei Personen von dieser Constitution nicht besonders häufig und es kann daher dieselbe nicht als eine besondere Anlage zum Schlage überhaupt betrachtet werden.

§. 1965.

Gelegenheitsursachen können alle äussern Einflüsse werden, welche Vollblütigkeit verursachen und Reitzung, Erschütterung oder Zerstörung des Gehirnes oder mehr oder weniger des ganzen Nervensystems veranlassen können, daher eine zu reichlich besetzte Tafel, der zu starke Genuss der geistigen Getränke, Mangel an Bewegung und zu grosse Geistesruhe, zu vieles Schlafen, die Unterdrückung gewohnter Blutflüsse und anderer Ausleerungen, die Hemmung der freien Blutbewegung und insbesondere des Rückflusses des Blutes

vom Kopfe durch das Tragen zu enger Halsbinden, Hemmung des Athmens auf irgend eine Weise, zu starke Herzthätigkeit bei Hypertrophie und andern Krankheiten des Herzens, Zurücktreibung der Lebensthätigkeit aus den peripherischen Theilen, z. B. durch einen unvorsichtigen Gebrauch des kalten Bades und andere Verkältungen, durch strenge Kälte im Winter, zu starke Einwirkung der Sonnenhitze auf den Kopf, zu starke Geistesanstrengungen, insbesondere wenn sie mit einer gewissen Hast und Gemüthsunruhe geschehen, häufig gestörte Nachtruhe, heftige Gemüthsbewegungen, insbesondere Verdruss und Schrecken, starke und häufige Geschlechtsreitzung, Verletzungen und Erschütterungen des Gehirnes, consensuelle Reitze durch Ueberladung des Magens, gallichte Reitze etc. Endlich müssen diejenigen Einflüsse erwähnt werden, die zwar für sich nicht leicht einen Schlagfluss zu Stande bringen, aber dazu geneigt machen, indem sie die Lebenskräfte herabstimmen, die Empfindlichkeit des Nervensystems erhöhen etc., dahin gehören Blutflüsse und andere schwächende Ausleerungen, schlechte Nahrungsmittel, eine niedergebeugte Gemüthsstimmung etc.

§. 1966.

Das Wesen des Schlagflusses scheint eine plötzlich eintretende, mehr oder weniger vollkommene Lähmung des ganzen Gehirnes oder einzelner Theile desselben zu sein. Dieser lähmungsartige Zustand kann auf verschiedene Weise hervorgebracht werden: durch Druck aufs Gehirn bei dem blutigen Schlagflusse, dem serösen Extravasat etc., durch eine Zerstörung der Gehirnmasse, wenn sie bis zu solchen Gehirntheilen fortschreitet, deren Unverletztheit zum Bewusstsein, zur Empfindung und zur willkürlichen Bewegung nothwendig ist, und durch Erschütterung des Gehirns und des ganzen Nervensystems, wodurch vielleicht in seinem feinern Bau unsichtbare

Verletzungen eintreten und seine Verrichtung gehemmt wird. Wie nun aber die im Nervensystem vorgehenden Lebensprozesse verändert sind, bleibt näher zu bestimmen so lange unmöglich, bis wir die innern Vorgänge im Nervensystem im gesunden Zustande näher kennen. Alle bisher vorgebrachten nähern Erklärungsweisen des Schlagflusses sind zu sehr Hypothesen, als dass sie hier angeführt werden können, man findet übrigens eine Zusammenstellung der wichtigern Ansichten in *Richters* Therapie.

Der Streit, ob ein Schlagfluss auch in andern Theilen des Nervensystems, als dem Gehirne, statt finden könne, ist nur ein Wortstreit, indem man denselben Vorgang, nämlich die schnell eintretende Lähmung bald Lähmung und bald Schlagfluss nennt.

§. 1967.

Die Vorhersage. Schlaganfälle gehen zwar sehr häufig, ohne tödtlich zu werden, vorüber, und manche Kranke erholen sich scheinbar ganz, doch ist ein solches schon einmal von einem Schlaganfall getroffenes Individuum in der Regel dem Tode durch diese Krankheit geweiht, indem die Anfälle in hohem Grade die Anlage zu dieser Krankheit steigern und daher meistens sich wiederholen. In der Regel werden die später erfolgenden Anfälle stärker, als die vorhergegangenen. Am wenigsten scheint ein reiner Nervenschlag die Neigung zu Rückfällen zu hinterlassen. Der Schlagfluss von Desorganisation und von Wasserergiessung sind unheilbar, wenn nicht bei dem erstern die materielle Ursache an der Oberfläche des Gehirnes liegt, so dass sie durch chirurgische Mittel hinweggenommen werden kann. Am günstigsten ist noch die Vorhersage bei einem leichtern Grade eines durch eine äussere Veranlassung entstandenen Blut- oder Nervenschlages.

§. 1968.

Behandlung. Ist der Character des Blutschlages deutlich ausgesprochen, so nimmt man, so schnell als möglich, indem zugleich die Hals- und andere Binden und fest anliegende Kleidungsstücke gelöst werden und der Körper in eine mehr aufrechte Lage gebracht wird, eine starke Aderlässe am Arme der nicht gelähmten Seite, und wenn daselbst kein Blut mehr fliesst, an der Drosselader, die aber so wenig wie möglich beim Verbinden zusammengedrückt werden darf, vor. Nebst der Aderlässe scheinen mir das beste Mittel, kalte Begiessungen des Kopfes zu sein, in der Art vorgenommen, wie sie gegen die hitzige Gehirnhöhlenwassersucht angewandt werden. Dieselben werden nach gemachter Aderlässe oder, bei zu langer Dauer bis zu deren Vollführung, sogleich vorgenommen. Nach dem Gebrauche beider Mittel, die zuweilen wiederholt in Anwendung gebracht werden müssen, lässt man nun, statt der Begiessungen, kalte Umschläge auf den Kopf machen, wendet eröffnende Klystiere an, giebt kühlende, eröffnende Mittel innerlich, und kann auch zur Ableitung Fussbäder, Senfteige und Frictionen der Glieder in Gebrauch ziehen.

Ist auf diese Weise die Kraft des Anfalls gebrochen, so ist es nunmehr erst Zeit nach den gewöhnlichen Heilanzeigen einen geordneten Heilplan zu entwerfen. Man sucht die Ursachen der Blutcongestion auf. Ist es Ueberladung des Magens oder der Gedärme von Speisen und geistigen Getränken oder andern Stoffen, so sucht man diese Stoffe durch gelindes, vermittelst lauwarmen Wassers, Kitzeln des Schlundes etc. erregtes Erbrechen, unter Vermeidung heftig wirkender Brechmittel, und auch durch abführende Mittel auszuleeren, oder setzt den schädlich wirkenden Stoffen andere, sie einhüllende und neutralisirende entgegen;

tragen unterdrückte Hämorrhoiden die Schuld, so lässt man Blutegel an den After setzen; ist es zurückgetretener Rothlauf, Gicht etc., so sucht man dieselben durch Senfteige und andere Mittel wieder auf die peripherischen Theile zu werfen; ist eine äussere Verletzung vorhanden, so lasse man sogleich das nothwendige chirurgische Verfahren eintreten etc.

Während man die entferntern Ursachen der Blutanhäufung im Gehirne zu beseitigen sucht, wendet man fortgesetzt das gegen die, dem Schlagfluss zunächst zum Grunde liegende Krankheit gerichtete Verfahren an. Zuweilen sind noch fortgesetzt kleine Blutentleerungen durch kleine Aderlässe, Blutegel an den Kopf gesetzt oder durch Schröpfen nothwendig, kalte Umschläge auf den Kopf, an deren Stelle auch das Verdunsten der Naphthe auf dem Kopf gesetzt werden kann, kühlende Mittel und geeignete Ableitungsmittel. Erst wenn die Blutcongestion gänzlich beseitiget ist, aber noch Lähmung vorhanden ist, fängt man nun an, zu dem gegen das Wesen der Lähmung unmittelbar gerichteten Verfahren überzugehen. Man wendet zuerst auf die gelähmten Glieder die äussern erregenden Mittel an und zieht sodann, insofern es nothwendig ist, auch die innern s. g. Nervina zu Hülfe, unter denen aber diejenigen möglichst vermieden werden müssen, die einen Orgasmus des Blutes und Wallungen nach dem Kopfe hervorzubringen geneigt sind.

§. 1969.

In den Fällen, in welchen es zweifelhaft ist, ob der Schlaganfall in einem Blut- oder in einem Nervenschlag besteht, glaube ich, sehr kräftig vollführte Bespritzungen des Kopfes, des Gesichtes und auch der Brust mit kaltem Wasser als das beste Mittel empfehlen zu dürfen. Es wird hier nicht das Wasser, wie in dem entschiedenen Blutschlage, in einem andauernden, starken

Strome aus einem Gefässe auf den Kopf gegossen, sondern vermittelst der hohlen Hand mit möglichster Kraft auf die bezeichneten Theile des Körpers geschleudert, was eine geraume Zeit fortgesetzt werden muss. Es gewährt dieses Mittel den Vortheil, dass es zugleich gegen etwa bestehende Congestionen gegen den Kopf wirkt und ein äusserst kräftiges, das Leben erweckendes Mittel ist und dass es überall ohne Zeitverlust in Anwendung gebracht werden kann. Sind mehr Gründe für das Dasein eines Blutschlages, als für das eines Nervenschlages vorhanden, so kann eine Probeaderlässe gemacht werden. Bessert sich der Kranke etwas, während das Blut fliesst, so wird mehr die Behandlung eingeleitet, welche gegen den Blutschlag angezeigt ist. sinkt der Puls aber und wird der Kranke schwächer, so muss schnell die Ader geschlossen und das Verfahren zu Hülfe gezogen werden, das man gegen den Nervenschlag in Anwendung bringt. In jedem Falle können übrigens die nicht schwächenden Ableitungsmittel angewandt werden.

§. 1970.

Bei dem rein ausgesprochenen Nervenschlag können ebenfalls die Bespritzungen mit kaltem Wasser in Anwendung gebracht werden und sind von vorzüglichem Nutzen, wenn der Schlag durch eine plötzliche Erschütterung des Nervensystems, z. B. durch eine heftige Gemüthsbewegung, hervorgebracht wurde; ist dem Schlage schon eine bedeutende Erschöpfung vorhergegangen, so wird man aber bald von diesem Verfahren abstehen und zur Anwendung der nunmehr zu bezeichnenden Methode übergehen müssen. Man bestreicht und wäscht dem Kranken die Schläfen, die Stirne, den Nacken mit flüchtig erregenden Mitteln und hält auch dieselben ihm unter die Nase. Hiezu taugen das Kölnische Wasser, der Hirschhorngeist, der Salmiakgeist, die Hoffmänni-

schen Tropfen, die Naphthen, die ätherischen Oele, der Balsamus vitae Hoffmanni, der aromatische Essig etc. Ferner dienen: aromatische Umschläge auf den Kopf, Reiben der Gliedmassen mit wollenen Tüchern, Bürsten derselben, warme Fussbäder, Senfteige in den Nacken, auf die Waden, die Arme und selbst auf den Kopf gelegt, desgleichen Blasenpflaster und selbst Moxen oder das glühende Eisen. Kann der Kranke wieder schlingen, so flösst man demselben einige Hoffmännische Tropfen, Hirschhorngeist, etwas Wein und nach Umständen auch Castoreum oder Moschus ein, und wenn er sich noch mehr erholt hat, einen Melissen- oder Pfeffermünzthee und etwas Fleischbrühe. Dauert noch ein lähmungsartiger Zustand des Gehirnes und einzelner Gliedmassen fort, so giebt man einen Aufguss von Flor. Arnicae, rad. Serpentariae und andere Mittel, die bei Lähmungen nützlich sind.

§. 1971.

Gegen den Wasserschlag, welcher immer mit einem Congestionszustand gegen das Gehirn in Verbindung zu stehen scheint, können die bei dem Blutschlag angezeigten Mittel und die gegen die hitzige Gehirnhöhlenwassersucht gebräuchlichen Mittel versucht werden. Gegen den Schlagfluss aus Desorganisation bringt man, je nachdem die Form desselben sich mehr dem blutigen oder mehr dem nervösen Schlagfluss nähert, in dem einen Fall die gegen jenen in dem andern die gegen diesen gerichtete Verfahrungsweise in Anwendung.

§. 1972.

Sind durch den Schlagfluss alle Aeusserungen des Lebens plötzlich aufgehoben worden, so müssen noch, so lange das Vorhandensein der Lebensfähigkeit möglich ist, die bei dem Scheintodt üblichen Belebungsversuche unternommen werden.

Die Lähmung.

(Paralysis, Resolutio nervorum.)

Chandler, *Kirkland* (in den im Kapitel vom Schlagfluss angeführten Werken). — *J. Cooke* (Lond. 1821).

§. 1973.

Lähmung ist der Verlust der Bewegungsfähigkeit und der Empfindung in einem Theile, wenn der erstere nicht in einem mechanischen Hinderniss der Bewegung begründet ist und die angegebenen Erscheinungen nicht die Symptome einer vorübergehenden allgemeinen Hemmung der Lebensäusserungen sind.

Ist noch einige Bewegungsfähigkeit vorhanden, so nennt man dieses unvollkommene Lähmung (Paresis), doch wird unter dieser Bezeichnung auch der Zustand verstanden, in welchem zwar die Bewegungsfähigkeit verloren, die Empfindung aber noch vorhanden ist. Die Lähmung der einen Seite des Körpers (die halbseitige Lähmung) pflegt man Hemiplegia, die Lähmung, welche von einer bestimmten Stelle an auf beiden Körperhälften besteht, Paraplegia zu nennen; doch bedeuten diese Ausdrücke vielmehr den Schlag, durch welchen diese Lähmungen entstehen als die Lähmung selbst (Halbschlag, Querschlag).

§. 1974.

Die Lähmungen entstehen in der Mehrzahl der Fälle plötzlich in Folge des eigentlichen Schlagflusses und zuweilen, ohne dass Zufälle eines Gehirnleidens zugegen sind, was auch von Vielen Schlag genannt wird (Apoplexia spinalis); in andern Fällen entwickeln sie sich allmählig. Die Kranken haben oft lange Zeit das Gefühl von Schwäche, Ameisenkriechen, Eingeschlafensein in einem oder meh-

reren Gliedern und manchmal auch die Empfindung, wie wenn kalte Wassertropfen in den Gliedern herabflössen, und zuweilen gehen auch der Lähmung Schmerzen und Zuckungen voraus. Hat sich dieselbe ausgebildet, so ist bei vollkommener Lähmung in dem gelähmten Gliede die Bewegungsfähigkeit und oft auch das Empfindungsvermögen gänzlich verloren, bei unvollkommener Lähmung ist noch etwas Fähigkeit der Bewegung und mehr oder weniger vollkommene Empfindlichkeit vorhanden. Das gelähmte Glied zeigt meistens eine geringere Wärme als die gesunden Theile des Körpers, der Puls ist meistens etwas kleiner als auf der gesunden Seite, doch zeigt er oft auch keine Verschiedenheit von dem dieser Seite, gerne schwillt das gelähmte Glied, das in der Regel sehr schlaff ist, wassersüchtig an, zuweilen, bei einem hohen Grade der Krankheit, wird es brandig, dauert die Lähmung lange Zeit, so tritt mehr oder weniger das Schwinden des Gliedes ein (Aridura).

§. 1975.

Es hat diese Krankheit einen langwierigen Verlauf. Stellt sich die Bewegungsfähigkeit in dem gelähmten Gliede wieder ein, so geschieht dieses meistens sehr langsam und es gehen dieser Umänderung oft das Gefühl von Kriebeln und Ameisenkriechen, so wie starke Schmerzen, zuweilen wie wenn das Glied mit Nadeln gestochen würde, und manchmal auch leichte Zuckungen vorher, die Wärme tritt wieder ein, der Puls hebt sich, die Haut des gelähmten Gliedes wird dünstend etc. In den Tod geht die Lähmung durch die im ganzen Körper gewöhnlich zugleich gesunkene Lebensthätigkeit über, wobei oft noch aufgelegene Stellen und theilweiser Brand die Erschöpfung beschleunigen, zuweilen kommt noch ein wassersüchtiger Zustand hinzu, manchmal breitet sich die Lähmung immer weiter aus, bis sie zuletzt ein zum Leben unbedingt nothwendiges Organ ergreift und

dadurch tödtet. Zuweilen gehen dem Tode allgemeine Zuckungen vorher.

§. 1976.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Am häufigsten findet man in den Centraltheilen des Nervensystems Zerstörungen, oder Veränderungen in ihren Hüllen, wodurch ein Druck auf diese Theile ausgeübt wird; im Gehirn und seinen Umgebungen dieselben Veränderungen, wie beim Schlagfluss, an der Wirbelsäule Caries, Verkrümmungen, Steatome, in der Wirbelhöhle Blut, Eiter, das Rückenmark getrennt, erweicht, verhärtet etc. Nur in seltenern Fällen findet man die Nerven, die zu dem gelähmten Theile gehen, verändert, oder Geschwülste, welche auf dieselben drücken. Zuweilen trifft man [1]) in dem gelähmten Gliede das Muskelgewebe zu Fett umgewandelt und die Arterien verknöchert an. Oft kann man durchaus keine Veränderung im Gehirn, dem Rückenmark oder den Nerven oder im gelähmten Gliede selbst wahrnehmen.

§. 1977.

Ursachen. Die häufigsten Veranlassungen zu Lähmungen sind Verletzungen des Gehirnes oder des Rückenmarkes und zwar sowohl durch äussere Gewalt, wie einen Schlag oder Fall auf diese Theile, als Krankheiten in ihnen und ihren Umgebungen. [2]) Oefters müssen auch allgemein das Nervensystem erschütternde oder auf andere Weise verletzende Einflüsse beschuldigt werden, wie heftiger Schrecken und Verdruss, heftige Krampfanfälle, ein Schlag vom Blitze, viele oder alle Gifte, namentlich Blei, Arsenik, Blausäure. Am seltensten

1) *Schröder van der Kolk*, Observ. anat. path. et pract. Amstel. 1826. F. I. — 2) Vergleiche das über den Schlagfluss Gesagte und den §. über das Ergebniss der Leichenöffnungen.

kommen wohl unmittelbar und ausschliesslich auf den Nerven des gelähmten Theiles wirkende Einflüsse vor, welche die Lähmung hervorbringen. Hieher gehören übrigens Durchschneidung oder Quetschung des Nervens, Druck durch nahliegende Geschwülste, Ausschwitzung in die Nervenscheiden bei heftigen Nevralgien entstanden, andauernd und gänzlich gehemmter Zufluss des Blutes nach einem Theile etc.

§. 1978.

Die nächste Ursache der Lähmung ist die aufgehobene Fähigkeit einzelner Nerven auf die Muskeln bewegend einzuwirken; aber in einem ausgedehntern, weniger gebräuchlichen Sinn: die aufgehobene Fähigkeit einzelner Nerven, Eindrücke aufzunehmen und zum Gehirne zu leiten, und auf die ihnen entgegenstehenden Similartheile irgend einer Art einzuwirken.

§. 1979.

Vorhersage. Die Lähmung ist immer eine hartnäckige Krankheit. Die Lebensgefahr hängt vorzüglich von dem Sitze der Krankheit ab, indem Lähmungen wichtiger innerer Theile augenblicklich tödten können, die Lähmung in äussern Theilen aber für sich nicht leicht tödtlich wird und oft unverändert stehen bleibt; meistens jedoch zeigt auch die Lähmung in äussern Theilen ein tiefes inneres Leiden an, das mit der Zeit dem Leben Gefahr zu bringen droht.

§. 1980.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man erforsche genau die Entstehungsweise der Lähmung und insbesondere den Zustand des Gehirnes und Rückenmarkes, der ihr etwa zum Grunde liegt. Zuweilen können selbst noch Blutentleerungen nützlich sein, wenn die Lähmung durch eine andauernde Blutüberfüllung im Gehirn unterhalten wird; bei dem Pottschen Uebel dienen Fontanelle und Moxen in die Nähe

der leidenden Wirbelbeine gesetzt, ebenso wendet man auch gegen andere Krankheiten der Wirbel und des Rückenmarkes die geeigneten Mittel an; haben Gifte eingewirkt, so sucht man diese aus dem Körper zu führen, zu neutralisiren und einzuhüllen; vermuthet man Ausschwitzungen in den Nervenscheiden, so sucht man dieselben durch Bäder, Einreibungen, Blasenpflaster etc. zur Zertheilung zu bringen. Unterdrückte Hautausschläge, Blutflüsse etc. sucht man wieder herzustellen u. s. w.

§. 1981.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die Nerventhätigkeit zu erwecken, dienen zum Theil die flüchtig erregenden Mittel, wie der Wein, die Valeriana, Angelica, Chenopodium ambrosioides, die versüssten Säuren, die Naphthen, das Ammonium und seine Präparate, namentlich der Hirschhorngeist, die ätherischen Oele, der Kampher, der Moschus, selbst der Phosphor, zum Theil solche mit scharfem Prinzip und zwar sowohl solche, welche zugleich flüchtig erregen, wie die Arnica, die Senega, manche ätherische Oele, zum Theil der Calamus aromaticus etc., als auch solche, die diese Wirkung in geringerm Grade oder gar nicht haben, wie der Senf, die Canthariden, die Coloquinthen, die Gratiola etc., und selbst und zwar vorzüglich auch solche, die zugleich mehr oder weniger narkotisch wirken, wie die Belladonna, Nux vomica und das aus ihr bereitete Strychnin, der Giftsumach (Rhus Toxicodendron), die sibirische Schneerose (Folia Rhododendri) etc. Mehrere dieser Mittel wirken auf einzelne Theile des Nervensystems mehr als auf die übrigen ein, z. B. das Strychnin und der Giftsumach auf das Rückenmark und sind daher in Anwendung zu bringen, wenn die Lähmung von diesen Theilen ausgeht.

§. 1982.

Mit der innerlichen verbindet man auch die äusser-

liche Anwendung entsprechender Mittel, welche immer so nahe als möglich an den gelähmten Nerven und insbesondere an der Stelle, von welcher die Lähmung ausging, angebracht werden müssen, wie z. B. in vielen Fällen von Lähmung der untern Gliedmassen nicht allein auf diese, sondern auch auf die der leidenden Stelle des Rückenmarkes entsprechende Stelle des Rückens. Man lässt Einreibungen von aromatischen Geistern mit Zusatz von Liquor Ammon. caustic, Naphthe, ätherischen Oelen und Balsamen, z. B. mit Balsamus vitae Hoffmanni, oder Cantharidentinctur, so wie von Unguentum nervinum, Linimentum volatile, Linimentum saponato camphoratum etc. machen, lässt das gelähmte Glied mit einem Aufgusse von aromatischen und gewürzhaften Stoffen mit Wein oder Weingeist bähen, stark reiben, künstliche oder natürliche warme Bäder, Schwefelbäder, das Dampfbad, das Bad in heisser Luft oder auch Tropfbäder gebrauchen, einen heissen Strahl des Dampfes an das gelähmte Glied gehen und wendet Senfteige, Blasenpflaster, das Schlagen mit Brennesseln, Einreibungen der Brechweinsteinsalbe, die Acupunctur, Electricität, Galvanismus und die Moxen an. Bei der Lähmung der Zunge wendet man ausserdem Kaumittel, wie Meerrettig, Radix Pyrethri, Senf, Pfeffer etc., an, von welchen Mitteln man auch einen Aufguss bereiten und den Mund ausspülen lassen kann; auch lässt man ätherische Oele auf die Zunge tröpfeln oder vermittelst Zucker auf dieselbe bringen.

Die Starrsucht.

(*Catalepsis*, *Catoche*, *Catochus*.)

Delius (lat. ed. 2. Erlangen 1784). — *Hirschel* (Berl. 1769). — *Fabri* (lat. Halle 1786). — *Göbel* (Diss. Berl. 1818). — *Tissot* (über die Nervenkrankheiten.

§. 1983.

Die **Starrsucht** sind Anfälle, welche sich vorzüglich in plötzlich eintretender, aber nur vorübergehender Hemmung des Einflusses der Willenskraft auf die Muskeln der willkührlichen Bewegung aussprechen, wobei die Gliedmassen oft die Stellung beibehalten, die man ihnen giebt, die Sinnes- und Geistesthätigkeit ruht, oft mit Ausnahme der des Gehöres, wo sodann auch das Bewusstsein vorhanden ist, und bei welchen die vegetativen Prozesse unverändert fortdauern oder geschwächt erscheinen.

§. 1984.

Es giebt verschiedene Grade und Modifikationen der Starrsucht.

Als eine Art Starrsucht und zwar als den niedersten Grad derselben, möchte ich die zuweilen vorkommenden Anfälle von unwillkührlichem **Staunen** ansehen. Es giebt nämlich Personen, die mitten im Gespräch und der Beschäftigung von Anfällen befallen werden, in welchen das Gespräch plötzlich abgebrochen wird, die Augen einen staunenden Blick erhalten und grad hinaus starren, und die Kranken, wenn sie gerade im Gehen begriffen sind, in der nämlichen Richtung unwillkührlich fortlaufen. Es sind die Kranken in diesen Anfällen bei keinem klaren Bewusstsein, es geht aber

der Anfall schnell vorüber, worauf sie sodann in dem angefangenen Gespräch und ihrer Beschäftigung fortfahren.

Bei vollständiger Entwicklung der Krankheit wird der Kranke, oft nach vorhergegangenem Schwindel, Kopfschmerz, Schmerz im Nacken, Eckel, Magenkrampf und dem Gefühl von Schwäche, plötzlich der Fähigkeit der willkürlichen Bewegung beraubt und verliert meistens dabei das Gefühl und das Bewusstsein, er behält die Stellung, in der er sich gerade befand, bei, und es bleiben selbst zuweilen die Glieder in der Stellung, die ihnen ein anderer giebt (wächserne Biegsamkeit) oder sie sinken langsam in die Lage, die ihnen das Gesetz der Schwere anweist. Die Temperatur des Körpers, der Puls, das Athmen und selbst das Aussehen des Kranken sind hiebei nicht oder nur wenig verändert.

In andern Fällen endlich sinkt auch die Temperatur des Körpers zu einem niedern Grade herab, der Puls wird sehr klein und das Athmen kaum merklich, ja es kann, wenn das Athmen und der Puls nicht mehr bemerkt werden, der Kranke für todt gehalten werden, dabei findet zuweilen der merkwürdige Umstand statt, dass während die übrigen Sinne ruhen, doch das Gehör noch wach ist und der Kranke daher das, was um ihn vorgeht, z. B. die Besprechung über seine Beerdigung hört, während er kein Zeichen des Lebens zu geben im Stande ist.

Nach dem Anfalle weiss oft der Kranke von dem, was mit ihm vorgegangen ist, nichts und vollendet die vor dem Anfall angefangene Periode des Gespräches, doch fühlt er sich oft matt, eingenommen im Kopfe und spricht selbst zuweilen irre.

§. 1985.

Solche Anfälle dauern einige Minuten und selbst einen Tag und länger, und kehren meistens in unbestimmter Zeit wieder zurück. — Der Uebergang in

Gesundheit erfolgt allmählig, der in den Tod durch allmähliges Erlöschen des Lebens und auch durch Schlagfluss. Häufiger als in den Tod geht die Krankheit in eine andere Form von Nervenkrankheit, insbesondere die Fallsucht, über.

§. 1986.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man fand, wie bei der Fallsucht, die Gefässe des Gehirns mit Blut überfüllt und auch blutiges Extravasat, so wie Substanzveränderungen verschiedener Art im Gehirne und Fehler in der Lunge, der Leber, den Eierstöcken etc.

§. 1987.

Ursachen. Die Krankheit kommt am häufigsten bei hysterischen Personen vor. Veranlassungen sind Gemüthsbewegungen, insbesondere aus unglücklicher Liebe, Zorn und Schrecken, Unordnungen in der monatlichen Reinigung, Onanie, Entartungen in der Gebärmutter, Würmer, der Missbrauch geistiger Getränke etc. — Die nächste Ursache dieser Krankheit ist unbekannt.

§. 1988.

Vorhersage. Es wird die Starrsucht nur sehr selten tödtlich und verschwindet meistens nach einer kürzern oder längern Zeit, doch ist der Uebergang in eine andere Form von Nervenkrankheit nicht selten.

§. 1989.

Behandlung. Während des Anfalls ist eine eingreifende Behandlung meistens nicht nothwendig und kann selbst schädlich werden. Droht das Leben im Anfall zu erlöschen, so verfährt man wie bei der Ohnmacht und dem Scheintode; droht ein Schlagfluss, so lässt man mit Vorsicht zur Ader. — Ausser dem Anfall sucht man die Ursachen zu beseitigen und wendet, wenn das Nervensystem in dem Zustande erhöhter Reitzbarkeit sich be-

findet, besänftigende Mittel, insbesondere antihysterische an, und wenn zugleich Körperschwäche vorhanden ist, die stärkende Methode, insbesondere China und Eisen.

Die Ohnmacht und der Scheintod.
(*Syncope et Asphyscia.*)

Hensler (Alton. 1770, umgearb. v. Scherf. Altona 1780, neue Aufl. 1787). — *Goodwin* (a. d. Engl. v. Michaelis, Lpz. 1790). — *Kite* (a. d. Engl. v Michaelis. Lpz. 1790). — *Coleman* (a. d. Engl. Lpz. 1793). — *Fothergill* (a. d. Engl. v. Michaelis, Leipz. 1796). — *Zarda* (Prag 1796). — *Wiedemann* (Braunschweig 1797, neue Aufl. 1804). — *Portal* (a. d. Franz. v. Humpel, Wien 1798). — *Ackermann* (Frankf. 1804). — *P. Frank* (System d. med. Polizei). — Anonym. (mit einer Vorrede v. Hufeland. Berlin 1808). — *Wendt* (Breslau 1818). — *Bernt* (Wien 1819). — *Troussel* (Par. 1823, a. d. Franz. v. Schlegel. Ilmenau 1826). — *Flittner* (Samml. k. preuss. Edikte über die Rettung in Lebensgefahr. Berl. 1825).

§. 1990.

Die Ohnmacht ist eine plötzlich eintretende Schwäche in allen Lebensverrichtungen, so dass insbesondere plötzlich die Wärmebildung sich vermindert und der Puls sinkt und der Kranke den Gebrauch der Glieder nicht mehr in seiner Macht hat. -- Der Scheintod ist der Zustand, in welchem der Körper des Kranken nicht mehr von dem einer Leiche unterschieden werden kann, aber noch Lebensfähigkeit vorhanden ist.

§. 1991.

Wird eine Person von Ohnmacht befallen, so wird es ihr schwach, so dass sie sich nicht mehr aufrecht halten kann, es wird ihr dunkel vor den Augen, sie fühlt oft Schwindel und Ohrenklingen, das Gesicht,

insbesondere die Lippen, werden blass und kalt, ebenso die Hände, ein kalter Schweiss bedeckt die Stirne und der Puls wird klein. Bleibt der ohnmächtige Zustand im niedern Grade (Lipothymia, Animi deliquium), so dauern Bewusstsein und Empfindung noch einigermassen fort; steigert er sich aber zu dem höhern Grade (Syncope), so verschwinden das Bewusstsein und die Empfindung völlig, der Puls und der Herzschlag werden kaum mehr fühlbar, der ganze Körper wird kalt, und es wird auch das Athmen kaum merklich. In dem Scheintod endlich haben das Athmen und der Herzschlag ganz aufgehört und es ist der Körper des Kranken von einer Leiche nicht mit Sicherheit zu unterscheiden, insofern dieselbe noch nicht in Verwesung übergegangen ist, indem die übrigen, als Merkmale des Todes angegebenen Erscheinungen, nämlich der gänzlich fehlende Athem und Herzschlag, das Aufhören des Gefühles und der Bewegung, Steifigkeit der Glieder, völlige Kälte des Körpers, Nichtausfluss des Blutes aus der geöffneten Ader, Gebrochensein der Augen, Erschlaffung der Muskeln, das Plattliegen und Mangel der Reitzempfänglichkeit für Electricität und Galvanismus auch beim Scheintode vorkommen.

§. 1992.

Nach Verschiedenheit der Ursachen des Scheintodes zeigen die Körper der scheintodten Individuen verschiedene Zustände, unter welchen vorzüglich *der* merkwürdig ist, dass in dem einen Falle das Gesicht bläulichroth und aufgetrieben ist und die Gefässchen der Augen mit Blut überfüllt sind, wie z. B. bei dem Scheintod der Erhängten, zuweilen bei dem der Ertrunkenen, dem der in mephitischen Grasarten scheintodt gewordenen Individuen und der einen Art des Scheintodes der Neugebornen, und in dem andern Falle das Gesicht blass ist und überhaupt die Zeichen der Blutüberfüllung im Ge-

hirne und andern innern Theilen fehlen, wie dieses namentlich bei der zweiten Art des Scheintodes der Neugebornen der Fall ist. — Bei den Ertrunkenen findet man viel Wasser und Schlamm in dem Munde und dem Schlunde, und es soll oft Wasser bis in die Lunge gedrungen sein. — Die Erfrornen sind kalt wie Eis. — Bei den vom Blitze Getroffenen ist ebenfalls das Gesicht aufgetrieben und roth und es fliesst Blut aus der Nase und den Ohren; die Spuren des Strahles findet man in der Regel nur an der Haut, an welcher man schlangenförmige, rothe Streifen antrifft, und welche oft an denselben mit Blasen bedeckt ist, so wie auch die Haare versengt sind.

§. 1993.

Die Dauer der Ohnmacht ist gewöhnlich nur wenige Minuten, die höhern Grade halten länger an, der Scheintod soll zuweilen mehrere Tage fortbestehen. Erholen sich die Kranken wieder, so stellt sich ein leichtes Klopfen des Herzens ein, die Pupille wird beweglich, es kehrt allmählig die Wärme zurück und der Kranke kommt unter Seufzen, Gähnen und Dehnen der Glieder wieder zu sich, oft stellen sich hierbei Erbrechen, Abgang von Blähungen, stinkende Stuhlentleerungen und zuweilen auch Zuckungen ein.

§. 1994.

Anlage zur Ohnmacht haben schwache und sehr reitzbare Individuen, insbesondere hysterische Personen.

Gelegenheitsursachen der Ohnmacht und des Scheintodes sind: a) solche, die die Blutmasse plötzlich vermindern oder dieselbe zu den Lebensprozessen weniger tauglich machen, daher Blut- und Säfteverlust, alle Einflüsse, die das Athmen hemmen, wie das Einathmen irrespirabler und giftiger Gasarten und die Hemmung des Athmens auf mechanische Weise und eine plötzliche Hemmung im Blutlauf, wie dieses durch manche Herz-

fehler geschieht, und *b*) solche, welche plötzlich die Nervenkraft schwächen und unterdrücken, insbesondere Gemüthsbewegungen, wie Schrecken, Zorn und Furcht, widrige Eindrücke auf die Sinne, grosse Körper- und Geistesanstrengung, heftige Schmerzen, Hunger, Kälte, gewisse Gifte, der Blitzstrahl, alle Ursachen des Schlagflusses etc.

§. 1995.

Das Wesen der Ohnmacht ist eine plötzliche, im ganzen Körper stattfindende Verminderung der Wechselwirkung zwischen Nerven und Blut und den übrigen, dem Nervensystem entgegenwirkenden Similartheilen, entweder erzeugt durch Verminderung des Blutes, so dass hierdurch die Nervenkraft auch so sehr geschwächt wird, dass sie nicht mehr auf die Muskeln einwirkt, oder durch unmittelbare Schwächung der Nervenkraft und Hemmung ihrer Thätigkeit. — Der Scheintod ist der Stillstand dieser Wechselwirkungen mit noch nicht erloschener Lebenskraft.

§. 1996.

Was insbesondere den Scheintod der Ertrunkenen betrifft, so wird derselbe vorzüglich durch die Entziehung des feinen Pabulum vitae bedingt, welches durch das Athmen dem Körper mitgetheilt wird, zum Theil auch durch Blutüberfüllung im Gehirn, durch den gehinderten Blutlauf und vielleicht auch durch den bei dem Untertauchen in das kalte Wasser geschehenden Zurücktritt der Säfte aus der Peripherie nach den innern Theilen.

Der Scheintod bei Erhängten ist ebenfalls durch die Hemmung des Athmens und zugleich durch starke Blutüberfüllung im Gehirne hervorgebracht. Zuweilen wird auch das Rückenmark gezerrt.

Der Scheintod durch mephitische Gasarten wird durch die Hemmung des Athmens und wie es scheint zugleich durch eine hiebei stattfindende giftige Einwirkung

auf die Nerven erzeugt, die bei mehreren Arten der verdorbenen Luft, namentlich dem kohlensauren Gase, dem Kohlendampf und der Kloakenluft, ähnlich, wie bei narkotischen Giften sich äussert.

Der Scheintod der Erfrornen wird wahrscheinlich durch unmittelbare zerstörende Einwirkung der heftigen Kälte auf das Nervenleben und auch durch Zurückdrängung der Säfte aus der Peripherie nach den innern Theilen hervorgebracht.

Der Scheintod der vom Blitz getroffenen ist durch heftige Erschütterung des ganzen Nervensystems und zum Theil auch durch Blutüberfüllung im Gehirne bedingt.

Die eine Art des Scheintodes der Neugebornen, bei welcher nämlich die Kinder ein aufgedunsenes und rothes Gesicht haben, ist durch Blutüberfüllung im Gehirne und gehemmten Lebensprozess in dem Mutterkuchen bedingt und durch langwierige Geburten, wobei die Nabelschnur zusammengepresst wird, veranlasst; die andere Art, bei welchen die Kinder blass aussehen und oft mager und klein sind, ist nicht in Unterdrückung der Lebenskräfte, sondern in wirklicher Verminderung derselben und der nöthigen Stoffe begründet und durch Schwächekrankheiten der Mutter, wobei die Ernährung des Kindes nicht gehörig von statten geht, durch Blutflüsse vor und während der Geburt, durch Gemüthsaffecte der Mutter und zuweilen durch eine Frühgeburt bedingt.

§. 1997.

Vorhersage. Die Ohnmacht ist in der Regel nicht sehr gefährlich, wenn nicht ihre Ursache fortdauert. Ueber das Verhältniss der Zahl der bei dem Scheintod gelingenden Rettungsversuche zu der der unglücklich sich endenden Fälle lässt sich Nichts angeben, da eine sichere Unterscheidung des Scheintodes von dem Tode nicht möglich ist.

§. 1998.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen* Ist die Ohnmacht durch verdorbene Luft erzeugt, so muss der Kranke sogleich in die frische Luft gebracht werden, und es müssen alle das Athmen und den Blutlauf hemmenden Bänder des Körpers gelöst werden; ist Oedigkeit die Ursache, so muss schnell etwas Fleischbrühe gereicht werden; noch fortdauernde Blutflüsse müssen aufs schleunigste gestillt werden; bei Blutüberfüllung im Gehirne muss zur Ader gelassen werden; sind heftige Schmerzen die Veranlassung der Ohnmacht, so muss Opium gegeben werden etc.

§. 1999.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die gesunkenen oder ganz ruhenden Wechselwirkungen zwischen Nerven und Blut wieder herzustellen, bedienen wir uns dreier Wege: 1) wir suchen die Sensibilität wieder zu erwecken, 2) den Blutlauf wieder herzustellen und 3) den auf Blut und Nerven wirkenden Athmungsprozess wieder in Gang zu bringen

§. 2000.

1) *Erweckung der Sensibilität.* Bei den Ohnmachten ist es gewöhnlich genügend, das Gesicht und die Brust des Kranken mit kaltem Wasser zu besprengen, Riechmittel von kölnischem Wasser, Hoffmännischen Tropfen, Naphthen, Salmiakgeist, Hirschhorngeist, ätherischen Oelen etc. anzuwenden, mit denselben Flüssigkeiten, oder mit Essig, aromatischem Essig, aromatischen Geistern etc., die Schläfe, die Brust und die Gliedmassen zu reiben, und wenn der Kranke schlucken kann, ihm einige Hoffmännische Tropfen in Wasser, etwas Wein, und sodann auch Fleischbrühe einzuflössen; bei dem Scheintode wende man noch ausserdem an: starke Reibungen des Körpers, besonders der Handflächen, der Fusssohlen und des Rückens, mit rauhen und besonders mit er-

wärmten Tüchern, mit Werg, Stroh oder mit Bürsten, Kitzeln des Schlundes mit dem Finger oder mit einer in Oel getauchten Feder, das Aufträpfeln von scharfen Dingen auf die Zunge, Prikeln zwischen den Nägeln der Finger und der Zehen mit Nadeln, Senfteige auf verschiedene Stellen des Körpers gelegt, Peitschen mit Brennesseln, trockene Schröpfköpfe, das Aufträpfeln von Siegellack, Moxen, Tabaksrauchklystiere, die Electricität und den Galvanismus; auch hat man Einspritzungen von warmem Wasser und Milch und von Reitzmitteln in die Adern empfohlen.

§. 2001.

2) *Wiederherstellung des Blutlaufes.* Wir vermögen auf dreierlei Weise erregend auf den Blutlauf zu wirken. 1) Durch Beförderung der centripetalen Blutbewegung vermittelst der alt-herkömmlichen Reibungen nach dem Verlaufe der Gefässe von der Peripherie gegen den Stamm des Körpers hin. Diese Methode ist sehr zweckmässig, da sie den Gang der Natur nachahmt, da auch bei der Entstehung des Thieres die Blutbewegung zuerst eine centripetale ist. – 2) Durch Erhöhung der Lebensthätigkeit in den Capillargefässen, vermittelst Anwendung der Wärme durch Auflegen von Ziegelsteinen auf die Fusssohlen, die innere Seite der Schenkel, die Herzgrube etc. und warme Sand- oder Aschbäder und vermittelst der allgemeinen Reibungen des Körpers, und 3) durch Erregung der Herzbewegung, vermittelst leichter electrischer Schläge, die man durch die Brust in der Herzgegend leiten kann und der von *Carraro* bei Thieren mit Glück in Anwendung gebrachten Acupunctur des Herzens.

Diese neue, von *Carraro* empfohlene Methode scheint zwar keineswegs gefahrlos zu sein und es ist daher immer mit den centripetalen Reibungen und der peripherischen Erwärmung der Anfang zu machen, doch ist dieselbe keineswegs zu verwerfen und von ihr und noch mehr

von der Electropunctur des Herzens allerdings etwas zu erwarten. Ich habe bei einem plötzlich verschiedenen, früherhin gesunden Mädchen, nachdem mehrere Stunden hindurch die gewöhnlichen Belebensversuche fruchtlos unternommen worden waren, eine Acupuncturnadel in das Herz eingeführt, worauf keine Herzbewegung wahrgenommen werden konnte; hierauf habe ich eine Acupuncturnadel, die durch ein an dem Griffe derselben befindliches Ringchen und eine Kette mit einer schwachen Electrisirmaschine in Verbindung gesetzt war, in das Herz gesenkt und electrische Schläge durch dieselbe geleitet, worauf in der That mehrere Contractionen des Herzens erfolgten, die vermittelst des Stethoscops deutlich wahrgenommen werden konnten; doch wurde der Kreislauf hierdurch nicht hergestellt und das Mädchen nicht mehr zum Leben gebracht. Bei der Leichenöffnung zeigte sich kein Bluterguss in der Höhle des Herzbeutels.

§. 2002.

3) *Wiederherstellung des Athmens.* Man bläst dem Kranken Luft durch Mund und Nase ein, oder, was vorzuziehen ist, vermittelst einer Röhre, die man durch den Mund in den Kehlkopf bringt, unmittelbar in die Luftröhre, oder bringt, vermittelst eines geeigneten Blasbalges, reine athmosphärische Luft oder Sauerstoffgas in die Wege der Respiration; doch darf das Einblasen der Luft nicht mit zu grosser Gewalt geschehen, besonders bei Kindern. Nach jedem Act des Einblasens von Luft drückt man sanft die Brust von unten nach oben zusammen, wodurch ein abwechselndes Ein- und Ausströmen von Luft in die Lunge bewirkt und somit das Athmen nachgeahmt wird. In der Zeit, in welcher das Einblasen der Luft nicht fortgesetzt werden kann, fächle man dem Kranken frische Luft zu.

§. 2003.

Diese Belebungsversuche müssen 5 bis 7 Stunden

fortgesetzt werden. Treten keine Erscheinungen des Lebens ein, so legt man den Körper noch so lange in ein warmes Bett oder ein warmes Sand oder Aschbad, bis unzweifelhafte Zeichen des Todes sich einstellen.

§. 2004.

Die angegebene Verfahrungsweise passt im allgemeinen in allen Arten des Scheintodes, doch muss die Behandlung auch nach der erregenden Ursache eingerichtet werden, und erhält hiernach verschiedene Modificationen.

§. 2005.

Die Ertrunkenen werden eine Zeit lang in eine solche Lage gebracht, dass der Kopf und insbesondere der Mund etwas nach unten liegt, so dass das Wasser aus dem Mund und der Lunge ausfliessen kann, doch ist das Aufheben an den Füssen (das Stürzen) verwerflich; ihr Mund muss von Schleim und Schlamm gereinigt werden, sie müssen abgetrocknet und in warme Tücher eingehüllt werden, wenn nämlich nicht das Ertrinken in eiskaltem Wasser statt fand, in welchem Falle die Behandlung des Scheintods der Erfrornen eintreten muss. Hierauf sucht man die Sensibilität und den Blutlauf wieder herzustellen und bläst Luft ein. Zuweilen muss dem schon zu sich gekommenen Kranken zur Entleerung des Schleimes ein Brechmittel gegeben werden. Bei dringendem Verdacht von blutigem Schlag lässt man zur Ader.

§. 2006.

Erhängte bringt man nach schleuniger Lösung des Strickes, in eine aufrechte Lage in frischer Luft und begiesst stark den Kopf mit frischem Wasser, zugleich öffnet man eine Vene am Arm und wenn das Blut nicht fliesst eine Jugularvene, hierauf wird Luft eingeblasen und mit den übrigen Belebungsversuchen be

gonnen. Auf den gequetschten Hals kann man erweichende Bähungen machen lassen.

§. 2007.

Bei dem Scheintode durch das Einathmen mephitischer Dünste bringt man den Kranken sogleich in frische Luft und in eine aufrechte Lage, begiesst den Kopf und den ganzen Körper desselben eimerweis mit frischem Wasser und spritzt auch frisches Wasser in sein Gesicht und auf die Brust, zugleich öffnet man eine Ader, wäscht und reibt den ganzen Körper mit Essig und giebt Klystiere mit Essig. Auch wird Luft eingeblasen, der Körper mit Bürsten gerieben etc.; doch muss das Werfen mit Wasser mehrere Stunden fortgesetzt werden und darf nicht lange unterbrochen werden. Auch hat man empfohlen, ein der schädlichen Luftart chemisch entgegenwirkendes Gas in die Lunge zu bringen, wie z. B. bei Kloakenluft schwache Chlordämpfe, doch ist jedenfalls hierin grosse Vorsicht nothwendig. Ist der Kranke nicht mehr scheintod, aber von tetanischen Krämpfen und andern schweren Zufällen befallen, so lässt man zur Ader, setzt die kalten Begiessungen, Essigwaschungen etc. fort, giebt dem Kranken innerlich frisches Wasser mit Essig und späterhin etwas Melissenthee, schwarzen Kaffe und andere gelind erregende Dinge.

Damit bei der Herausbringung aus dem mit mephitischer Luft gefüllten Raume kein neues Unglück sich ereigne, müssen sogleich die Luftlöcher geöffnet, grosse Massen Wasser oder Seifensiederlauge oder einer Auflösung von Chlorkalk hineingegossen und brennende Strohwische hineingeworfen werden, und die zur Rettung in jenen Ort sich begebenden Personen sich durch einen mit Essig oder verdünnten Salmiakgeist getränkten und vor den Mund gehaltenen Schwamm, durch Besprengung der Kleider mit kaltem Wasser oder einer Auflösung

von Chlorkalk, durch ein Seil, an das sie, um wieder herausgezogen werden zu können, gebunden werden, und, wo es vorhanden ist, durch ein Respirationsrohr sichern. Man kann erst mit weniger Gefahr sich in den gefährlichen Raum begeben, wenn ein in denselben gebrachtes Licht fortbrennt.

§. 2008.

Bei dem Scheintode durch Erfrieren muss man sich hüten, den Körper des Erfrorenen zu schnell zu erwärmen. Man bedecke denselben zuerst mit Schnee oder mit Tüchern in eiskaltes Wasser getaucht, oder bringe ihn in eine Wanne mit eiskaltem Wasser, bis der Körper etwas aufthaut, sodann reibe man ihn mit Tüchern, in etwas weniger kaltes Wasser getaucht, bringe ihn hierauf in ein mässig erwärmtes Bett und sodann auch in ein mässig erwärmtes Zimmer, und bringe nunmehr die gewöhnlichen Belebungsversuche mit gehöriger Vorsicht in Anwendung. Zuweilen ist auch eine Aderlässe nothwendig.

§. 2009.

Die vom Blitze Getroffenen übergiesst man stark mit kaltem Wasser, besonders den Kopf derselben, lässt ihnen, wenn man Blutüberfüllung im Gehirne annehmen kann, zur Ader, hält ihnen Salmiakgeist unter die Nase, spritzt denselben, mit Wasser verdünnt, in die Nasenlöcher ein, lässt auch einige Tropfen auf die Zunge fallen und bringt die übrigen Belebungsversuche in Anwendung. Von einigen ist empfohlen worden, die vom Blitz Getroffenen in ein Erdbad zu bringen, das heisst, den Körper derselben in eine Grube zu legen und eine Hand hoch mit frischer Erde zu bedecken.

§. 2010.

Bei der ersten Art des Scheintodes der Neugebornen, der von Blutüberfüllung im Gehirne herrührenden, sorge man, dass die Nabelschnur nicht sogleich unter

bunden werde; kommt der Blutlauf nicht zu Stande, so wird die Nabelschnur abgeschnitten und etwas Blut entleert; ist dieses nicht mehr möglich, so setzt man 1 – 2 Blutegel auf die Brust und bringt das Kind in ein warmes Bad; zugleich reinigt man den Mund des Kindes und fängt mit Vorsicht an Luft einzublasen; hierauf werden auch allmählig die übrigen Belebungsversuche in Anwendung gebracht.

Bei der zweiten Art, dem Scheintod aus Schwäche, lässt man das Kind längere Zeit in Verbindung mit dem Mutterkuchen, schlägt es in ein warmes Tuch ein, reinigt den Mund, bläst Luft ein und sucht auf die schon angegebene Weise den Blutlauf und die Sensibilität herzustellen; hierauf unterbindet man die Nabelschnur legt, das Kind einige Zeit in ein warmes Bad und setze sodann die gewöhnlichen Belebungsversuche wieder fort.

Anhang zu den Nervenkrankheiten.

Zusammengesetzte Krankheitsformen mit vorwaltender Nervenaffection.

Die durch Vergiftung entstandenen Krankheiten.

Gmelin (thier. u. min. Gifte, Lpz. 1776, n. Ausg. m. Vorrede v. Blumenbach, Erf. 1810, Pflanzengifte Erf. 1803). — *Plenk* (Wien 1801). — *Jos. Frank* (Wien 1803). — *Orfila* (2 Bde. Par. 1813, nach d. neuesten Aufl. deutsch herausgegeb. v. Kühn, Lpz. 1830). — *Schneider* (2te Aufl. 1821). — *Marx* (Goett. 1827—29). — *Christison* (a. d. Engl. Weimar 1831).

§. 2011.

Krankheiten aus Vergiftung sind solche Krankheitszufälle, welche durch Stoffe erzeugt sind, die unmittelbar, das heisst, ohne zu grosse Erregung und ihre Folgen, die Lebenskräfte zu zerstören im Stande sind und zwar, ohne dass dieses durch Zerstörung der Organisation geschieht.

§. 2012.

Die Vergiftungskrankheiten sind von verschiedenartigen Zufällen begleitet, je nachdem das eine oder das andere Gift eingewirkt hat; in den höhern Graden der Krankheit aber, in welchen die wesentlichen Vergiftungserscheinungen stärker hervortreten, stellen sie Krankheitsformen dar, die unter einander die grösste Aehnlichkeit haben, ja oft nicht von einander zu unterscheiden sind. Die meisten Gifte bringen zunächst in dem Theile, durch welchen

sie aufgenommen worden sind, Störungen hervor, leichteres Magenweh oder heftigeren Magenkrampf, Erbrechen, selbst die Zufälle von Magenentzündung, Colik, Durchfälle oder auch Verstopfung, einige veranlassen Schmerz und Zusammenschnürung im Halse; die meisten verursachen bei höherm Grade der Wirkung Eingenommenheit des Kopfes, Kopfschmerz, zum Theil Betäubung, bei längerer Einwirkung einer geringern Menge des Giftes einen cachectischen Zustand; sämmtliche Gifte bringen aber vorzüglich ein Gefühl von Auflösung der Körperkräfte und insbesondere ein Gefühl von Muskelschwäche hervor, sie bewirken, wenn sie in geringen Mengen, aber öfters, genommen wurden, allmählig sich entwickelnde Lähmungen, und verursachen, wenn sie in grosser Masse in den Körper gekommen sind, heftige, meistens mit Unterdrückung des Bewusstseins verbundene tetanische Verdrehungen des ganzen Körpers, Lähmung, aussetzendes Athmen und aussetzenden Herzschlag, und auf diese Weise den Tod.

§. 2013.

Bei den **Leichenöfnungen** findet man häufig die Schleimhaut des Magens und Darmkanals geröthet, zuweilen auch brandige Stellen in diesen Theilen und das Gehirn, die Lungen etc. mit Blut überfüllt, doch sind häufig diese und andere Veränderungen, die man etwa antrifft, nicht in dem Grade vorhanden, dass sie die genügende Todesursache sein konnten. Zuweilen bemerkt man auch eine Abweichung in der Beschaffenheit des Blutes.

§. 2014.

Ursachen. Die Substanzen, welche die oben bezeichnete Wirkung äussern, gelangen in der Regel durch die ersten Wege in den Körper, indem sie dahin bei absichtlicher Vergiftung oder durch zufällige Beimengung zu den Nahrungsmitteln oder zu dem Schleime

im Munde gebracht werden, zuweilen sind Gifte in der Athmosphäre enthalten und werden eingeathmet, andere werden durch Verwundung des Körpers beigebracht, wie z. B. das Gift giftiger Thiere etc.

§. 2015.

Wesen der Krankheit. Es entsteht die Frage: sind die Krankheitszufälle, welche durch die Vergiftungen hervorgebracht werden, eigenthümliche Krankheitsprozesse und demnach eigene Krankheitsarten oder sind sie nur Zufälle, welche auch ohne die Einwirkung eines bestimmten Giftes zu Stande kommen können. Gewisse giftartige Stoffe giebt es, die offenbar eigenthümliche Krankheitsprozesse zur Folge haben, das sind die sog. contagiösen Gifte, wie z. B. das Wuthgift, indem durch dieselben specifische Prozesse erzeugt werden, wodurch das Contagium vervielfältigt wird; auch giebt es gewisse Gifte, die eine eigenthümliche Veränderung in den Säften und den festen Theilen bewirken, die auf specifische Krankheitsprozesse schliessen lassen; die den Giften allgemein zukommende Wirkung aber besteht in Krankheitszufällen, die auch ohne Vergiftung vorkommen und wir müssen daher, wenn wir nicht auf die erzeugende Ursache, sondern nur auf die Form der Krankheit sehen, die Vergiftungen zu jenen Krankheitsarten zählen, deren Form sie darstellen.

Untersuchen wir, welches die wesentlichen Krankheitszufälle der durch Gifte veranlassten Krankheiten sind und zu welchen Krankheitsgattungen und Arten daher die Vergiftungen gehören, so werden wir erkennen, dass die oft vorkommenden fehlerhaften Absonderungen, Entzündungen und Congestionen es nicht sind, indem diese Zufälle oft fehlen oder nur in einem geringen Grade vorhanden sind und doch die tödtliche Wirkung des Giftes eintritt. Ein Zufall, der bei allen Vergiftungen sich einstellt, wenn das Gift in grosser Menge

gewirkt hat, sind allgemeine Krämpfe, die die Form der Eclampsia darstellen, aber auch zu dieser Krankheitsart können die durch Vergiftung entstandenen Krankheiten nicht gezählt werden, da bei allmähliger Wirkung des Giftes die Eclampsie oft nicht entsteht, sondern nur allmählig sich Lähmungen ausbilden. Die einzige, allen Giften gemeinschaftliche und unter allen Verhältnissen eintretende Wirkung ist die Auflösung der Lebenskräfte, die in den höhern Graden die Lähmung darstellt und wir müssen demnach die durch Vergiftung erzeugten Krankheiten ihrer wesentlichen Erscheinung nach zu den Adynamien zählen.

Eine Adynamie oder Lähmung, die also die wesentliche Erscheinung aller Vergiftungen ist, kann auf zweierlei Weise entstehen, durch Ueberreitzung und durch unmittelbare Schwächung. Manche Gifte bringen nun allerdings zuweilen Entzündungen und Congestionen hervor, die für sich schon tödtlich werden können, unter andern Verhältnissen äussern aber die nämlichen Gifte ihre giftige Wirkung, ohne dass die erregende Wirkung in einem solchen Grade eingetreten wäre, dass die Zerstörung des Lebens die Folge davon hätte sein können. Die Gifte unterscheiden sich demnach von andern Stoffen, die auch in kleinen Gaben sehr nachtheilig wirken können, wie z. B. den Naphthen, dadurch, dass sie nicht, wie diese, blos durch zu starke Erregung und dadurch bewirkte Congestion, Blutextravasat, Entzündung etc. dem Leben nachtheilig werden, sondern ohne Ueberreitzung das Leben zu zerstören vermögen.

Diese unmittelbare Zerstörung der Lebenskräfte könnte dadurch bewirkt werden, dass die Gifte, die in die Wege des Blutumlaufes zu gelangen pflegen, das Blut in der Art verändern, dass es nicht mehr im Stande ist, die Lebensprozesse, die in der Wechselwirkung zwischen Nerven und Blut bestehen, nämlich die Blut-

bewegung, die Wärmebildung, die Absonderungen und die Ernährung zu unterhalten, und es scheint auch theilweise das Gift diese Wirkung hervorzubringen, die Hauptwirkung des Giftes besteht aber nicht in den so eben bezeichneten Störungen, indem oft Blutbewegung, Wärmebildung etc. noch unverändert fortdauern, nachdem schon schwere Vergiftungszufälle eingetreten sind, es äussert sich vielmehr die Vergiftung, vorzüglich in Störungen solcher Lebensprozesse, an welchen das Blut keinen Antheil nimmt, nämlich in Störungen der Sinnesverrichtungen und der Muskelbewegung.

Es ist nun allerdings auch möglich, dass die Gifte zuerst das Blut verändern und dadurch nur secundär die Nerventhätigkeit zerstören, indem sie das Blut unfähig machen, den Reitz dem Nervensystem zu gewähren, welcher auch zur Fortdauer der rein-sensiblen Verrichtungen nothwendig ist; doch ist auch dieses nicht die alleinige Wirkung der Gifte, indem bei Fröschen, die man ganz von Blut entleert, doch noch geraume Zeit Empfindung, Bewegung und Bildung von Vorstellungen fortdauern, während sie durch Gifte sehr schnell getödtet werden können.

Diesemnach bin ich anzunehmen geneigt, dass die Gifte (und zwar vorzüglich, wenn sie resorbirt sind) dadurch wirken, dass sie unmittelbar die Nervenkraft zerstören (vielleicht das in den Nerven wirkende Agens neutralisiren), wobei, bis dieses vollständig bewirkt ist, Unordnungen in den Bewegungen im Nervensysteme nothwendigerweise eintreten müssen.

Aus dieser Erklärung der Wirkungsart der Gifte geht auch hervor, wie die Gifte als Arzneimittel wirken können, indem sie in kleinern Gaben genommen, dem Nervensystem nicht das in ihm wirkende Etwas ganz entziehen, sondern es nur vermindern, wo es z. B. zu sehr angehäuft ist, oder in zu reichlichem Grade sich

entwickelt, und daher Schmerzen und Krämpfe stillen, was auch metallische Gifte zu thun vermögen, wie z. B. Zinkpräparate, das salpetersaure Wissmuthoxyd, das salzsaure Silber etc.

Nehmen wir diese unmittelbare, nicht auf dem Wege der Ueberreitzung erfolgende Zerstörung der Lebenskräfte als die wesentliche Wirkung der Gifte an, und setzen wir in das Vorhandensein dieser Eigenschaft das characteristische Merkmal von Gift, so werden wir den gewöhnlich begangenen Fehler in der Begriffsbestimmung von Gift vermeiden, nämlich in der geringen Menge, in welcher ein Stoff wirkt, das wesentliche Merkmal des Giftes zu suchen, was aus vielfachen Gründen unstatthaft ist.

§. 2016.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Lässt sich annehmen, dass das Gift noch im Magen des Kranken befindlich ist, so muss schleunigst dasselbe ausgeleert werden. Bei nicht scharfen Giften giebt man sogleich ein Brechmittel, wozu gewöhnlich das schon von *Boerhave* bei Vergiftungen gerühmte Zincum sulphuricum gewählt wird, weil es am schnellsten wirkt und nicht leicht Durchfälle erregt. Man giebt dasselbe zu 6 — 12 Granen auf einmal und sodann alle 5 — 10 Minuten 6 Grane und auch mehr, bis die Wirkung eintritt. Bei scharfen Giften wird gewöhnlich die Anwendung der eigentlichen Brechmittel missrathen, weil durch dieselben die ohnehin bestehende grosse Reitzung noch vermehrt werden würde, man empfiehlt dagegen grosse Mengen warmes Wasser, schleimige Dinge, Seifenauflösung etc. trinken zu lassen und den Schlund vermittelst des in denselben eingebrachten Fingers zu reitzen, damit Erbrechen erfolge, wo dieses etwa nicht durch das Gift selbst in hinreichender Stärke erregt worden ist; es hängt übrigens immer von den gerade

obwaltenden Umständen in dem einzelnen Falle ab, ob ein eigentliches Brechmittel bei der Einwirkung scharfer Gifte gegeben werden darf oder nicht, indem es auch Fälle giebt, in welchen ein Brechmittel nothwendig wird, indem Gift, das im Magen liegen bleibt, auch auf die Gefahr hin, die Entzündung im Augenblick noch zu vermehren, hinweggeschafft werden muss. Endlich bedient man sich auch zur Hinwegbringung des Giftes mit grossem Vortheil der Magenpumpen (von *Read*), durch welche wiederholt lauwarmes Wasser in den Magen gebracht und, nachdem dasselbe von dem Gift in sich aufgenommen hat, wieder ausgezogen wird.

So lange noch Gift in dem Magen sich befindet, dürfen keine Abführungsmittel gegeben werden, ist dagegen dieses nicht mehr der Fall und vermuthet man, dass von dem Gifte in die dünnen und dicken Gedärme gelangt sei, so sucht man dasselbe nach unten durch geeignete Abführungsmittel, z. B. Ricinusöl, auszuleeren.

§. 2017.

Um das in den ersten Wegen liegende Gift, das meistens nicht ganz vollkommen ausgeleert werden kann, unschädlich zu machen, sucht man es zu verdünnen, einzuhüllen und mit Stoffen zu vereinigen, mit welchen dasselbe chemisch verbunden, eine weniger unschädliche Substanz darstellt. -- Zu den beiden erstern Zwecken lässt man den Kranken warmes Zuckerwasser, Eibischthee, Milch, Magsaamenöl, Oliven- oder Süssmandelöl, frische Butter, Eiweiss, warmes Seifenwasser etc. in reichlicher Menge nehmen, wählt jedoch unter diesen Mitteln jedes Mal diejenigen, die der Erfahrung gemäss, oder wegen ihrer chemischen Eigenschaft bei dem eingenommenen Gifte vorzugsweise passen. — Zum letztern Zwecke giebt man solche Mittel, die mit dem Gifte in chemische Verbindung eingehen und entweder eine Substanz bilden, die keine giftige Eigenschaft mehr besitzt oder wenigstens

in geringerm Grade die giftige Wirkung äussert, indem sie z. B. im Wasser unlösliche Stoffe bilden. Die Unlöslichkeit einer Substanz im Wasser gewährt übrigens keine Bürgschaft, dass dieselbe nicht giftig wirke, indem der Magen manche Stoffe auflöst, die das Wasser für sich nicht zu lösen im Stande ist und man kann daher nur diejenigen Mittel mit Sicherheit als Gegengift betrachten, die auch durch die Erfahrung als solches bestätigt worden sind.

§. 2018.

Ist das Gift vermittelst einer Verwundung beigebracht worden, so sucht man dasselbe aus der Wunde auszuziehen oder es in derselben einzuhüllen oder zu zerstören; man wäscht daher die Wunde sorgfältig aus, saugt s-e aus, setzt Schröpfköpfe oder eine Luftpumpe auf dieselbe, bringt erwärmtes Baumöl in sie ein und reibt zugleich dasselbe in die Umgegend ein; man scarificirt und ätzt die Wunde und erhält die Eiterung in derselben; auch unterbindet man das verletzte Glied oder nimmt es bei sehr schnell tödtlich werdenden Giften schleunigst hinweg.

§. 2019.

Ist die giftige Materie auf dem Wege des Athmens in die Lunge gelangt, so bringt man schnell den Kranken in frische Luft, die man auch bei mangelndem Athmen einblasen kann und lässt auch Stoffe einathmen, die die giftige Substanz neutralisiren; doch muss man sich hüten, durch dieses Verfahren die Lunge zu sehr zu reitzen.

§. 2020.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um den Blutandrang nach dem Kopfe, welcher vorzüglich bei den mit Eclampsie verbundenen Vergiftungen satt findet, zu mässigen, kann man vorerst die kalten Begiessungen des Kopfes zu Hülfe ziehen. Zu

demselben Zwecke, so wie gegen die Entzündung in dem Magen und andern Organen dienen Blutentleerungen. Ich habe kräftige Aderlässe in einem Falle von Vergiftung durch Blausäure, in zwei Vergiftungen durch Kohlendampf, zwei durch Kloakenluft und in einem durch Blei, in welchen sämmtlichen Fällen heftige Eclampsie vorhanden war, mit dem grössten Nutzen in Anwendung gebracht. Ich halte dafür, dass durch dieses Mittel nicht allein die Congestion nach dem Gehirne und die sich etwa entwickelnden Entzündungen gehoben werden, sondern dass dasselbe auch dadurch wirke, dass hierdurch auch der Hauptträger des Giftes, zu welchem es auf dem Wege der Aufsaugung gelangt und von wo aus es auf die Nerven wirkt, nämlich das Blut, theilweise entleert wird, wornach es den Nervenkräften, besonders wenn die Säfte zugleich durch reichliches mildes Getränk verbessert werden, eher möglich wird, dem Gifte zu widerstehen und auf diese Weise erleichtert, mit dem Reste des Blutes die Lebensprozesse fortzusetzen. Durch Mässigung der Congestionen und Verbesserung der Säfte wirken vielleicht auch die bei vielen Vergiftungen sehr gerühmten Pflanzensäuren mit reichlichem Wasser verdünnt. Um die Krämpfe zu mässigen, können ausser der eben angegebenen, vorzüglich bei den mit Unterdrückung der Gehirnthätigkeit verbundenen Krämpfen (Eclampsia) passende Methode auch verschiedene andere besänftigende Mittel, wie z. B. Bäder, zu Hülfe gezogen werden. Das Opium, das früher als ein Hauptmittel in den meisten Vergiftungen angesehen wurde, kann wohl nur dann in Anwendung gebracht werden, wenn die Krämpfe nicht mit einer Unterdrückung der Gehirnthätigkeit in Verbindung stehen. — Gegen die die eigentlich wesentliche Erscheinung der Vergiftung bildende Auflösung der Kräfte und die Lähmungen dient endlich, so weit die Unordnung in der Blutbewegung

diese Mittel zulässt, die erregende Methode, der schwarze Kaffe, die versüssten Säuren, die Naphthen, das Ammonium, die Angelica, Serpentaria, Arnica, China, Reibungen des Körpers mit geistigen und aromatischen Stoffen etc.

§. 2021.

Die Vergiftungskrankheiten können nach Verschiedenheit der Nebensymptome, die die wesentlichen Erscheinungen der Vergiftungen begleiten, in folgende Ordnungen eingetheilt werden: 1) Die Vergiftungen durch narkotische Substanzen. 2) Die Vergiftungen durch scharfe Gifte. 3) Die durch austrocknende Gifte und 4) die durch septische Gifte.

1) Vergiftungen durch narkotische Substanzen.

§. 2022.

Die narkotischen Vergiftungen können in Hinsicht ihrer Erscheinungen in drei Reihen getheilt werden: a) in eine solche, in welcher dem Narcotismus keine oder nur eine unbedeutende Erregung vorausgeht, b) in diejenige, in welcher im Anfange der Wirkung des Giftes eine deutliche Gefäss- und Nervenerregung, wie auf den Gebrauch von Reitzmitteln, sich einstellt, und c) in diejenige, in welcher Erscheinungen sich kund geben, wie nach dem Gebrauche scharfer Mittel. Die Vergiftung durch Blausäure, die durch Opium und die durch Belladonna mögen also Repräsentanten dieser drei Ordnungen angeführt werden.

§. 2023.

a) *Die Vergiftung durch Blausäure.* Die ersten Zeichen der zu starken Wirkung der Blausäure sind:

das Gefühl von Auflösung der Kräfte, Schwindel, Kopfschmerz, Uebelkeit, Erbrechen und zuweilen etwas Magenweh; im höhern Grade des Uebels sehr erweiterte Pupillen, nur wenn Krämpfe sich einstellen, Verengerung derselben, Verlust des Sehvermögens, die Augen sind fest anzufühlen, die Augenlieder hängen herab und haben varicös ausgedehnte Gefässe, der Herzschlag wird schwankend und aussetzend, es gesellen sich unwillkührliches Zittern hinzu und sodann heftige Krämpfe, Trismus, furchtbare Verdrehungen der Glieder und Verzerrung der Gesichtsmuskeln und vollkommener allgemeiner Starrkrampf mit Bewusstlosigkeit, der Koth und der Harn gehen unwillkührlich ab, oft ergiesst sich auch der Samen, im höchsten Grad des Leidens macht das Athmen grosse Pausen, und der Herz- und der Arterienschlag scheinen zu verschwinden, der Kranke fällt in Scheintod.

Diese verschiedenen Grade der Vergiftung folgen nicht immer in der angegebenen Reihenfolge aufeinander, es stellt sich oft sogleich der höchste Grad ein, so dass selbst die Kranken unmittelbar nach der Aufnahme des Giftes wie vom Blitze getroffen niederstürzen und augenblicklich sterben; auch folgen die leichtern Grade auf die heftigen, wenn Besserung zu Stande kommt; zuweilen folgen noch Zufälle von Hirnentzündung und es bleibt einige Zeit ein Schmerz in der Tiefe der Augen und der Schläfen und im Hinterhaupte und manchmal auch Empfindlichkeit des Magens zurück. Bis zum völligen Verschwinden der Vergiftungssymptome dauert es oft mehrere Tage und länger.

In den Leichnamen findet man meistens die Gefässe des Gehirns mit Blut überfüllt, zuweilen auch entzündliche Stellen in der Lunge, dem Magen und dem Darmkanal, das Blut sehr dunkel und den Blausäuregeruch zeigend.

§. 2024.

b) *Die Vergiftung durch Opium.* Es äussert sich

die zu starke Wirkung des Opiums durch starke Erregung des Gefäss- und Nervensystems, einen häufigen und vollen Puls, Turgescenz der Haut, Schweisse, zuweilen mit symptomatischen Ausschlägen verbunden, Aufregung des Gehirns, eine Art Rausch, hierauf Abgespanntheit und tiefen Schlaf. — Nach wiederholten Einwirkungen der Art werden das Gehirn und die Sinne abgestumpft und der Kranke selbt blödsinnig. — Nach sehr grossen Gaben ist der Zeitraum der Aufregung kurz, wildes Herumschweifen der Augen, Verengerung der Pupillen, Lichterscheinungen, wildes Delirium, aufgetriebenes blaurothes Gesicht, bald hierauf der tiefste Sopor, Unbeweglichkeit der Pupillen und pralles, mit überfüllten Blutgefässen durchzogenes Auge, erschwertes, schnarchendes, zuweilen aber auch unmerkliches Athmen, ein wankender aussetzender Puls in immer grössern Pausen, auf welche Weise oft das Leben erlöscht, meistens aber Trismus, krampfhafte Verdrehungen der Glieder und allgemeiner Starrkrampf, unter welchem der Tod zuweilen nach hinzugekommenem Schlaganfall eintritt.

In den Leichen trifft man Blutüberfüllungen im Gehirne und Entzündungen in verschiedenen Organen, insbesondere dem Magen und dem Darmkanal an.

§. 2025.

c) *Die Vergiftung durch die Belladonna.* Es entsteht Trockenheit im Halse, erschwertes Schlingen und Zusammenschnürung des Halses, oft auch Empfindlichkeit in der Magengegend und Erythemata im Gesichte und andern Theilen des Körpers, Gesichtstäuschungen, zuweilen Verengerung, meistens aber Erweiterung der Pupillen, Schwindel und Kopfschmerz; in höhern Graden der Vergiftung heftige Schmerzen im Halse, Würgen und entzündliche Geschwulst der Mandeln, Erbrechen, Magenkrampf, wildes Irrereden und Neigung zum Beissen, sodann Sopor, Trismus, heftige Verdrehungen der Glie-

der, Starrkrampf, unwillkührlicher Abgang des Kothes, Tod meistens durch Schlagfluss.

Die Leichenöffnungen geben ungefähr dieselben Resultate, wie bei den Vergiftungen durch die Blausäure und das Opium, doch sind hier meistens der Magen und der Darmkanal und der Schlund mehr entzündet.

§. 2026.

In der Behandlung der narkotischen Vergiftungen ist eine vorzügliche Aufgabe, das Gehirn zu schützen, wesswegen sogleich kräftige Begiessungen des Kopfes mit kaltem Wasser vorgenommen werden und nach Umständen auch eine und selbst mehrere Aderlässe unternommen werden müssen. — Das Gift sucht man durch Brechmittel zu entleeren. — Die Gegengifte scheinen meistens das nicht zu leisten, was man sich von ihnen verspricht. Gegen die Blausäure sind gerühmt worden: das Olivenöl, die Milch, das Chlor, das Ammoniak, das kaustische Kali, der concentrirte Kaffe, das Terpenthinöl, das schwefelsaure Eisen, das Opium; gegen Opium der Weinessig und andere vegetabilische Säuren, die übrigens noch Orfila, so lange das Gift nicht durch Erbrechen ausgeleert ist, eher schaden, und daher erst nach Entleerung des Giftes gegeben werden dürfen, der Kaffe, die Galläpfel, eine Auflösung von Chlor, der Kampher; gegen die Tollkirsche vegetabilische Säuren, schwarzer Kaffe, Milch, Essignaphtha, Ammonium, Opium; gegen Hyoscyamus vegetabilische Säuren, Kaffe, Terpenthinöl; gegen den Stechapfel die Citronensäure etc.

Gegen den nach einer Blausäurevergiftung noch einige Tage andauernden schwarzen Staar (den ich aus einer Apoplexia retinae herleitete) habe ich mit günstigem Erfolg Blutegel in die Umgegend des Auges gesetzt und kalte Umschläge auf den Kopf und das Verdunsten des Schwefeläthers auf der Umgegend des Auges angewandt.

2) Vergiftungen durch scharfe Gifte.

§. 2027.

Die Vergiftung durch Arsenik. In der acuten Arsenikvergiftung treten die Zufälle so rasch auf, dass der Tod in wenigen Stunden erfolgen kann. Dieselben sind (nach *Orfila*) folgende: herber Geschmack, stinkender Mund, häufiger Speichelfluss, fortwährendes Ausspucken, Zusammenziehung des Schlundkopfes und der Speiseröhre, Stumpfheit der Zähne, Schluchzen, Eckel, Erbrechen bald bräunlicher, bald blutiger Stoffe, Angst, häufiges Schwinden der Sinne, Hitze in der Präcordialgegend, Entzündung der Lippen, der Zunge, des Gaumens, der Speiseröhre, ein so schmerzhafter Magen, dass die mildesten Getränke nicht vertragen werden, Darmentleerungen von einer schwarzen Farbe und einem unerträglichen Geruche, kleiner, häufiger, zusammengezogener und unregelmässiger, bisweilen langsamer und ungleicher Puls, Herzklopfen, Ohnmachten, unauslöschlicher Durst, heftige Hitze über den ganzen Körper, Empfindung eines verzehrenden Feuers, bisweilen Eiskälte, erschwertes Athmen, kalte Schweisse, sparsamer, rother und blutiger Urin, Veränderung der Gesichtszüge, ein missfarbiger Ring um die Augenlieder, Geschwulst und Jucken am ganzen Körper, der mit missfarbigen Flecken und zuweilen mit einem frieselartigen Ausschlag sich bedeckt, Sinken der Kräfte, Verlust der Empfindung, namentlich an den Händen und Füssen, Irrereden, Convulsionen, oft von einem unerträglichen Priapismus begleitet, Ausfallen der Haare, Ablösung der Oberhaut, endlich der Tod.

Diese Symptome sind selten alle bei *einem* Individuum vorhanden, doch zuweilen zu verschiedenen Zeiten, wenn die Krankheit mehrere Tage dauert, auch

giebt es seltene Fälle, in welchen diese Erscheinungen beinahe gänzlich fehlen und die Kranken blos unter Ohnmacht sterben.

§. 2028.

Die chronische Form äussert sich durch Verdauungsbeschwerden, Neigung zum Erbrechen, chronisches Magenweh, Durchfälle oder Verstopfung, vermehrte Speichelabsonderung, asthmatische Zufälle, Husten, Verfall der Kräfte, cachectisches Aussehen, Abmagerung, hektisches Fieber, ödematöse Geschwülste, flechtenartige Ausschläge und rothlaufartige Entzündungen, Geschwüre, pergamentartige Vertrocknung der Haut, Ausgehen der Haare, herumziehende Schmerzen, Lähmungen, besonders der untern Gliedmassen, Abstumpfung des Geistes. Der Tod stellt sich oft erst nach mehreren Monaten oder Jahren ein.

§. 2029.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Meistens zeigen sich im Munde, der Speiseröhre und vorzüglich im Magen und Darmkanal entzündete Stellen, brandige Flecken, Krusten, Durchlöcherungen, die Schleimhaut des Magens breiartig erweicht und braunroth, das Herz entzündet und gefleckt, blaue, von Blutextravasat herrührende Flecken auf der äussern Haut und verschiedenen innern Theilen, die Venen mit flüssigem, schwarzem Blut überfüllt, die Fäulniss macht langsame Fortschritte. Bei schnell eingetretenem Tode findet man zuweilen gar keine Veränderungen in den Geweben.

§. 2030.

Behandlung. Vorerst muss der im Magen liegende Arsenik durch Erbrechen ausgeleert werden, zu welchem Zwecke meistens die Darreichung von reichlichem, lauwarmen Wasser, Zuckerwasser, Honigwasser, Milch, Eibischabkochung etc. und das Reitzen des Gaumens mit dem Finger genügen. Sollte hierauf nicht bald Erbrechen

erfolgen, so muss dieses allerdings durch ein Brechmittel erregt werden. Die vielen, gegen den Arsenik empfohlenen Gegengifte haben sich sämmtlich nicht bewährt, mit Ausnahme der Hydrothionsäure und des Kalkwassers in dem Falle, wenn die arsenige Säure (der weisse Arsenik) in flüssiger Form beigebracht worden ist, in welchem Falle das erstere Mittel mit reichlichem Wasser verdünnt, das letztere mit Milch gegeben werden kann. Im Uebrigen giebt man blos die oben erwähnten Getränke fort, indem auch fette Stoffe, wie Oel, Butter etc. in dieser Vergiftung eher nachtheilig, als nützlich wirken sollen. — Um die Folgen des Giftes zu bekämpfen, setzt man Blutegel, lässt zur Ader, lässt besänftigende Umschläge auf die Magengegend legen, verordnet lauwarme Bäder, erweichende Clystiere, bei heftigen Schmerzen und Krämpfen Opium etc.

§. 2031.

Auf eine ähnliche Weise werden die übrigen Vergiftungen durch scharfe Stoffe behandelt. Bei der Sublimatvergiftung empfiehlt *Orfila* mehrere Gläser Eiweiss (das Gegengift des Sublimates), in Wasser gelöst, nehmen zu lassen, oder wenn dieses nicht sogleich vorhanden ist, mit einer Abkochung von Leinsamen, Eibischthee, Zuckerwasser oder blosem Wasser von 25 bis 30 Graden Wärme den Magen anzufüllen, worauf es gewöhnlich zum Erbrechen kommt. — Bei Kupfervergiftung wird von *Orfila* ebenfalls Eiweiss empfohlen. — Bei Vergiftung durch Antimonialpräparate, wenn nicht Erbrechen zu Stande kommt, die Galläpfel (4 bis 5 zerstossene Galläpfel mit zwei Maass Wasser gekockt und hievon einige Gläser voll gegeben), auch China in Ermanglung derselben und Eichen- oder Weidenrinde. — Bei Vergiftung durch den Höllenstein Küchensalz mit einer grossen Menge Wasser. — Bei

der Aufnahme von concentrirten Säuren in den Magen die verkalkte Magnesia mit Wasser (1 Unce auf 1 Maass Wasser) und in deren Ermanglung Seife in Wasser aufgelöst ($^1/_2$ Unce in eine Maass Wasser) und auch Kreide etc. — Bei der von ätzenden Alkalien der Essig und der Citronensaft (jedesmal 2 Löffelvoll in einem Glas Wasser) etc.

3) Die Vergiftungen durch austrocknende Gifte.

§. 2032.

Die **Bleivergiftung.** Diese äussert sich vorzüglich durch Coliken, welche immer von neuem zurückkehren und oft sehr heftig werden, der Bauch ist in der Nabelgegend gegen die Wirbelsäule hingezogen und der Koth geht nur in kleinen, harten Stücken, wie Schafkoth ab, oder es ist gänzliche Verstopfung vorhanden; oft sind Eckel und Erbrechen und Beengstigung zugegen; der Kranke erhält ein blasses, cachectisches Aussehen, magert ab, und es stellen sich Schmerzen in den Gliedern, Krämpfe, Ohnmachten und Lähmungen ein. In einem Falle sah ich Trismus und heftige tetanische Krämpfe des ganzen Körpers, mit Abwesenheit des Bewusstseins und Verdrehung der Augen, ähnlich den Krämpfen bei Blausäurevergiftung, entstehen. — In den Leichnamen findet man öfters Spuren von Entzündung auf der Schleimhaut des Magens und des Darmkanals oder schwärzliche Flecken von extravasirtem Blute oder venöser Ueberfüllung der feinsten Gefässchen. Orfila hat nach grossen Gaben von Bleiauflösung bei Thieren einen häutigen, dicken, aschgrauen Ueberzug, der sich leicht in Flocken ablöste, auf der innern Fläche des

Magens gefunden; den Dickdarm, besonders des Colons trifft man zusammengezogen an.

§. 2033.

Behandlung. Da in der Regel das Blei nur nach und nach in den Körper gelangt, so kann die Erregung des Erbrechens keinen grossen Nutzen gewähren. Als Gegengifte sind vorzüglich die schwefelsauren Salze, namentlich Natrum sulphuricum und Magnesia sulphurica im Gebrauche, welche dadurch wirken sollen, dass die Schwefelsäure mit dem Blei sich zu dem unauflöslichen schwefelsauren Blei vereinigt, aber, da oft von dem Blei wenig oder nichts mehr in dem Darmkanal vorhanden sein dürfte, wie es scheint noch mehr dadurch nützen, dass sie einer Hauptwirkung des Bleies, nämlich der Austrocknung und Verstopfung, entgegenwirken, wie auch ein Senneaufguss und das Ricinusöl mit Vortheil gegeben werden. Nebst diesen Mitteln giebt man Oelmixturen, und was noch nützlicher ist, Butter in grossen Massen und angemessene Gaben von Opium. In dem oben erwähnten Fall von starker Vergiftung wandte ich, nebst den so eben angegebenen Mitteln eine Aderlässe mit gutem Erfolg an. Auch können Klystiere, Bäder und andere, den Umständen entsprechende Mittel zu Hülfe gezogen werden.

4) Die Vergiftungen durch septische Gifte.

§. 2034.

Unter den bezeichneten Vergiftungen versteht man diejenigen, in welchen die Säfte eine aufgelöste Beschaffenheit erhalten und die festen Theile eine vorzügliche Neigung in den Brand überzugehen zeigen; es kommen übrigens beide Erscheinungen auch bei andern

Vergiftungen vor, z. B. eine Veränderung der Blutmasse bei der Blausäurevergiftung und die Neigung zum Brande bei der Arsenikvergiftung, und anderer Seits fehlen bei den septischen Vergiftungen die heftigen Nervenaffectionen keineswegs. Zu den septischen Vergiftungen können gerechnet werden: 1) die durch Kloakenluft, Kohlendampf, kohlensaures Gas etc. bewirkten Vergiftungen, bei welchen das Blut sich immer verändert zeigt, die aber eben so sehr narkotische Wirkungen äussern und deren Behandlung in dem Kapitel von dem Scheintod schon angegeben worden ist, 2) die durch in Fäulniss übergegangene Stoffe erzeugten Vergiftungen, wohin *Orfila* die Vergiftung durch verdorbene Würste zählt, und 3) die von giftigen Thieren verursachten Vergiftungen. Zu den letztern gehören auch die durch das Gift des Milzbrandes erzeugte Krankheit und die Hundswuth, welche ich aber, da sie zu gleicher Zeit contagiöse Krankheiten sind, in besondern Kapiteln abhandeln werde.

§. 2035.

Die *Vergiftung durch verdorbene Würste.* *) Die Vergiftungserscheinungen zeigen sich 12 — 24 Stunden nach der Aufnahme des Giftes und sind folgende: grosses Mattigkeitsgefühl, brennender Schmerz in der Magengegend, Erbrechen von blutigen Materien und von Stoffen, die nach der verdorbenen Wurst riechen, Starrheit der Augen, Erweiterung und Unempfindlichkeit der Pupillen, Doppeltsehen, Unbeweglichkeit der Augenlieder, Veränderung und Unterdrückung der Stimme, erschwertes Athmen, kaum fühlbarer Herzschlag, Ohnmachten, erschwertes Schlucken, Unterdrückung aller Absonderungen,

*) *Kerner* hat diese Vergiftung zuerst beschrieben (Tübingen 1820 und Stuttgart 1822). — *Kühn* (Lpz. 1824). — *Weiss* (mit einer Vorrede und Anhang von Kerner, Karlsruhe 1824).

Verstopfung und harte Excremente, wie von Erde und mit Galle nicht gefärbt, kalte, trockene Haut, ein Gefühl von Reissen in den Gliedern, Tod unter leichten Convulsionen oder allmähligem Erlöschen des Athmens und Verschwinden des Herzschlages.

Die Leichen sind oft steif und hart, wie Erfrorne, zuweilen aber auch schlaff, die innern Organe, besonders Gehirn, Lunge, Leber und Milz, strotzen von blauschwarzem, aufgelöstem Blute, blutiger Schleim ist in den Bronchien, blutige oder sonst veränderte Galle in der Gallenblase, Spuren von Entzündungen in verschiedenen Organen und im Zwerchfells- und dem herumschweifenden Nerven.

§. 2036.

Ursachen: Diese Krankheit wird durch verdorbene, schlecht bereitete, insbesondere unvollkommen geräucherte Blut- und Leberwürste erzeugt und kommt insbesondere in Würtemberg vor. *Kerner* hält das Gift für eine Säure und bezeichnet dasselbe als Fett-, Leichen-, Thier- oder Blutsäure.

§. 2037.

Behandlung. Zuerst sind Brechmittel und sodann abführende Mittel nothwendig. Als specifische Gegenmittel sind von *Kerner* die alkalische Schwefelleber, von *Weiss* die Milch und von *Steinbuch* die Terra Catechu empfohlen worden. Nach den erregten Krankheitszufällen sind meistens im Anfange eine Aderlässe und späterhin erregende Mittel erforderlich.

§. 2038.

Die *Vergiftung durch den Biss giftiger Schlangen*, besonders der in heissen Ländern einheimischen. Die Erscheinungen sind: ein heftiger Schmerz in der Wunde, welcher sich über das ganze Glied ausbreitet, hierauf Geschwulst, welche meistens zuerst fest und blass ist und hierauf röthlich, bleifarben und brandig wird, die lymphatischen

Gefässe insbesondere sind angeschwollen und geröthet und die Drüsen angeschwollen, grosse Mattigkeit, Erbrechen, Trismus, allgemeine Krämpfe, oft Empfindlichkeit des Magens, Gelbsucht, Sinken des Pulses, erschwertes Athmen, kalte, starke Schweisse. Der Tod erfolgt oft, besonders wenn eine bedeutende Blutader verletzt worden ist, sehr bald.

§. 2039.

Die **Behandlung** der Wunde ist die im §. 2018 angegebene. Durch die innerlich gegebenen Mittel beabsichtigt man vorzüglich die Transspiration und den Schlaf; man wendet an: Hollunder Thee mit einigen Tropfen Ammoniak, ein Glas Maderawein, gute Bedeckung des Körpers etc. und etwas Opium. Auch sind mehrere Mittel im Rufe einer specifischen Wirkung, vorzüglich der Guaco, dessen Saft in den Körper eingerieben und in Wunden geimpft, auch die Schlangen abhalten soll, zu beissen, und das arseniksaure Kali, so wie die arsenige Säure.

Die Kriebelkrankheit.
(*Convulsio cerealis*, *Morbus cerealis*, *Raphania.*)

Gruner (lat. Jena 1793). — *Tissot* (üb. d. Nervenkrankheiten). — *Wichmann* (Lpz. u. Zelle 1771 und in dessen kleinen medizin. Schriften). — *Leidenfrost* (lat. Duisb 1771). — *Hensler* (Kopenh. 1772). — *Marcard* (Hamb. u. Stade 1772 u. s med. Versuche). — *Lentin* (Beobacht. einig. Krankh. Gött. 1774). — *Taube* (Gött. 1782).

§. 2040.

Die **Kriebelkrankeit** ist die auf den Genuss von verdorbenem Getreide entstehende Krankheit, die sich vorzüglich durch ein Gefühl von Kriebeln, Krämpfe und die Entstehung von Brand auszeichnet.

§. 2041.

Die Krankheit beginnt mit Magenkrampf, Sodbrennen, Erbrechen, Durchfällen, Eingenommenheit des Kopfes und dem Gefühl von Kriebeln in den Gliedern, das zuletzt in der ganzen Haut und in der Zunge bemerkt wird. Sodann kommen Anfälle von Convulsionen und Starrkrampf hinzu, endlich werden einzelne Glieder gefühllos und lahm, die Pupille ist erweitert, die Sprache stammelnd, der Geist abgestumpft, auch entstehen meistens Brandblasen und oft werden selbst ganze Gliedmassen bleifarbig und brandig.

§. 2042.

Die Krankheit hat bald einen mehr chronischen Verlauf von mehreren Wochen und ist fieberlos, bald einen acuten und ist mit Fieber verbunden. In dieser letztern Form, die in Frankreich in dem Lande von Sologne beobachtet worden ist und mit den Namen Necrosis ustilaginea, Convulsio soloniensis und Ergot belegt wurde, kam insbesondere der ausgebreitete Brand vor,

durch welchen oft ganze Glieder ohne alle Ergiessung von Blut abgestossen wurden.

§. 2043.

Der Uebergang in Gesundheit erfolgt unter schleimigem Erbrechen und Durchfällen, womit oft der Trichocephalus dispar ausgeleert wird, in den Tod durch Lähmung und Brand. Nachkrankheiten sind: Fallsucht, Lähmungen, schwarzer Staar, colliquative Durchfälle, Abzehrung, Wassersucht.

§. 2044.

Ursachen. Die Krankheit wird dem, besonders in nassen Jahren oft in reichlicher Menge in dem Getreide enthaltenen Mutterkorn und den Samen von Lolium temulentum, Raphanus Raphanistrum, Agrostemma Githago, Nigella arvensis, Bromus multiflorus u. Br. vitiosus etc. zugeschrieben und scheint demnach eine Vergiftungskrankheit zu sein.

§. 2045.

Behandlung. Man verordnet im Anfange Brechmittel, sodann Abführungsmittel und hierauf einhüllende Mittel, und wendet das durch die Zufälle angezeigte Verfahren an; insbesondere sind wegen den Krämpfen, den Lähmungen und dem Brande, warme Bäder, Opium, Baldrian, Kampher, Moschus und erregende Einreibungen und Umschläge empfohlen worden.

§. 2046.

Prophylaxis. Man versorge den Ort, in welchem die Krankheit epidemisch herrscht, mit gesunden Nahrungsmitteln und lasse die vorräthige Frucht durch gehöriges Werfen und Sieben von dem Mutterkorn und fremden Samen befreien, auch ist empfohlen worden, das Getreide

lange liegen zu lassen, es vor dem Mahlen zu waschen, um alles Schädliche wegzuspülen und es sodann in einem Backofen zu trocknen, wodurch das noch vorhandene Mutterkorn und der Taumellolch ihr flüchtiges narcotisches Prinzip verlieren sollen.

Die Cholera.

(*Brechdurchfall, Gallenruhr, Cholera, Cholera morbus.*)

Sydenham (Observ. med. sect. III). — *Henrici* (Diss. Halle 1740, rec. in Haller. Diss. pract. vol. III). — *Brendel* (Diss. Goett. 1747, rec. in opusc. ed. Wrisberg. P. II). — *Tralles* (lat. Vratislav. 1753).

Ueber die asiatische Cholera: *Curtis* (Edinburg. 1807). — *Tytler* (2 Thle. Calcutta 1820). — *Orton* (2 Bde. Madras 1820). — *Blane* (Lond. 1820). — *Scott* (Madras 1824). *Kéraudren* (Par. 1825 und 1831). — *Annesley* (2 Bde. m. K. Lond. 1828, n. d. 2ten engl. Aufl. v. Himly, Hannov. 1831). — *Moreau de Jonnès* (Par. 1821, 24, 26, 29 u. 31). — *Mason Good* (a. d. Engl. v. Gmelin, Tübing. 1831). — *Tilesius* (Nürnb. 1830 u. Lpz. 1831). — *Schnurrer* (Stuttg. u. Tübing. 1831). — *Lichtenstädt* (Berl. 1831). — *Elsner* (Königsb. 1831). — *Harless* (2 Bde. Braunschw. 1831). — *Jänichen* u. *Marcus* (lat. Moskau 1830). — *Krieger-Hansen* (Rostock 1831). — *Simon* (jun. Hamb. 1831). — *Marx* (Karlsr. u. Baden 1831). — *Plya* u. *Grünhut* (m. Abbildungen, Pesth 1831). — *Sachs* (Königsb. 1832). — *Bartels* (Berl. 1832). — *Casper* (Berl. 1832). — *Heyfelder* (Bonn 1832). — *Leo* (Warschau 1832). — *Zeller* (Tübing. 1832). - *Hergt* und *Sommerschu* (Karlsruhe 1832). — *R. Froriep* (m. Abbildungen, Weimar 1832). — *Fabre* (a d. Franz. v. Schüler, Mannh. 1832). — *Dieffenbach* (2te Aufl. Güstrow 1834). — *Phoebus* (Berl. 1833). — *Delpech* (Par. 1832). — *Gendrin* (Par. 1832). — *Magendie* (Par. 1832). — *Broussais* (Nant. 1832).

§. 2047.

Die **Cholera** tritt unter sehr mannigfachen Formsverschiedenheiten auf und anderer Seits giebt es Krankheitszustände, die oft nicht von der Cholera unter-

schieden werden können und doch gewöhnlich nicht zu ihr gerechnet werden, wie z. B. gewisse Vergiftungen und es ist daher nicht wohl möglich, eine genau bezeichnende descriptive Definition von der Cholera zu geben; ihrer gewöhnlicheren Form nach stellt übrigens die Cholera eine Krankheit dar, die sich vorzüglich durch stürmisch eintretende krampfhafte Schmerzen im Unterleibe, Erbrechen, Durchfälle, Krämpfe in den Gliedern und schnelle Erschöpfung der Lebenskräfte ausspricht.

§. 2048.

Man unterscheidet gewöhnlich die *sporadische* oder bei uns *einheimische* von der *epidemischen* oder *ostindischen* Cholera und es muss auch angenommen werden, dass der asiatischen Cholera andere ursächliche Momente als der bei uns vorkommenden zum Grunde liegen, so wie auch das Krankheitsbild der höhern Grade der ostindischen Cholera sich wohl von dem der gewöhnlichen Fälle der sporadischen unterscheidet, doch kennt man die Ursachen der ostindischen Cholera nicht und es kann die Verschiedenheit der entfernteren Ursachen keinen Grund zur Annahme verschiedener Krankheitsarten geben, auch giebt es bei Epidemien der ostindischen Cholera eine grosse Anzahl von Krankheitsfällen, die der sporadischen Cholera vollkommen gleich sind, und auf der andern Seite beobachtet man einzeln vorkommende Cholerafälle, die so heftig sind, wie selbst bedeutendere Fälle der epidemischen (ostindischen) Cholera; es ist daher zweckmässig, die sogenannte sporadische und epidemische Cholera nicht als zwei verschiedene Krankheitsarten abzuhandeln, sondern die verschiedenen Grade der Cholera zu beschreiben, von denen die niedern die sog. sporadische Cholera darstellen, aber auch zugleich die niederen Grade und häufig die ersten Stadien der ostindischen Cholera sind.

§. 2049.

Bricht die ostindische Cholera in einer Gegend aus, so geschieht dieses häufig, nachdem schon einige Zeit vorher sich mit der Cholera verwandte Krankheitszufälle, insbesondere Fälle von sporadischer Cholera gezeigt haben, auch wird bei vollkommenem Ausbruch der Epidemie ein grosser Theil der Bevölkerung von Krankheitszufällen befallen, die nicht die Form der ausgebildeten Cholera haben, aber offenbar aus der nämlichen Krankheitsconstitution entspringen und sich oft wie Anfänge und Bruchstücke der vollendeten Krankheit darstellen.

Diese verschiedenen Krankheitszustände, die die Epidemie darstellen, können in drei Reihen geordnet werden, von denen ich die erste unter dem Namen Cholera-Regungen, die zweite unter dem Namen Cholerine und die dritte unter dem der schweren Cholera beschreiben will.

§. 2050.

1) *Die Cholera-Regungen.* Bei sehr vielen Individuen erscheinen, während die Cholera herrscht, folgende Zufälle, ohne dass sich die Cholera weiter bei ihnen ausbildet: vermehrte Neigung zum Stuhlgange und wirkliche Durchfälle, Aufblähen und Kollern im Leibe, etwas Leibweh, ein schmerzhaftes Gefühl im Magen, Aufstossen von Blähungen, Mangel an Appetit und ein besonderes Gefühl von Mattigkeit. Wenn in den dünnflüssigen Stuhlentleerungen weissliche Flocken wahrgenommen werden, so wird dieses als ein näheres Zeichen der bevorstehenden Cholera angesehen.

§. 2051.

2) *Die Cholerine.* Oft, nachdem die so eben angegebenen Erscheinungen einige Zeit vorhergegangen sind, oft aber auch sehr schnell werden die Kranken von häufig wiederkehrendem Erbrechen und Durchfällen befallen, wodurch meistens eine weissliche, dem Reisswasser

ähnliche Flüssigkeit ausgeleert wird, welche Beschaffenheit der Entleerungen mehr der sog. asiatischen als der bei uns sporadisch vorkommenden Cholera eigenthümlich ist; doch kamen auch bei der asiatischen Cholera grünliches und bräunliches Erbrechen und bräunliche Stuhlentleerungen vor; es haben die Kranken dabei das Gefühl von grosser Zerrüttung in den Gedärmen und insbesondere von heftig klemmenden Schmerzen, vorzüglich im Magen, auch in der Herzgrube die Empfindung von grosser Hitze und Feuer, wobei meistens diese Stelle bei einem Druck auf dieselbe eine krankhafte Empfindlichkeit zeigt. Es ist grosser Durst vorhanden, die Urinsecretion sparsam, der Puls etwas klein und zusammengezogen. Hierzu gesellen sich schmerzhafte Krämpfe in den Füssen, wobei die Waden ganz hart werden und die Zehen nach dem Rücken des Fusses gezogen werden und eine mehr schmerzlose Verdrehung der Arme, so dass die Arme grad ausgestreckt erscheinen und der Radius um die Ulna gedreht ist, und wobei die Finger grad gestreckt, aber einwärts gegen die Fläche der Hand gezogen sind. Meistens ist Schwindel vorhanden und das Gefühl von grosser Kraftlosigkeit.

§. 2052.

3) *Die schwere Cholera.* Indem die genannten Erscheinungen fortdauern und zum Theil zunehmen, namentlich das Gefühl von Feuer in der Herzgrube, was die Kranken noch einige Zeit sehr unruhig macht und zu wimmern veranlasst, oder auch ein Theil derselben, namentlich das Erbrechen, die Durchfälle und die Krämpfe nachlassen, wird der Körper marmorkalt, insbesondere im Gesichte, den Händen und den Füssen und es wird selbst der Athem kühl, die Augen sinken tief in ihre Höhlen zurück und werden von einem breiten, bleifarbenen dunkeln, oft ins Schwärzliche oder Violette gehenden Ring umzogen, in geringerm Grade färbt sich oft auch

mehr oder weniger der ganze Körper, insbesondere die Hände und Füsse auf eine ähnliche Weise und in seltenern Fällen werden einzelne Hautstellen, z. B. die Haut der Finger, die Nase etc. ganz dunkelviolett und selbst brandig, ebenso wird in seltenen Fällen die Haut der Hände und Füsse runzlich, wie die einer Wäscherin, es ist die Haut teigig anzufühlen und verzieht sich, (nach *Casper*) in eine Falte gelegt, nicht oder nur zum Theil. Die Zunge ist platt, breit und kalt, die Stimme der Kranken wird heisser, fein und schwach (Vox cholerica), der Harnabgang fehlt meistens gänzlich, der Puls wird immer schwächer und verliert sich zulezt ganz und die Athemzüge geschehen immer langsamer und mit grosser Anstrengung. Die Kranken können nur noch ihre Hände und Füsse regen, ihr Rumpf wird unbeweglich, wie wenn er von Stein oder Holz wäre, sie sinken nun in einen Zustand von Bewusstlosigkeit, sie liegen grad ausgestreckt auf dem Rücken, die Augenlieder halb geschlossen und die Augen nach oben gedreht, wie bei Gichtern der Kinder, die Oberlippe etwas in die Höhe gezogen, so dass man die Zähne sehen kann, sie sind pulslos und kalt und lange Zeit ohne Athemzug, einer Leiche gleich (Chol. asphyctica), doch kann man sie bis kurz vor dem Tode durch rasches Anreden noch zu sich bringen. Nach *Dieffenbachs* Versuchen blutet die Haut nicht, wenn man sie einschneidet und selbst aus geöffneten grossen Arterien (der Armarterie) fliesst kein Blut aus.*) Manchmal erfolgen noch, nachdem das Leben schon lange erloschen zu sein scheint, Zuckungen in einzelnen Muskeln.

§. 2053.

Diese Krankheitszufälle treten entweder in der Rei-

*) Ich habe ebenfalls bei Oeffnung der Armarterie bei einem asphyctischen Cholerakranken beobachtet, dass nur wenige Tropfen eines bräunlichen Blutes ausflossen.

henfolge, in welcher ich sie hier beschrieben habe, auf, so dass die leichteren Grade der Cholera sich zuerst zeigen und die schwerern sich aus diesen entwickeln, oder es bricht die Krankheit sogleich in ihrer ganzen Heftigkeit aus. — Der Uebergang in Genesung erfolgt meistens unter allmähligem Nachlass der Erscheinungen, zuweilen unter einer stärkern Rückwirkung der Natur (Reactionsstadium), wobei der Puls voll, die Haut roth und warm wird und Schweiss eintritt, und in seltenern Fällen durch den Uebergang in das Choleratyphoid. Nach diesen Verschiedenheiten kann die Genesung in wenigen Tagen und auch erst nach einigen Wochen erfolgen. — Zum Tod führt die Cholera oft schon nach 2 bis 3 Stunden, meistens im Verlaufe von 1, 2 bis 4 Tagen, nach einigen Erzählungen zuweilen fast augenblicklich, wie wenn der Kranke vom Blitze getroffen worden wäre, oft aber erst später durch den Uebergang in eine andere Krankheitsform. Meistens erfolgt der Tod unmittelbar durch den asphyctischen Zustand, zuweilen, nachdem noch Darmblutungen hinzugekommen sind, und häufig durch den Uebergang in das Typhoid. Es tritt nämlich eine Reaction ein, der Puls erhebt sich wieder, die Haut wird wieder elastisch und warm, es entwickelt sich aber ein fieberhafter Zustand, wobei die Zunge trocken wird, der Kranke in Delirium verfällt etc., und zuletzt bilden sich alle Symptome eines tödtlich werdenden Nervenfiebers aus. — Nachkrankheiten sind ausser dem schon erwähnten Typhoid verschiedene Störungen in den Verdauungsorganen, so wie Harnverhaltung, Lähmungen, Wassersucht etc.

§. 2054.

Ergebniss der **Leichenöffnungen**. Bei Oeffnung der Bauchhöhle fällt insbesondere in die Augen, dass die Venen stark mit einem schwarzen Blute angefüllt sind, wie wenn sie mit schwarzer Masse eingespritzt

wären; der Magen und der Darmkanal sind meistens mit einer grossen Menge jener weisslichen flockigen Flüssigkeit angefüllt, die auch durch Erbrechen und die Stuhlgänge ausgeleert wird, die Schleimhaut des Magens ist zuweilen mit einem eiweissartigen Ueberzug bedeckt, sie ist etwas aufgelockert und meistens gleichförmig blassroth gefärbt, oft zeigt sie dunkelrothe und bräunliche Flecken von überfüllten kleinen Gefässchen, zuweilen ist sie auch ganz blass; ebenso ist die Schleimhaut des Darmkanals meistens geröthet, oft mehr blassroth, oft aber in grossen Stellen dunkelroth, wie ein Schwamm, der in schwarzes Blut getaucht ist, zuweilen aber auch von normaler Farbe, was vorzüglich von dem Stadium herrührt, in welchem der Kranke gestorben ist; die Peyerschen Drüsen sind besonders im untern Theile des Dünndarmes aufgeschwollen und stellen Platten von granulirter Oberfläche und von ovaler oder länglicher Form von 1 bis 3 Zollen Länge und 3 bis 10 Linien Breite dar, ebenso sind die Brunnerschen Drüsen an mehreren Stellen aufgeschwollen, welche aber nur ein einzeln stehendes Korn bilden. — Die Leber ist nicht verändert, blos oft von schwarzem Blute überfüllt, die Gallenblase ist von dunkel gefärbter Galle sehr ausgedehnt. — Die Milz ist oft sehr mit Blut angefüllt. — Die Nieren sind ebenfalls blutreich, in den Nierenbecken und Kelchen ist oft etwas weisser Schleim. — Die Blase ist zusammengezogen und leer. — Die Lunge ist in der Regel gesund, doch mehr zusammengefallen als gewöhnlich, nur selten mit Blut überfüllt. — Das Herz ist mit dunkelm Blute angefüllt. — In den Hirnhäuten sind die Venen mit schwarzem Blute überfüllt. — Die grossen Arterien und Venenstämme sind fast gleichmässig mit Blut angefüllt, während das Blut in den Arterien der dritten Ordnung, z. B. der axillaris fast immer fehlt.

§. 2055.

Geschichte der Krankheit. Schon von *Hippokrates* und *Celsus* sind Krankheitsformen beschrieben worden, die im wesentlichen mit der Cholera übereinstimmen und *Sydenham* schildert eine Epidemie, die im Jahre 1669 (in England) geherrscht hat und zum Theil so heftig war, dass die Kranken innerhalb 24 Stunden starben. Nach *Livingstone* soll die Cholera in der heftigsten Art schon frühe in China vorgekommen sein. In den Jahren 1782 und 83 herrschte zu Madras eine Epidemie, die von *Curtis* gut beschrieben worden ist, und die nämliche Krankheit, wie die gegenwärtige grosse Epidemie gewesen zu sein scheint. Eine so furchtbare und allgemein verbreitete Choleraepidemie, wie die gegenwärtig herrschende scheint aber noch nie den Erdboden heimgesucht zu haben.

Diese grosse Krankheit zeigte sich zuerst im Jahre 1817 in Jessore, erschien sodann in Calcutta und durchlief innerhalb 15 Monaten ganz Ostindien, wo sie vorzüglich dem Marsche der Truppen gefolgt sein soll; auch brach sie auf den meisten Inseln des Ozeans aus, wohin sie durch die Schifffahrt gebracht worden sein soll; 1820 war sie in China. Nachdem die Krankheit 5 Jahre in Indien an verschiedenen Orten geherrscht hatte, erschien sie 1821 an den Ufern des persischen Meerbusens, wo sie bald nach der Ankunft von Schiffen aus Bombay ausgebrochen sein soll. Sie durchzog nun Persien und Arabien, wie man angiebt, vorzüglich auf den Caravannenstrassen und erschien nunmehr in Aleppo und an den Küsten Syriens. Im Jahre 1823 herrschte die Krankheit in Astrachan und schritt nun langsam im russischen Reich vorwärts; 1829 war sie in Orenburg, 1830 in Moskau, 1831 in Polen, in Gallizien, in Ungarn und zugleich auch in Danzig und St. Petersburg, und sodann in Wien und Berlin und einem grossen Theil des östlichen und

nördlichen Deutschlands. Hierauf erschien sie in England und im Frühjahr 1832 plötzlich in der Mitte von Paris; sie brach nun in vielen Orten von Frankreich aus und in den Jahren 1833 und 34 in den Niederlanden, Spanien, Portugal und in Amerika. 1835 zeigte sich die Krankheit von neuem im südlichen Frankreich, sie ist nun gegenwärtig (September 1835) in mehreren Städten von Italien und soll auch in Egypten ausgebrochen sein.

§. 2056.

Ursachen der Cholera. Die Krankheit befällt Personen von jedem Alter, Geschlecht und Constitution, die asiatische Cholera kommt selten bei Kindern vor, häufig aber erscheint die sporadische bei denselben.

Die Gelegenheitsursachen der sporadischen Cholera sind: der Genuss fehlerhafter Nahrungsmittel, namentlich erkältender Obstarten, fetter Kuchen, verdorbenen Käses, fauligter Stoffe, jungen Weines, unausgegohrnen Bieres, und bei ganz jungen Kindern der eines schlechten Breies, fehlerhafter Milch etc., und ein solcher von giftigen Stoffen, wie giftiger Schwämme, des Arseniks, des Sublimats, des zuweilen im Mehl enthaltenen Secale cornutum, der Saamen von Lolium temulentum, Agrostemma Githago etc., auch Verkältung, Metastasen etc.

§. 2057.

Als Ursache der Verbreitung der ostindischen Cholera wird von vielen Aerzten die Ansteckung angenommen und für diese Annahme angeführt, dass die Cholera von Ostindien aus von Land zu Land sich nach Europa gezogen habe, dass sie hierbei vorzüglich den Caravannenstrassen gefolgt sei, und dass sich öfters die Fortpflanzung von einem Kranken und von einem Orte zum andern genau nachweisen lasse. Unter den zur Unterstützung dieser Behauptungen angeführten Thatsachen giebt es nun allerdings solche, die die Fortpflanzung

von einem Kranken auf den andern mit ziemlicher Sicherheit beweisen, doch hat man Grund, die Richtigkeit vieler in Zweifel zu ziehen, z. B. die angebliche Thatsache, dass die Krankheit auf den Caravannenstrassen zu uns gekommen sei, indem wohl hier die Krankheit geherrscht haben mag, aber wahrscheinlich zugleich in unzähligen andern Orten, von denen die Reisenden nichts zu erzählen wissen, und für viele der angeführten Thatsachen lässt sich eine andere Erklärung als die Ansteckung geben, so z. B. kann das Erkranken mehrerer Glieder einer Familie ebenso wohl als durch Ansteckung durch eine andere auf alle wirkende Gelegenheitsursache erfolgen, und selbst die Wanderung von Asien über Europa und Amerika kann durch andere Ursachen bedingt sein.

Unter den Gründen, die gegen die Verbreitung der Cholera durch die Ansteckung allein angeführt werden, scheint mir der der wichtigste zu sein, dass sich häufig in den Orten, in welchen die Cholera ausbricht, einige Zeit vorher eine mit der Cholera verwandte Krankheitsconstitution zeigt und namentlich die Cholerine vorkommt, dass ferner in solchen Orten oft beinahe die ganze Bevölkerung von gastrischen Beschwerden befallen wird, und dass zu gleicher Zeit in vielen Orten, in welchen die Cholera nicht zum Ausbruch kommt, zur Zeit der Choleraepidemien häufig sich Krankheiten zeigen, die mit der Cholera die nächste Verwandtschaft haben, namentlich die sog. sporadische Cholera, Magenkrämpfe, Durchfälle etc. Dieser oft in weiten Landstrecken sich zeigende Krankheitsgenius kann unmöglich der Ansteckung zugeschrieben werden. Ausserdem werden gegen die contagiöse Natur der Krankheit angeführt, die Unzulänglichkeit selbst der besten Sperrmassregeln (von Oestreich und Preussen), die geringe Mortalität der Sanitätsbeamten, die Unähnlichkeit der Krankheit mit den contagiösen

Krankheiten und selbst einige Fälle, in welchen die Cholera auf Schiffen ausgebrochen sein soll, die längere Zeit in keine Berührung mit dem Lande kamen.

Die so eben vorgebrachten Gründe bestimmten mich anzunehmen, dass die Hauptursache der Verbreitung der Cholera nicht in einem Contagium zu suchen sei, sondern in einem allgemeiner verbreiteten schädlichen Einfluss, dessen Natur uns übrigens gänzlich unbekannt ist. — Nicht unmöglich ist allerdings ein tellurischer Einfluss. Was ist die Ursache, warum heute dichte Nebel aufsteigen und Wolken sich sammeln, während gestern ein herrlicher Tag war, und warum oft plötzlich auf die mildeste Frühlingswärme heftiger Winterfrost eintritt? Können wir hier nicht Veränderungen, die in der Erde vorgehen, beschuldigen? Sind wir nicht selbst Theile der Erde? Können nicht abnorme Vorgänge in der Erde unmittelbar störend auf unsere Lebenskräfte, wie auf die Beschaffenheit der Athmosphäre, wirken, und können nicht solche tellurische Vorgänge in gewissen Richtungen sich fortpflanzen, wodurch der Zug mancher Epidemien bedingt wird? — Ich behaupte nicht, dass solche Vorgänge der Cholera wirklich zum Grunde liegen, halte es aber für eine oberflächliche Weise der Naturanschauung, wenn man die unmittelbaren cosmischen Einwirkungen auf unser Leben gar nicht der Aufmerksamkeit werth hält. — Wenn ich blos nach meinen eigenen, in Paris im Frühjahr 1832 gesammelten Beobachtungen mich über die Ansteckungsfähigkeit der Cholera entscheiden soll, so kann ich sie nicht zu den eigentlichen contagiösen Krankheiten, wie die Blattern, die Pest, der Typhus etc. sind, rechnen; ja bei der asphyctischen Cholera, bei welcher auch meistens das Erbrechen und die Durchfälle aufhören, scheint mir eine Einwirkung des Kranken auf die Gesundheit eines andern Individuums, mit Ausnahme des psychischen Eindrucks, in

den meisten Fällen kaum möglich zu sein, da meistens durchaus keine Ausdünstung statt findet, sondern der Körper kalt ist, wie eine Leiche, und nicht einmal ein warmer Hauch aus dem Munde des Kranken dringt. Nur die Ausdünstungen der durch Erbrechen und die Stuhlgänge ausgeleerten Massen, scheinen mir, wenn sie in gehöriger Menge einwirken, zur Entstehung der Cholera beitragen zu können, wie auch die Ausdünstung anderer Fäcalmassen nachtheilig auf den Darmkanal wirkt, und die Galle auf die Leber, der Harnstoff auf die Nieren und der Nasenschleim auf die Schleimhaut der Nase als Reitze wirken.

§. 2058.

Die den Ausbruch der asiatischen Cholera bei dem einzelnen Individuum begünstigenden Einflüsse sind vorzüglich 1) schon bestehende krankhafte Zustände des Magens und der Gedärme und die Einwirkung der auch die sporadische Cholera veranlassenden schadhaften Stoffe, 2) Furcht und 3) Verkältung, ausserdem auch Ausschweifungen in den Geschlechtsverrichtungen, Körper- und Geistesanstrengungen etc.

§. 2059.

Wesen. Es lässt sich zwar Einiges über das Wesen der einzelnen Krankheitsvorgänge angeben, so lange aber die erregende Ursache nicht bekannt ist, der Zusammenhang des Ganzen nicht erklären. Diese Prozesse sind vorzüglich Krampf im Mangen und Darmkanal und in den Muskeln der willkührlichen Bewegung, theilweise Entzündung der Schleimhaut des Darmkanals, vermehrte und veränderte Absonderung der Darmsäfte, Anziehung des Blutes nach den centralen Körpertheilen, insbesondere den grossen Gefässstämmen und den Gefässen der Unterleibsorgane, Verminderung oder völliger Stillstand der Wechselwirkungen zwischen Nerven und Blut in den peripherischen Theilen, chemische Veränderung des

Blutes (vielleicht unmittelbar durch die einwirkende Schädlichkeit, jedenfalls aber auch durch den Stillstand des Blutlaufes und den gehemmten Athmungsprozess hervorgebracht) baldige Zernichtung der Lebenskräfte. Es zeigt die Krankheit grosse Aehnlichkeit mit den Vergiftungskrankheiten.

§. 2060.

Vorhersage. Die s. g. sporadische Cholera ist meistens leicht zu heben, wird jedoch zuweilen auch tödtlich. Die ostindische Cholera soll, wenn der Kranke sich selbst überlassen bleibt, beinahe immer tödten; durch die Kunst wird eine grosse Anzahl der Kranken gerettet, doch kommt es auf den Grad der Krankheit an, indem die asphyctische Cholera doch in der grossen Mehrzahl der Fälle tödtlich endet.

§. 2061.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Bei der sporadischen Cholera hat man, wenn schädliche Stoffe im Magen enthalten sind und nicht durch Erbrechen ausgeleert werden, auf die Weise zu verfahren, die in den Kapiteln von dem Magenkrampf, der Magenentzündung und den Vergiftungen angegeben worden ist. Auch bei der ostindischen Cholera wenden viele Aerzte, wenn kein gehöriges Erbrechen eintritt, Brechmittel (aus Ipecacuanha und Tartarus emeticus) an, so wie auch bei nicht gehörig erfolgenden Stuhlentleerungen abführende Mittel, insbesondere das Ricinusöl, doch ist immerhin bei Gebrauch dieser Mittel Vorsicht nothwendig. Um die vorhandenen schadhaften Stoffe weniger schädlich zu machen, sind auch einhüllende Mittel zweckmässig.

§. 2062.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Es scheinen mir vorzüglich folgende Anzeigen Berücksichtigung zu verdienen, 1) Milderung der krampf-

haften Zustände, insbesondere des Darmkanals, 2) Bekämpfung der Entzündung und des heftigen Blutandranges nach den innern Theilen, 3) Wiederherstellung der Lebensprozesse in den äussern Theilen und 4) Unterstützung der Lebenskräfte zur geeigneten Zeit.

In den leichtern Fällen der Cholerine hat man nur die erstere Anzeige zu erfüllen und es genügen gewöhnlich einige Gaben Opium, z. B. von 10 Tropfen, das Auflegen von einem erwärmten irdenen Deckel auf den Magen und die übrigen in dem Kapitel von dem Magenkrampf angegebenen Mittel.

In einigen schweren, durch das Gefühl von Feuer und zusammenschnürendem Schmerz im Magen, Krämpfe und Kälte des Körpers ausgezeichneten Fällen von Cholera, die zwar nicht in einer eigentlichen Epidemie, aber während die ostindische Cholera in Deutschland und Frankreich herrschte, bei uns vorkamen, und ganz dasselbe Krankheitsbild darstellten, wie viele, schon bedeutendere Cholerafälle, die ich in Paris sah, wandte ich, nachdem ich in einem solchen Falle ohne Nutzen die englisch-ostindische Methode zu Hülfe gezogen hatte, folgendes Verfahren mit auffallend günstigem Erfolge an. Ich liess abwechselnd Opiumtropfen und grosse Stücke Butter, die vorher in Eiswasser gelegt waren, nehmen, so dass die Kranken innerhalb eines Tages etwa $^3/_4$ Pfund Butter gebrauchten. Zugleich liess ich den Körper durch sehr warme Sandsäckchen, die auf den Unterleib des Kranken und die Füsse gelegt waren, erwärmen, und wandte auch einigemale Blutegel, auf die Magengegend gesetzt, an. — Durch dieses Verfahren werden die Wandungen des Magens und des Darmkanals gegen schadhafte Stoffe möglichst geschützt, der Butter wirkt besänftigend auf den gereitzten Darmkanal und die Kälte (die schon früher in Deutschland in Form von Eispillen und Eiswasser und später besonders von

Broussais gerühmt worden ist) bekämpft die Entzündung und die Blutcongestion nach innern Theilen. — Mit diesen Mitteln können verschiedene andere in Verbindung gesetzt werden, z. B. die Eispillen, die von *Casper* mit Erfolg in Anwendung gebrachten Begiessungen und doucheförmigen Anwürfe mit kaltem Wasser, Hautreitze etc.

Die Unterstützung und Erregung der Lebenskräfte scheint in der Regel erst dann angezeigt zu sein, wenn der Entzündungs- und Congestionszustand in den innern Theilen bekämpft ist, doch können die zu diesem Zwecke dienlichen Mittel, wie z. B. erregende Getränke, zuweilen neben der besänftigenden Methode in Anwendung gebracht werden.

§. 2063.

Nach denselben Anzeigen können auch verschiedene andere Mittel gebraucht werden: Aderlässe, einhüllende Getränke, z. B. Reisabkochung mit arabischem Gummi, Oelmixturen, die Ipecacuanha in kleinen Gaben, die Aufgüsse von Chamillen, Melisse, Pfeffermünze, sehr verdünntes Ammonium, Campher, das warme Wasserbad, Dampfbad, Bad von heisser Luft, Reibungen des Körpers mit Schnee, Einreibungen mit aromatischen Geistern und Ammonium- oder Canthaидentinctur, Blasenpflaster etc.

§. 2064.

Von den vielen, gegen die ostindische Cholera in Anwendung gebrachten Heilmethoden und den empfohlenen specifischen Mitteln erwähne ich folgende.

Die *englisch-ostindische* Methode: allgemeine und örtliche Blutentleerungen, Opiumtinctur, zu 60 Tropfen mit 20 Tropfen Pfeffermünzöl und 2 Unzen Wasser, welche Dosis selbst manchmal wiederholt wird, oder jede Viertelstunde 10 bis 15 Tropfen Opiumtinctur, zugleich das Calomel in Scrupeldosen in Zwischenräumen

von 2 — 3 Stunden ein Paarmal gegeben, auch nach Umständen Naphthen, Campher, Arak mit Wasser, das Erwärmen des Körpers durch heisse Aschesäckchen und das Kneten des Körpers.

Casper's Methode: Der Kranke wird, wenn die Haut trocken und welk ist, in eine leere, wenn diese aber weich, mässig dünstend oder mit klebrichem Schweisse bedeckt ist, in eine bis zum Nabel des Kranken mit lauwarmem Wasser gefüllte Badwanne geseszt und hierauf mit 4 bis 5 Eimern eiskaltem Wasser übergossen und auch mit kaltem Wasser aus einem Topfe auf Brust und Magengegend geworfen, dieses wird alle 2 bis 4 Stunden wiederholt, nach dem Bade wird derselbe ins Bett gelegt, erhält eiskalte Umschläge auf Kopf, Brust und Unterleib, die Füsse werden aber in nassheisse wollene Tücher eingeschlagen und zuweilen auch heisse Fussbäder angewandt. Zum Getränke wird kaltes Wasser oder kaltes Bier gegeben. Wenn die Stuhlausleerungen stocken, werden Clystiere von gleichen Theilen kaltem Wasser und Essig angewandt. Nicht immer wird die Kälte in dieser vollen Ausdehnung in Gebrauch gezogen.

Blumenthal wandte bei grosser Reitzbarkeit des Magens, heftigem Erbrechen und grossem Durst Eispillen alle 5 Minuten an.

Gräfe empfiehlt das Chininum sulphuricum.

Leo rühmt das Bismuthum nitricum zu drei Granen auf die einzelne Gabe.

Gumbert und *Bärens* gaben das Extractum nucis vomicae.

Broussais wandte innerlich Eis und zuweilen Opium an, setzte Blutegel auf die Magengegend, liess zur Ader und suchte den Körper zu erwärmen.

Magendie lässt Reitzmittel, insbesondere den Punsch gebrauchen.

§. 2065.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Gegen das heftige Erbrechen dienen viele der gegen den gereitzten Zustand im allgemeinen anzuwendenden Mittel. Die Durchfälle darf man nicht zu schnell stillen; übrigens sind gegen dieselben die gewöhnlichen Mittel, namentlich Columbo in Gebrauch gezogen worden. Zuweilen ist es nothwendig, Oeffnung zu bewirken, wozu man sich des Ricinusöls, des Glaubersalzes oder der Rhabarber bedienen kann, gegen den Durst giebt man kaltes Wasser, Selterserwasser, warme Milch etc.

§. 2066.

Prophylaxis. Die Sperrmassregeln und Desinfectionsanstalten haben bis jetzt keine Vortheile gewährt und können, wenn die Verbreitung der Cholera auf eine andere Weise, als durch Ansteckung geschieht, auch von keinem Nutzen sein; eben so scheinen das Riechen an Chlorkalk oder aromatischem Essig, die wachstaffetnen Mäntel und andere Schutzmittel gegen die Ansteckung für den Einzelnen überflüssig zu sein; nur eine reine Luft in dem Krankenzimmer ist erforderlich, um Verbreitung der Krankheit durch Kranke zu verhüten, daher schnelle Entfernung der Entleerungen des Kranken, häufiges Auslüften des Zimmers etc. Zur Vorsicht kann man auch Chlorräucherungen vornehmen und nach Berührung der Kranken die Hände mit einer Auflösung von Chlorkalk waschen. — Auch die übrigen, gegen die Cholera empfohlenen Präservativa sind grossentheils ohne Nutzen uud zum Theil selbst nachtheilig, dahin gehören der anhaltende Gebrauch ätherischer Oele (des Cajeput-, Chamillen-, Pfeffermünzöl) und anderer erregender Mittel, das Tragen von Pechpflastern, das Vesicatorium perpetuum u. dgl., Seifen- und Laugenbäder, das Tragen von Campher und andern Stoffen in Säckchen und Gürteln etc.

Das, was allein zur Vermeidung der Cholera zu thun ist, lässt sich wohl auf folgendes zurückführen: Vermeidung von Excessen in der Diät und Vermeidung der Speisen und Getränke, die leicht die Verdauung in Unordnung bringen und Durchfälle veranlassen, Vermeidung der Verkältung, insbesondere des Unterleibes, wesshalb wohl eine leichte Flanellbinde um den Unterleib angelegt werden mag, Vermeidung von Erschöpfung der Kräfte durch zu starke Körperanstrengung, den Beischlaf etc. und wo möglich Beseitigung der Furcht vor der Krankheit, wozu angemessene Beschäftigung und Zerstreuung und Unterlassung aller überflüssigen Vorsichtsmassregeln, die nur beständig die Aufmerksamkeit auf die Krankheit hinlenken, im allgemeinen die besten Mittel sind.

Der Milzbrand der Menschen.

(*Die bösartige, contagiöse Blatter, die schwarze Blatter, die schwarze Pocke, Pustula maligna.*)

Enaux und *Chaussier* (Méthode de traiter les morsures des animaux enragés. Dijon 1785). — *la Chevrie* (Diss. Par. 1807), — *J. F. Hoffmann* (Stuttg. 1827). — *Basedov* (Journ. von Gräfe und Walther. B. 7 u. 12) — *Schroeder* (Rust's Magazin. B. 29)

§. 2067.

Der Milzbrand der Menschen ist die durch Ansteckung von milzbrandigen Thieren entstandene Krankheit, welche sich durch Brandbeulen mit Bläschen an der Ansteckungsstelle, Fieber und Nervenaffectionen auszeichnet.

§. 2068.

Die Brandbeulen entstehen an den Stellen des Körpers, die mit dem thierischen Gift in Berührung gekommen sind. Man unterscheidet zwei Formen derselben:

1) Die hervorragende Brandbeule. Nach geringem Jucken und vorübergehendem Stechen löst sich, ohne Röthe der Haut, die Oberhaut ab, und es entsteht eine seröse Blase, zuerst nur von der Grösse eines Hirsekorns und sodann etwas grösser, welche bräunlich wird und aufgekratzt eine röthliche, seröse Flüssigkeit ergiesst. Es bildet sich nun an dieser Stelle eine platte, härtliche Geschwulst von der Grösse einer Linse, von natürlicher Hautfarbe, nur in der Mitte etwas livid, es kommt ein Gefühl von Fressen und Brennen hinzu, die Haut schwillt etwas an und wird gespannt, um den harten Mittelpunkt entsteht ein etwas hervorragender Kreis, welcher bald blass, bald röthlich oder livid gefärbt ist und mit Phlyctänchen besetzt ist, die oft zusammenfliessen und eine seröse, rothe Flüssigkeit enthalten; das ursprüngliche Knötchen wird braun, schwarz, brandig und vergrössert sich. Die Geschwulst dringt nun auch in das Zellgewebe unter der Haut und der Brand schreitet auf den mit Blasen besetzten Hof fort, um welche neue brandige Stellen sich ein neuer, mit Blasen besetzter Ring bildet. So greift der Brand immer weiter um sich und zu gleicher Zeit entsteht eine weit ausgebreitete Anschwellung der Weichtheile, die eine grosse, elastische und pralle Geschwulst darstellt, und in dem ergriffenen Theile ein Gefühl von Zusammenschnürung und Betäubung veranlasst. — 2) Die eingesunkene Brandbeule: Nach starkem Jucken bildet sich ein schwarzer, dem Flohstiche ähnlicher Punkt, hierauf entstehen Phlyctänchen, die aufbrechen, eine bräunliche Flüssigkeit ergiessen und unter welchen die Haut schwarz und wie verkohlt

sich darstellt, Schmerz, Hitze und das Gefühl der Erstarrung in den unterhalb dieser Stelle gelegenen Theilen sind damit verbunden, nur eine geringe Geschwulst ist zu bemerken.

Mit diesen örtlichen Zufällen verbindet sich ein nervöses und putrides Fieber, Magenschmerzen, Beängstigungen, Ohnmachten und Delirien. — So kann die Krankheit innerhalb sieben Tagen, zuweilen auch schon innerhalb 24 Stunden tödten. — Im glücklichen Fall begrenzt sich der Brand und nach dem Abfallen des Schorfes stellt sich eine reichliche Eiterung ein.

§. 2069.

Ursachen. Die Krankheit entsteht durch Berührung des Geifers, des Blutes etc. der am Milzbrand leidenden oder an dieser Krankheit gestorbenen Thiere, besonders an zarten und an wunden Stellen der Haut, und kommt daher vorzüglich bei Metzgern, Gerbern, Thierärzten, Wasenmeistern und Hirten vor. Auch soll der Genuss des Fleisches milzbrandiger Thiere zuweilen dieselbe Krankheit veranlassen. Ob das Contagium auch im Menschen sich erzeuge, ist unentschieden, doch ist dieses wahrscheinlich.

§. 2070.

Vorhersage. Wird der Kranke sich selbst überlassen, so führt die Krankheit meistens zum Tode; bei frühzeitiger Hülfe wird derselbe in der Regel gerettet, bei spät erst eingetretener Kunsthülfe aber ist der Ausgang sehr zweifelhaft.

§. 2071.

Behandlung. Man schneidet die harte, schwarze Stelle aus oder macht durch den Brandschorf einen Kreuzschnitt und cauterisirt die Wunde mit Höllenstein, Vitriolgeist, dem Glüheisen etc., man verbindet mit Charpie mit Chlorwasser befeuchtet, und nach Hinwegnahme des Schorfes mit Digestivsalbe etc.

Die innere Behandlung richtet sich nach der Beschaffenheit der Krankheitserscheinungen, vorzüglich sind antiseptische und erregende Mittel empfohlen worden, die Mineralsäuren, Serpentaria, Campher, Wein, China.

Die Hundswuth.

(*Wasserscheu, Hydrophobia, Hygrophobia, Rabies canina.*)

Ueberlacher (in Stollii Diss. vol. 2.) — *Portal* (aus dem Franz Lpz. 1782). — *Mederer* (lat. Freib. 1783). — *Enaux* u. *Chaussier* (Dijon 1785). — *Andry* (a. d. Franz. 1785). — *Hamilton* (aus dem Engl. Lpz. 1787). — *Bader* (Frankf. u. Lpz. 1792). — *le Roux* (a. d. Franz. Tübingen 1795) — *Rougemont* (a. d. Franz. v. Wegeler, Frankf. 1798). — *Benedict* (Lpz. 1808). — *Fothergill* (a. d. Engl. v. Werner, Wien 1810). — *Göden* (Bresl. 1816). — *Ribbe* (Leipzig 1820). — *Trollier* (Lyon und Paris 1820). — *St. Martin* (übersetzt v. Fitzler. Ilmenau 1824). — *Wendt* (Breslau 1824). — *Berndt* (Hufelands Journ. 1824). — *Krügelstein* (Gotha 1825). — *Urban* (Hufelands Journ. 1826).

§. 2072.

Die **Hundswuth** ist die Krankheit des Menschen, welche durch den Biss wuthkranker und vielleicht auch durch den sehr erzürnter Thiere hervorgebracht wird, und sich vorzüglich durch Tobsucht, Wasserscheu und Krämpfe auszeichnet.

§. 2073.

Die Krankheit kommt eine oder mehrere Wochen, zuweilen aber erst viele Monaten nach dem Bisse zum Ausbruch. Ist die Wunde noch offen, so wird sie

schmerzhaft, verändert ihre Farbe und fängt an, nur einen dünnen Eiter abzusondern; ist sie schon vernarbt, so fängt sie zu schmerzen an, entzündet sich, bricht auf und sondert eine jauchigte Flüssigkeit ab. Es ziehen sich nunmehr Schmerzen von der gebissenen Stelle nach dem Verlauf der Nerven nach dem Rumpfe hin, das leidende Glied wird oft wie gelähmt, zuweilen entstehen auch Zuckungen, die Saugadern und Drüsen schwellen aber gar nicht oder nur wenig an, und manchmal bemerkt man aber gar keine Veränderung in dem verwundeten Theile.

Es stellt sich nunmehr ein allgemeines Uebelbefinden ein, ein Ziehen im Rücken und Nacken, Mattigkeit, Schwindel, Klingen in den Ohren, Verdunklung des Gesichtes, Lichtscheue, schreckhafte Träume und Auffahren aus dem Schlafe, der Speichel läuft im Munde zusammen, es ist Neigung zum Erbrechen und zuweilen Schmerz in der Herzgrube vorhanden, und es kommt auch zu wirklichem Erbrechen, wodurch eine grüne Galle ausgeleert wird, der Athem ist beklemmt, oft stellt sich Schluchzen ein, der Puls ist klein und unordentlich, der Urin blass, der Kranke wird zuweilen ohnmächtig und ist in einer sehr niedergeschlagenen Gemüthsstimmung.

Nachdem diese Zufälle ein oder mehrere Tage gedauert haben, bemerkt man, dass bei heftigem Durste der Kranke doch die Flüssigkeit nicht gehörig zu schlucken vermag, er empfindet eine grosse Hitze und Trockenheit im Schlunde, und bei dem Versuche, die Flüssigkeit hinabzuschlingen, entstehen Zuschnürung des Schlundes, Zuckungen der Hals-, Nacken- und Gesichtsmuskeln, und der Kranke zeigt nunmehr eine solche Abscheu vor Wasser, dass ihm der Anblick desselben, ja alles, was

den Gedanken an Flüssigkeit erregt, wie z. B. ein Glas, ein Siegel, ja eine helle Wand, so wie das Geräusch einer Flüssigkeit und selbst das Rauschen des Windes die heftigste Angst und die Anfälle der Wuth erregen.

Die Anfälle der Wuth entstehen zum Theil nach den so eben angegebenen Veranlassungen, zum Theil auch ganz von selbst. Der Kranke rollt seine Augen, die meistens blutroth sind, er hat Schaum vor dem Munde, er springt auf, heult, schreit, sucht die Umstehenden anzuspeien, zu beissen und auf andere Weise zu verletzen, oft ist grosse Neigung zum Beischlafe vorhanden, der Harn und der Samen werden ausgespritzt, und der Kranke wird nunmehr auch von allgemeinen Zuckungen und oft auch von Starrkrampf befallen. Es dauern diese Anfälle im Anfange eine kürzere, später eine längere Zeit, oft über dreissig Minuten und noch länger.

Nach den Anfällen ist der Kranke sehr matt und äusserst niedergeschlagen, so dass er selbst den Selbstmord versucht. Die Anfälle kehren immer häufiger zurück und gehen zuletzt in einen soporösen Zustand, Schlagfluss und Lähmungen über, wodurch der Tod in seltenen Fällen schon nach 30 Stunden, häufiger nach drei Tagen und zuweilen auch erst nach 5 bis 8 Tagen herbeigeführt wird.

§. 2074.

Bei den Leichenöffnungen traf man zuweilen die Nerven in der Umgebung der Wunde entzündet an, in andern Fällen aber schlaff und weich, öfters fand man Spuren von Entzündung in den Gehirnhäuten, im Schlunde, in dem Nervus vagus, sympathicus und phrenicus, im Herzen, den Lungen, dem Brustfell, dem Magen

und Darmkanal, welche beide Theile auch zuweilen im brandigen Zustand sich befinden; auch sah man die Gefässe des Gehirnes mit schwarzem Blute überfüllt, die Muskeln zeigten eine dunkle Röthe und schnell trat Fäulniss in den Leichen ein, oft wurde auch gar nichts ungewöhnliches angetroffen.

§. 2075.

Die alleinige Ursache der Hundswuth beim Menschen ist der Biss wuthkranker Thiere oder die Berührung des Geifers solcher Thiere an Stellen mit zarter Oberhaut, wie z. B. den Lippen, auch soll der Speichel sehr gereitzter Thiere dieselbe Wirkung hervorbringen; eine spontane Entwicklung dieser Krankheit scheint es aber beim Menschen nicht zu geben. Das Wuthgift ist fixer Natur, bleibt an Kleidern haften und vermag noch nach langer Zeit die Ansteckung hervorzubringen. Die Thiere, welche diese Krankheit dem Menschen mittheilen sind der Hund, die Katze, der Fuchs, der Wolf, das Schwein, das Pferd, das Rind und andere Säugethiere, und nach Einigen auch selbst Geflügel.*)

*) Es äussert sich die Wuth bei den Hunden auf folgende Weise: Das Thier verliert seine Munterkeit, wird still, es bellt nicht mehr, sondern murrt nur oder bricht in eine Art von Heulen aus, wobei die Stimme rauh und heiser ist, es legt sich in einen dunkeln Winkel, läuft zwecklos umher, wird gleichgültig gegen Fressen und Trinken, belecket und frisst Stroh, Holz, Wolle und schnappt oft umher, wie nach Mücken. Zuweilen fängt dasselbe nun an, das Wasser zu scheuen, häufiger aber zeigt es keine Wasserscheu, sondern leckt oft im Wasser, kann aber meistens dasselbe wegen Anschwellung der Zunge oder des Rachens nicht hinabschlucken, sein Aussehen wird verstört, die Augen werden roth und triefend, aus dem Munde läuft Geifer, die Zunge hängt zuweilen aus demselben heraus, in andern Fällen ist der Mund aber ganz trocken; das Thier zeigt Neigung, alles zu beissen, selbst seinen Herrn, den es nicht mehr zu kennen scheint; bei weiterer Entwicklung der Krankheit senkt dasselbe den Kopf,

§. 2076.

Wenn man für das Wesen der Krankheit Entzündung der Nerven, Entzündung der Magenschleimhaut etc. ansieht, so sucht man auch hier das Ganze nur in einem Theile. Die Krankheit kann als Vergiftungskrankheit, ähnlich der Vergiftung durch den Vippernbiss, angesehen werden, nur ist hier das Gift zugleich ein Contagium, das sich im Körper des Menschen erneuert und vorzüglich durch die Speicheldrüsen ausgeschieden wird.

§. 2077.

Vorhersage. Die Hundswuth tödtet auch bei der zweckmässigsten Behandlung, die man kennt, beinahe immer.

§. 2078.

Prophylaxis. Am zweckmässigsten ist es, die ganze Wunde schleunigst vollkommen auszuschneiden, und wenn dieses nicht geschehen kann, mit Wasser oder Salzwasser auszuwaschen, zu scarificiren und das Bluten durch Aufsetzen von Schröpfköpfen einige Zeit zu unterhalten; in beiden Fällen wird hierauf die Wunde cauterisirt, indem man Pulver in sie einstreut und dasselbe anzündet oder sie mit dem Glüheisen ausbrennt. Lässt der Kranke das Ausbrennen der Wunde nicht zu,

zieht den Schwanz zwischen die Beine, sein Gang wird taumelnd, am Hintertheile des Körpers ist es oft wie lahm, es wird von Convulsionen befallen, und stirbt unter Zuckungen. — In dem Leichnam solcher Thiere findet man zuweilen keine merkliche Verletzung, zuweilen die auch in menschlichen Leichen nach der Wuthkrankheit sich vorfindenden Veränderungen, den Magen oft angefüllt mit Hobelspähnen, Stroh etc. — Als Ursachen der auf spontane Weise entstandenen Wuth der Hunde werden vorzüglich beschuldigt: unbefriedigter Geschlechtstrieb, schlechte Nahrung, grosse Hitze, schneller Wechsel der Temperatur und Mangel an Wasser, doch kennt man die Ursachen nicht genügend.

so wendet man Aetzmittel, z. B. Spiessglanzbutter oder kaustischen Salmiakgeist an, die Brandschorfe nimmt man bald hinweg, und unterhält die Eiterung in der Wunde wenigstens drei Monate lang, vermittelst eingestreuter Canthariden und reitzender Salben. In dem Umfang der Wunde wird Quecksilbersalbe bis zur Erregung des Speichelflusses eingerieben.

Unter den innerlichen, als Prophylactica gerühmten Mitteln haben vorzüglich die Belladonna und das Calomel einen Ruf erhalten, man giebt von der Belladonnawurzel zuerst einen Gran vor dem Schlafengehen und steigt täglich um einen halben Gran, bis Verdunklung der Augen und Trockenheit des Schlundes eintritt, sodann lässt man dieselbe einige Wochen in verminderter Gabe gebrauchen. Das Calomel giebt man bis zur Salivation, die man im mässigen Grade 6 Wochen lang unterhält. Es ist übrigens zweifelhaft, ob diese innerlichen Mittel Nutzen gewähren und der Erfolg der Kur nicht vielmehr allein der örtlichen Behandlung zuzuschreiben ist. Ausserdem sind gerühmt worden, die Canthariden, der Terpenthin, Kampher, Salmiakgeist etc.

Nach *Marochetti* entstehen am sechsten Tag nach dem Biss oder später kleine Bläschen und Knötchen unter der Zunge, in welchen man mit der Sonde eine Fluctuation fühlen kann, und nach deren Vertrocknung die Wuth ausbreche. Es sollen diese Bläschen mit der Lancette geöffnet und sodann mit dem glühenden Eisen cauterisirt werden, und der Mund mit einer Abkochung der Genista lutea tinctorea ausgespühlt werden. Auch soll der Kranke 6 Wochen lang täglich 1½ Pfund von einer Abkochung der Genista trinken oder viermal täglich das Pulver zu 1 Quentchen nehmen.

§. 2079.

Gegen die schon ausgebrochene Krankheit sind Aderlässe bis zur Ohnmacht, grosse Gaben der Belladonna, das Quecksilber bis zum Speichelfluss, die Canthariden in grossen Gaben, Kirchlorbeerwasser, Strammonium, Kampher, Moschus, kalte Sturzbäder etc. empfohlen worden. Man entferne dabei Alles, was den Kranken beunruhigt, und suche die Heftigkeit der Zufälle durch Opium, erweichende Umschläge um den Hals etc. zu mässigen.

NEUNTE KRANKHEITS-FAMILIE.

Die Seelenkrankheiten.

(Seelenstörungen, Geisteskrankheiten, Gemüthskrankheiten, das Irresein, morbi animi, m. mentis, m. psychici, Alienatio mentis, Vesaniae, Paranoiae.)

Schriftsteller.

Lorry (Paris 1765, aus d. Lat. v. Ch. A. Wichmann. 2 Bde. Frankf. 1769). — *Dufour* (aus d. Franz. 1769, Leipzig 1786). — *Arnold* (Leicest. 1782 und Lond. 1806, a. d. Engl. v. Ackermann, Lpz. 1784—88). — *Perfect* (Lond. 1787 u. 1791, a. d. Engl. v. Michaelis, Leipzig 1789 u. 1794). — *Pinel* (Paris 1791. 3me Ed. 1809, a. d. Franz. v. Wagner, Wien 1801). — *Wagner* (Beiträge zur philosoph. Anthropol. 2 Bde. Wien 1794 — 95). — *Chiarugi* (3 Vol. Florenz 1793 u. Turin 1808, aus. d. Ital. Leipz. 1795). — *Crichthon* (a. d. Engl. 1798, v. Hoffbauer, Lpz. 1816). — *Haslam* (Lond. 1798, aus d. Engl. Stend. 1800, Eb. verschiedene Werke. Lond. 1809, 1810, 1811, 1817). — *Weickard* (Frankf. 1799 u. der 3te Theil des philos. Arztes). — *Coxe* (Lond. 1804, a. d. Engl. v. Reil, Halle 1811). — *Hoffbauer* (1r — 2r Thl. Hannover 1802, 3r. Thl. Halle 1807). — *Reil* (Fieberl. B. 4. — Eb. Rhapsod. üb. die Anwend. d. psych. Kurmethode auf Geisteszerrütt. Halle 1803, 2te Aufl. 1818; Eb. u. Hoffbauer, Beiträge zur Beförd. einer Kurmethode auf psych. Wege, 2 Bde. Halle 1808 — 10). — *Haindorf* (Heidelb. 1811). — *Marschall* (Lond. 1815, a. d. Engl. v. Romberg. Berl. 1820). — *Fodéré* (2 Vol. Par. 1816). — *Spurzheim* (London

1817, nach d. Engl. u. Franz. v. Emden, m. 3 K. Hamb. 1818). — *Vering* (2 Bde. Lpz. 1817—21). — *Heinroth* (Lehrb. d. Störungen d. Seelenlebens. 2 Bde. Lpz. 1818. Eb. Anweis. f. angehende Irrenärzte zu richtiger Behandl. ihrer Kranken. Berl. 1826). — *Esquirol* (nach d. betreffend. Artik. im Dict. d. scienc. méd. frei bearb. von Hille u. mit Zusätzen v. Heinroth). — *Georget* (Par. 1820, aus dem Franz. v. Heinroth, Lpz. 1821). — *Neumann* (Leipzig 1822). — *v. Lenhossek* (2 Bde. Wien 1824 u. 25) — *Rush* (a. d. Engl. v. König 1825). — *Burrows* (Lond. 1828, a. d Engl. Weimar 1831) — *Friedreich* (Diagnost. d. psych. Krankheiten. Würzburg 1829, 2te Aufl. 1832).

ERSTES HAUPTSTÜCK.

Von den Seelenkrankheiten im allgemeinen.

§. 2080.

Die Seelenkrankheiten sind die Krankheitsformen, in welchen der Verstand und das Gemüth in der Art leidend erscheinen, dass die Kranken in Beziehung auf alle oder auf einzelne Gegenstände einfache Begriffe nicht richtig aufzufassen vermögen und die Kraft der Selbstbestimmung verloren haben, insofern diese Erscheinungen nicht blos Symptome einer andern Krankheit sind.

§. 2081.

Verlauf. In der Mehrzahl der Fälle entwickeln sich die Seelenkrankheiten allmählig, zuweilen jedoch entstehen sie plötzlich. Dem aufmerksamen Beobachter zeigt sich oft schon frühe, selbst bei den ersten Regungen der Geisteskräfte, der Keim der Krankheit. Es giebt sich derselbe nicht selten dadurch zu erkennen, dass das Individuum etwas Unstetes in seinem Benehmen hat,

von einem Gedanken zum andern und von einem Gefühl zu einem oft ganz entgegengesetzten schnell überspringt, wobei es meistens in seinen Aeusserungen excentrisch ist, ungewöhnliche und oft schiefe Urtheile fällt und in seinem Blicke etwas fremdartiges zeigt. Oft zeichnen sich solche Individuen dadurch aus, dass sie eine besondere Neigung zeigen, sich in Gedanken zu verlieren und beinahe immer von einzelnen, oft sehr unbedeutenden Gegenständen, tief ergriffen das Interesse an allem Uebrigen verloren haben. Oft bemerkt man tief wurzelnde moralische Gebrechen, eine alle Handlungen beherrschende Eitelkeit, einen weit gehenden Egoismus und dabei doch Schwäche des Willens, so dass oft eben so sehr die Kraft fehlt, einem Anspruche oder einem Genusse des Lebens zu entsagen, als die, durch eine gewisse Anstrengung dem Verlangen des Gemüths Befriedigung zu verschaffen. Zuweilen geht dem Ausbruch der Seelenkrankheit das Gefühl der moralischen Auflösung vorher. Schon längere Zeit war der Geist auf nichts Edleres mehr gerichtet, Ausschweifung und fader Umgang haben eine Leere, oder Lüge und Entehrung eine Zerrüttung im Innern hervorgebracht. Der Kranke fühlt seine Lage und weiss sich nicht mehr zu helfen.

§. 2082.

Kommt nun die Krankheit zum Ausbruche, so geschieht dieses entweder auf die Weise, dass die schon vorhandenen Sonderbarkeiten in dem Benehmen des Kranken bis zu der Höhe sich steigern, dass sie den Charakter der Seelenkrankheit erhalten, die Eigenthümlichkeiten im Urtheil steigern sich zum Wahnsinn und verbinden sich mit dem Unvermögen, die Richtigkeit gemachter Vorstellungen einzusehen, das Hinbrüten über gewisse Gegenstände wird zur Melancholie, das heisst der Kranke wird gänzlich unvermögend, die Gedanken auf einen andern Gegenstand hinzuwenden etc., oder es

zeigen sich bei dem Kranken bisher nicht wahrgenommene Erscheinungen, wo der Fall wieder ein doppelter sein kann, entweder schlägt ein schon vorhandenes ungewöhnliches Betragen in ein anderes über, der in sich Gekehrte wird plauderhaft, der allzu Schüchterne und Friedliche zanksüchtig, der Gesprächige in sich gekehrt etc., oder es entwickeln sich bei einem Individuum, das bisher keine Hinneigung zur Gemüthskrankheit zeigte, meistens auf eine erschütternde äussere Einwirkung, mehr oder weniger schnell die Symptome der Seelenstörung. — Sehr häufig äussert sich die Krankheit zuerst durch einen Anfall, welcher durch eine äussere Ursache hervorgebracht worden zu sein scheint, doch ist öfters diese scheinbare Ursache nicht sowohl die Veranlassung der Seelenkrankheit, als vielmehr die Gelegenheit, bei welcher eine schon bestehende Seelenstörung ans Licht tritt. Mit den angegebenen psychischen Störungen entwickelt sich öfters auch ein körperliches Leiden, das bei der ausgebildeten Krankheit immer stärker hervortritt.

§. 2083.

Die vollständig entwickelte Krankheit äussert sich durch folgende Erscheinungen. Vorzüglich sind in der Regel die Aeusserungen des Vorstellungsvermögens (Phantasie) abnorm. Einen unbedeutenden Vorfall malt sich der Kranke zu einem grossen, ganz anders gestalteten Ereigniss aus und sieht in einer ziemlich gleichgültigen Eigenschaft seiner selbst eine Tugend, die ihn zum Gott erhebt oder einen Fehler, der ihn zur verworfensten Kreatur stempelt. Seine Phantasie erkennt z. B. in dem gleichgültigen Lächeln eines Menschen ein Merkmal von den feindlichen Gesinnungen desselben und setzt eine vollständige Geschichte feindlicher Unternehmungen gegen ihn zusammen, sie erklärt ein leichtes körperliches Uebelbefinden auf die wunderlichste Weise,

z. B. einen Schmerz aus dem Einnisten von Schlangen und die Schwäche eines Gliedes aus einer Umwandlung desselben zu Glas, sie erblickt als Folge des leichtesten Vergehens gerichtliche Untersuchung und das Schaffot. In den höhern Graden der Krankheit ist die Phantasie auch ohne äussere Erregung thätig, sie schafft Königreiche aus Nichts und lässt eine Geisterwelt in die Erscheinung treten etc. Oft beziehen die Ausschweifungen des Vorstellungsvermögens sich nur auf einen oder auf eine Reihe ähnlicher Gegenstände, oft aber erscheinen mehr oder weniger alle Gegenstände in einem falschen Lichte, und zuweilen wechseln die Vorstellungen so schnell auf einander, es findet ein so schnelles Vorüberjagen der Bilder statt, dass wenn gleich jedes einzelne eine gewisse Vollendung hat, doch der Kranke dieses nicht eben so schnell in Worten ausdrücken kann und daher eine wundersame Verwirrung in seinen Aeusserungen sich kund giebt. — Das Urtheil und die Combination sind entweder im allgemeinen falsch, oder nur in Beziehung auf eine Reihe von Gegenständen, so dass der Kranke, so lange die verstimmte Saite nicht berührt wird, keine Dysharmonie zeigt, und sich selbst eine lebhafte Geistesthätigkeit durch scharfes Urtheil und sprühende Witzfunken kund giebt. — In manchen Fällen sind nur einzelne Verstandeskräfte abnorm, in andern sind alle leidend, so dass selbst das Gedächtniss mehr oder weniger erloschen ist.

§. 2084.

Wie die Verstandesthätigkeit abnorm ist, so ist mehr oder weniger auch das Gemüth leidend. Die meisten Irren werden sehr leicht zu irgend einem Affecte erregt, sie sind ausgezeichnet lustig oder traurig, sie sind furchtsam, argwöhnisch, eigensinnig und gerathen leicht in Zorn. Oft ist die Gemüthsverstimmung die Haupterscheinung der ganzen Krankheit, indem oft das Ge-

müth so sehr von einem einzigen Affect ergriffen ist, dass die Kranken nichts Anderes zu fühlen und zu denken mehr im Stande sind und ihre Handlungen ganz durch denselben bestimmt werden. Die Gemüthsstimmung bleibt oft die ganze Krankheit hindurch ein und dieselbe, oft ist aber ein grosser Wechsel zu bemerken und es finden oft sehr schnelle Uebergänge von ausgelassener Freude zur Betrübniss, von Ruhe zur Wuth statt. Zuweilen sind auch die Irren ganz gefühllos, indem nichts Neues sie mehr erfreut oder betrübt und oft auch der ursprüngliche Affect erloschen ist; sie sind ein ausgebrannter Vulcan.

§. 2085.

Bei starker und bei länger dauernder Verstandesstörung und Gemüthsleiden entwickelt sich in der Regel auch ein körperliches Kranksein. Bei den meisten Irren ist der Schlaf unruhig oder gänzlich gestört, nur bei Blödsinnigen ist derselbe vermehrt. Die Sinne sind im Ganzen wenig gestört, am häufigsten ist das Gehör vermindert, die thierischen Triebe sind dagegen sehr häufig krankhaft, oft ist Heisshunger und grosse Gefrässigkeit vorhanden, oft gänzlicher Mangel an Appetit, häufig haben die Kranken einen grossen Geschlechtstrieb, oft ist derselbe gänzlich erloschen. Viele Kranken leiden, besonders im Anfange der Krankheit und in den Exacerbationen, an Kopfschmerz, zuweilen auch an epileptischen und andern Krämpfen. Die Unterleibsorgane sind meistens in ihren Verrichtungen mehr oder weniger gestört, insbesondere ist häufig eine sehr hartnäckige Verstopfung vorhanden. Der Herz- und Arterienschlag sind wenig verändert, zuweilen stellen sich Fieberbewegungen ein und bei Gemüthsbewegungen Herzklopfen. Die Absonderungen sind meistens wenig verändert, die Haut ist mehr trocken, als schwitzend, der Urin oft roth, trüb und sparsam, oft aber auch wasserhell und

reichlich. Bei manchen Kranken leidet die Ernährung so, dass Abzehrung eintritt, oft ist aber die Ernährung nicht verändert, und es wird selbst oft der Körper stark genährt und fett.

§. 2086.

Die Dauer der Seelenstörung ist oft nur wenige Tage, oft mehrere Wochen, Monate, Jahre und nicht selten ist selbst die Krankheit das ganze Leben bleibend, sie hält jedoch gewöhnlich nicht in ganz gleichem Grade an, sondern hat Remissionen und Exacerbationen, oft tritt am Abend Verschlimmerung ein, zuweilen soll sich die Krankheit nach dem Stande des Mondes richten und im Vollmond exacerbiren. Zuweilen hält die Krankheit auch vollkommene Intermissionen von mehreren Monaten und längerer Zeit.

§. 2087.

Der *Uebergang in Genesung* geschieht zuweilen sehr schnell, in welchem Falle aber seltener die Heilung von Dauer ist, häufiger allmählig, indem der Kranke nach und nach mehr Theilnahme für fremde Personen und Gegenstände zeigt, der Gemüthssturm sich legt, Schlaf zurückkehrt, die vegetativen Prozesse wieder normal werden u. s. w. Die Besserung stellt sich entweder ohne den Eintritt besonderer Erscheinungen ein, oder es gehen ihr besondere Zufälle voran, es findet z. B. unmittelbar vor derselben eine heftige Gemüthserschütterung statt oder die bestehende Art der Seelenstörung schlägt in eine andere Form der Geisteskrankheit noch vor dem Verschwinden der Krankheit über, z. B. die Melancholie in Wuth (die Krisen auf psychischem Wege) oder es kommen kritische Ausscheidungen zu Stande, die unterdrückt gewesene monatliche Reinigung, Hämorrhoiden, Schweisse, Durchfälle, ein Speichelfluss, es bilden sich Hautausschläge, Geschwülste der Speicheldrüsen, kritische Abscesse in den Gliedmassen etc.

§. 2088.

Nachkrankheiten der Seelenkrankheiten sind oft noch eine allzuleichte Beweglichkeit des Geistes und Gemüthes und oft auch eine Schwäche der Geisteskräfte. Nicht selten geht eine Seelenkrankheit in eine andere Form der Seelenstörung über; insbesondere ist der Blödsinn ein häufiger Ausgang der andern Geisteskrankheiten. Nicht selten werden durch die Seelenstörungen Gehirnkrankheiten hervorgebracht, Entzündung, Extravasat etc., und in deren Folge Lähmung, die Fallsucht u. s. w. Auch können Störungen in den Unterleibsorganen und andere körperliche Leiden zurückbleiben.

§. 2089.

Den Tod können die Seelenkrankheiten sowohl durch schnelle oder allmählige Verzehrung der Lebenskräfte durch die Heftigkeit der Anfälle, als auch durch Zerstörung des Gehirnes zur Folge haben; die meisten Geisteskranken sterben übrigens an andern Krankheiten, an welchen sie neben der Seelenstörung leiden, an Lungenschwindsucht, Wassersucht, Nervenfiebern, Entzündungen etc.

§. 2090.

Ergebniss der L e i c h e n ö f f n u n g e n. Bei vielen verstorbenen Irren findet man weder im Gehirne noch in andern Theilen irgend Etwas, was Bezug auf die Seelenkrankheit hat, in manchen aber findet man insbesondere im Gehirne Veränderungen, die bald als die Folge, bald als die Ursache der gestörten Aeusserung der Seelenthätigkeit angesehen werden müssen, wie Entzündungen, Ausschwitzungen, Verhärtungen im Gehirne, einen fehlerhaften Bau des Schädels etc., welche Veränderungen in den Kapiteln von den einzelnen Arten der Seelenkrankheiten näher dargestellt werden sollen, in so fern sie besondern Arten der psychischen Krankheiten vorzugsweise zukommen.

§. 2091.

Anlage. Eine krankhafte Veränderung der psychischen Thätigkeit wird zwar auch bei Thieren bemerkt, doch kommt dieselbe, wie es scheint, nur als Symptom körperlicher Krankheiten vor, zu den eigentlichen Seelenstörungen scheint nur der Mensch Anlage zu haben. Es wird diese Anlage zum Theil durch die eigenthümliche Stufe der Entwicklung seines Geistes bedingt, indem ihm vergönnt ist, höhere Begriffe, wie Gott, Ewigkeit u. s. w. gleichsam zu ahnen, aber nicht, sie vollständig aufzufassen, und daher leicht ein endloses Abmühen seines Geistes entsteht, und zum Theil durch seinen Standpunkt als moralisch-freies Wesen, indem hierdurch leicht ein zerstörender Kampf des Willens mit den Trieben eintritt, was bei dem Thiere nicht der Fall ist.

Eine besondere Anlage haben Individuen von glänzenden Verstandeskräften, insbesondere einer regen Phantasie, welche daher leicht im Fluge des Denkens über die Grenzen des menschlichen Begreifens emporsteigen, ferner solche mit sehr beweglichem Gefühle und starken Leidenschaften und vernachlässigtem Gebrauche der Willenskräfte, so wie auch solche mit viel Gefühl und wenig Verstand, welche daher leicht den äussern Stürmen Preis gegeben sind und nicht vermögen, über die Regungen des Gemüthes Herr zu werden, und endlich solche mit leicht erregbarem Gehirn und Nerven und daher mit Anlage zu Schmerzen, Krämpfen etc., wobei leicht das psychische Leben in Mitleidenschaft gezogen wird.

Die Anlage ist oft angeerbt. Das sanguinische, das cholerische und das melancholische Temperament besitzen sie mehr als das phlegmatische. Das Alter von der Mannbarkeit an bis zum 50sten Jahre ist dasjenige, in welchem die Seelenstörungen am häufigsten wahrgenommen werden. Die Krankheit ist so ziemlich gleich häufig beim männ-

lichen und dem weiblichen Geschlecht, es bedingen aber bei dem letztern gewisse Veränderungen im körperlichen Zustand eine besondere Anlage, nämlich das Wochenbett, die Schwangerschaft und die Zeit der monatlichen Reinigung.

§. 2092.

Gelegenheitsursachen sind a) solche Einwirkungen, welche die intellectuelle Kraft des Menschen über ihr Vermögen beschäftigen; angestrengtes Nachdenken über Gegenstände, welche der Verstand des Menschen nicht begreifen kann, über Gott, die Schöpfung, Anfang und Ende der Schöpfung, Begrenzung oder Unendlichkeit derselben, so wie übermässiges Studiren etc., häufiger noch b) solche Einflüsse, welche das Gefühl sehr erschüttern oder die Leidenschaften aufregen oder verletzen, die heftiger wirkenden Ursachen des Schreckens und des Kummers, häusliches Unglück, der Schrecken bei grossen politischen Ereignissen, die Furcht vor der Entdeckung eines Verbrechens, Verletzungen der Ehre und Beleidigung der Eitelkeit, Unglück in der Liebe etc.; endlich c) solche, welche das Nervensystem, insbesondere das Gehirn verletzen, wie Versetzungen der Kindbettreinigung, des Monatsflusses oder von Absonderungen nach dem Gehirne, die Fallsucht, der Sonnenstich, Verletzungen des Gehirnes, Gehirnentzündungen und ihre Folgen, übermässige Geschlechtsreitzungen, ein heftiges hysterisches oder hypochondrisches Leiden, Stockungen im Pfortadersystem, gastrische Reitze etc.

§. 2093.

Wesen der Seelenkrankheiten. In den ältesten Zeiten, so wie bei den rohen Völkern der gegenwärtigen Zeit, hielt man die Geisteskranken für Besessene, das heist für Individuen, in welchen böse Dämonen ihren Wohnsitz genommen haben. — *Hippokrates* leitet die Melancholie, so wie auch die Manie und die Verwirrung

von einem durch Galle und Schleim verdorbenen Blute ab, und in einer untergeschobenen hippokratischen Schrift findet man die Bemerkung: ein krankhafter Hirnzustand sei von Galle und Schleim abzuleiten, wovon jene die wüthende Melancholie erzeuge und dieser die stille.[1]) Die Idee von der Erzeugung der Seelenstörungen durch das Ueberwiegen der erwähnten Säfte und vorzüglich auch durch schwarze Galle (daher der Name Melancholie) war im Alterthume die vorherrschende, doch hat man sich im allgemeinen wenig mit der Theorie beschäftigt, obgleich schon treffliche Methoden der Behandlung vorzüglich durch *Alsklepiades* eingeführt und in den Werken von *Celsus*, *Aretäus*, *Cälius Aurelianus* und *Galen* gute Darstellungen psychischer Krankheiten und ihrer Behandlung gegeben sind.

Seit der wissenschaftlichen Reform ist der Sitz und das Wesen der Seelenkrankheiten Gegenstand vielfacher Forschungen geworden. Die Ansichten der Aerzte wichen in zwei durchaus entgegengesetzten Richtungen von einander ab. Viele Aerzte halten die Krankheit für eine organische Störung, und zwar nehmen Manche an, es könne das Leiden aus verschiedenen Theilen des Körpers seinen Ursprung nehmen. Auf diese Seite neigen sich *Pinel*, welcher von der Manie sagt, dass der primitive Sitz dieser Krankheit in der Gegend des Magens und der Gedärme zu liegen, und von diesem Centrum aus die Verwirrung des Verstandes, wie durch eine Art Ausstrahlung, sich auszubreiten scheine;[2]) *Esquirol*, welcher annimmt, es seien bald die Enden des Nervensystems und die an verschiedenen Punkten befindlichen Empfindungsheerde, bald der Verdauungsapparatat, bald

1) Vergl. *Heinroths* Lehrbuch der Seelenkrankheiten. — 2) Traité sur l'alénation mentale. ed. II. pag. 141.

die Leber der Hauptsitz der Krankheit;[1]) *Amard*, der den Sitz der Manie ohne Delirium, der Melancholie und Hypochondrie in den grossen sympathischen Nerven und den der Manie mit Delirium, der Narrheit und des Blödsinns in das Gehirn legt[2]) und *Nasse*, welcher das Herz als eine reiche Quelle der Seelenstörungen ansieht.[3]) Andere Aerzte, welche die Seelenkrankheiten ebenfalls als organische Störungen betrachten, nehmen ihren Sitz ausschliesslich im Gehirne an. Hieher gehören *Reil*,[4]) *Spurzheim*,[5]) *Georget*[6]) und Andere. Einen vorzüglichen Einfluss hatte auf diese Ansicht die Organenlehre von *Gall*,[7]) welche in der neueren Zeit *Combe*[8]) weiter ausgebildet hat, und nach welcher das Gehirn aus einer Mehrheit von Organen besteht, aus deren Zusammenwirken die Gesammtheit der geistigen Funktionen hervorgeht. — Bei diesen Annahmen des organischen Ursprungs der Seelenkrankheiten hat man zum Theil die Meinung, dass die Seelenäusserungen eine reine organische Verrichtung seien; mehr aber ist die Ansicht verbreitet, dass ein höheres psychisches Prinzip vorhanden sei, das aber zu seiner Aeusserung der Organe bedürfe, und dass die Seelenkrankheiten nicht ihren Grund in dem immateriellen Geist habe, sondern in den zu den Geschäften des Denkens mitwirkenden Organen. Diese Ansicht haben ausser Andern *Spurzheim*[9]) und *Hartmann*[10]) ausgesprochen. *Groos* hält zur Entwicklung von

1) Dictionn. des scienc. med. art. Folie. — 2) Traité analitique de la Folie, Lyon 1807. — 3) *Nasse*, Zeitschrift für psych. Aerzte. Von der psych. Beziehung des Herzens, Lpz. 1818. — 4) Fieberl. 3te Ausg. B. 4. S. 480. — 5) Beobachtungen über den Wahnsinn, Hamb. 1818. — 6) Ueber die Verrücktheit, übersetzt von Heinroth, Lpz. 1821. St. 24. — 7) Par. 1808, deutsch. Strassb. 1808. Par. 1810—22. — 8) In seinem System der Phrenologie. — 9) A. a. O. — 10) In seinem vortrefflichen Werke: der Geist des Menschen, Wien 1820.

Seelenkrankheiten ebenfalls die Entstehung einer organischen Abnormität nothwendig, doch lässt er das psychische Prinzip dadurch mitwirken, dass er die Geisteskrankheiten aus dem Zusammenflusse einer psychischen Negation und eines somatischen Positiven erklärt. [1])

Andere Aerzte halten die psychischen Krankheiten für ein Leiden der Seele selbst. Zu diesen Aerzten gehören vorzüglich *Heindorf* [2]) und *Heinroth*. Die Ansichten des letztern Arztes sind im wesentlichen folgende: Wir haben, wie die Flamme des Lichtes, welche lediglich durch das Zusammentreten des Sauerstoffs und des Stickstoffs erzeugt ist, kein selbstständiges Dasein und sind nur eine Erscheinung, welche durch das Aufeinanderwirken der beiden grossen, einander entgegenstrebenden Kräfte der Natur hervorgebracht ist; wird nun das negative oder böse Prinzip in uns überwiegend, so dass wir dadurch völlig gebunden werden, so ist dadurch Seelenstörung gegeben. [3])

§. 2094.

Um uns einen möglichst klaren Begriff von dem Wesen der Seelenkrankheiten zu bilden, ist es vorerst nothwendig, zu untersuchen, welche Theile des Menschen (Kräfte und Similartheile) einen unmittelbaren Antheil an dem Krankheitsprozesse nehmen. Da man die Entstehung der Seelenstörung häufig einem Fehler in dem Blute zuschreibt und selbst in der neuesten Zeit noch *Fodéré* [4]) die Krankheit aus Störungen eines in dem Blute haftenden Lebensgeistes hergeleitet hat, so müssen wir zuerst untersuchen, welchen Antheil das Blut an

1) Entwurf einer philosoph. Grundl. für die Lehre von den Geisteskrankheiten, Heidelb. u. Lpz. 1828. — 2) Vers. e. Path. u. Therap. der Geistes- und Gemüthskrankheiten, Heidelb. 1811. §. 22 u. d. f. — 3) Lehrb. der Seelenstörungen. B. I. S. 378 u. d. f. — 4) Traité d. délire. T. II. pag. 133 sq.

den Seelenstörungen nehme. Ausser andern Gründen, die mich veranlassen, dem Blute keinen unmittelbaren Antheil an den Prozessen der Empfindung und der Gedankenbildung zuzuschreiben, ist die Thatsache entscheidend, dass bei niedern Thieren die erwähnten Verrichtungen stattfinden, wenn auch der Körper vollständig vom Blute entleert ist; [1]) wirkt aber das Blut bei den intellectuellen Funktionen in ihrem normalen Zustand nicht unmittelbar mit, so können wir auch nicht annehmen, dass dasselbe in den Seelenkrankheiten ein in den Krankheitsprozess selbst eingehender Factor sei und ich kann daher einen Fehler des Blutes nur als ein entfernteres Krankheitsmoment ansehen.

Da das Gehirn unstreitig ein Hauptsitz der Seelenkrankheiten ist und in demselben den Nerven keine andern Similartheile entgegen stehen als das Blut, das Blut aber nicht ein den Krankheitsprozess bildender Factor ist, so müssen wir annehmen, dass die Seelenkrankheiten ein ausschliesslich in dem Nervensystem vor sich gehender Krankheitsvorgang sind.

Betrachten wir sämmtliche Krankheiten, bei welchen Störungen der intellectuellen Verrichtungen vorkommen, so finden wir, dass dieselben Symptome vieler unbezweifelt rein körperlicher Krankheiten sind. Abgesehen von der Zerstörung der gröberen Materie kommen solche Störungen, insbesondere Irrereden, bei solchen Krankheiten vor, in welchen das Nervenagens, das bei der Blutbewegung, der Muskelbewegung etc. mitwirkt, den einen Krankheitsfactor bildet, in so fern hierbei das Gehirn mitleidet. Dieses ist z. B. der Fall bei der Gehirnentzündung und bei der eigenthümlichen, mit dem beständigen Zittern der Muskeln verbundenen Gehirn- und

1) Vergleiche hierüber den §. 1777.

Nervenaffection, die man Delirium tremens nennt. — Diese Störungen in den intellectuellen Aeusserungen zählt man nicht zu den Geistes- und Gemüthskrankheiten und zwar mit vollkommenem Rechte, indem sie mit dem Seelenleben, wie es ausserhalb des krankhaften Zustandes sich darstellte, durchaus in keiner Beziehung stehen, sondern den bei jeder Geistes- und Gemüthsbeschaffenheit gleichmässig vorkommenden Sinnestäuschungen analog sind, indem, wie bei diesen durch die Sinnesorgane, bei den genannten Krankheiten durch die Gehirnorgane Bilder vor die Seele geführt werden, die diese gleichsam als etwas äusseres anschaut, und indem bei diesen Krankheiten eine psychische Behandlung durchaus ohne Nutzen ist und dagegen oft ein rein somatisches Mittel den Krankheitszustand fast augenblicklich hebt, wie z. B. das auf das Nervenagens überhaupt so kräftig wirkende Opium dieses bei dem Delirium tremens thut.

Diesemnach müssen wir annehmen, dass bei den Seelenkrankheiten noch ein anderes Princip als jenes Nervenagens wirke, und untersuchen wir, welche Störungen in den intellectuellen Funktionen wir unzweifelhaft zu den Seelenkrankheiten zählen, so finden wir, dass es vorzüglich jene sind, die durch eine auf den Geist oder das Gemüth unmittelbar wirkende Ursache hervorgebracht sind, und welche mit dem Seelenleben, wie es ausser der Krankheit sich äusserte, mehr oder weniger in Beziehung stehen.

Sehen wir nunmehr, dass die Störungen der intellectuellen Funktionen sowohl von dem Nervenagens als auch von einem höhern Prinzip, das wir noch über das Nervenagens zu stellen uns genöthigt sehen, ausgehen können, so frägt es sich, wie verhalten sich beide Theile zur Krankheit? ist der eine von ihnen etwa nur ein entfernteres Krankheitsmoment, wie z. B. auch das Blut, das durch Ueberfüllung der Gefässe des Gehirns die

intellectuellen Verrichtungen hemmen kann, oder sind beide Theile unmittelbare Factoren des Krankheitsprozesses? — Es scheint mir, dass zu den intellectuellen Verrichtungen beide Agentien, das Nervenagens und die höchste Kraft in uns, die wir Seele nennen, unmittelbar mitwirken. Dem Nervenagens allein können wir die intellectuellen Funktionen nicht zuschreiben, denn einmal sehen wir, dass dasselbe in allen übrigen Verrichtungen nie für sich allein eine Thätigkeit äussert, sondern immer durch die Entgegenwirkung eines zweiten Factors, z. B. der Blutkügelchen oder der Muskularsimilartheile, und sodann müssen wir auch nach dem oben Gesagten anerkennen, dass die intellectuellen Störungen, die unzweifelhaft durch jenes Nervenagens erregt sind, keine Seelenkrankheiten sind; die Seele für sich aber vermag eben so wenig, in dem an den menschlichen Organismus gebundenen Zustand, ohne Mitwirkung der Organe irgend eine Thätigkeit zu äussern und erhält insbesondere durch das Nervenagens die Eindrücke der Aussenwelt, gleichsam das Materielle, welches die Seele zur Bildung der Vorstellungen und Begriffe nothwendig hat, und durch welches diese auch wiederum mehr oder weniger ihre Gestalt erhalten.

Können wir nach diesen Voraussetzungen die psychische Thätigkeit in eine Wechselwirkung zwischen der Seele und dem Nervenagens setzen und müssen wir aus den oben angegebenen Gründen *die* Störungen in den intellectuellen Verrichtungen, welche unzweifelhaft durch eine Verletzung des Nervenagens hervorgebracht sind, von den Seelenkrankheiten ausschliessen, so müssen wir das Wesen der psychischen Krankheiten dahin bestimmen: Seelenkrankheiten sind die krankhaften Wechselwirkungen zwischen der Seele und dem Nervenagens, welche von der Seele erregt sind.

§. 2095.

Diese Begriffsbestimmung drückt nicht aus, dass die Seele selbst krank sein könne, was auch nicht gedacht werden kann, in so fern man sich die Seele als ein einfaches Prinzip vorstellt, da die Krankheit immer ein Vorgang zwischen *zwei* Factoren ist.

§. 2096.

Indem die gegebene Begriffsbestimmung die Seelenkrankheiten als eine *krankhafte* Wechselwirkung zwischen der Seele und dem Nervenagens bezeichnet, lässt sie noch zu bestimmen übrig, durch welches Verhältniss in den Wechselwirkungen zwischen der Seele und dem Nervenagens die Krankheit gesetzt sei, und wodurch sich also die Seelenkrankheiten von den mannigfaltigen, in die Grenzen der Gesundheit fallenden Weisen, in welchen sich die geistige Thätigkeit nach Verschiedenheit des Characters des Individuums, nach dem Vorherrschen der Tugend oder der Lasterhaftigkeit etc. äussert, unterscheiden.

Das Merkmal der Gesundheit in den psychischen Verrichtungen ist die Freiheit in dem Geschäfte des Denkens, so wie im Handeln; das Merkmal der Krankheit ist das Gebundensein an gewisse Vorstellungen und Gefühle, so dass die Seele die Fähigkeit des freien Urtheils verloren hat und oft ganz ausser Stand ist, sich von einem Gegenstand loszureissen und nach freiem Willen ihrer Thätigkeit eine bestimmte Richtung zu geben.

Diese Unfreiheit in der psychischen Thätigkeit scheint auf folgende Weise entstehen zu können. Wie in der Gehirnentzündung, dem Delirium tremens und andern somatischen Krankheiten durch die von aussen einwirkenden Reitze viele frühere Eindrücke der Gehirnorgane wieder erregt werden, die der Seele sich vorstellend mannigfaltige Phantasiebilder erzeugen, so kann auch durch heftige

und öfters wiederholte gleichartige Einwirkung der Seele auf das Gehirn die Reaction des Nervenagens gegen die Seele krankhaft werden. Gewisse von der Seele erhaltene Eindrücke stellen sich unwillkührlich immer von neuem dar und binden gleichsam die Seele an sie. Wechseln diese Eindrücke schnell auf einander, so entsteht allgemeine Verwirrung; ist es nur ein einziger bestimmter Eindruck, der eine krankhafte Wechselwirkung zwischen den Organen und der Seele veranlasst und nur in Beziehung auf eine bestimmte Vorstellung den Vorgang des Denkens krankhaft macht, so ist dieses der fixe Wahn; ist es ein Gefühl, das die Seele in den gebundenen Zustand versetzt, so ist dieses nach Verschiedenheit der Reaction entweder die Schwermuth oder die Wuth.

§. 2097.

Seelenkrankheiten sind demnach die durch eine bestimmte Weise der Einwirkung der Seele auf die bei den intellectuellen Verrichtungen mitwirkenden Organe bedingten und zunächst durch eine krankhafte Rückwirkung der letztern hervorgebrachten derartigen Störungen in den Vorgängen zwischen dem höchsten, im Menschen wirkenden Prinzip und dem Nervenagens, dass das erstere nicht mehr als das frei bestimmende erscheint.

§. 2098.

Die Vorhersage. Die Seelenkrankheiten sind im allgemeinen schwer zu heilen und nach geglückter Heilung treten leicht Recidive ein; lebensgefährlich sind sie dagegen selten. Angeborne Störungen in den Aeusserungen der intellectuellen Kräfte sind in der Regel unheilbar, meistens auch die aus einer erblichen Anlage hervorgegangenen Geistes- und Gemüthskrankeiten. Wenig Hoffnung ist auch vorhanden, wenn die Krankheit ohne bedeutende äussere Ursache mehr allein aus der Anlage sich entwickelt hat, wenn sie Individuen von höherm Alter, namentlich solche über 50 Jahre befällt, wenn

die veranlassende Ursache fortwirkt und wenn die Krankheit schon lange gedauert hat. Eher ist Heilung zu erwarten, wenn das Leiden bei geringer Anlage beinahe allein durch die äussere Ursache veranlasst worden ist, wenn die Kranken noch jung, z. B. 20 bis 30 Jahre alt sind und die Krankheit noch nicht lange gedauert hat, z. B. nur wenige Wochen und wenigstens nicht länger als zwei Jahre. Auch ist der Erfolg der Behandlung sehr von der Art der Seelenstörung abhängig.

§. 2099.

Behandlung der Seelenkrankheiten. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man suche die etwa noch fortdauernd auf den Geist oder das Gemüth einwirkenden schädlichen Einflüsse zu entfernen. Schon zu diesem Zwecke ist es meistens gut, den Kranken aus seinen gewöhnlichen Verhältnissen herauszureissen, durch die Vornahme einer Reise oder durch Verbringung desselben zu Verwandten oder in eine gute Anstalt. Aendern sich die äussern Verhältnisse desselben zu seinen Gunsten, so muss man sich bemühen, von dem geschehenen glücklichen Wechsel, ihm die Ueberzeugung beizubringen. In der Regel ist es zuträglich, den Gegenstand, auf den sich die Seelenstörung bezieht, so wenig wie möglich im Gespräche zu berühren etc. Ebenso wie die psychischen Einwirkungen müssen die körperlichen Zustände, die auf die psychische Thätigkeit nachtheilig einwirken, gehoben werden; hartnäckige Verstopfungen und Stockungen im Pfortadersysteme sucht man zu beseitigen, Congestionen nach dem Gehirne oder einen entzündlichen Zustand zu heben, dem zu grossen Sinken der Kräfte, besonders im Nervensysteme, Einhalt zu thun, den Schlaf, wo er fehlt, zu bewirken etc.

§. 2100.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krank-*

heit. Da der Krankheitsprozess, in welchem die Seelenstörungen bestehen, durch das Zusammenwirken des höchsten Prinzipes in uns und des Nervenagens hervorgebracht sind, so wirken wir unmittelbar auf den Krankheitsprozess ein, sowohl durch die Einwirkung auf den einen als durch die auf den andern Factor. Die psychische Behandlung ist häufig unzureichend, da die Rückwirkung des Nervensystems oft von der Art ist, dass die Seele mit aller Anstrengung nicht mehr zur freien Thätigkeit gelangen kann, und eine rein somatische Behandlung ist oft fruchtlos, da die Einwirkungen der Seele das Nervensystem immer in einem krankhaften Zustand erhalten. Wir haben demnach die doppelte Aufgabe, 1stens unmittelbar auf die Seele einzuwirken, um ihre Wirkung auf die bei den intellectuellen Verrichtungen thätigen Organe zum Normalen zurückzuführen, und 2tens die nöthigen Veränderungen in der Thätigkeit des Nervensystems hervorzubringen, um die Rückwirkung desselben auf die Seele zu ordnen.

§. 2101.

1) *Umstimmung der Wechselwirkung zwischen der Seele und den Organen durch Einwirkung auf das psychische Prinzip.* Wir haben hier zum Theil die Aufgabe, die Einwirkung der Seele auf die an den intellectuellen Verrichtungen Theil nehmenden Organe in der *Art* ihrer Wirkung umzustimmen, zum Theil die Wirkung derselben überhaupt zu beschränken und auch in manchen Fällen, dieselbe zu erhöhen. Den ersten und zweiten Zweck erreichen wir sehr häufig durch die nämlichen Mittel.

§. 2102.

Um die Art der Seelenstimmung zu verändern, müssen wir die Eigenthümlichkeiten des Geistes und Gemüthes des Kranken genau zu erkennen suchen. Am sichersten erreichen wir in der Regel unsern Zweck, wenn wir

den Kranken an *der* Eigenthümlichkeit seines Characters auffassen, welche das prädisponirende Moment der Seelenstörung wurde. — Wir können hier zweierlei Wege einschlagen: Entweder suchen wir das Besondere in seinem Character auszugleichen, insbesondere den etwa vorhandenen moralischen Fehler zu verbessern, indem wir z. B. dem Geiste des Egoisten eine höhere Richtung zu geben suchen, oder wir verzichten auf diese Verbesserung des Individuums und bemühen uns, nur die schwache Seite desselben vor Verletzung zu schützen, und den auf dieselbe gemachten Eindruck, wodurch die Seelenstörung entstand, durch einen entgegengesetzten Eindruck wieder auszugleichen. Wir heilen z. B. die durch Kränkung entstandene Melancholie des Ehrgeitzigen, indem wir durch Lob und andere Anerkennungen dem Ehrgeitze desselben Befriedigung zu verschaffen suchen.

Ausser diesem das Uebel in seiner Wurzel angreifenden Verfahren vermögen wir noch auf verschiedene Weise die psychische Thätigkeit umzustimmen. Wir bekämpfen die einzelnen unrichtigen Vorstellungen unmittelbar durch den Verstand, wobei übrigens ein unmittelbarer Widerspruch oder eine ausführliche Beweisführung meistens wenig nützen, sondern mehr frappante Gegensätze, witzige Einwürfe etc. Wir suchen ferner die psychische Thätigkeit auf einen andern Gegenstand zu leiten. Dieses bewirken wir, indem wir das Gespräch auf andere Gegenstände führen und durch Gesellschaft, Lectüre, Reisen und vorzüglich durch Anhalten zum ununterbrochenen Arbeiten, die Aufmerksamkeit des Kranken auf andere Gegenstände, als die, auf welche sich seine Seelenstörung bezieht, zu fesseln suchen, und auch dadurch, dass wir neue Gefühle, Gemüthsaffecte und selbst Leidenschaften in dem Kranken erregen. In dem einen Falle suchen wir ihn zur Freude zu stimmen durch eine freundliche Behandlung, den Anblick freudiger

Gegenstände, durch Erweckung der Hoffnung, durch Ueberraschung, durch Musik etc., wir suchen das Gefühl der eigenen Kraft zu stärken, suchen die Gefühle der Zuneigung und selbst der Liebe zu erwecken etc.; in einem andern Falle erregen wir das Gefühl der Scham durch Demüthigung und Verachtung, wir versetzen den Kranken in eine heilsame Furcht, oder bedienen uns selbst des Schreckens, um auf ihn zu wirken, oder erregen seinen Zorn, um seiner Geistesthätigkeit eine andere Richtung zu geben. — In manchen Fällen hält es sehr schwer, den psychischen umstimmenden Mitteln Eingang zu verschaffen, indem die Seele des Kranken beinahe für keine äussern Eindrücke mehr empfänglich ist. Man sucht in solchen Fällen die Aufmerksamkeit des Kranken zu erwecken und die erste Ableitung der geistigen Thätigkeit von dem Wahne auf andere Gegenstände vorzüglich durch folgende Mittel zu bewirken: durch aussergewöhnliche Sinneseindrücke, z. B. ein ungewöhnliches Geräusch, durch das Vorlesen interessanter Schriften, wobei man unrichtig lesen kann, so dass der Sinn entstellt wird, durch Belehrung, die man bei dem Kranken sucht, vorzüglich aber durch Erregung eines körperlichen Leidens, durch Hervorbringung eines Schmerzes vermittelst der Senfteige, Blasenpflaster, der Brechweinsteinsalbe und selbst der Moxen oder des Glüheisens, so wie durch Erregung von Uebelkeit und Erbrechen vermittelst der innerlichen Anwendung der Nauseosa und der Brechmittel und vermittelst der Schaukeln und Drehmaschinen, durch Erregung des Gefühls des Hungers, durch Erschütterung des Körpers vermittelst der Sturzbäder etc.

§. 2103.

Um die excessive Thätigkeit der Seele zu mässigen, dienen die meisten der im vorhergehenden Paragraphen angegebenen Mittel, indem dadurch, dass die Seelenthätigkeit eine andere Richtung erhält, auch in der Regel

die Stärke der Aeusserung vermindert und zum Normalen zurückgeführt wird. Ausserdem vermögen wir aber auch die dem Grade nach das richtige Maass überschreitende Seelenthätigkeit durch folgende psychische Mittel zu beschränken: Wir entziehen die Reitze, die die Seele zu einer bestimmten Thätigkeit erregen und nach Umständen, so viel wie möglich, auch alle Reitze, die überhaupt ihre Thätigkeit erwecken. Wir hüten uns, die Erinnerung auf das hinzuleiten, was die Krankheit hervorgebracht hat, und irgend die verstimmte Seite zu berühren, ja manchmal ist es nothwendig, um die unordentlichen Schwingungen sich legen zu lassen, den Kranken ganz sich selbst zu überlassen oder ihm selbst alle Reitze, die auf die Seele wirken, durch Verbringung in die dunkle Kammer möglichst zu entziehen oder durch Erregung eines tiefen Schlafes ihn wenigstens momentan zu beruhigen. Schweift der Geist des Kranken schnell von einem Gegenstand zum anderen und welchseln die Gefühle zu rasch, so suche man diese ausschweifende Thätigkeit durch Fixirung der Thätigkeit auf einen bestimmten Gegenstand zu beschränken, insbesondere durch eine dem Kranken aufgegebene Arbeit. Ist der Kranke exaltirt und pflegt er sich über die Grenzen unseres Begreifungsvermögens zu erheben, so beschränke man diesen Flug durch Anhalten zu einer den Geist weniger in Anspruch nehmenden Arbeit, z. B. zum Abschreiben. Zuweilen ist es auch nothwendig, nicht allein um den Kranken unschädlich zu machen, sondern zum Zwecke der Heilung, die ausschweifende Thätigkeit desselben durch Zwang und selbst durch Strafe zu mässigen, und zwar ist dieses nicht allein bei wirklichen Handlungen zulässig, sondern zuweilen bei Ausschweifungen in der Phantasie und den Gefühlen nützlich.

§. 2104.

Um die Seelenthätigkeit, wo sie darnieder liegt,

durch psychische Mittel zu erwecken und zu erhöhen, halten wir den Kranken zur Thätigkeit an, von den leichtern Uebungen zu den schwereren übergehend, doch ist es zuweilen nothwendig, um den Kranken aus der Erstarrung, in welche die Seele versunken ist, zu wecken, sogleich starke psychische Eindrücke in Anwendung zu bringen, in welchem Falle man, wenn die Seelenthätigkeit durch das angewandte Mittel erregt ist, zu schwächer erregenden Mitteln übergehen kann.

§. 2105.

Um auf diese Weise die psychische Thätigkeit der Kranken zu lenken, muss der Arzt sogleich im Anfange der Behandlung ein Uebergewicht über den Kranken zu erhalten oder nach *Pargeters* Ausdruck sich denselben anzueignen suchen. Er kann dies nur, wenn er selbst keine Schwäche zeigt, das heisst wenn sein Verstand scharf, sein Wille entschieden und sein Gemüth frei von Leidenschaft ist. Vortheilhaft ist es, wenn der Kranke ganz den Händen des Arztes übergeben ist, so dass dieser auch die äussern Mittel besitzt, um den Kranken von sich abhängig zu machen, wie dieses insbesondere in gut eingerichteten Anstalten der Fall ist.

§. 2106.

2) *Umstimmung der Wechselwirkung zwischen der Seele und den Organen durch Einwirkung auf die bei den intellectuellen Verrichtungen mitwirkenden Organe.* — Wir vermögen die psychischen Verrichtungen durch Einwirkung auf die Organe zu vermindern und auch dieselben zu befördern.

§. 2107.

Wir vermindern die Thätigkeit der bei den Seelenkrankheiten betheiligten Organe:

1) Durch Ableitung der Nerventhätigkeit auf andere Organe (die antagonistische Methode, in der neuern Zeit vorzüglich von *Horn* in Anwendung gebracht). Auf eine

milde Weise wird das Nervenagens vom Gehirn und Gangliensystem schon durch einen angemessenen Gebrauch der Muskelkräfte abgeleitet, und es ist daher auch in dieser Hinsicht eine etwas anstrengende körperliche Arbeit sehr wohlthätig.

Die Nerventhätigkeit ausgleichend und von den innern Organen ab, mehr nach der Peripherie leitend, wirken die allgemeinen warmen Bäder und die Fussbäder. Vielleicht auf eine ähnliche Weise, durch Erregung und Umstimmung der Hautthätigkeit, wirken auch theilweise die Begiessungen mit kaltem Wasser und die kalten Waschungen des Körpers. Vom Gehirne leiten auch ab das Reiben der Haut, das Bürsten der Fusssohlen, trockene Schröpfköpfe, Senfteige, Blasenpflaster, die Brechweinsteinsalbe (vorzüglich in den Nacken eingerieben), Fontanelle, Haarseile, Moxen und das Glüheisen.

Vorzügliche Mittel, um die Nerventhätigkeit vom Gehirne abzuleiten sind ferner die Eckel und Brechen erregenden Mittel. Man giebt, um erstern zu erregen, die Brechmittel in kleinen Gaben, um letzteres zu bewirken, in vollen Gaben, und hat oft sehr bedeutende Dosen nothwendig. Am gebräuchlichsten ist der Brechweinstein; man giebt ihn zuerst in den gewöhnlichen Gaben und steigt sodann bis zu 10, 20, ja bis zu 30 Granen, in mehrere Portionen vertheilt in einem Tag gegeben; nach *Willis* und *Cox* soll aber der Brechweinstein in den gewöhnlichen Gaben genügend wirken, wenn man seiner Anwendung einen oder zwei Grane Opium vorausschickt. Die Ipecacuanha giebt man, um Eckel zu erregen, im Aufguss zu 2 Drachmen auf 6 Uncen Flüssigkeit, jede Stunde 1 Löffel voll, und kann, um Brechen zu veranlassen, bis zu einer Unce im Aufguss steigen. Vorzüglich möchte auch die von *Magendie* entdeckte Emetine passen. Das Zincum sulphuricum wird

als Nauseosum zu 4 — 8 Granen in 6 Uncen Wasser, jede Stunde 1 Löffel voll, angewandt, als emeticum zu 6 Granen bis zu 1 Scrupel in 3 — 4 Uncen Wasser, jede halbe Stunde 1 Löffel voll, oder auch 6 — 10 Grane mit einem male in einer Tasse Fleischbrühe gereicht. Das Cuprum sulphuricum, besonders von englischen Aerzten in Gebrauch gezogen, wird als Nauseosum zu 6 — 10 Granen in 5 — 6 Uncen Wasser löffelvollweise gegeben, als Brechmittel zu 10 — 30 Granen in derselben Form. Das Cuprum sulphurico-ammoniacum wird vorzüglich als Nauseosum gerühmt, zu welchem Zwecke man 4 — 10 Grane in 6 Unzen Wasser löffelvollweise nehmen lässt. Die Squilla wird vorzüglich als Nauseosum gebraucht, alle 2 Stunde 5 — 10 Grane, oder eine halbe Unce im Aufguss von 6 — 8 Uncen löffelvollweise. Zu gleichen Zwecken werden auch Radix Asari, Colchici, die Ignatiusbohne etc. angewandt. — Eben so kräftig und noch eingreifender wirken Eckel und Erbrechen erregend und die Nerventhätigkeit im Ganzen umstimmend und erschöpfend die Schaukel- und Drehmaschinen, die gewöhnliche Schaukel auch als Drehmaschine benutzt, die Schaukel von *Hayner*, der Drehstuhl von *Horn* und der von *Hallaran*, und das Drehbett von *Hallaran* und das von *Horn*; insbesondere hat das letzere eine furchtbare Wirkung. *)

Ferner verdienen als Ableitungsmittel vom Gehirn und auch als Mittel, die, wie es scheint, Anhäufungen des Nervenagens in den Ganglien zu zertheilen vermögen, die Abführungsmittel eine besondere Erwähnung. Bei kräftiger Reaction wählt man die kühlenden Abführungsmittel, das Kali sulphuricum, Natrum sulphuricum und

*) Abbildungen von diesen Maschinen findet man in Schneiders Entwurf zu einer Heilmittellehre gegen psychische Krankheiten.

die Magnesia sulphurica, das Karlsbader Wasser, auch das Calomel etc., bei mehr torpidem Character die Rhabarber, die Sennеblätter, die Jalappe, die Gratiola und die bei den Alten in so grossem Rufe gestandene Radix Hellebori nigri, so wie auch die Radix Hellebori albi (von Veratrum album). Hiemit können die kämpfischen Visceralklystiere verbunden werden.

Endlich muss auch die Erregung eines Speichelflusses erwähnt werden, welches Millel ebenfalls durch Ableitung vom Gehirne wirkt.

§. 2108.

2) Durch unmittelbare Besänftigung der erhöhten Nerventhätigkeit. Bei grosser Erregung des Nervensystems ist, wenn keine Congestionen nach dem Gehirne und kein besonderer Organismus des Blutes damit verbunden sind, das Opium in schlafmachenden Gaben oft vorzüglich nützlich. Von *Hufeland* wird die Tinctura Stramonii für das grösste Stupefaciens erklärt (aus 8 Unc. span. Wein, 1 Unce Alcohol und 2 Uncen Samen bereitet); es wird dieselbe von 4 bis 50 Tropfen allmählig steigend 3 mal täglich gegeben. Die Digitalis ist sehr stark in England in Gebrauch und wird vorzüglich von *Cox* gerühmt; man fange mit kleinen Gaben an, z. B. mit einem halben oder einem ganzen Gran zweimal täglich und steige allmählig zu grössern Gaben, z. B. zu 5 bis 6 Granen für eine Dosis. Die Belladonna wurde vorzüglich von *Evers* empfohlen, bei sehr wüthenden Personen allmählig bis auf 8 Grane der gepulverten Blätter, täglich zweimal, gestiegen. Auch wurden zu denselben Zwecken Herba Conii maculati, Cicutae virosae, Hyoscyami, Aqua Laurocerasi, Semina Lolii temulenti und andere narcotische Mittel gebraucht.

§. 2109.

3) Durch Schwächung der Lebensthätigkeit. Bei starker Reaction wirken wir auf den das Nervenleben

unterhaltenden Factor des Lebens ein, das Blut, und suchen durch dasselbe die erhöhten Lebensprozesse im Gehirne und ganzen Nervensystem zu mässigen. Zu diesem Zwecke wenden wir die Aderlässe an, die Blutegel, die Schröpfköpfe, die antiphlogistischen Salze und Verminderung der Nahrung, und suchen die Lebensthätigkeit aus dem Gehirne zurückzudrängen, durch kalte Umschläge auf den Kopf, die Eiskappe, das Regenbad, Tropfbad und das Sturzbad, so wie durch warme Fussbäder und andere Ableitungsmittel.

§. 2110.

Wir erhöhen die Thätigkeit der bei den Seelenkrankheiten betheiligten Organe dadurch, dass wir die Gehirn- und Nerventhätigkeit, wo sie gesunken ist, theils durch die flüchtig erregenden, theils durch die permanent reitzenden und stärkenden Mittel zu erregen suchen. Wir wenden desshalb an: Valeriana, Angelica, Serpentaria, Arnica, Senega, Campher, Wein, Naphthen und Moschus, China und Eisen, so wie reitzende und stärkende Nahrungsmittel. Mit diesen innerlichen Mitteln verbinden wir geistige und aromatische Einreibungen und Umschläge auf den Kopf, so wie auch Niessmittel, die Electricität, den Galvanismus etc.

§. 2111.

Zeigen sich kritische Bewegungen, so unterstützt man dieselben. Nach Verschiedenheit dieser Bestrebungen der Natur wirkt man auf die Haut, auf die Darmentleerungen, man sucht Abscesse zur Reife zu bringen etc.

§. 2112.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* In Folge der bei den seelenkranken Individuen stattfindenden heftigen Gehirnanstrengungen entwickeln sich leicht ein Congestionszustand und Entzündung des Gehirnes, welchen durch die geeigneten Mittel entgegengewirkt werden muss. — Häufig leiden die Kranken an hartnäckiger

Verstopfung und es bilden sich leicht eine Plethora abdominalis und ein Status nervosus und atrabilarius aus; es sind daher die eröffnenden und auflösenden Mittel häufig durchaus nothwendig, und, indem das erwähnte Unterleibsleiden selbst wieder auf die geistige Stimmung zurückwirkt, auch in Beziehung auf die Seelenkrankheit selbst von entschiedenem Nutzen. – Nicht selten verbinden sich mit den Seelenstörungen Unordnungen in der Herzbewegung, die man zu beschränken suchen muss. Ebenso wirkt man jedem andern körperlichen Leiden entgegen, insofern dasselbe nicht zur Heilung der Seelenstörung benutzt werden kann.

§. 2113.

Die Diät der Irren muss nach Verschiedenheit des psychischen und körperlichen Zustandes verschieden bestimmt werden. Die Orte, in welchen die Kranken sich aufhalten, müssen die Beschaffenheit haben, dass die Kranken gehörig Luft und Licht geniessen können, sich im Freien ergehen können, die geeignete Beschäftigung finden, sich nicht einander beunruhigen, für die Reinlichkeit gesorgt werden kann und alle dienlichen Mittel in Anwendung gebracht werden können.

§. 2114.

Um Kranke, die sich selbst und andern gefährlich sind, unschädlich zu machen, hat man verschiedene Zwangsmittel erfunden. Das vorzüglichste, das die Stricke und Ketten beinahe ganz entbehrlich macht, ist das Zwangskamisol, welches ein aus starkem Zeug verfertigtes Kleidungsstück, wie die Nachtschoben der Kinder, ist, nämlich auf dem Rücken zugemacht wird, und sehr lange Aermel hat, die auf dem Rücken des Kranken zugebunden werden. Aehnlich sind die weniger gebräuchlichen Zwangshosen. Von Vortheil ist auch der Zwangsstuhl, ein Lehnstuhl, auf welchem der Kranke vermittelst einer breiten Gurte um den Leib

und an den Armen und Beinen durch Riemen befestigt wird, er darf jedoch nicht zu lange Zeit unausgesetzt gebraucht werden. Noch stärkere Zwangsmittel sind der Sack, das hohle Rad, welches nach einer von *Langermann* angegebenen Idee *Reil* erfand und in einem Rade besteht, in welches der Kranke gebracht sich vollkommen ruhig verhalten muss, um nicht in Bewegung fortgerissen zu werden; es dient dieses Mittel auch, um zerstreute Irren anhaltend auf sich selbst zurückzuführen, und der Schrank, ähnlich einem Uhrenschranke, in welchen der Kranke in aufrechter Stellung eingeschlossen wird. Weniger vortheilhaft sind die authenrieth'sche Maske, die Birne, der Tollriemen, die metallenen Armbänder, der Däumling und die Handschuhe. Ganz wilde Irren kann man in dem Pallisadenzimmer in Verwahrung bringen, von welchem *Authenrieth* eine zweckmässige Einrichtung angegeben hat.*)

§. 2115.

Eintheilung der Seelenkrankheiten. Die wichtigste Verschiedenheit zwischen den einzelnen Arten der Seelenkrankheiten ist wohl die, dass in der einen Reihe mehr die höhern geistigen Verrichtungen gestört erscheinen, in der andern mehr das Gemüth leidet. Zwar ist meistens Geist und Gemüth in den einzelnen Fällen zugleich ergriffen, doch sind bei der einen Krankheitsform Fehler in den Verstandeskräften die wesentlichen Merkmale derselben, wie z. B. in dem Blödsinn, und in der andern ein Leiden des Gemüthes, wie z. B. in der Melancholie, welche oft keineswegs aus einer fehlerhaften Vorstellung entsprungen ist, und bei welcher selbst oft der Verstand noch einige Zeit gegen das sich des Kranken

*) Eine nähere Beschreibung und Abbildungen der erwähnten Vorrichtungen findet man von den meisten in Schneiders Heilmittellehre gegen psychische Krankheiten.

bemeisternde Gefühl ankämpft. Auch scheint in der reinen Störung der Verstandesäusserungen nur das Gehirn in unordentlicher Thätigkeit zu sein, bei den Gemüthskrankheiten dagegen giebt sich sehr deutlich ein Ergriffensein der Abdominal- und zum Theil auch der Brust-Nervengeflechte kund.

Diesemnach können die Seelenkrankheiten eingetheilt werden:

1) In die Geisteskrankheiten; das sind solche, in welchen die wesentlichen Zufälle der Krankheit ein fehlerhafter Zustand des Vorstellungsvermögens ist. Hieher gehören a) der Blödsinn, b) die allgemeine Verwirrtheit und c) die partielle Verrücktheit oder der fixe Wahn.

2) Die Gemüthskrankheiten; das sind solche, in welchen ein Leiden des Gemüthes das Characteristische der Krankheitsform ist. Diese sind a) die Schwermuth (Melancholie) und b) die Wuth.

ZWEITES HAUPTSTÜCK.

Von den einzelnen Arten der Seelenkrankheiten.

Erste Gruppe: die Geisteskrankheiten.

Der Blödsinn.

(*Geistesschwäche*, *Fatuitas*, *Stupiditas*, *Amentia*, *Anoia*, *Idiotismus*.)

§. 2116.

Der **Blödsinn** ist die Seelenkrankheit, welche sich vorzüglich durch Schwäche des Erkenntnissvermögens ausspricht.

§. 2117.

Im geringern Grade äussert sich die Geistesschwäche nur durch Mangel des richtigen Urtheils. Es fehlt nicht an Aufmerksamkeit, ja selbst nicht an einer gewissen Lebhaftigkeit des Geistes, die Gefühle sind ebenfalls rege und der Wille oft selbst kräftig, es fehlt aber an der Schärfe des Urtheils, das Gespräch ist albern (Fatuitas) und es missglücken in der Regel sämmtliche Unternehmungen, weil die Berechnung falsch ist. — In einem höhern Grade spricht sich das Uebel durch Mangel der Aufmerksamkeit, ein sehr langsames und unvollständiges Auffassen der Gegenstände, Mangel der

Phantasie, Schwäche des Gedächtnisses, Trägheit der Gefühle und Schwäche der Willenskraft aus (Stupiditas). — Im höchsten Grade des Blödsinns (Idiotismus) sind oft kaum mehr Spuren einer geistigen Thätigkeit zu bemerken, und es zeigt sich selbst ein krankhafter Zustand in den vegetativen Verrichtungen. Das Bild dieses höchsten Grades des Blödsinnes stellen insbesondere die in den tiefen Thälern von Savoyen, Wallis, Tyrol, Salzburg etc. wohnenden Cretinen*) dar. Die neugebornen Kinder haben ein scrophulöses und rhachitisches Aussehen, einen grossen Schädel, einen Kropf, sie weinen nicht und saugen nicht gehörig, sie zahnen schwer und die Zähne werden leicht cariös, sie fangen nicht an mit den Händen die Speisen in den Mund zu stecken, so dass man ihnen bis in das zehnte und zwölfte Jahr die Speisen in denselben bringen muss. Die Erwachsenen haben einen schlotternden Gang, der Kopf hängt vor, die Mundwinkel hängen herab, die Lippen sind wulstig und aufgeworfen, die innern Augenwinkel stehen tiefer als die äussern, der Blick ist stier und dummlächelnd, die Sprache ist lallend oder fehlt ganz, die Sinne sind im allgemeinen stumpf, insbesondere das Gehör, die Kranken interessiert nichts andauernd, doch haben sie oft Gedächtniss für empfangene Wohlthaten oder Verletzungen und sind zuweilen rachsüchtig, zuweilen haben sie auch grossen Geschlechtstrieb, oft sind sie aber ganz gleichgültig gegen Alles, ja sie nehmen oft nicht einmal von selbst Speise zu sich und lassen den Harn und den Koth ohne Scheu, wo sie sich gerade befinden, von sich gehen.

*) *Malacarne* (Turin 1789). — *Ackermann* (Gotha 1790). — *Fodéré* (Par. 1792, aus d. Franz. v. Lindemann, Berlin 1796). — *Wenzel* (Wien 1802). — *Iphofen* (Dresden 1817). — *Knolz* (med. Jahrb. d. k. k. östr. Staaten. Neueste Folge. B. I.).

§. 2118.

Es haben die Cretinen meist einen eigenen Schädelbau, an welchem insbesondere oft eine grosse Schiefheit zu bemerken ist, auch sollen die Foramina lacera und condyloidea sehr verengt sein, so dass die durch dieselben gehenden Gefässe und Nerven gedrückt werden, und nach *Melacarne* sollen im kleinen Gehirne nur 390 Blätter vorhanden sein, während bei Vernünftigen sich 800 vorfinden.

§. 2119.

Ursachen. Meistens ist der Blödsinn angeboren, wovon oft Abneigung der Eltern gegen einander und die Zeugung während eines Rausches etc. Schuld tragen sollen, häufig ist er angeerbt, was insbesondere bei dem Cretinismus der Fall ist. — Erworben wird die Krankheit durch verschiedenartige Gehirnaffectionen, z. B. die Fallsucht und den Schlagfluss, durch übermässige Anstrengungen des Geistes und insbesondere auch durch andere Seelenkrankheiten, von denen oft der Blödsinn ein Ausgang ist. — Als mitwirkende Ursachen des Cretinismus, werden der in den bezeichneten Gegenden oft stattfindende Mangel am Zug der Luft und an Sonnenlicht und Sumpfausdünstungen beschuldigt.

§. 2120.

Vorhersage. Der angeborne Cretinismus ist unheilbar, in der Regel auch der nach Seelenkrankheiten eingetretene Blödsinn, eher lässt sich einige Milderung oder Heilung bei den geringern Graden und der aus vorübergehenden Ursachen entsprungenen Geistesschwäche hoffen.

§. 2121.

Behandlung. Bei den geringern Graden des Blödsinns gelingt es manchmal durch eine sehr sorgfältige Erziehung, und insbesondere durch allmähligen Uebergang von den leichtesten zu schwerern Verstandesübungen die Geisteskräfte einigermassen zu

wecken. — Die Cretinen müssen frühzeitig aus den tiefen Thälern auf die Höhe der Berge gebracht werden. Die ungesunde Gegend muss so viel wie möglich durch Cultur verbessert werden. Um das Uebel aus einer Gemeinde auszurotten, ist das beste Mittel, Vermeidung der Ehen der Familien des Ortes unter sich und dagegen eheliche Verbindung mit auswärtigen, gesunden und kräftigen Geschlechtern.

Die allgemeine Verwirrtheit.

§. 2122.

Die **allgemeine Verwirrtheit** ist die Seelenkrankheit, welche sich vorzüglich durch eine schnelle Aufeinanderfolge unzusammenhängender Vorstellungen, Gefühle und Handlungen zu erkennen giebt.

§. 2123.

Es entwickelt sich die allgemeine Verwirrtheit oft aus einer andern Seelenstörung; zuweilen tritt die Krankheit aber sogleich unter der angegebenen Form auf. Die Kranken sind geschwätzig, sie springen von einer Idee auf die andere, ohne sie vollständig auszubilden, wobei oft nur ein einziges Wort oder ein angefangener Satz, die ohne Zusammenhang zwischen andern Worten stehen, die schnell vorübergegangene Vorstellung anzeigen. Oft leuchten aus einem solchen Chaos von verworrenen Vorstellungen witzige Einfälle und einzelne schöne Gedanken hervor, oft taucht immer von neuem eine fixe Idee auf, die aber einem andern verworrenen Phantasiestück schnell wieder Platz macht. Oft sind dabei die Kranken in

froher Gemüthsstimmung, sie schwatzen, lachen und singen, oft sind sie in einer düstern Gemüthsstimmung, in welchem Falle ihre oft abgebrochenen Aeusserungen aus Anstrengungen des Geistes zu philosophiren hervorgehen oder Bruchstücke vieler düsterer, mit einander abwechselnder Vorstellungen sind. Oft wechseln auch eine heitere und traurige Gemüthsstimmung, Lachen und Weinen, schnell mit einander ab. Hiebei ist der Kranke oft auch sehr thätig, aber die kaum angefangene Beschäftigung wird schnell wieder verlassen und eine andere ergriffen, und selbst die gewöhnlichen Verrichtungen werden auf eine verworrene und oft phantastische Weise vollführt. — Nur selten ist die Krankheit acut, in der Regel ist sie langwierig und oft habituell.*)

§. 2124.

Ursachen. Bei manchen Individuen ist die Anlage zur Verwirrtheit angeboren. Häufig ist die allgemeine Verwirrtheit der Ausgang einer andern Seelenstörung, namentlich des fixen Wahnes und der Wuth, zuweilen wird sie unmittelbar durch einen heftig erschütternden Eindruck auf Geist und Gemüth hervorgebracht, manchmal tragen somatische Krankheiten, insbesondere Gehirn- und Nervenkrankheiten, zu ihrer Entstehung bei, zuweilen ist sie die Folge des hohen Alters.

§. 2125.

Vorhersage. Die aus einer besondern Anlage entsprungene Verwirrtheit ist in der Regel unheilbar, die durch eine andere Seelenstörung, einen starken Gemüthseindruck etc. hervorgebrachte allgemeine Verwirrung wird oft geheilt.

*) Es ist dieses die Form von Seelenstörung, die man am häufigsten Narrheit nennt, doch legt man diesen Namen auch andern Seelen krankheiten bei, namentlich dem fixen Wahne.

§. 2126.

Behandlung. Bei der aus einer besondern Anlage entsprungenen Verwirrtheit ist eine planmässige Erziehung vorzüglich nothwendig, insbesondere strenges Anhalten des Kranken zu einer bestimmten Arbeit, auf welche er seine Aufmerksamkeit fest zu richten genöthigt ist. Gegen die durch eine andere Ursache bedingte allgemeine Verwirrung, insofern dieselbe, was in der Regel der Fall ist, mit zu grosser Erregung der psychischen Thätigkeit verbunden ist, wendet man die in dem §. 2103 und den §§. 2107 – 9 angegebene beschränkende Methode an. Nur wenn die Verwirrung aus allgemeiner Schwäche entsprungen ist, sind die erregenden und tonischen Mittel in Gebrauch zu ziehen.

Die partielle Verrücktheit.

(*Fixer Wahn, Wahnsinn, Monomania.*)

§. 2127.

Die **partielle Verrücktheit** ist die Seelenkrankheit, in welcher die Urtheilskraft nur in Beziehung auf *einen* Gegenstand oder eine Reihe homogener Gegenstände krank erscheint.

§. 2128.

Tritt diese Krankheit ohne Verbindung mit einer andern Art der Seelenstörung auf, so ist oft an dem Kranken keine Spur einer Verwirrung zu bemerken und es zeigt sich selbst grosse Klarheit des Verstandes bis zu dem Augenblick, in welchem die fixe Idee hervortritt, ja selbst in der Vertheidigung der festgewurzelten

Vorstellung zeigt sich oft eine grosse Folgerichtigkeit in den Schlüssen, es betrachtet aber der Kranke den Gegenstand von einem verrückten Standpunkt aus und ist unvermögend, die Unrichtigkeit desselben einzusehen. Er hält z. B. einen längst sehnlich gehegten Wunsch für realisirt oder ein lange gefürchtetes Ereigniss für wirklich eingetreten und handelt hiernach ganz consequent, indem er zu gleicher Zeit ein freies Urtheil über alle Gegenstände besitzt, mit Ausnahme des einzigen, der sein Gemüth so sehr ergriffen hat. — Häufig behält die Krankheit nicht ihre reine Form bei. Ausser dem fixen Wahne zeigen sich auch andere Erscheinungen eines gestörten Seelenlebens, mehr oder weniger Verwirrung in den Begriffen, auch in Beziehung auf andere Gegenstände, als die des fixen Wahnes, und leicht erregte Gemüthsaffecte.

§. 2129.

Nach Verschiedenheit des Gegenstandes, auf welchen sich der fixe Wahn bezieht, hat man verschiedene Arten der partiellen Verrücktheit angenommen. Hieher gehören vorzüglich:

Der *Wahnsinn der Stolzen.* Es hält sich der Kranke für unübertrefflich schön, reich, vornehm, er glaubt erstaunungswürdige und selbst unmögliche Dinge vollbracht zu haben, er glaubt dieser oder jener berühmte Gelehrte oder grosse Feldherr, ein Fürst, ein König, der Papst oder Gott selbst zu sein, seine Mienen sind stolz, und nach der Beschaffenheit seines Characters ist er entweder herablassend oder zurückstossend, herrisch und gewaltthätig.

Der *Wahnsinn, der sich auf den Zustand des Körpers bezieht.* Es entwickelt sich diese Art der Verrücktheit meistens aus der Hypochondrie, sie unterscheidet sich aber dadurch von dieser Krankheit, dass die Kranken nicht mehr im Stande sind, das Unmögliche ihrer

thörigten Vorstellung einzusehen. Ein Kranker ist z. B. fest überzeugt, er habe ein Vogelnest im Kopfe, ein anderer glaubt, seine Füsse seien von Glas, seine Nase von Wachs etc.

Der *Wahnsinn der Geitzigen.* Es glaubt der Kranke, wenn er mitten im Ueberfluss sich befindet, verhungern zu müssen.

Der *religiöse Wahnsinn.* Es bildet sich der Kranke ein, von Gott zu seinem Werkzeug für bestimmte Zwecke auserlesen zu sein und begeht von dieser Idee geleitet mit kaltem Blute die grössten Verbrechen, oder er verlässt die Arbeit, verschmähet Speis und Trank und erwartet betend seine Himmelfahrt bei lebendigem Körper etc.

Die *Daemonomanie.* Es glauben die Kranken von höllischen Geistern verfolgt zu werden, sich dem Teufel verschrieben zu haben, die Qualen der Hölle zu empfinden, zuweilen glauben sie auch behext zu sein, in Thiere, z. B. Wölfe und Hunde verwandelt worden zu sein (Lycanthropia, Cynanthropia) etc.

§. 2150.

Es ist die partielle Verrücktheit in der Regel ein chronisches Leiden. Der Uebergang zum gesunden Zustand geschieht oft sehr rasch. Manchmal geht das Leiden in eine andere Seelenkrankheit über, oft in Melancholie, anfallsweise in Wuth, zuletzt in allgemeine Verwirrtheit oder Blödsinn.

§. 2151.

Ursachen. In der Regel liegen dieser Form von Seelenstörung gewisse Affecte und Leidenschaften zum Grunde, z. B. grosser Ehrgeitz. Nur in seltenen Fällen wird die Krankheit durch unmittelbare Einwirkung auf die Verstandeskräfte oder auf das Gehirn selbst hervorgebracht.

§. 2132.

Vorhersage. Der fixe Wahn gehört zu den Seelenkrankheiten, die am häufigsten geheilt werden.

§. 2133.

Behandlung. Bei der partiellen Verrücktheit tritt häufiger als bei den übrigen Seelenstörungen der Fall ein, dass die Verrücktheit durch geistreiche Einwendungen, Ueberraschung etc. mit Erfolg bekämpft wird (vergl. §. 2102). In der Mehrzahl der Fälle ist, da die Krankheit in einer excessiven Thätigkeit besteht, die beschränkende und ableitende Methode (§. 2103 u. 2107 – 9) angezeigt; nur in seltenen Fällen die erregende (§. 2110), wenn nämlich die krankhafte Vorstellung mit einem Gesunkensein der Lebenskräfte in Verbindung steht und zuweilen auch, wenn sie aus einem deprimirenden Affect hervorgegangen ist.

Die Schwermuth.

(*Der Tiefsinn, Trübsinn, Melancholia, Athymia.*)

§. 2134.

Die **Schwermuth** ist eine so traurige Stimmung des Gemüthes, dass die ganze Denkkraft des Kranken an den Gegenstand seiner Betrübniss geheftet ist und der Kranke dadurch die Kraft der Selbstbestimmung verloren hat.

§. 2135.

Die Krankheit bildet sich oft nur langsam, oft auch schneller aus. Die Kranken verlieren sich gerne in Gedanken, doch geben sie im Anfange noch auf die an sie gerichteten Fragen die gehörige Antwort, sie suchen

Einsamkeit und überlassen sich im Anfange nur dort ihrem tiefen Kummer, bald beherrscht sie aber auch in der lebhaftesten Gesellschaft das niederbeugende Gefühl völlig, sie stieren mit düsterm Blicke vor sich hin und wissen nicht mehr, was um sie vorgeht; der Schlaf flieht von ihrem Lager und ihre Seele starrt Tag und Nacht auf den Gegenstand der Betrübniss hin, der Kranke wiederholt sich ohne Unterlass die Scene der erlittenen Schmach oder malt sich das Bild einer geliebten verlornen Person oder das der Heimath aus, nach welcher die Rückkehr ihm nicht vergönnt ist (das Heimweh, Nostalgia). Entweder ist hiebei der Kranke mehr regungslos und behält oft selbst Monate und Jahre dieselbe Stellung des Körpers bei, mit dem Blicke stets grad hinausstierend (Melancholia attonita), oder wird von innerer Unruhe getrieben und läuft von einem Orte zum andern (Melanch. errabunda). Oft ist der Kranke so sehr für alle äussern Einwirkungen unempfindlich, dass er selbst körperliche Eindrücke, namentlich die Einwirkung der Kälte, die übrigens für ihn, wie für gesunde Individuen, nachtheilig ist, nicht wahrnimmt und keine Speisen von selbst zu sich nimmt. Zuweilen verweigert auch der Kranke die Annahme der Nahrungsmittel, weil er den Selbstmord sich vorgesetzt hat. — Häufig und selbst meistens ist das die Seele beherrschende Gefühl mit einer krankhaften Vorstellung über den Gegenstand, auf welchen sich die Melancholie bezieht, verbunden, so dass der Kranke einen geringfügigen Vorfall durch seine Phantasie zu einem Ereigniss bildet, das ihn allerdings physisch oder moralisch zu zernichten im Stande wäre. Es leidet dabei der Körper mit, das Aussehen des Kranken wird bleich, erdfahl, seine Haut trocken, er leidet an grosser Verstopfung, Aufgetriebenheit des Leibes, Appetitlosigkeit, er magert ab, zuweilen stellt sich Gelbsucht oder Wassersucht ein.

§. 2136.

Die Krankheit ist chronisch. Sie endigt sich mit Gesundheit, vorzüglich nach Beseitigung der veranlassenden Ursache, nicht selten auch durch Krisen. Selten geht die Melancholie in Wuth, häufiger in allgemeine Verwirrtheit und Blödsinn über; manchmal treten Anfälle von Fallsucht oder Schlagfluss hinzu. — Die Leichenöffnungen geben die im §. 2090 schon angeführten Resultate, insbesondere findet man öfters Verhärtungen und andere Organisationsveränderungen in der Leber, der Milz, dem Herzen etc. und nach Esquirol zuweilen eine Verschiebung des Quergrimmdarms, so dass dieser eine senkrechte Lage zeigt und sein linkes Ende hinter dem Schambeine liegt, oder auch, dass er bogenförmig bis unter die Schambeine und selbst in das Becken herabsteigt; doch hat man diese eigenthümliche Lage des Quergrimmdarmes auch in andern Leichen als in solchen von melancholischen Individuen gefunden.

§. 2137.

Ursachen. Es ist die Anlage oft erblich und angeboren und haftet an dem cholerischen und melancholischen Temperament. Gelegenheitsursachen sind häusliche Sorgen, unglückliche Liebe, der Verlust geliebter Personen, die Entfernung aus der Heimath, verletzte Ehre, Unglück des Vaterlandes, körperliche Leiden, insbesondere die Krankheitszustände, die die Hypochondrie und Hysterie darstellen etc.

§. 2138.

Vorhersage. Diejenigen Fälle, in welchen die Melancholie allein oder vorzüglich durch eine äussere Ursache veranlasst worden ist und diese nur vorübergehend ist, sind die günstigsten, auch ist die Melancholie, die nicht mit Verkehrtheit verbunden ist, leichter zu heilen, als die mit Verkehrtheit.

§. 2139.

Behandlung. Unter den psychischen Mitteln ist vorzüglich die Erregung des Interesses des Kranken für andere Gegenstände, als die, auf welche sich die Schwermuth bezieht, Zerstreuung und die Erhebung des Selbstgefühls des Kranken von Wichtigkeit. — Unter den somatischen Mitteln passen oft die erregenden und die stärkenden Mittel, z. B. etwas Wein, um das Gefühl körperlichen Wohlseins und Kraft zu erregen und dadurch auf das Gemüth zurückzuwirken. — Meistens sind auch eröffnende Mittel nothwendig.

Die Wuth.

(*Raserei, Tobsucht, Mania, Furor.*)

§. 2140.

Die **Wuth** ist die Seelenkrankheit, die durch einen blinden Trieb zu Gewaltthätigkeiten, der oft durch die geringste Veranlassung und zuweilen selbst nur durch körperliche Gefühle zur Thätigkeit geweckt wird, und durch welchen die Kraft der Selbstbestimmung gebunden ist, sich ausspricht.

§. 2141.

Gewöhnlich ist die Wuth mit einer andern Seelenkrankheit verbunden, insbesondere der partiellen Verrücktheit, und es entspringen meistens die Wuthanfälle aus einer krankhaften Vorstellung (Wuth mit Verkehrtheit), doch ist auch in diesem Falle meistens die Gemüthsaufregung ungleich grösser, als sie die eingebildete Veranlassung, wenn sie gegründet wäre, naturgemäss hervorbringen sollte.

Es gehen oft der Wuth Vorbothen vorher, brennende Hitze im Unterleibe, grosser Durst, heisses und rothes Gesicht, starkes Klopfen der Arterien des Halses und der Schläfen etc., wiewohl in der Regel bei diesen Zufällen die Gemüthserregung schon begonnen zu haben scheint und sich nur noch nicht durch Thätlichkeiten äussert. In andern Fällen bricht auch die Wuth plötzlich aus. Der Kranke schreit, brüllt, stampft mit den Füssen, wälzt sich auf dem Boden, zerreisst seine Kleider, und sucht alle Gegenstände zu zertrümmern und die Umstehenden zu verletzen, die Kraft der Muskeln scheint oft verstärkt zu sein, und zuweilen zeigen sich auch einzelne Geisteskräfte gesteigert, so dass z. B. die Kranken mit grosser Beredtsamkeit declamiren, was sie sonst nicht vermochten. Beim weiblichen Geschlechte äussert sich die Wuth, mehr als durch Gewaltthätigkeiten, durch unaufhörliches Schwatzen und Schimpfen. Zuweilen ist auch der Kranke ganz still, nur rollt er seinen Blick und knirscht mit den Zähnen. Er sucht selbst die Regungen in seinem Innern zu verbergen und wartet den günstigen Augenblick ab, um zu schaden (die stille Wuth). — Unmittelbar nach dem Anfalle weiss der Kranke in der Regel nicht, was er gethan hat, oder er hat nur eine dunkle Erinnerung davon.

§. 2142.

In seltenen Fällen bleiben (nach *Pinel*) bei der Wuth die intellectuellen Kräfte im normalen Zustande. Es werden die Wuthanfälle durch keine krankhafte Vorstellung geweckt, der Kranke erkennt selbst seinen Zustand, er fühlt das Herannahen des Wuthanfalls und warnt selbst die Umstehenden, er vermag aber das Gefühl des Grimmes, das in ihm aufsteigt, nicht zu bemeistern und wird in solchen Augenblicken zu gewaltsamen Handlungen hingerissen (die Wuth ohne Verkehrtheit).

§. 2143.

Die Wuth macht häufig nur Anfälle von einigen Stunden oder Tagen (die acute Wuth), nach welchen aber meistens eine andere Seelenstörung, z. B. Melancholie, fortdauert, in andern Fällen hält sie mehrere Wochen und Monate an (die chronische Wuth). Oft kehren die Wuthanfälle nur in bestimmten Perioden, z. B. zur Zeit der monatlichen Reinigung, zurück. — Der Uebergang in Gesundheit geschieht oft schneller, als bei andern Seelenstörungen. — Nachkrankheiten sind häufig allgemeine Verwirrtheit und Blödsinn. — Tod oft durch Erschöpfung und Schlagfluss.

§. 2144.

Ursachen. Die Anlage zur Manie ist oft angeerbt und vorzüglich Individuen von cholerischem und sanguinischem Temperament, von vollsaftiger und kräftiger Constitution, von einem Alter von 20 bis 40 Jahren und mehr Männern als Weibern eigen. Gelegenheitsursachen sind heftige Leidenschaften, alle äussern Einwirkungen, die zum Zorne reitzen, der Missbrauch geistiger Getränke, grosse Hitze, Versetzungen der Milch, der Lochien etc.

§. 2145.

Vorhersage. Die erst entstandene und durch zufällige äussere Veranlassungen erregte Wuth wird häufiger geheilt, als in der Regel die andern Seelenstörungen.

§. 2146.

Behandlung. In der Wuth ist immer die besänftigende und herabstimmende Methode angezeigt. Häufiger, als in andern Seelenstörungen, passen die Aderlässe, wiewohl sie auch hier nicht unbedingt und zu kräftig, und vorzüglich nur dann, wenn sie durch einen Congestionszustand nach dem Gehirne angezeigt sind, in Anwendung gebracht werden dürfen. Dem

Blutandrang wird oft genügsam durch kalte Umschläge auf den Kopf und innerliche schwächende Mittel entgegen gewirkt. — Vorzüglich nützlich sind oft in der Wuth die in den §§. 2103 u. 2107 bis 9 angegebenen herabstimmenden und beschränkenden Mittel, insbesondere die Brechmittel, die Sturzbäder und die Drehmaschinen. Der Rath, den Kranken sich austoben zu lassen, ist doch wohl nur für Anfälle von kürzerer Dauer angemessen, bei länger anhaltenden Anfällen ist die beschränkende Methode oft absolut nothwendig und häufig von dem besten Erfolg. — In der Zeit zwischen den Anfällen sucht man das Gemüthsleiden zu bekämpfen, aus welchem die Wuth entsprungen ist.

RECEPTFORMELN.

Nro. 53.

Rp. Mixturae sulphurico-acidae, *Drachmam unam*,
Syrupi Rubi Idaei, *Uncias duas.*

MDS. Unter dem Getränk innerhalb eines Tages zu nehmen.

Nro. 54.

Rp. Radicis Ratanhiae, *Unciam dimidiam*,
coque Aqua fontana,
colaturae *Unciarum quinque*
adde
Tincturae Cinnamomi, *Unciam dimidiam*,
Syrupi corticum Aurantiorum, *Unciam unam.*

MDS. Jede Stunde einen Löffel voll zu geben.

Nro. 55.

Rp. Decocti radicis Althaeae, *Uncias sex*,
Creosoti, *Guttas sex — octo*,
Syrupi simplicis, *Unciam dimidiam.*

MDS. Jede Stunde einen Löffel voll zu geben.

Nro. 56.

Rp. Magnesiae carbonicae,
Sacchari albi, *aa. Drachmas duas.*

M., fiat pulvis, detur ad scatulam, signetur: zuweilen einen Kaffelöffel voll zu nehmen.

Nro. 57.

Rp. Lapidum Cancrorum, *Unciam dimidiam,*
Flavedinis corticum Aurantiorum,
Sacchari albi, *aa. Drachmam unam.*

M., fiat pulvis, detur ad scatulam, signetur: 2 bis 4 mal täglich eine Messerspitze voll zu nehmen.

Nro. 58.

Rp. Kali carbonici, *Drachmam unam,*
solve in
Aquae destillatae, *Unciis quatuor,*
adde
Extracti corticum Aurantiorum, *Drachmas duas,*
Tincturae Rhei vinosae,
Syrupi Cinnamonii, *aa. Unciam dimidiam.*

MDS. 4 mal täglich einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 59.

Rp. Croci orientalis, *Grana quatuor,*
Lapidum Cancrorum,
Tincturae Rhei aquosae, *aa. Drachmam semis,*
Syrupi Cichorei, c. Rheo, *Drachmas septem,*
Aquae Foeniculi, *Unciam unam.*

MDS. Umgeschüttelt, jede halbe Stunde einen Theelöffel voll zu geben. (Für ein Kind, von *Richter*)

Nro. 60.

Rp. Kali carbonici, *Drachmam unam et dimidiam*,
solve in
Aquae destillatae, *Unciis quatuor*,
adde
Syrupi Althaeae, *Unciam dimidiam*.

DS. Jede Stunde einen Löffel voll, mit 2 bis 3 Kaffelöffel voll Citronensaft, unter dem Aufbrausen zu nehmen. (*River*'scher Trank.)

Nro. 61.

Rp. Natri carbonici aciduli, *Grana octo*,
Acidi tartarici, *Grana quinque*,
Sacchari albi, *Grana decem*.

M. f. pulv. d. tal. dos. VI.

S. Alle 2 Stunden 1 Pulver mit Wasser, während des Aufbrausens zu nehmen. (Brausepulver.)

Nro. 62.

Rp. Opii pur, *Granum unum*,
Pulveris radicis Columbo,
Sacchari albi, *aa. Grana decem*.

M. f. pulv. dent. tal. dos. IV.

S. 2 mal täglich 1 Pulver zu nehmen.

Nro. 63.

Sp. Tincturae thebaicae, *Guttas duas*,
Aquae fontanae, *Unciam unam*,
Syrupi Althaeae, *Unciam dimidiam*.

MDS. Jüngern Kindern in 4, ältern Kindern in 2 Theilen, in Zwischenräumen von 3 bis 4 Stunden zu geben.

Nro. 64.

Rp. Radicis Columbo, *Unciam semis,*
coque Aqua fontana,
colaturae, *Unciarum sex*
adde
Pulveris gummi arabici, *Drachmas duas,*
Syrupi corticum Aurantiorum, *Unciam unam.*

MDS. Jede Stunde 1 Löffel voll zu nehmen.

Nro. 65.

Rp. Balsami Copaivae, *Drachmas duas,*
Pulv. gummi arabici, *Drachmas tres,*
Aquae florum Sambuci, *Uncias quinque,*
Syrupi Atthaeae, *Unciam unam.*

MDS. Alle 2 Stunden 1 Löffel voll zu nehmen.

Nro. 66.

Rp. Croci orientalis, *Drachmam unam,*
infunde Aquae fervidae, *Unciis quinque,*
Colaturae adde
Boracis, *Drachmam unam,*
Extracti Millefolii, *Drachmas duas,*
Syrupi corticum Aurantiorum, *Unciam unam.*

MDS. Alle 2 Stunden 1 Löffel voll zu nehmen.

Nro. 67.

Rp. Foliorum Sabinae, *Unciam dimidiam – unam*,
infunde Aqua fervida,
colaturae, *Unciarum sex*
adde
Boracis, *Drachmam unam*,
Syrupi simplicis, *Unciam unam*.

DS. 4 mal täglich einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 68.

Rp. Sulphuris stibiati aurantiaci,
Calomelis, *aa. Granum dimidium – unum*,
Sacchari albi, *Grana decem*.

M. f. pulv. dent. tal. dos. XII.

S. 2 mal täglich ein Pulver zu nehmen. (Die *Plummer*'schen Pulver.)

Nro. 69.

Rp. Hydrargyri stibiato-sulphurati,
Resinae Guajaci, *aa. Drachmam unam*,
Extracti Dulcamarae, *Drachmas duas*.

M. f. c. Syrupo Sacchari pilulae ponderis *Granorum duorum*.

DS. Früh und Abends 8 Stücke zu nehmen (*P. Frank*)

Nro. 70.

Rp. Radicis Graminis,
„ Bardanae,
„ Saponariae,
Ligni Guajaci, *aa. Unciam unam*,
Radicis Liquiritiae, *Unciam dimidiam.*

MDS. Zum Thee.

Nro. 71.

Rp. Boracis, *Drachmam unam*,
Mellis rosati, *Unciam unam.*

MDS. Mundsaft

Nro. 72.

Rp. Hydrargyri ammoniato muriatici, *Drachmam dimidiam*,
Adipis suillae lotae, *Drachmas sex.*

MDS. 2 mal täglich eine Bohne gross aufzustreichen.

Nro. 73.

Rp. Graphitis laevigati, *Drachmas duas*,
Unguenti rosati, *Drachmas decem.*

M. f. unguentum. DS. Theelöffelvollweise einzureiben (*Weinhold.*)

Nro. 74.

Rp. Florum Sulphuris, *Unciam unam*,
Axungiae Porci, *Uncias duas.*

M. f. unguentum. DS. Zum Einreiben.

Nro. 75.

Rp. Sulphuris depurati, *Unciam unam*,
Pulveris radicis Hellebori albi, *Drachmas duas*,
Kali nitrici, *Grana decem*,
Saponis nigri, *Unciam unam*,
Adipis Suilli, *Uncias tres*.

MDS. Zum Einreiben. (Ung. atipsor anglic.)

Nro. 76.

Rp. Stibii sulphurati nigri laevigati, *Unciam semis*,
Magnesiae carbonicae, *Drachmam unam*,
Pulveris florum Cassiae, *Drachmam semis*,
Sacchari albi, *Drachmas quinque*.

M. f. pulvis d. ad scatulam. S. 2 mal täglich eine Messerspitze oder Kaffelöffel voll zu nehmen. (*Kämpf.*)

Nro. 77.

Rp. Hydrargyri stibiato sulphurati, *Drachmam semis*,
Resinae Guajaci, *Drachmam unam*,
Magnesiae carbonicae,
Sacchari albi, *aa. Drachmas duas*.

M. f. pulv. d. ad scatulam. S. 2 mal täglich eine starke Messerspitze voll zu nehmen.

Nro. 78.

Rp. Barytae muriaticae, *Drachmam unam*,
Aquae Laurocerasi, *Unciam unam*.

MDS. Täglich 4 mal 15 Tropfen zu nehmen. (*Hufeland.*)

Anwendung des Jod's nach Lugol.

Nro. 79.

(Jodmineralwasser.)

		Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Nr. 4.
Rp.	Jodinae	Gr. ½.	Gr. ¾.	Gr. 1.	Gr. 1¼.
	Kali hydriod.	Gr. ¾.	Gr. 1½.	Gr. 2.	Gr. 2½.
	Aquae destillatae	Unc. 8.	Unc. 8.	Unc. 8.	Unc. 8.

Zuerst die Formel Nr. 1 täglich morgens und abends die Hälfte zu nehmen; nach 14 Tagen Nr. 2. in zwei Portionen, nach 4 bis 6 Wochen auf dieselbe Weise Nr. 3 und in seltenen Fällen noch Nr. 4.

Nro. 80.

Rp. Jodinae, *Scrupulum unum*,
Kali hydriodinici, *Scrupulos duos*,
Aquae destillatae, *Uncias octo*.

DS. Erwachsenen 2 mal täglich 6 Tropfen, alle 8 Tage um 2 Tropfen bis auf 30 bis 36 Tropfen steigend; Kindern unter 7 Jahren bis zu 5 Tropfen, Kindern über 7 Jahren bis zu 16 Tropfen.

Nro. 81.

Jodsalbe.

		Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Nr. 4.
Rp.	Jodinae	Gr. 12.	Gr. 18.	Gr. 21.	Gr. 24.
	Kali hydriod.	Scr. 4.	Dr. 2.	Dr. 2½.	Dr. 2½.
	Adip. suill.	Unc. 2.	Unc. 2.	Unc. 2.	Unc. 2.

Nro. 82.

(Mercurial-Protojod-Salbe.)

	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.
Rp. Protojodureti Mercurii	Scr. 2.	Scr. 3.	Scr. 4.
Adip. suill.	Unc. 2.	Unc. 2.	Unc. 2.

Nro. 83.

(Jod-Liquor.)

	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.
Rp. Jodinae	Gran 2.	Gran 3.	Gran 4.
Kali hydriod.	Gran 4.	Gran 6.	Gran 8.
Aq. destill.	Pfd. 1.	Pfd. 1.	Pfd. 1.

Nro. 84.

(Rothmachender Jod-Liquor)

Rp. Jodinae, *Drachmam dimidiam*,
Kali hydriodinici, *Unciam unam*,
Aquae destillatae, *Uncias sex*.

MD. ad vitrum epistomate vitreo clausum.

Nro. 85.

(Kaustischer Jod-Liquor.)

Rp. Jodinae, *Drachmam unam*,
Kali hydriodinici,
Aquae destillatae, *aa. Uncias Duas.*

Nro. 86.

(Jod-Bäder. — Für Kinder.)

		Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Nr. 4.
Rp.	Jodinae	Scr. 2.	Scr. $2^1/_2$.	Scr. 3.	Scr. 4.
	Kali hydrojod.	Scr. 4.	Scr. 5.	Scr. 6.	Scr. 8.
	Aq. destillat.	Unc. 6.	Unc. 6.	Unc. 6.	Unc. 6.

(Für Erwachsene.)

		Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Nr. 4.
Rp.	Jodinae	Dr. 2.	Dr. $2^1/_2$.	Dr. 3.	Dr. 4.
	Kali hydrojod.	Dr. 4.	Dr. 5.	Dr. 6.	Dr. 8.
	Aq. destillat.	Unc. 6.	Unc. 6.	Unc. 6.	Unc. 6.

Die Salben wendet man auf Geschwülste und Geschwüre an, 1 bis 2 mal täglich. Den zuerst angegebenen Jod-Liquor (Nr. 83) benutzt man bei scrophulösen Ophthalmien, zu Injectionen bei Fistelgängen, gegen Geschwüre und Flechten. Wirkt dieser Liquor nicht mehr, so kann der Nr. 84 angegebene gebraucht werden; auch dient dieser Liquor zu Local-Jod-Bädern und als Zusatz zu Jodkataplasmen. Den kaustischen Jodliquor kann man bei schwammigen Auswüchsen und fressenden Flechten in Anwendung bringen. Die Jodbäder giebt man wöchentlich 2 bis 3 mal, in der Wärme von 28 bis 30 Gr. R

Nro. 87.

Rp. Limaturae martis.
Pulveris radicis Rhei, *aa. Grana quinque,*
Sacchari albi, *Grana decem.*

M. f. pulv. dent. tal. dos. octo. S. 2 mal täglich 1 Pulver zu nehmen.

Nro. 88.

Rp. Extracti Ferri pomati, *Drachmam unam et semis*,
Pulv. radicis Rhei,
„ corticis Cascarillae, *aa.* q. s. ut. f. pilul. *granor. duor.*

S. 2 mal täglich 5 bis 8 Stücke zu nehmen.

Nro. 89.

Rp. Unguenti Althaeae, *Unciam unam*,
Fellis Tauri inspissati,
Saponis veneti, *aa. Drachmas tres*,
Petrolei, *Drachmas duas*,
Ammonii carbonici pyroleosi, *Drachmam semis*,
Camphorae, *Drachmam unam*.

M. f. linimentum. DS. Alle 3 Stunden einen Theelöffel voll einzureiben. (*Hufeland.*)

Nro. 90.

Rp. Radicis Rubiae tinctorum, *Unciam semi*
Salis Tartari, *Drachmam dimidiam*,
coque Aquae fontanae *Unciis decem*
colaturae adde
Extracti Martis pomati, *Guttas viginti*,
Syrupi corticum Aurantiorum, *Unciam unam*.

MDS. Alle 2 Stunden einen Esslöffel voll. (*Henke.*)

Nro. 91.

Rp. Herbae Digitalis purpureae, *Grana quindecim*,
infunde Aqua fervida,
colaturae *Unciarum quinque*,
adde
Aquae Cinnamomi simplicis,
Syrupi corticum Aurantiorum, *aa. Unciam unam.*

MDS. Alle 2 Stunden einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 92.

Rp. Aceti scillitici, *Unciam unam*,
Kali carbonici, q. s. ad saturationem,
Aquae destillatae, *Uncias quatuor*,
Syrupi Althaeae, *Unciam unam.*

MDS. Alle 2 Stunden einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 93.

Rp. Hydrargyri muriatici corrosivi, *Grana quatuor*,
solve in Aquae destillatae. q. s.
Micae panis albi. q. s. ut fiant pilulae triginta duae.

S. Täglich zweimal 1 — 2 Stücke genommen.

Nro. 94.

Rp. Hydrargyri muriati corrosivi, *Grana sex — duodecim*,
Extracti Cicutae,
Extracti florum Chamomillae, *aa. Drachmas duas*,
Tincturae anodynae simplicis, *Drachmam unam*,
Mellis rosati, *Unciam unam.*

DS. Pinselsaft. (von *Rust*.)

Nro. 95.

Rp. Hydrargyri muriatici corrosivi, *Grana duodecim*,
solve in Aquae destillatae q. s.
adde
Micae panis albi,
Sacchari albi, *aa.* q. s. ut. f. pilulae Nr. 240.

D. (*Dzondi's* Sublimatpillen.)

Nro. 96.

Ep. Hydrargyri muriatici corrosivi,
Ammonii muriatici, *aa. Drachmam unam*,
Axungiae porcinae, *Unciam unam.*

M. exactissime in mortarco vitreo. D. (*Cirillo's* Salbe.)

Nro. 97.

Rp. Decocti radicis Althaeae, *Uncias quinque*,
Acidi borussici methodo Ittneri parati, *Guttas duodecim*,
Syrupi Althaeae, *Unciam unam.*

MDS. Alle 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Nro. 98.

Rp. Seminum Phellandrii aquatici, *Drachmas duas*,
infunde Aqua fervida,
colaturae, *Unciarum quatuor*
adde
Syrupi capillorum Veneris, *Unciam unam.*

DS. Alle 2 Stunden einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 99.

Rp. Lichenis islandici, *Drachmas tres*,
coque Aqua fontana,
colaturae, *Unciarum sex*
adde
Elaeosacchari Anisi, *Drachmas tres.*

DS. Alle 2 Stunde einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 100.

Rp. Plumbi acetici,
Opii puri, *aa. Granum dimidium*,
Sacchari albi, *Grana decem.*

M. f. pulv. dentur tales doses octo. S. Morgens und abends ein Pulver zu nehmen.

Nro. 101.

Rp. Morphii acetici, *Grana duo*,
solve in
Aquae destillatae, *Drachma una et dimidia*,
adde
Aceti Vini destillati, *Guttas octo*,
Vini malacensis, *Drachmam dimidiam.*

MDS. Abends 16 Tropfen zu geben.

Nro. 102.

Rp. Zinci hydrocyanici, *Granum unum*,
Sacchari albi, *Grana decem.*

M. f. pulv. dent. tal. dos. octo. S. 2 — 4 mal täglich ein Pulver zu nehmen.

Nro. 103.

Rp. Sterychnii puri, *Granum unum*,
Acidi acetici, *Guttas duas*,
Sacchari albi, *Drachmas duas*,
Aquae florum Aurantii, *Uncias duas*.

MDS. Täglich 2 mal 2 Theelöffel voll zu nehmen. (*Magendie.*)

Nro. 104.

Rp. Emetini fusci, *Grana quatuor*,
Aquae florum Aurantii, *Uncias duas*,
Syrup, *Unciam semis*.

MDS. Alle halbe Stunde einen Esslöffel voll zu nehmen. (*Magendie.*)

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

SACHREGISTER.

A.

	Band.	Seite
Abmagerung	II.	283
Absonderungskrankh.	II.	51
Abweichen	II.	87
Abzehrung	II.	283
Achores	II.	237
Acne	II.	215
Acor. primarum viarum	II.	76
Adstrictio alvi	II.	137
Agalactia	II.	129
Agrypnia	II.	671
Alienatio mentis	II.	764
Alp	II.	678
Altersschwäche	II.	320
Alvi fluxus	II.	87
Alvus adstricta, constipata, obstructa	II.	137
Amenorrhoea	II.	152
Amentia	II.	795
Anasarca	II.	376
pulmonum	II.	399
Aneuvrysma cordis	II.	301
Angina	I.	403
bronchialis	I.	427
catarrhalis	I.	405
faucium	I.	404
gangraenosa	I.	407
laryngea	I.	409
maligna	I.	407
membranacea	I.	411
oedematodes	I.	405
parotidea	I.	395

	Band.	Seite
Angina pharyngea	I.	407
pectoris, n. Heberden	II.	583
— nach Selle	I.	427
phlegmonodes	I.	405
polyposa	I.	411
putrida	I.	407
serosa	I.	405
strangulatoria	I.	411
stridula	I.	411
suffocatoria	I.	411
tonsillaris	I.	404
trachealis	I.	410
ulcerosa	I.	407
uvularis	I.	404
Angiometritis	I.	529
Animi deliquium	II.	703
morbi	II.	764
Anthrax	II.	209
Anuria	II.	135
Aphthae	II.	210
Apoplexia	II.	679
pulmonum	II.	12
Arachnitis	I.	379
spinalis	I.	390
Arquatus morbus	II.	341
Aridura	II.	283
Arsenikvergiftung	II.	727
Arterienentzündung	I.	340
Arthralgia	I.	580
Arthritis	I.	580
Ascites	II.	402

	Band.	Seite
Asphyxia	II.	702
Assimilationskrankh.	II.	281
Asthenopyra	I.	108
Asthma	II.	635
acut. infant Millar.	II.	638
adultorum	II.	635
caducum	II.	635
convulsivum	II.	583
dolorificum	II.	583
nocturnum	II.	678
spasmodicum	II.	635
Asturische Rose	II.	257
Atrabilarius morbus, s. Febr. atrabilaria u. Morb. niger.		
Atrophia	II.	283
glandularis	II.	308
neonatorum	II.	308
nervosa	II.	313
Aurigo	II.	341
Ausfahren, rothes	II.	188
Aussatz	II.	251
Ausschwitzung, plast.	I.	330
seröse	I.	329
Aussonderungskrankh.	II.	51
Auswüchse	II.	161
hornartige	II.	273
Auszehrung	II.	283

B.

	Band.	Seite
Ballismus	II.	632
Barbadosfieber	I.	163
Bauchfellsentzündung	I.	538
Bauchfluss, eitriger u. jauchigter	II.	91
wässerigter	II.	87
Bauchspeicheldrüsenentzündung	I.	511
Bauchwassersucht	II.	402
Bauchweh	II.	598
Bauernwetzel	I.	393
Beerschwämme	II.	267
Bildungskrankheiten	II.	281
Bilis in praecordiis	II.	81
Bilis suffusio	II.	341
Blähungsbeschwerden	II.	440
Blase, s. Harnblase		
Blasen	II.	160
Blasenausschlag	II.	206
Blasenfieber	II.	206
Blasengrind	II.	200
Blasenhämorrhoiden	I.	653
Blätterchen	II.	159
Blattern	II.	256
falsche	I.	309
modificirte	I.	268
schwarze	II.	754
Blaue Krankheit	II.	354
Blauer Husten	II.	644
Blausucht	II.	354
Bleichsucht	II.	348
Bleikolik	II.	730
Bleivergiftung	II.	730
Blennorrhoea urethral.	II.	115
Blödsinn	II.	795
Blutandrang	I.	634
Blutanhäufung	I.	630
Blutbrechen	II.	16
Blutfleckenkrankheit	II.	360
Blutfluss	II.	1
Blutharnen	II.	21
Bluthusten	II.	11
Blutmaal	II.	277
Blutspeien	II.	11
Blutschwär	II.	209
Blutschwamm	II.	536
Blutsturz	II.	2
Blutüberfüllung	I.	630
Blutung	II.	1
Branchus	I.	619
Brand, heisser, kalter	I.	335
Bräune	I.	405
häutige, pfeifende, polypöse	I.	411
Brechdurchfall	II.	737
Brennfieber, westind.	I.	154
Bronchitis	I.	427
Bronchorrhagia	II.	12

	Band.	Seite
Brustbräune	II.	583
Brustfellsentzündung	I.	456
Brustnervenschmerz	II.	583
Brustwassersucht	II.	396
Bubonen	II.	460
Bubonenpest	I.	314
Bulamfieber	I.	160
Bulimia	II.	77
Bulimos	II.	77
Bullae	II.	160

C.

	Band.	Seite
Cachexia	II.	281
virginea	II.	348
Caduca passio	II.	616
Caducus morbus	II.	616
Cancer	II.	526
aquaticus	II.	362
Carbunculus	II.	209
Cardialgia	II.	583
Cardiogmus	II.	583
Carditis	II.	466
Carebaria	II.	573
Caries	I.	341
Catalepsia	II.	699
Catamenia, profusa	II.	25
suppressa	II.	152
Catarrhalfieber	II.	55
Catarrhus u. s. Arten	I.	618
suffocativus	I.	427
Catoche	II.	699
Causus	I.	154
tropicus	I.	163
Cayenne, morbus ruber	II.	258
Cephalagra	I.	582
Cephalalgia	II.	573
Ceratiasis	II.	273
Cerealis morbus	II.	735
Chanker	II.	459
Chicot, mal de	II.	487
Chiragra	I.	582
Chloasma	II.	270
Ephelis	II.	269
Chlorosis	II.	348
Cholecystitis	I.	498
Cholepyra	I.	154
Cholera - morbus	II.	737
Choleratyphoid	II.	749
Cholerine	II.	739
Chorda	II.	116
Chorea St. Viti	II.	632
Choreomania	II.	632
Circinus	II.	203
Clavus	II.	573
Coeruleus morbus	II.	354
Colica	II.	598
saturnina	II.	730
Comedones	II.	215
Comitialis morbus	II.	616
Congestion	I.	634
Convuls. d. Gebärenden	II.	629
Convulsio cerealis	II.	735
soloniensis	II.	735
Cornua cutanea	II.	273
Coryza	I.	618
Croup	I.	411
Crusta lactea	II.	222
Cyanosis	II.	354
Cynanche	I.	403
parotidea	I.	393
stridula	I.	411
thyreoidea	I.	397
Cystitis	I.	519

D.

	Band.	Seite
Daemonomania	II.	802
Darmblutung	II.	16
Darmentzündung	I.	484
Darmgeschwüre	I.	489
Darrsucht der Greise	II.	320
der Kinder	II.	308
Defluvium capillorum	II.	278
Delirium potatorum, tremens	II.	676
Dementia	II.	705
Dermoceras	II.	273
Diabetes	II.	104
Diaphragmitis	I.	471

	Band.	Seite
Diarrhoea chylosa	II.	92
Diarrhoea ichorosa	II.	91
serosa	II.	87
Difficultas intestinorum	II.	96
Dipsacus	II.	104
Dittmarsche Krankh.	II.	487
Divinus morbus	II.	616
Dolor faciei Fothergill	II.	578
Dothienteritis	I.	484
Durchfall	II.	87
Dyscrasia	II.	284
Dysenteria u. ihre Arten	II.	96
Dysmenorrhoea	II.	152
Dysuria	II.	143
E.		
Ecchymoma	II.	192
Eclampsia infantum	II.	629
parturient.	II.	629
Ecthyma u. seine Arten	II.	200
Eczema u. s. Arten	II.	198
Eicheltripper	II.	116
Eierstockwassersucht	II.	410
Eintägiges Fieber	I.	55
Eiterblase	II.	200
Eiterung	II.	331
Elephantiasis	II.	254
Emesis	II.	662
Emphysema	II.	448
pulmonum	II.	444
Emprostothonus	II.	667
Empyema	II.	460
Encephalitis	I.	379
Encephaloide	II.	536
Encephalomalacia	II.	492
Engbrüstigkeit, krankhafte	II.	635
Englische Krankheit	II.	534
Enteralgia	II.	598
Enteritis	I.	484
Enterorrhagia	II.	16
Entzündliches Fieber	I.	135
Entzündung	I.	525
catarrhalische	I.	618
Entzünd. erysipelatöse	I.	596
phlegmonöse	I.	559
seröse	I.	559
wahre	I.	526
Enuresis	II.	149
Ephelis	II.	269
Ephemera	I.	55
Ephialtes	II.	675
Ephidrosis	II.	62
Epiala	I.	81
Epilepsia	II.	616
Epiploitis	I.	540
Epistaxis	II.	8
Erbrechen	II.	662
schwarzes	I.	163
Erfrieren	II.	706
Erysipelas u. s. Arten	I.	596
pulmonum	I.	445
Zoster.	II.	203
Erythema u. s. Arten	II.	181
Essera	II.	187
Esthiomenos	II.	251
Exanthemata	II.	157
Excrescentia	II.	161
Exostosis	I.	341
Exulceratio	I.	334
F.		
Fallsucht	II.	616
Fatuitas	II.	795
Faulfieber	I.	179
Febris	I.	19
angeiotenica	I.	135
anglica	I.	220
atrabilaria	I.	69
bellica	I.	195
biliosa	I.	154
bullosa	II.	206
carceralis	I.	195
catarrhalis	I.	63
dialeipyra	I.	72
diaria	I.	55
ephemera	I.	55
ex consensu	I.	57

	Band.	Seite
Febris inflammatoria	I.	135
flava	I.	163
gastrica	I.	63
glutinosa	I.	144
hectica	I.	187
hepatica	I.	154
hydrocephalica	II.	386
inflammatoria	I.	135
intermittens	I.	72
— anomala	I.	81
— comitata	I.	82
— duplex	I.	77
— duplicata	I.	77
— larvata u. i. Arten	I.	85
— maligna	I.	84
— quartana	I.	76
— quotidiana	I.	76
— stipata	I.	82
— subcontinea	I.	83
— subintrans	I.	83
— tertiana	I.	76
— triplex	I.	77
lactea	I.	63
lenta, hectica	I.	187
lymphatica	I.	144
malign. bil. Americae	I.	163
maligna lenta	I.	108
miliaris	I.	195
morbillosa	I.	244
mucosa	I.	144
nervosa u. ihre Arten	I.	108
nosocomialis	I.	195
pestilentialis oriental.	I.	314
petechialis I. 195 u.	I.	179
phlegmatica	I.	144
pituitosa	I.	144
polycholica	I.	154
puerperalis	I.	546
putrida	I.	179
rheumatica	I.	63
rubra	I.	222
saburralis	I.	65
scarlatinosa	I.	222
septenaria	I.	135
Febris soporosa senum	II.	321
sthenica	I.	135
sudatoria	I.	220
traumatica	I.	62
variolosa	I.	256
venosa	I.	150
Feigwarzen	II.	463
Fettsucht	II.	369
Feuermasern	I.	240
Fieber	I.	19
Fieberkuchen	I.	86
Finnen	II.	213
Fischschuppenausschl.	II.	274
Flatulentia	II.	440
Flechten u. i. Arten	II.	226
Flechte von Aleppo	II.	257
Flecken I. 244 u.	II.	159
Fluor albus	II.	123
Flug	II.	190
Fluss	I.	563
weisser	II.	123
Fluxio	I.	563
Fluxus chylosus	II.	92
coeliacus	II.	92
haemorrhoidalis	I.	652
hepaticus	II.	91
spleneticus	I.	508
Fothergillscher Gesichtsschmerz	II.	578
Framboesia	II.	487
Franzosenkrankheit	II.	455
Friesel	II.	195
Fungus haematodes	II.	536
Furfuratio	II.	219
Furor uterinus	II.	602
Furunculus	II.	209

G.

	Band.	Seite
Galactacrasia	II.	75
Galactia depravata	II.	75
Galactorrhoea	II.	70
Galle i. d. ersten Wegen	I.	81
Gallenfieber	II.	154
Gallenmangel	II.	132

	Band.	Seite
Gallenruhr	II.	737
Gallicus morbus	II.	455
Gangraena und ihre Arten	I.	535
pulmonum	I.	445
Gasanhäufung, krankhafte	II.	439
Gastrisches Fieber	I.	63
Gastritis	I.	474
Gastrodynia	II.	585
Gastromalacia	II.	496
Gastrorrhagia	II.	16
Gebärende, Krämpfe derselben	II.	529
Gebärmutterblutfluss	II.	24
Entzündung, Eiterung etc.	II.	527
Krebs	II.	530
Wassersucht u. ihre Arten	II.	407
Gefängnissfieber	I.	195
Gehirnentzündung	I.	379
Gehirnerweichung	II.	492
Gehirnhöhlenwassersucht	II.	386
Geisteskrankheiten	II.	764
Gemüthskrankheiten	II.	764
Gelbes Fieber	I.	165
Gelbsucht	II.	341
Geschlechtstrieb, übermässiger	II.	602
Gesichtsrose	I.	601
Gesichtsschmerz	II.	578
Gicht	I.	580
Glatzmaal	II.	279
Gliederreissen	I.	563
Glossitis	I.	400
Goldader	I.	652
Gonagra	I.	582
Gonorrhoea	II.	110, 115
Graviditas hydatitosa	II.	408
Grimmen	II.	598
Grindflechte	II.	221
Grindkopf u. s. Arten	II.	236
Gürtel	II.	203
Gutta rosacea	II.	214

H.

	Band.	Seite
Haarverlust	II.	278
Haematemesis	II.	16
Haematuria und ihre Arten	II.	21
Haemoptoe, -ptysis	II.	11
Haemorrhagia, -rhoea und ihre Arten	II.	1
Haemorrhagicus maculosus Werlhofii morbus	II.	360
Haemorrhoiden u. ihre Arten	I.	647
Halsentzündung, -weh und ihre Arten	I.	403
Harnabgang, erschwerter	II.	143
unwillkührlicher	II.	149
Harnblasenentzündung, Eiterung etc.	I.	519
Harnmangel	II.	135
Harnruhr	II.	104
Hartleibigkeit	II.	137
Hautausschläge	II.	157
Hauthorn	II.	275
Hautjucken	II.	217
Hautkleie	II.	219
Hautmoos	II.	190
Hautröthe u. i. Arten	II.	181
Hautwassersucht	II.	376
Heimweh	II.	804
Heiserkeit	I.	619
Heisshunger	II.	77
Helminthiasis	II.	541
Hemicrania	I. 567, II.	573
Hepatisation	I.	439
Hepatis hypertophia	II.	305
Hepatitis	I.	496
Hepatomalacia	I.	503
Herculeus morbus	II.	616
Herpes u. s. Arten	II.	226

	Band.	Seite
Herpes Aleppicus	II.	257
Zoster	II.	203
Herzbeutelentzündung	I.	466
wassersucht	II.	399
Herzentzündung, Eiterung etc.	I.	466
Herzgespann	II.	441
Herzklappen-Verknöcherung	II.	659
Herzklopfen, nervöses	II.	658
von organischen Fehlern	II.	659
Hidroa u. s. Arten	II.	198
Hirnentzündung, Eiterung etc.	I.	379
Hirnerweichung	II.	492
Hirnhautentzündung	I.	379
Hitzbläschen	II.	198
Hitzblätterchen	II.	188
Höllisches Feuer	II.	203
Hüftweh	II.	581
Hühnerhusten	I.	411
Hundswuth	II.	757
Husten	I.	620
Hydatiden	II.	542
in der Gebärmutter	II.	408
Hydroa	I.	198
Hydrocardia	II.	399
Hydrocephalus u. seine Arten	II.	377
Hydrometra	II.	407
Hydrophobia	II.	757
Hydrops	II.	374
anasarca	II	376
ad matulam	II.	104
ascites	II.	402
pulmonum cellulare	II.	399
saccatus	II.	405
siccus	II.	440
ventriculorum cerebri	II.	386
Hydrorhachia	II.	392
Hydrothorax	II.	396
Hygrophobia	II.	757
Hyperaesthesia	II.	569
Hyperemesis	II.	662
Hyperpiaenesis	II.	369
Hypertrophia	II.	282
cordis	II.	300
hepatis	II.	305
lienis	II.	307
Hypochondriasis	II.	604
Hysteria	II.	607
Hysteritis	I.	527
Hysteromania	II.	602
Hysterorrhagia	II.	24
Hystriciasis	II.	275

I. J.

	Band.	Seite
Ichthyosis	II.	274
Icterus u. s. Arten	II.	341
Idiotismus	II.	795
Ignis sacer	II.	203
Ileus	II.	599
Iliaca passio	II.	599
Impetigo u. s. Arten	II.	221
Incontinentia urinae	II.	149
Incubus	II	675
Inflammatio	I.	325
Joannis Sti. morbus	II	616
Jonthus acne	II.	215
Irresein	II.	764
Ischiagra	I.	582
Ischias nerv. Cotunni	II.	581
Ischuria u. ihre Arten	II.	143
Isthmitis	I.	404
Juckknötchen	II.	217

K.

	Band.	Seite
Kaltes Fieber	I.	259
Karfunkel	II.	209
Katarrh u. s. Arten	I.	618
Katarrhalfieber	I.	63
Kehlkopfsentzündung	I.	409
schwindsucht	II.	523
Keloide	II.	272
Keratosis	II.	273
Keuchhusten	II.	644

	Band.	Seite
Kindbettfieber	II.	546
Kinnbackenkrampf	II.	666
Kleiengrind u. s. Arten	II.	219
Knochenauswuchs	I.	341
Brand	I.	341
Erweichung	I.	341
Frass	I.	341
Fleischgeschwulst	I.	341
Speckgeschwulst	I.	341
Knötchen	II.	159
Knoten	II.	161
Knotenaussatz	II.	254
Kolik	II.	598
Kopfgrind u. s. Arten	II.	236
Kopfschmerz und seine Arten	I. 384 u. II.	573
Kopfwassersucht und ihre Arten	II.	377
Kotherbrechen	II.	599
Krätze	II.	243
Krämpfe	II.	616
Krebs	II.	525
Kretinismus	II.	796
Kriebelkrankheit	II.	735
Kriegspest	I.	195
Krimmische Krankheit	II	258
Krustenflechte	II.	250
Kühpockenimpfung	I.	291
Kupfergesicht, -handel, -nase	II.	214
vergiftung	II.	729

L.

	Band.	Seite
Lactumen	II.	222
Laevitas intestinorum	II.	94
Lähmung	II.	693
Laryngitis	I.	409
Laryngorrhagia	II.	12
Laubflecke	II.	270
Läusesucht	II.	555
Lazarethfieber	I.	195
Leberentzündung, -Eiterung, -Verhärtung	I.	496
Leberflecken	II.	270
fluss	I.	501
Leibgrind u. s. Arten	II.	221
Lendenweh	I.	508
Lenticulae solares	II.	296
Lentigo	II.	269
Leontiasis	II.	255
Lepra u. ihre Arten	II.	251
Leucophlegmatia	II.	376
Leucorrhoea	II.	125
Lichen u. s. Arten	II.	190
Lienis hypertrophia	II.	307
Lienitis	I.	506
Lienteria	II.	94
Lipothymia	II.	705
Lochiorrhagia	II.	32
Lues syphilitica, venerea	II.	455
Luftröhrenentzündung	I.	409
schwindsucht	II.	525
Lumbago	I.	568
Lunaticus morbus	II.	616
Lungenblutung	II.	11
Brand	I.	445
Congestion	I.	645
Emphysem	II.	444
Entzündung, Eiterung etc.	I.	430
Krampf	II.	635
Oedem	II.	399
Schwindsucht	II.	504
Sucht	II.	504
Tuberkeln	II.	504
Lupus	II.	251
Lustseuche	I.	455
Lycanche	I.	405
Lymphangioitis	I.	540

M.

	Band.	Seite
Maal, das dunkle und weisse	II.	252
Macula hepatica	II.	270
Madesis	II.	278

	Band.	Seite
Magenentzündung, -Eiterung etc.	I.	474
Erweichung	II.	495
Krampf	II.	587
Krebs	II.	527
Ruhr	II.	94
Mailändische Rose	II.	257
Malacia cerebri	II.	492
ventriculi	II.	495
Mal rouge von Cayenne	II.	258
Mania	II.	806
Manntollheit	II.	602
Marasmopyra	I.	187
Marasmus senilis	II.	320
Mariscae	I.	650
Markschwamm	II.	536
Marschkrankheit	II.	487
Masern	I.	244
Mastknoten	I.	650
Matrosenfieber	*I.	163
Medorrhoea	II.	123
Medullarcarcinom	II.	536
Mehlhund	II.	210
Mehlkruste	II.	210
Melaena	II.	18
Melancholia	II.	803
Melanose	II.	523
Meningitis	I.	379
Menorrhagia	II.	25
Menostasia	II.	152
Menstruatio difficilis	II.	152
Mentagra	II.	231
Mesaraische Drüsenkrankheit	II.	308
Mesenteritis	I.	541
Meteorismus	II.	442
Metritis	I.	527
Metrorrhagia und ihre Arten	II.	24
Mictus cruentus	II.	21
Migrän	I.	567
Milchfieber	I.	63
Fluss	II.	70
Mangel	II.	129
Milchruhr	II.	92
Schorf	II.	222
Miliaria u. ihre Arten	II.	195
Millars Asthma	II.	638
Milzbrand	II.	754
Milzentzündung, -Eiterung etc.	I.	506
Milzsucht	II.	604
Mitesser	II.	215
Molimina haemorrhoidalia	I.	650
Mollusum	II.	271
Monomania	II.	800
Morbilli	I.	244
Morbus niger Hippocratis	II.	18
Morphaea	II.	252
Mucosus morbus	I.	144
Mumps	I.	393
Mundbluten	II.	10
Mundfäule	II.	361
Mundsöhr	II.	210
Mutterbeschwerde	II.	607
Blutfluss	II.	24
Maal	II.	276
Wuth	II.	602
Myelitis	I.	390

N.

	Band.	Seite
Nachtwandeln	II.	673
Naevus	II.	276
Narrheit	II.	799
Nasenbluten	II.	8
Necrosis	I.	341
ustilaginea	II.	735
Nephritis	I.	512
Nervenentzündung	I.	341
Nervenfieber	I.	108
ansteckendes	I.	195
Nervenkrankheiten	II.	556
Schwindsucht	II.	313
Nesselsucht	II.	185
Nevralgiae	II.	571
Nevralgia cordis	II.	583

	Band.	Seite
Nevralgia facialis	II.	578
ischiadica	II.	581
pectoris interna	II.	583
Nevritis	I.	341
Nierenblutung	II.	21
Entzündung, Eiterung etc.	I.	512
Noctambulatio	II.	673
Noma	II.	362
Nostalgia	II.	804
Notiaeomyelitis	I.	390
Nymphomania	II.	602
O.		
Oaritis	I.	529
Obesitas nimia	II.	369
Obstructio alvi	II.	137
Ochropyra	I.	163
Odontagra	I.	582
Odontalgia	II.	575
Oedema	II.	376
pulmonum	II.	399
Oesophagitis	I.	407
Ohnmacht	II.	702
Ohrendrüsen-Entzündung	I.	393
Omagra	I.	582
Omentitis	I.	540
Ophoritis	I.	529
Ophiasis	II.	279
Opisthotonus	II.	667
Orientalische Pest	I.	314
Osteomalacia	I.	341
sarcoma	I.	341
steatoma	I.	341
Ovarien-Entzündung, Eiterung etc.	I.	529
Ovarienwassersucht	II.	410
Ozaena syphilitica	I.	462
P.		
Paedatrophia	II.	308
Pallor virginum	II.	348
Palpitatio cordis	II.	658
Pancreas-Entzündung, Eiterung, Verhärtung etc.	I.	511
Pancreatitis	I.	511
Papulae	II.	159
Paralysis	II.	693
Paranoiae	II.	764
Paraphimosis	II.	116
Paraphrenitis	II.	471
Parotitis	I.	393
Pechyagra	I.	582
Pellagra	II.	257
Pemphigus u. s. Arten	II.	206
variolodes	I.	309
Pericarditis	I.	466
Peripneumonia	I.	430
Peritonitis	I.	538
puerperalis	I.	546
Pertussis	II.	644
Pervigilium	II.	671
Pest, amerikanische, westindische	I.	163
levantische	I.	314
Pestis occidentalis	I.	163
orientalis	I.	314
Petechiae, Peticulae u. ihre Arten	II.	192
Pharyngitis	I.	407
Phimosis	II.	116
Phlegmasia, -mone	I.	325
alba dolens	I.	555
lactea	I.	555
Phlegmopyra	I.	144
Phlogopyra	I.	135
Phlogosis	I.	325
Phlyzacium	II.	200
Phrenitis	I.	379
Phthiriasis	II.	555
Phthisis	II.	283
hepatica	I.	501
laryngea	II.	523
meseraica	I.	541
pancreatica	I.	511
pituitosa	II.	504

	Band.	Seite
Phthisis pulmonalis	II.	504
renalis	I.	514
trachealis	II.	523
tuberculosa	II.	504
uterina	I.	531
Phymata	II.	161
Physconia hepatis	II.	305
lienis	II.	307
Physometra	II.	442
Pians	II.	487
Pituitosus status	II.	84
Pityriasis u. i. Arten	II.	219
Plethora abdominalis	I.	647
localis	I.	630
Pleuresia	I.	456
Pleuritis	I.	456
spuria	I.	567
PleuritischesExtravasat	I.	457
Pleuropneumonia	I.	431
Pleurothotonus	II.	667
Plica polonica	II.	262
Pneumatosis	II.	439
Pneumonia, -nitis und ihre Arten	I.	430
notha	I.	427
Pneumonorrhagia	II.	11
Pneumothorax	II.	443
Pnigalion	II.	675
Pnigophobia	II.	583
Pocken	I.	256
Podagra	I.	582
Pollutio	II.	111
Polyaemia	II.	369
Polycholia	II.	81
Polypionia	II.	369
Polysarcia	II.	369
Pompholyx	II.	206
Porzellanfieber	II.	187
Porphyrisma	I.	222
Porrigo	II.	236
Priapismus	II.	602
Profluvia cruenta	II.	1
Prosopalgia	II.	578
Prurigo u. ihre Arten	II.	217

	Band.	Seite
Pseudoerysipelas	I.	599
Psora	II.	243
Psoriasis u. ihre Arten	II.	229
Psychici morbi	II.	764
Ptyalismus	II.	66
Purpura	II.	192, 195
scarlatina	II.	222
Pustulae	II.	160
Pustula maligna	II.	754
Putrescenz des Uterus	I.	533
Pyrexiae	I.	19
Pyrexia haematoseptica	I.	179

Q.

	Band.	Seite
Quecksilbervergiftung	II.	729

R.

	Band.	Seite
Rabies canina	II.	757
Rachenentzündung	I.	404
Radesyge	II.	486
Raphania	II.	735
Raserei	II.	806
Raucedo -itas	I.	619
Regius morbus	II.	341
Reproductionskrankh.	II.	281
Resolutio nervorum	II.	693
Retentio alvi	II.	137
mensium	II.	152
urinae	II.	143
Rhachiagra	I.	582
Rhachitis	II.	334
Rheuma	I.	563
Rheumatismus u. s. A.	I.	563
Rhypia	II.	202
Ritteln	I.	240
Rosa	I.	596
asturica	II.	257
Roseola u. ihre Arten	II.	183
Rossalia, Rossania	I.	222
Rötheln	I.	240
Rother Hund	I. 222 u. I.	240
Rothes Ausfahren	II.	188
Rothlauf	I.	596
der Neugebornen	I.	602

	Band.	Seite
Rubeola	I.	240
Rückendarre	II.	316
Rückenmarksentzünd.	I.	390
Wassersucht	II.	392
Rückenspalte	II.	394
Ruhr	II.	96
S.		
Saburralfieber	I.	68
Sacer morbus	II.	616
Sackbauchwassersucht	II.	405
Säuferwahnsinn	II.	676
Salivatio	II.	66
Samenfluss	II.	110
Sanguifluxus	II.	1
Sanguinus stillicidium	II.	2
Sarcoma medullare	II.	536
Satyriasis	II.	602
Saurer Magensaft	II.	76
Scabies u. ihre Arten	II.	243
Scandinavisches Syphiloid	II.	486
Scarlatina	I.	222
Scelalgia puerperalis	I.	555
Scelotyrbe	II.	632
Schaafshusten	II.	644
Schälblätterchen	II.	188
Schanker	II.	459
Scharbock	II.	357
Scharlachfieber	I.	222
friesel	II.	225
Scheintod	II.	702
Scherlievo	II.	484
Schilddrüsenentzünd.	I.	397
Schlaflosigkeit	II.	671
Schlafreden	II.	673
Schlafwandeln	II.	673
Schlagfluss u. s. Arten	II.	679
Schleimfieber	I.	144
Schleimhaemorrhoiden	I.	651
Schluchzen	II.	661
Schlundentzündung	I.	407
Schmerzkrankheiten	II.	521
Schmutzrufe	II.	202
Schnupfen	I.	618
Schuppenflechte	II.	229
Schutzpocke	I.	291
Schwämmchen	II.	210
Schwangersch., falsche	II.	408
Schwarze Blatter	II.	754
Schweissfieber, engl.	I.	220
Schwinden e. Gliedes	II.	283
Schwindflechten	II.	190
Schwindsucht	II.	283
Schwitzen, krankhaft.	II.	62
Scirrhus	II.	525
Sclerema neonatorum	I.	604
Scleroderma neonat.	I.	604
Scorbutus	II.	357
Scropheln	II.	~~374~~ 24
Scrophula mesenterica	II.	308
Secretionen, krankhaf.	II.	51
Seekrankheit	II.	664
Seelenkrankheiten	II.	764
Störungen	II.	764
Seitenstich, entzündl.	I.	456
gallichter	I.	444
Serpedo, Serpigo	II.	226
Sialadenitis	I.	593
Sibbens, Siwwens	II.	486
Singultus	II.	661
Skarlievo	II.	484
Sodbrennen	II.	77
Sommersprossen	II.	269
Somnambulismus	II.	673
Sora	II.	187
Spasmi	II.	616
Speicheldrüsenentzünd.	I.	593
Speichelfluss	II.	66
Speiseröhrenentzünd.	I.	407
Spermatorrhoea	II.	110
Sphacelismus cerebri	I.	383
Sphacelus	I.	335
Spili	II.	277
Spina bifida	II.	394
Splenitis	I.	506
Stachelschweinmenschen	II.	275

	Band.	Seite
Starrkrampf	II.	666
Starrsucht	II.	699
Status biliosus	II.	81
pituitosus	II.	81
Steckfluss	I.	643
Stenocardia	II.	583
Sthenopyra	I.	135
Sternalgia	II.	583
Stickhusten	II.	644
Stomacace	II.	361
Stomatorrhagia	II.	10
Stranguria	II.	143
Streifmaal	II.	279
Strophulus u. s. Arten	II.	188
Struma inflammatoria	I.	379
Stuhlverstopfung	II.	137
Stymatorrhagia	II.	23
Stymatosis	II.	23
Sudamina	II.	198
Sudatio morbosa	II.	62
Sudor anglicus	I.	220
Suppressio mensium	II.	152
Syam, Maladie de	I.	163
Sycosis menti	I.	215
Synanche	I.	403
Syncope	II.	702
Synocha	I.	135
imputris	I.	135
Synochus ardens	I.	154
biliosus	I.	154
icterodes	I.	163
putris	I.	179
simplex	I.	135
Syphiloiden	II.	484
Syphilis	II.	455

T.

	Band.	Seite
Tabes	II.	283
dorsalis	II.	316
mesaraica	II.	308
nervosa	II.	313
Tarantismus	II.	632
Tartareus morbus	I.	580
Tenesmus	II.	92
Tetanus	II.	666
Thymiosis	I.	267
Thyreoadenitis	I.	397
Thyreoncus inflammatorius	I.	397
Thyreophyma acutum	I.	397
Tinea u. ihre Arten	II.	236
Tobsucht	II.	806
Tölpel	I.	393
Tracheitis	I.	410
infantum	I.	411
Tracheorrhagia	II.	12
Trichoma	II.	262
Tripper	II.	115
Trismus	II.	666
dolorificus	II.	578
Trommelsucht	II.	440
Truculentus morbus infantum	I.	411
Tuberkelbildung	II.	503
der Lungen	II.	504
Tussis catarrhalis	I.	620
convulsiva	II.	644
ferina	II.	644
strangulatoria	II.	644
suffocans	II.	644
Tympanites	II.	440
Typhomania	I.	201
Typhus	I.	195
abdominalis	I.	108
anthracicus	I.	314
bubonicus	I.	314
contagiosus, europaeus, exanthemat.	I.	195
icterodes, americae	I.	163
mitior	I.	108
sporadicus	I.	108

U.

	Band.	Seite
Unvermögen den Harn zu halten	II.	149
Uredo	II.	185
Urethrorrhagia	II.	23
Urinblase, s. Harnblase.		

	Band.	Seite
Urinae incontinentia	II.	149
retentio, suppressio	II.	143
Urocystitis	I.	519
Urorrhoea	II.	104
Urschlechten	I.	256
Urticaria u. ihre Arten	II	185
Uteruskrankheiten, s. Gebärmutter.		

V.

Vaccination	I.	291
Valentis St. Morbus	II.	616
Vari	II.	213
Varicellae	I.	309
Variolae u. ihre Arten	I.	256
spuriae	I.	309
Variola vaccina	I.	291
volatica	I.	309
Varioloiden	I.	268
Veitstanz	II.	632
Venenentzündung	I.	340
Venerische Krankh.	II.	455
Venöse Fieber	I.	150
Verflüssigungsentzünd.	I.	326
Vergiftungen	II.	714
m. narcotischen Substanzen	II.	723
mit scharfen Giften	II.	727
mit austrocknenden Giften	II.	730
mit septischen Gift.	II.	731
Verhärtung	I.	330
Verminatio	II.	541
Verruca	II.	271
Verrücktheit, partielle	II.	800
Verschleimung der ersten Wege	II.	84
Verschwärung	I.	334
Verstopfung	II,	137
Vesaniae	II	764
Vesiculae	II.	160
Vigilium morbosum	II.	671
Vitiligo alba	II.	252
Vitiligo hepatica	II.	270
nigra	II.	252
Volvulus	II.	600
Vomica pulmonum	I.	441
Vomitus	II.	662
cruentus	II.	16
marinus	II.	664
Voss	II.	210

W.

Warzen	II.	271
Wasserkopf	II.	377
Wasserkrebs	II.	362
Wasserpocken	I.	310
Wasserscheu	II.	757
Wassersucht	II.	374
Wechselfieber	I.	72
Weichselzopf	II.	262
Weisser Fluss	II.	123
Weisse Geschwulst der Wöchnerinnen	I.	555
Werlhofische Blutfleckenkrankheit	II.	360
Windpocken	I.	273
Windsucht	II.	439
Wundfieber	I.	62
Wurmfieber	I.	66
Wurmkrankheit	II.	541
Wurstvergiftung	II.	732
Wuth	II.	806

Y.

Yaws	II.	487

Z.

Zahnfieber	I.	62
Zahnschmerz	II.	575
Zehrfieber	I.	187
Zellgewebsverhärtung	I.	604
Ziegenpeter	II.	393
Zona	II.	203
Zoster	II.	203
Zungenentzündung	I.	400
Zweiwuchs	II.	334
Zwerchfellsentzündung	I.	471

INHALT
DES ZWEITEN BANDES.

VIERTE KRANKHEITSFAMILIE.

Seite

Die Blutflüsse. 1

FÜNFTE KRANKHEITSFAMILIE.

Die krankhaften Absonderungen.

Erstes Hauptstück: *Von den krankhaften Absonderungen im allgemeinen* 51

Zweites Hauptstück: *Von den einzelnen Arten der krankhaften Absonderungen.* 62

ERSTE ORDNUNG
DER KRANKHAFTEN ABSONDERUNGEN.

Die vermehrten und die der Art nach veränderten Absonderungen 62

Das krankhafte Schwitzen 62

Der Speichelfluss 66

„ Milchfluss 70

Die qualitativ veränderte Milchabsonderung 75

Der saure Magensaft 76

Die vermehrte Gallenabsonderung 81

„ Verschleimung der ersten Wege 84

Der wässerige Durchfall 87

„ jauchige und der eiterige Bauchfluss 91

Die Milchruhr 92

Seite

Die Magenruhr 94
„ Ruhr 96
„ Harnruhr 104
Der Samenfluss 110
„ Tripper 115
„ weisse Fluss 123

ZWEITE ORDNUNG
DER KRANKHAFTEN ABSONDERUNGEN.

Verminderte und unterdrückte Absonderungen . . . 128
Die verminderte Hautausdünstung 128
„ verminderte und die unterdrückte Milchabsonderung . 129
„ verminderte Gallenabsonderung 132
„ verminderte Absonderung der Darmsäfte und des Saftes der Bauchspeicheldrüse 134
„ verminderte Absonderung des Harnes 135

Anhang zu den krankhaften Absonderungen.

Die Hartleibigkeit und die Verstopfung 137
„ Harnverhaltung 143
Der unwillkührliche Harnabgang 149
„ Mangel der monatlichen Reinigung 152

SECHSTE KRANKHEITSFAMILIE.

Die Hautausschläge.

Erstes Hauptstück. *Von den Hautausschlägen im allgemeinen* 157
Zweites Hauptstück. *Von den einzelnen Ausschlagsarten* 180

ERSTE ORDNUNG DER HAUTAUSSCHLÄGE.

Die specifischen fieberhaften Hautausschläge 180

ZWEITE ORDNUNG DER HAUTAUSSCHLÄGE.

Die symptomatischen Ausschläge 181
Erste Gruppe. *Die flüchtigen symptomatischen Hautausschläge* 181
Die Hautröthe (Erythema) 181
Das Röschen (Roscola) 183

	Seite
Die Nesselsucht (Urticaria)	185
„ Hitzblätterchen (Strophulus)	188
Die Schwindflechte (Lichen)	190
„ Petechien (Petechiae)	192
Der Friesel (Miliaria)	195
Die Hitzbläschen (Hidroa u. Eczema)	198
„ Eiterblase (Ecthyma)	200
„ Schmutzrufe (Rhypia)	202
Der Gürtel (Zona)	205
„ Blasenausschlag (Pemphigus)	206
Das Blutschwär und der Karfunkel (Furunkulus et Carbunculus)	209
Die Schwämmchen (Aphthae)	210

Zweite Gruppe *der symptomatischen Ausschläge.*

Die festwurzelnden symptomatischen Hautausschläge	215
„ Finnen (Vari)	215
„ Juckknötchen (Prurigo)	217
„ Hautkleie (Pityriasis)	219
Der Leibgrind (Impetigo)	221
Die Flechten (Herpes)	226
Der Kopfgrind (Tinea)	236

DRITTE ORDNUNG DER HAUTAUSSCHLAGE.

Die specifischen fieberlosen Ausschläge	245
„ Krätze (Scabies)	245
Der Aussatz (Lepra)	251
„ Weichselzopf (Plica polonica)	262
Die Beerschwämme (Thymiosis)	267

VIERTE ORDNUNG DER HAUTAUSSCHLÄGE.

Die unverändert bleibenden ausschlagsartigen Hautfehler	268
Die Sommersprossen (Ephelides)	269
Der Leberfleck (Chloasma hepaticum)	270
Die Warzen (Verrucae)	271
„ Mollusken (Mollusca)	271
„ Keloide	272
Das Hauthorn (Dermoceras)	273
Der Fischschuppenausschlag (Ichthyosis)	274

Seite
Das Muttermaal (Naevus maternus) 276
„ Ausgehen der Haare (Madesis) 278

SIEBENTE KRANKHEITS-FAMILIE.

Die Cachexien und die örtlichen fehlerhaften Bildungsprozesse.

Erstes Hauptstück. *Von den krankhaften Bildungsprozessen im allgemeinen* 281

Zweites Hauptstück. *Von den einzelnen Arten der Bildungskrankheiten* 300

ERSTE ORDNUNG DER BILDUNGSKRANKHEITEN.

Die krankhaft vermehrten Bildungsprozesse 300

„ Substanzvermehrung des Herzens 300
„ „ „ der Leber 305
„ „ „ der Milz 307

ZWEITE ORDNUNG DER BILDUNGSKRANKHEITEN.

Krankhaft verminderte Bildungsprozesse 308

Die Darrsucht der Kinder 308
„ Nervenschwindsucht 313
„ Rückendarre 316
„ Darrsucht der Greise 320

DRITTE ORDNUNG DER BILDUNGSKRANKHEITEN.

Krankhafte Umwandlungen der flüssigen und der festen Theile 324

Erste Gruppe. *Die allgemeinen Mischungsausartungen* . 324

Die Scropheln 324
„ englische Krankheit 334
„ Gelbsucht 341
„ Bleichsucht 348
„ Blausucht 354
Der Scorbut 357
Die Fettsucht 369

Seite

Die Wassersucht 374
„ Windsucht 439
„ Lustseuche 453
„ Syphiloiden 484

Zweite Gruppe. *Die Erweichung einzelner Gewebe* . . 492
Die Gehirnerweichung 492
„ Mageuerweichung 495

Dritte Gruppe. *Die Erhärtung einzelner Gewebe* . . 502

Vierte Gruppe. *Die Afterbildungen* 503
Die Tuberkelbildung 503
Die Lungenschwindsucht 504
„ Luftröhrenschwindsucht 523
Die Bildung des Melanosengewebes 523
„ krebshafte Verhärtung und der Krebs 525
Der Markschwamm 536

Fünfte Gruppe. *Die Bildung parasitischer Thiere* . . 541
Die Wurmkrankheit 541
„ Läusesucht 555

ACHTE KRANKHEITS-FAMILIE.

Die Nervenkrankheiten.

Erstes Hauptstück. *Von den Nervenkrankheiten im allgemeinen* 556

Zweites Hauptstück. *Von den einzelnen Arten der Nervenkrankheiten* 571

ERSTE ORDNUNG DER NERVENKRANKHEITEN.

Nervenkrankheiten mit Aeusserung erhöhter Nerventhätigkeit 571

Erste Gruppe. *Krankhafte Empfindungen* 571
Die Sehmerzkrankheiten 571
Das Nervenkopfweh 573
„ Zahnweh 575
Der Gesichtsschmerz 578
Das nervöse Hüftweh 581
Der Brustnervenschmerz 583

Seite

Das Magenweh 587
„ Bauchweh 598
Der übermässige Geschlechtstrieb 602
Die Hypochondrie 604
„ Hysterie 607

Zweite Gruppe. *Die Krämpfe* 616

Die Fallsucht 616
„ eigenthümlichen Convulsionen der Gebärenden . . 629
Der Veitstanz 632
„ Brustkrampf 635
„ Keuchhusten 644
Das nervöse Herzklopfen 658
„ Schluchzen 661
„ Erbrechen 662
Der Starrkrampf 666

Dritte Gruppe. *Von den Nerven ausgehende krankhafte Erregung der geistigen Thätigkeit* 671

Die Schlaflosigkeit 671
Das Schlafwandeln 673
Der Alp 675
„ Säuferwahnsinn 676

ZWEITE ORDNUNG DER NERVENKRANKHEITEN.

Nervenkrankheiten mit verminderter Nerventhätigkeit . . 679

Der Schlagfluss 679
Die Lähmung 693
„ Starrsucht 699
„ Ohnmacht und der Scheintod 702

Anhang zu den Nervenkrankheiten.

Zusammengesetzte Krankheitsformen mit vorwaltender Nervenaffection 714

Die durch Vergiftung entstandenen Krankheiten . . . 714
Vergiftungen durch narkotische Substanzen . . . 723
„ durch scharfe Gifte 727
„ durch austrocknende Gifte 730
„ durch septische Gifte 731

Seite

Die Kriebelkrankheit 735
„ Cholera 737
Der Milzbrand der Menschen 754
Die Hundswuth 757

NEUNTE KRANKHEITS-FAMILIE.

Die Seelenkrankheiten.

Erstes Hauptstück. *Von den Seelenkrankheiten im allgemeinen* 765

Zweites Hauptstück. *Von den einzelnen Arten der Seelenkrankheiten* 795

Erste Gruppe. *Die Geisteskrankheiten* 795

Der Blödsinn 795
Die allgemeine Verwirrtheit 798
„ partielle Verrücktheit 800

Zweite Gruppe. *Die Gemüthskrankheiten* 803

Die Schwermuth 803
„ Wuth 806

Receptformeln 810
Alphabetisches Sachregister von beiden Bänden . . . 825

Seite
Die Kriebelkrankheit 750
„ Cholera 752
Der Milchbrand der Menschen 754
Die Handwurst 757

NEUNTE KRANKHEITS-FAMILIE.

Die Seelenkrankheiten.

Erstes Hauptstück. *Von den Seelenkrankheiten im allgemeinen* 765
Zweites Hauptstück. *Von den einzelnen Arten der Seelenkrankheiten* 783
Erste Gruppe. *Die Geisteskrankheiten* 793
Der Blödsinn 793
Die allgemeine Verwirrtheit 798
„ partielle Verrücktheit 800
Zweite Gruppe. *Die Gemüthskrankheiten* 805
Die Schwermuth 805
„ *Wuth* 806

Receptformeln 810
Alphabetisches Sachregister von beiden Bänden 823

Schi

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Baumgärtner, Karl Heinrich,

Handbuch der speciellen Krankheits- und Heilungslehre mit besonderer Rü
cksicht auf die Physiologie

Bd.: 2

Stuttgart ; Leipzig 1835

Path. 96 d-2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10470633-5